



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

30


15

15

**BIBLIOTECA RICCARDI**

in Modena

S. V/ F. S. N. 2.





QA

35

P985

1749

ARI: =



# ARIMMETICA P R A T I C A

Divisa in quindici Trattati,

C O M P O S T A

DAL P. ALESSANDRO

DELLA PURIFICAZIONE

Cherico Regolare Povero della Madre di  
Dio delle Scuole Pie.

CON L'ARTE DI FAR IL CALENDARIO  
SECONDA EDIZIONE.



I N R O M A M D C C X L I X .

Nella Stamperia di S. Michele a Ripa,  
Per Ottavio Puccinelli.

*Con Licenza de' Superiori.*

*Don. Innocenzo Minieri* *permutavit*  
Digitized by Google

0447

100-443887-100

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

Lib. Com.  
maglione  
2-10-28  
16615

# BENIGNI LETTORI.



A Stampa della presente Opera Arimmetica si deve al nostro Padre Gio: Grisostomo di S. Paolo, decimo Generale delle Scuole Pie, il quale mi chiamò dalla Scuola dell' Abbato di Fiorenza, commune nostra Patria, in Roma all' ufficio di suo Segretario nel secondo Triennio, e volle, che à tempo avanzato andassi ordinando quei scritti di Arimmetica, che per mia cognizione, per sodisfare all' obbligo dell' Istituto, e per mia particolare inclinazione aveva io fatti. Non seppi contradire alla sua benigna autorità, benché lo supplicassi umilmente à volere stampare più tosto un Libro in foglio da esso in lingua latina composto di Arimmetica, mà per essere più speculativo, che pratico non cercando *quæ sua sunt*, preferì i miei a' suoi scritti: tuttavia per la repugnanza, che io aveva di metterli in publico, per non stimarli degni, andava prolungando l' esecuzione di terminarli; & il medesimo sempre più mi stimolava à compirli. Mosso egli finalmente da zelo di fare cosa utile per il nostro Istituto, diede allo Stampatore quella parte di Trattati da me trascritti, e così mi necessitò, mentre quelli si stampavano, dare l' ultima mano agl' altri, che ci mancavano.

Ne' Trattati per lo più ho proceduto per via di domande, e risposte con stile semplice, e facile ad essere inteso da i Giovanetti, a i quali per lo spazio di 25. anni in circa hò insegnato. Nel Trattato de numeri rotti mi sono assai diffuso, perchè hanno maggior difficoltà ad intendersi: si ancora nel moltiplicare, e partire di lire, soldi, e danari, moneta, che quasi per tutte le Città d'Italia si usa, ò almeno in essa, e fuori di essa ancora è diviso lo scudo nelle medesime parti ventessime, e dodicesime, come lo scudo stampe di Roma, d' oro di Fiorenza, di Marcie di Pistoia, del Sole di Lione in Francia &c.

apportando molti modi di operare secondo la pratica Fiorentina, Genovese, e Romana, che si possono stendere, & applicare à qualsivoglia moneta di altro Paese; come porto esempi della moneta Veneziana divisa in 24. grossi, & il grosso in 32. piccioli. Hò abbondato in dare prove alle operazioni, alcune chiamate da me di proporzione, che servono di esercizio agli Scolari, e di sicurezza al Maestro. Di più hò detto la mia opinione circa molti quesiti particolarmente di Compagnie, Meriti, Sconti, Baratti &c. correggendo alcuni errori, e in più copia in materia di Pigioni, Affitti, e Locazioni, secondo mi sono occorsi di osservare nel leggere gl'Autori di Arimmetica, non che io in questo mi ci sia posto di proposito, perche di tutti hò quella stima, che si deve, e in tali correzioni hò avuto la mira di far conoscere la verità à beneficio di altri; e se parerà, che di Nicolò Tartaglia non abbia io parlato con quella venerazione, che merita; ciò si attribuisca all' avere egli cercato di screditare per lo più senza ragione eccellenti Autori, come appare nella sua seconda parte del Trattato dell' estrazioni delle radici, e dell' approssimarsi ad esse. Onde hò stimato bene per difendergli dire contro di esso qualche cosa, benché abbia tralasciato di stampare un' intiera Apologia, che à pro di essi avevo composto per non mostrarmi appassionato verso sì benemerito Autore nelle Matematiche.

In questa Opera hò trattato di tutte le ragioni, e conti Mercantili, che si praticano per quanto hò saputo ricavare da Libri, che hò letto perche non hò avuto mai la pratica in esercizio, se non quella, che hà portato il dovere insegnare nella Scuola, e però farò degno di scusa, se in qualche parte farò ritrovato manchevole. Ho ancora trattato di molte cose, che ai Mercanti non appartengono, ma bensì convengono saperli da un Maestro esposto ad esser ricercato di varj quesiti, ancora di sola curiosità, e questi servono ai Giovanetti d'allettativo per imparare con essi le cose utili, e  
ne-



necessarie . Ho aggiunto molte cose di mia speculazione , come mi dò à credere , le quali rare volte hò notate per mie persuaso à far questo dall' aver ritrovato alcuna volta nei libri ciò che stimavo di mia invenzione . Alcune cose sono sparse per i Trattati levate dal libro latino del P. Gio. Grisostomo sopradetto , & altre suggeritemi , le quali hò trascurato di notare per tema di dargli dispiacere . Devo anche avvertire i lettori, che essendosi tralasciate in alcuni Trattati l' operazioni de numeri stese per non accrescere la spesa della Stampa, sarà avvenuto essere rimasta alquanto oscura l' esplicazione di quesiti , che era resa chiara dalle medesime , benchè si sieno poste , dove si sono stimate opportune .

Io aveva pensiero di accompagnare con questi il Trattato dell' Algebra , ma l'esser cresciuto il Libro di fogli assai, mi hà indotto à riserbarlo ad un altro Libro da stamparsi con l' aggiunta delle regole pratiche cavate da i Libri di Diosanto comentati dal sagace Gaspero Bacheto , e con un Trattato di Geometria pratica , se i Superiori lo permetteranno , & io averò tempo , e comodità di ordinarli .

L' Indice è fatto brevemente delle Materie secondo l' ordine de Trattati , si per non accrescer fogli , si per dare occasione di leggere ne' Trattati stessi le Materie à quelli spettanti .

Tutto il bene , & utile , che da quest' Opera risulterà , si doverà attribuire à quello , per la di cui autorità , e benevolenza verso di me si è stampata , come hò detto sul principio , si come ogni onore , e gloria à Dio , dal quale deriva ogni bene . Vivete Felici .

# ANDREAS A' S. SEBASTIANO

*Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei  
Scholarum Piarum Praepositus Generalis.*

**C**Um Librum, cui titulus, *Arimmetica Pratica* composta dal P. Alessandro della Purificazione, Sacerdote della nostra Religione, duo ex nostris, quibus commissum fuit, recognoverint, ac approbaverint, ut Typis mandetur, si iis, ad quos spectat, ita videbitur, facultatem in Domino concedimus. In quorum fidem &c. Datum Romae in Aedibus nostris Schol. Piar. apud S. Pantaleonem die 12. Januarij 1714.

*Andreas à S. Sebastiano Praepositus Generalis.*

*Julianus à S. Agatha Secretarius.*

Loco ✕ Sigilli

*Reg. fol. 146.*

---

**D'**ordine del Reverendissimo P. Fr. Gregorio Sellari Maestro del Sagro Palazzo Apostolico hò letto l'*Arimmetica pratica* del P. Alessandro della Purificazione delle Scuole Pie divisa in quindici Trattati, e non vi hò trovato cosa veruna, che possa pregiudicare à i dettami della S. Fede, ò de buoni Costumi, anzi la stimo un'Opera profittevole per i professori dell'Abbaco, e de Computisti, e Mercanti, per potere con ogni equità fare i loro conti, e per i Maestri di scuola per potere fondatamente insegnare à i Giovannetti l'arte tanto necessaria di conteggiare. In fede di che con ogni più ossequiosa sommissione faccio alla P. V. Reverendiss. il presente attestato. Roma primo Gennaio 1714.

*Gio: Filippo di S. Antonio Professore d' Arimmetica delle Scuole Pie.*

---

**REIMPRIMATUR,**

Si videbitur Reverendiss. P. Mag. Sac. Palat. Apostol.

*F. M. de Rubeis Archiep. Tarvisi Vicesg.*

---

**REIMPRIMATUR,**

Fr. R. Palombi Mag. Soc. Reverendiss. Patris Sac. Pal. Apost. Mag.

INDI-

# I N D I C E

## B R E V E.

Il Numero significa le Carte.

### TRATTATO PRIMO.

Distinzione Prima . car. 1.

**C** He cosa è Arimmetica . car. 1.  
Da che derivino Arimmetica, & Abbaco . 1.

Inventore dell' Arimmetica . 1.

A che serve, e di quante sorti è . 2.

Che cosa è unità, e numero . 2.

In quante specie si distingue il numero . 2.

Di quante sorti è il numero Cardinale . 2.

Figure à descrivere i numeri . 3.

Numerare, e sua Tavola . 3. 4.

Opinione del Milliet non approvata . 5.

Scriversi numeri detti in voce . 6.

Caratteri Romani rappresentano i numeri . 6.

Distinzione Seconda . car. 7.

**C** He cosa è sommare, e sue Tavole . 7.

Come si sommi quando passa cento . 8.

Sommare al contrario . 8.

Prove diverse . 9. 10. 11. 12. 13.

Dove si fondano le regole del sommare . 12.

Distinzione Terza . car. 14.

**C** He cosa è sottrarre, e sue Tavole . 14.

Come si sottra prestando la decina . 15.

Diversi modi di sottrarre . 16. 17.

Varie prove al sottrarre . 18.

Fondamenti della sottrazione . 19.

Distinzione Quarta . car. 19.

**C** He cosa è moltiplicare . 19.

Tavole per il moltiplicare con la Pitagorica . 20. 21.

Moltiplicare à colonna . 22.

Per Organetto, per Baricocolo, & à Scala . 23.

Moltiplicare à Crocetta, e per Ripiego . 24. 25. 26.

Per tronco, per Quadrato, o Quadrilatero . 27.

Per Gelosia, à Piramide, & à Calice . 28. 29.

Diverse prove . 30. 31. 32.

Prodotto di una medesima figura, &c. 33. 34. 35.

Opinione del Tartaglia circa il numero piano, e numero solido non ammessa . 35. 36.

Pratica del Nepero . 37. 38.

Massime del moltiplicare . 38.

Distinzione Quinta . car. 39.

**C** He cosa è partire, e sue Tavole . 39. 40.

Partire à Colonna, e Tavoleta . 41. 42. 43.

Partire per ripiego, e sua prova . 44.

Partire à Danda, come si fa . 45.

Partire à Danda alla breve, con prova . 47.

Partire detto per Galera, & altri modi . 48. 49.

Prove diverse al partire . 50. 51. 52.

Massime del partire . 52. 53.

TRAT.

## TRATTATO SECONDO.

Distinzione Prima . car. 54.

**C**he cosa , e di quante sorti  
è il Rotto . 54.Numerazione, e valore de' Rot-  
ti . 55.Produrre più rotti uguale ad un  
Rotto . 56.Schifare Rotti, e trovare lo schi-  
satore . 57. 58.

Ridurre Rotti, e traslatarli. 59. 60.

Recar in parte i rotti, ò valutar-  
gli . 60. 61. 62.Infilzare Rotti di Rotti , prova  
del valutarli, ò secondo modo  
di recare in parte . 63. 64.

Innestare Rotti di Rotti . 65

Trovare un numero di parte ali-  
quote diverse quante bisogna-  
no, detto accattare . 66.Pigliare diverse parti di un nu-  
mero . 67.Ridurre Rotti ad un medesimo  
Denominatore , e sue pro-  
ve . 67. 68.

Distinzione Seconda . car. 68.

**C**he cosa, e come si fa il som-  
mare de' Rotti . 68.Sommare Rotti di diverso De-  
nominatore . 69.

Sommare Intieri , e Rotti . 70.

Sommare Monete con prove. 71. 72.

Sommare libbre, once, &amp;c. 72. 73.

Sommare Anni, Mesi, e Gior-  
ni . 73. 74.Sommare Misure di Terreno  
con prove . 74. 75.

Sommare Rotti di Rotti . 75. 76.

Che cosa è sottrarre di Rotti, e  
come si fa . 76.Sottrarre Rotti di diverso De-  
nominatore . 76. 77.

Prove del sōmare col sottrarre. 78.

Sottrarre Rotti di Rotti di mo-  
neta . 79. 80.Di peso , e misura con le pro-  
ve . 81. 82.Sottrarre Rotti di Rotti di di-  
verso Denominatore . 83.

Distinzione Terzo . car. 84.

**C**ome si moltiplica rotto con  
rotto . 84.

Altro modo galante . 84. 85.

Perche il prodotto è minor de'  
rotti . 85. 86.Moltiplicare rotto con numero  
intiero . 86.

Intiero, e rotto con intiero . 87.

Intiero , e rotto con rotto . 88.

Intiero, e rotto con intiero, e rot-  
to . 88.

Falsità di Fr. Luca . 88. 89.

Moltiplicare intieri con rotti di  
rotti . 89.

Rotto di rotti con rotto . 90.

Moltiplicare lire, soldi, e da-  
nari . 91.Moltiplicare per 10. all' in-  
sà . 91. 92. 93.

Prove del 7. e del 9. 93.

Diversi modi di moltiplicare  
lire, soldi, danari, & al-  
tre monete .

Per il 10. all' insà . 93. 94.

Per castelluccio . 95. 96.

Per riduzione . 97.

Moltiplicare spezzato . 97. 98.

Con pigliare in parte . 98. 99. 100.

Altri modi . 101. 102. 103.

Moltiplicare per centesimi . 104.

105.

Distinzione Quarta . car. 160.

**C**ome per rotto si parte il  
rotto . 106. 107.

Come

Come si parte l'intero per rotto . 107.

Come si parte l'intero, e rotto per rotto, e per intero, e rotto . 108. 109.

Quoziente maggiore dell'intero e rotto partito . 110.

Prova del moltiplicare per il partire . 111.

Prove del partire col moltiplicare &c. 112.

Come si partono monete diverse 112. 113.

Distinzione Quinta . car. 113.

**V** Arie risoluzioni sopra i rotti . 113.

$\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{8}$ . di quanti sesti, quarti, terzi, e mezzi costa, e secondo modo . 114.

Quanti soldi, e danari sono  $\frac{1}{2}$ . di lira . 115.

La somma di  $\frac{1}{4}$ . di  $\frac{1}{2}$ . di lira con  $\frac{1}{3}$ . 115.

La somma di  $\frac{1}{2}$ . con  $\frac{1}{3}$ . di 1300. 116.

Levare  $\frac{1}{2}$ . di  $\frac{1}{2}$ . da  $\frac{1}{2}$ . 116.

Levare  $\frac{1}{2}$ . di  $\frac{1}{2}$ . da  $\frac{1}{2}$ . di  $\frac{1}{2}$ . 116.

Trovare due, tre, e quattro numeri, che le parti d' uno sieno tanto, quanto le parti diverse dell' altro . 117. 118.

Massime de numeri rotti . 118.

### TRATTATO TERZO.

De Partitori . cart. 119.

**R** Egola prima de partitori, e come si fa, e sua prova . 119. 120.

Seconda de partitori, e sua prova . 121. fino a 124.

Terza de partitori, e sua prova . 125. fino 127.

Modo del Figatelli laborioso. 128.

Da me facilitato . 129. 130.

Terza de' partitori con scudi, lire &c. 130. 131.

Con libbre, once, danari, e grani . 131.

Cambiare i numeri da moltiplicarsi in moltiplicanti da carte . 132. fino a 136.

Moltiplicare misure di Terreno . 136. a 140.

### Distinzione Seconda.

**D** El partire a danda lire soldi, e danari con un rotto nel partitore . 141.

Superfluità del Pisani . 142.

Partire per canne, e braccia . 142.

Partire per moggia, e staja . 143.

Partire per mesi, e giorni . 143.

Partire per libbre, once, e rotto . 144.

Partire per some, barili, e fasci . 144.

Partire per pezze, soldi, e danari . 145.

Partire per moggia, sacca, staja, e rotto . 145.

Partire per once, danari, e rotto . 146.

Partire per misure di Terreno . 146.

Partire per anni, mesi, giorni, e rotto . 147.

Partire per once, danari, e grani . 147.

### Distinzione Terza.

**P** Artire per apporre, e che cosa sia . 148.

Partire per apporre come si opera alla lunga, & alla breve . 148. 149.

Diverse prove, e prova con sommare . 150. 151.

Partire lire, soldi, e danari per lire

b

<i>lire soldi, e danari per trovare libbre, &amp; onze.</i>	151.	<i>renza tra loro da carte .</i>	175.
<i>Per trovare pezze, soldi, e danari.</i>	152.	<i>fino a car.</i>	186.
<i>Per trovare libbre, onze, danari, e grani.</i>	153.	<i>Del contrarsi le monete a mani da 187. a 191.</i>	
<i>Secondo modo di partire per apporre.</i>	154.	<i>Monete, pesi, e misure di Roma.</i>	192.
<i>Avvertenza per questo modo.</i>	155.	<i>Commutazione di monete di Roma.</i>	da 193. a 194.
<i>Partire alla lunga, &amp; alla breve.</i>	155. 156. 157.	<i>Distinzione Sesta.</i>	
<i>Se si può usare con numeri di mercanzia.</i>	158.	<b>S</b> <i>ommare rotti astronomici.</i>	195. 196.
<i>Distinzione Quinta.</i>		<i> sottrarre rotti astronomici .</i>	197.
<b>C</b> <i>He cosa è Tara per 100., come si levi .</i>	159.	<i>Moltiplicare rotti astronomici.</i>	197. 198.
<i>Come si fa la prova.</i>	160.	<i>Partire rotti astronomici .</i>	199. 200. 201.
<i>Tara ad un tanto per migliaro.</i>	160.	<i>Estrazione di radice quadra, e cuba da' rotti astronomici.</i>	201. 202.
<i>Altro modo di levare la Tara.</i>	161.	<b>T</b> <i>RATTATO QUARTO</i>	
<i>Tara per la seta.</i>	162.	<i>Distinzione Prima.</i>	203.
<i>Valutazioni con Tara in due modi con tarare la mercanzia, a il prezzo, da carte.</i>	162. a 166.	<b>C</b> <i>He cosa è regola del Trè.</i>	203.
<i>Dono mercantile, e differenza dalla Tara.</i>	167.	<i>Ordine de' numeri per operare.</i>	204.
<i>Valutazioni con dono in due modi.</i>	168.	<i>Modi quattro per trovare il quarto numero proporzionale.</i>	205. 206. 207.
<i>Provisione per 100. e che cosa sia.</i>	169.	<i>Industrie, che facilitano l'operazione.</i>	207. 208.
<i>Provisione ad <math>\frac{2}{3}</math>. per 100. alla lunga, &amp; alla breve.</i>	170.	<i>Diverse prove alla regola del Trè.</i>	209. 210. 211.
<i>Provisione di <math>\frac{2}{3}</math>. per 100. alla lunga, &amp; alla breve.</i>	171.	<i>Regola del Trè col roto nel primo luogo.</i>	213. 214.
<i>Altra sorte di provisione.</i>	173. 174.	<i>Col roto nel secondo luogo.</i>	215. 216.
<i>Distinzione Quinta. car.</i>	174.	<i>Col roto nel terzo luogo.</i>	217. 218.
<b>M</b> <i>Onete, pesi, e misure di Fiorenza.</i>	174. 175.	<i>Col roto nel primo, e secondo luogo.</i>	219. 220.
<i>Commutazione di monete di Fiorenza a tra loro da carte.</i>		<i>Col roto nel primo, e terzo luogo.</i>	221. 222.
		<i>Col roto nel secondo, e terzo luogo.</i>	223. 224.
		<i>Col</i>	



*Col retto in tutti li tre luoghi.*  
da 225. d 228.

*Regola del Tre con lire, soldi,  
e danari da carte 229. d c. 233.*

*Regola del Tre con scudi, e du-  
cati &c. 234. 235.*

*Modo speciale per trovare il  
quarto proporzionale. 235. 236.*

Distinzione Seconda.

**R** *Regola del Tre roverscia  
differisce dalla dritta. 237.*

*Come si conosce la domanda di  
tal regola. 238.*

*Questi diversi da carte 238. si-  
no a car. 246.*

Distinzione Terza.

**D** *ella regola del Tre com-  
posta, detta del cinque.*  
246.

*In che consiste, & ordine de'  
numeri. 246.*

*Sua operazione, e per regola  
del tre replicata. 247.*

*Diverse prove da car. 248. si-  
no a car. 250.*

*Diversi questi da car. 250. si-  
no a car. 254.*

*Opinione circa il quesito del  
Zucchetta. 254.*

*Quesito del Ciacchi male sciol-  
to. 255.*

*Quesito di 11. termini. 256.*

Distinzione Quarta.

**D** *ella regola del Tre compo-  
sta roverscia. 256.*

*Come si distingue dalla dritta. 256.*

*Tre modi del Zucchetta per co-  
noscerla. 257.*

*Terzo modo migliore degl' al-  
tri. 258.*

*Osservazione certa per conosce-  
re tal regola. 258.*

*Disposizione de' numeri per ope-  
rare. 259.*

*Che operazioni si fanno. 260. 261.*

*Prova di questa regola. 261.*

*Diverse domande da carte. 262.  
d 268.*

*Baratti risolti per questa rego-  
la. 262.*

*Domande di 11. termini. 269. 270.*

Distinzione Quinta.

**D** *ella regola del Tre multi-  
plice. 270.*

*Che cosa sia, e chi ne ha tratta-  
to. 270.*

*Se è necessaria, & a quali con-  
ti serve. 271.*

*Ordine de' numeri per operare. 271.*

*Come si opera, e sue avverten-  
ze. 272. 273.*

*Prove diverse per regole del  
Tre distinte, e con rivoltare  
domanda. 273. 274.*

*Avvertenza per i numeri di  
proporzione. 275.*

*Diverse domande con prove da  
275. d 283.*

*Cambj, e ritorni con provvisio-  
ni. da 283. d 285.*

*Spacci in Fiera per questa re-  
gola. 285. 289.*

*Ragguagli di piazze da. 289. 294.*

*Cambio doppio, e ritorno &c.  
294. 296.*

*Censi, meriti, e sconti. 296. 299.*

*Corrispondenza di misure.  
299. 300.*

T R A T T A T O Q U I N T O.

**D** *E' guadagni, e perdite  
per 100. 301.*

*Quesiti di compre, e vendite con  
guadagno perdita con sue pro-  
ve da carte 301. d carte 305.*

# I N D I C E

Guadagni , e perdite per 100.  
 l' anno . *Ida* 305. d 311.  
**TRATTATO SESTO.**  
**D**E' baratti , che cosa sia bar-  
 ratto, e di quante forti. 311.  
 Baratti semplici uguali , e pro-  
 ve . 311. 314.  
 Baratti con guadagno per 100.  
*da* 314. d 316.  
 Sapere la perdita per 100. 316.  
 Baratti con mercanzia, e con-  
 tanti . 317. 318.  
 Baratto del Ciacchi corretto. 319.  
 Altri baratti con modi diver-  
 si . 319. 322.  
 Baratto del Zucchetto corret-  
 to . 322. 323.  
 Altri baratti diversi . 323. 328.  
 Baratto di F. Luca , opinione  
 falsa del Tartaglia circa tal  
 baratto . 329. 330.  
 Errore maggiore dell' Unicornio  
 circa l' istesso . 330. 332.  
 Baratto di F. Luca sciolto per  
 Algebra , e regola del cinque  
 roverscia , e rivoltato , con  
 varie prove . 333. 334.  
 Altri baratti di F. Luca sciolti  
 come da esso, del Tartaglia,  
 e dall' Unicornio . 335.  
 Apri Baratti con sue prove .  
 335. 336. 337.  
 Baratto con scont o a capo d' an-  
 no . 337.  
 Altri baratti differenti in 338.  
 d 341.  
**TRATTATO SETTIMO.**  
 Distinzione prima  
 De' meriti , e sconti .  
 semplici . 342.  
**C**he cosa sia merito, e sconti .  
 342.

Sconto a modo di merito si ri-  
 prova . 343.  
 Non seguitato in Firenze da-  
 gl' intendenti . 344.  
 Contraddizione del Ciacchi .  
 344. 345.  
 Domande di meriti per abbrevi-  
 are operazioni . 346.  
 Modo di sapere il tempo di rad-  
 doppiare il capitale . 347.  
 Meriti , e sconti semplici per  
 prova di diverso tempo da  
 carte 347. d 351.  
 Raddoppiamento di capitale , e  
 guadagno di sua determinata  
 parte , e sua ragione . 352.  
 Modo di scontare di F. Luca più  
 lungo . 352. 353.  
 Merito con paghe uguali , e sal-  
 do . 354.  
 Avvertimento, & industria per  
 i meriti . 354. 355.  
 Avvertimento per li sconti .  
 355. 356.  
 Inganno del Tartaglia . 356.  
 Errore del Forestani . 357.  
 Distinzione Seconda .  
**D**elli meriti , e sconti a ca-  
 po d' Anno . 357.  
 Sei diversi modi d' operare .  
 358. 360.  
 Cinque modi per li sconti .  
 360. 362.  
 Meriti, e sconti a capo d' Anno .  
 362. 363.  
 Opinione di F. Luca , & al-  
 tri Autori circa i meriti a ca-  
 po di anno d' anni spezzati  
 nell' operare . 363.  
 Altro modo con sua ragione .  
 364.  
 Diversa opinione del Tartaglia

- glia, & altri Autori circa i meriti à capo di anno di anni non intieri. 364.  
 Sconto à capo d' anno secondo F. Luca. 364. 365.  
 Secondo il Tartaglia, & altro modo. 365. 366.  
 Altre domande risolte secondo F. Luca, e secondo il Tartaglia. 366. 367.  
 Merito di F. Luca non bene concluso. 367. 368.  
 Regola falsa del 72. da trovare il tempo per raddoppiare il capitale. 368. 369.  
 Modi di trovare il tempo mercantile da raddoppiarsi il capitale. 369. 370.  
 Comporre Tavole per i meriti, e sconti à capo d' anno in due modi. 370. 372.  
 A che servono le dette Tavole. 372.  
 Come si adoprano. 373.  
 Per g<sup>li</sup> anni non intieri ne' meriti. 373.  
 Per g<sup>li</sup> anni non intieri ne' sconti. 374.  
 Merito à capo d' anno con l'estrazione di radice quadra. 375.  
 Con estrazione di radice cuba. 376.  
 Sconto con estrazione di radice cuba. 376. 377.  
 Trovare capitale, ragione, e tempo. 377. 378.  
 Errore di F. Luca emendato. 379.  
 Meriti con radice qq. in due modi. 379.  
 Caso dell' Unicornio brevemente sciolto. 380.  
 Questo avuto in Roma di ra-  
 dice relata, e prova. 380.  
 Questo, che si scioglie per Algebra. 381.  
 Questo avuto in Fiorenza, e sua prova. 382.  
 Distinzione Terza.  
**P**igioni, locazione, & Affitti. 383.  
 Pigione di Casa errore di F. Luca emendato. 383.  
 Altri del Forellani emendati. 383. 384.  
 Altro del Ciacchi emendato, e sua prova. 384. 385.  
 Affitto del Figatelli altrimenti sciolto. 385.  
 Affitto con sconto dell' Unicornio emendato. 385. 386.  
 Affitto di F. Luca dall' Unicornio falsato. 387.  
 Pigioni con frutto à capo d' anno per Algebra. 387. 388.  
 Questo ambiguo del Zucchetto con prova. 389.  
 Caso del Tartaglia falsamente concluso con due modi di bene operare. 390.  
 Si prova la falsità con un' altro. 391. 392.  
 Si prova con altra domanda. 392. 393.  
 Altro caso simile con sua prova. 393.  
 Pigione con danaro anticipato, che meriti semplicemente in due modi. 395.  
 Errore di F. Luca, e del Paganini. 396. 397.  
 Errore del Zucchetto, e del Pisanini, si prova. 397. 398.  
 Errore per un' altro verso del Figatelli. 398.  
 Si

# I N D I C E

<p><i>Si emenda, e si prova doppiamente.</i> 399.</p> <p><i>Regola di modo per trovare la pigione di due anni, e di tre anni per Algebra.</i> 399. 400.</p> <p><i>Affitto per regola di modo, e per Algebra.</i> 400. 401.</p> <p><i>Per doppia falsa posizione.</i> 401.</p> <p style="text-align: center;"><b>Distinzione Quarta.</b></p> <p><b>M</b> <i>Odo di saldare ragioni mercantili.</i> 402.</p> <p><i>Trovare differenze di tempo.</i> 402. 403.</p> <p><i>Saldi col merito in più modi.</i> 404. 405.</p> <p><i>Saldo in due modi differenti.</i> 406. 407.</p> <p><i>Saldo col merito à capo d'anno.</i> 407. 408.</p> <p><i>Saldo con lo sconto.</i> 408. 409.</p> <p><i>Recare più pagamenti di diverso tempo ad un solo in un dì con sue prove, e domande diverse.</i> da 409. 417.</p> <p><i>Modo di tirare in resto una ragione d'una, ò più partite di credito, e debito con assegnare il giorno nel quale si deve notare in libro per contraccambiare nel tempo il merito non pagato domande diverse da carte 417. fino à 427.</i></p> <p style="text-align: center;"><b>TRATTATO OTTAVO</b></p> <p><b>D</b> <i>Elle compagnie mercantili.</i> 428.</p> <p><i>Che cosa è compagnia, e per qual regola si fa, mercanzia, e tempo.</i> 428.</p> <p><i>Da i capitali trovare guadagni con sue prove, &amp; al contrario.</i> 428. 430.</p> <p><i>Trovare la perdita in due mo-</i></p>	<p><i>di.</i> 430.</p> <p><i>Trovare à che ragione uno guadagni.</i> 430. 431.</p> <p><i>Trovare il prezzo di mercanzia, e sua prova.</i> 431. 432.</p> <p><i>Distribuire guadagno, quando le parti sono più, ò meno del tutto.</i> 432. 433.</p> <p><i>Quando i capitali non sono distinti.</i> 433.</p> <p><i>Stima della persona per il guadagno.</i> 434.</p> <p><i>Compagnie con diverse condizioni.</i> 434. 435.</p> <p><i>Capitale, e guadagni confusi.</i> 436.</p> <p><i>Trovare il prezzo della lana, e dello scudo d'oro.</i> 436.</p> <p><i>Compagnie con diverse condizioni.</i> 437. 438.</p> <p><i>Compagnie diverse col tempo.</i> 438. 441.</p> <p><i>Compagnie col tempo, &amp; à ragione per 100.</i> 442.</p> <p><i>Compagnia di F. Luca oppugnata dal Tartaglia, e sue soluzioni.</i> da 442. à 445.</p> <p><i>Compagnia con difficoltà tralasciata dal Tartaglia, e sue soluzioni.</i> da 445. à 447.</p> <p><i>Compagnia simile di F. Luca, e sue soluzioni.</i> 447.</p> <p><i>Compagnia di F. Luca altrimenti conclusa.</i> 448.</p> <p><i>Compagnia di F. Luca riprovata dal Tartaglia, e varie soluzioni.</i> da 448. à 451.</p> <p><i>Compagnia del Griminelli altrimenti conclusa.</i> 452. 453.</p> <p><i>Compagnia simile in più modi.</i> 454.</p> <p><i>Compagnia del Zucchetto, e del Pisa-</i></p>
---	--

*Pisani altrimenti conclusa.*  
da 455. a 457.  
*Altra simile compagnia.* 457. 459.  
*Distribuzione falsa del Ciacchi.*  
459. 460.  
*Compagnia del Tartaglia, e di  
altri corrette a causa del  
tempo.* da 460. a 464.  
*Avvertenze per dette compa-  
gnie.* 465.  
*Errore del Forestani.* 465.  
*Soluzione del Forestani non de-  
terminata.* 467.  
*Da me determinata ad una ri-  
sposta.* 468.  
*Compagnia di F. Luca altri-  
mente conclusa dal Tartaglia,  
e da me per equazione.*  
469. 470.  
**Distinzione Seconda**  
**Delle Soccite** 470.  
**C** *He cosa sia Soccita.* 470.  
*Questiti per il pascolo del  
bestiame.* 470. 471.  
*Questiti per ridurre ad un termi-  
ne le foccite.* 471. 473.  
*Soccita del Zucchetto, e doppia  
errore.* 473. 474.  
*Emendazioni, e prova della  
passata.* 473. 474.  
*Soccita con patti chiari.* 475.  
*Soccita del Tartaglia altrimenti  
conclusa.* 475. 476.  
*Soccite prolungate dopo il ter-  
mine.* 476. 477.  
*Soccita del Forestani, e varie  
conclusioni.* 478. 480.  
*Soccita dell' Unicorn, e varie  
soluzioni.* 481.  
*Soccita della Sfortunati stimata  
falsa dal Tartaglia, varie  
divisioni probabili.* 482. 484.

*Soccita del Zucchetto approva-  
ta dal Bassi, riprovata dal Fi-  
gatelli con sua soluzione, ma  
non sempre giusta &c.* 484. 485.

## TRATTATO NONO

**D** *Ella regola d' Alligazione.*  
486.  
*A' chi sia necessaria.* 486.  
*Distinguere i metalli in un pez-  
zo per la lega.* 486.  
*Domande diverse per far moneta  
e sue prove.* 486. 489.  
*Altre domande per trovare la  
lega.* 489. 490.  
*Altre domande diverse da* 490.  
494.  
*Campana di metalli di vario  
prezzo.* 494.  
*Alligazione dell'oro.* 495.  
*Diverse domande con sue prove*  
da 495. a 500.  
*Alligazione d' altre cose da* 500.  
504.  
*Domande di curiosità.* da 504.  
507.  
*Domande di F. Luca di diversi  
animali.* 507.  
*Altra del Tartaglia, e sua con-  
tradizione.* 508.  
*Domanda risoluta per doppia  
posizione.* 509.  
*Varie soluzioni a quella del  
Tartaglia.* 509. 510.  
*Diverse monete a comporre sac-  
chetti.* 510. 511.  
**TRATTATO DECIMO**  
**D** *El cambio Reale per let-  
tere.* 513.  
*Persone, che intervengono nel  
cambio.* 513.  
*Come s' intendono rimettere, e  
trarre.* 513.  
Diver-

<i>Diversi avvertimenti .</i>	514.	<i>Domande 8. di cambj. da 555. a</i>	556.
<i>Firenza come cambia , e con</i>		<i>Genova , e sue monete .</i>	556.
<i>quali Piazze .</i>	515. 516.	<i>Ridurre soldi correnti in soldi</i>	
<i>Domande 36. di cambj, e ricam-</i>		<i>di cartulario .</i>	557.
<i>bj . da 516. a 526.</i>		<i>Genova con quali Piazze cam-</i>	
<i>Roma ha due sorti di moneta. 526.</i>		<i>bia .</i>	557.
<i>Come s' intende l' Aggio di Ro-</i>		<i>Domande 12. di cambj . da 557.</i>	
<i>ma .</i>	526.		a 560.
<i>Come si riducono li scudi stam-</i>		<b>TRATTATO UNDECIMO.</b>	
<i>pe in scudi correnti, &amp; al con-</i>		<b>D</b> <i>Eragnagli di Piazze</i>	
<i>trario .</i>	526. 527.	<i>mercantili .</i>	561.
<i>Roma con quali Piazze cambia</i>		<i>Come si ragguagliano le Piazze</i>	
<i>domande 12. di cambj . da</i>		<i>con la nota de prezzi di Fie-</i>	
	528. a 532.	<i>ra .</i>	561.
<i>Fiera nel Genovesato .</i>	532.	<i>Che cosa sia ragguaglio . come si</i>	
<i>Con quali Piazze cambia .</i>	532.	<i>opera , e come s' intavolano i</i>	
<i>Domande 15. di cambj . da</i>		<i>numeri .</i>	562.
	532. a 538.	<i>Nel primo ragguaglio si dichia-</i>	
<i>Venezia ha due sorti di Ducati</i>		<i>ra l' operazione , &amp; in che</i>	
	539.	<i>consiste l' utile .</i>	562. 563.
<i>Differenza del Ducato di Ban-</i>		<i>Il secondo ragguaglio è danno-</i>	
<i>co dal Ducato fuor di Banco, e</i>		<i>so .</i>	564.
<i>loro riduzione .</i>	539.	<i>Avvertimento per la provisione</i>	
<i>Venezia con quali Piazze cam-</i>		<i>da aggiungersi , &amp; levarsi .</i>	564.
<i>bia .</i>	539.	<i>Prova con variarsi il ragguaglio</i>	
<i>Domande 13. di cambj . da 539.</i>		<i>in tre modi .</i>	564.
	a 543.	<i>Esempi 22. di ragguagli risol-</i>	
<i>Livorno , e sua moneta .</i>	543.	<i>ti molti per regola multipli-</i>	
<i>Con quali Piazze cambia .</i>		<i>ce . da 562. a 572.</i>	
	544.	<i>Delle Commissioni de Cambi .</i>	
<i>Domande 10. di cambi . da</i>		<b>C</b> <i>He cosa sia commissione , e</i>	
	544. a 546.	<i>due sorti .</i>	572.
<i>Napoli , e sue monete .</i>	546.	<i>Limitazione di prezzo in quat-</i>	
<i>Con quali Piazze cambia .</i>	547.	<i>tro modi .</i>	572.
<i>Domande 8. di cambj . da 546.</i>		<i>Limitazione di tempo , e quanti-</i>	
	548.	<i>ta .</i>	573.
<i>Milano , e sue monete .</i>	549.	<i>Prima commissione, suoi raggua-</i>	
<i>Con quali Piazze cambia .</i>	549.	<i>gli , e quattro avvertenze per</i>	
<i>Domande 14. di cambj da 550.</i>		<i>conoscere l' utilità .</i>	573.
	a 554.	<i>Come si prova la commissione</i>	
<i>Bologna , e sue monete .</i>	554.	<i>con eseguirsi .</i>	574.
<i>Con quali Piazze cambia .</i>	554.		Ese-



<i>Eseguita per regola moltiplice .</i>	<i>Di prezzo per braccio di panno .</i>
574. 575.	603.
<i>Seconda commissione di primo modo .</i>	<i>Di guadagno di compra .</i>
575.	604.
<i>Provisione ne'ragguagli di <math>\frac{2}{3}</math> per cento .</i>	<i>Di quadrini, che uno ha .</i>
576.	604.
<i>Documenti per detta Provisione .</i>	<i>Di danari nel principio del gioco .</i>
577.	604.
<i>Commissione netta di spese .</i>	<i>Di scudi ereditati .</i>
577.	605.
<i>Eseguita per prova, e nota d'avviso .</i>	<i>Di giuili nel principio del gioco .</i>
578.	605.
<i>Altre commissioni da car .</i>	<i>Di varie misure di panno .</i>
579. d	606.
582.	<i>Di quantità di lire avute .</i>
<i>Commissioni di secondo modo .</i>	<i>Di scudi per compra di Galeffo .</i>
<i>Quando il commissionario dà prezzo stabile con sue prove .</i>	607.
da 582. d 586.	<i>Di danari avuti da trè .</i>
<i>Commissioni di terzo modo .</i>	608.
587.	<i>Di scudi per compra di Corallo .</i>
<i>Regola del Trè roverscia per i ragguagli .</i>	608.
587.	<i>Di ore sonate .</i>
<i>Diverse commissioni . da 587. d</i>	609.
590.	<i>Di debito da pagare .</i>
<i>Commissioni di quarto modo .</i>	609.
590.	<i>Di scudi posti in compagnia .</i>
<i>Due documenti per la provisione di <math>\frac{2}{3}</math> per eseguirle nette di spesa .</i>	610.
590.	<i>Di anni , che uno ha , &amp; errore del Figatelli corretto .</i>
<i>Diverse commissioni . da 590. d 598.</i>	610.
<i>Commissioni d' Autore moderno altrimenti eseguite . da 598. d</i>	<i>Di Grue che volavano .</i>
601.	611.
<b>TRATTATO DUODECIMO.</b>	<i>Di Grue contate .</i>
<i>Delle false posizioni .</i>	612.
<i>Distinazione Prima</i>	<i>Di divisione di scudi .</i>
<b>D</b> <i>Elle posizioni semplici .</i>	612.
602.	<i>Di prezzo di pezze di panno .</i>
<i>Come si ordinano in regola del Trè .</i>	612.
602.	<i>Di guadagno in sicra .</i>
<i>Questi diversi .</i>	613.
<i>Del numero di scolarj .</i>	613.
602.	<i>Di scudi, che trè abbiano .</i>
<i>Di compra , e vendita di vino .</i>	613.
602.	<i>Di scudi , che uno aveva .</i>
<i>Di guadagno per cento .</i>	613.
603.	<i>Di scudi lasciati per testamento .</i>
<i>Di capitale da saperse .</i>	614.
603.	614.
	<i>Di scudi donati .</i>
	614.
	<i>Di scudi di due compagni .</i>
	614.
	<i>Di moneto di varia sorte .</i>
	615.
	<i>Di ducati avuti da trè .</i>
	615.
	<i>Del numero della monete .</i>
	616.
	<i>Questi, ne' quali oltre le posizioni si ricerca l' estrazione di radici .</i>
	617.
	<i>Di libbre vendute .</i>
	617.
	<i>Di scudi spesi in panno .</i>
	617.
	<i>Di lire, che trè abbiano .</i>
	618.
	<i>Di scudi lasciati a luoghi pii .</i>
	618.
	<i>Di due</i>

Di due lati d' un triangolo . 618.  
 De lati d' un rettangolo . 619.  
 De diametri d' un Rombo . 619.  
 Di tempo per empire una Lava-  
 fea . 619.  
 Questi di curiosità senza posi-  
 zione . da 619. a 625.  
**D**istinzione Seconda .  
 Ella doppia falsa posizio-  
 ne . 625.  
 De li questi che portano seco ra-  
 dicali non si possono scia-  
 gliere per doppia falsa posi-  
 zione . 625. 626.  
 Dimostrando per questa regola . da  
 627. a 635.  
 Domande diverse . da 635. a 638.  
 Errore di F. Luca enunciato . 638.  
 Altre domande . da 639. a 641.  
 Sconto sciolto per doppia posi-  
 zione . 642.  
 Esolto ancora per sua regola .  
 643.  
 Questo di F. Luca , e sua diffi-  
 coltà . 643.  
 Come si scioglie con altri . da  
 643. a 645.  
 Proposizione di F. Luca , e mo-  
 doperatore . 645. 646.  
 Altera domanda simile . 647.  
 Questo dello Stifalio sciolto con  
 più posizioni . 648. 649.  
 Altro sciolto con più posizioni ,  
 e senza . 650.  
 Questo del Tartagliuogo matre-  
 matico . 651.  
 Altre domande diverse . da 651.  
 a 656.  
 Domanda di due lati d' un Trian-  
 golo . 656.  
 Domanda della superficie di due  
 Triangoli . 657.

Altra simile , che non si può  
 sciogliere per doppia posizione ,  
 ma è necessaria l'Algebra . 658.  
 Altre domande , che ricercano  
 diverse estrazioni di radici  
 col modo di operare per dop-  
 pia posizione , e risolute anco-  
 ra per Algebra . da 659. a 662.  
**T**RATTATO DECIMO TERZO  
 D'istruzioni Prima Delle Pro-  
 gressioni Arimmetiche .  
**C**he cosa sia progressione  
 Arimmetica , e varie pro-  
 gressioni con i suoi documen-  
 ti . 663.  
 Trovare la somma di tali pro-  
 gressioni . 664.  
 Trovare il numero de' termini .  
 665. 666.  
 Trovare l' ultimo termine , e la  
 differenza de' termini , & il  
 primo termine . 666. 667.  
 Questi sciolti per dette regole .  
 667.  
 Inganno di Giuseppe Unicornio .  
 670.  
 Altri questi di viaggi , e paga-  
 menti . 671. 672.  
 Questo di F. Luca altrimenti  
 sciolto . 672. 673.  
 Altri questi diversi da 673. a 674.  
 Regole per sapere il numero de'  
 Bini , Terni , Quaterni , e  
 Cinquini di nomi . 150. nel  
 gioco di Genova . da 665. a 671.  
 Variazione di più Dadi , e d' al-  
 tre cose . 677.  
 Numero degli Angeli . 677. 678.  
 Distinzione Seconda .  
 Delle Progressioni Geometriche  
**C**ome si avanzano , e loro  
 varietà . 678.  
 Riveda-

Trovare qualsivoglia termine . . . 679.  
 Trovare la somma de' termini di tali progressioni di qualsivoglia proporzione . . . da 680. a 682.  
 Trovare l'ultimo termine . . . 682.  
 Trovare il primo, ultimo termine l'ascendente, e il denominatore della proporzione . . . 683.  
 Sommare i numeri quadrati per ordine brevemente . . . 684.  
 Trovare il numero de' quadrati per la somma di essi . . . da 685. a 689.  
 Sommare brevemente i numeri cubi . . . 688.  
 Trovare il numero de' cubi dalla somma di essi . . . da 689. a 691.  
 Domande sopra le progressioni da 691. a 693.  
 Questito del Cardano più facilmente sciolto . . . 693.  
 Errore di F. Luca in simil questito . . . 694.  
 Numero perfetto, e sua origine . . . 694.  
 Numero abbondante . . . 695.  
 Numero diminuto . . . 696.  
 Artificiosa disposizione de' termini di progressione Arimmetica in numero dispari . . . da 696. a 698.  
 Disposizione in numero parimente pari . . . da 698. a 701.  
 Disposizione in numero disparimente pari . . . 702.  
 Diversa disposizione secondo la Stifelio . . . 704.  
 Disposizione de' numeri minori . . . da 703. a 705.  
 Disposizione de' numeri maggiori . . . 706.

Disposizione de' termini in numero parimente quadrato . . . 706.  
 Quando il quadrato è numerabile . . . per 6. per 12. per 4. da 707. a 712.  
 Disposizione de' termini di qualsivoglia progressione da 712. a 713.  
 Disposizione de' termini Geometrici continui . . . da 714. a 716.  
**TRATTI DECIMO QUARTO**  
 Estrazione delle Radici  
**D** Efinizioni delle radici . . . 717.  
 Tavola delle radici, e denominazione . . . 718.  
 Partire le figure de' numeri . . . 718.  
 Far la tavola per i numeri propri . . . 719.  
 Formare i numeri propri . . . 719.  
 Origine de' numeri quadrati . . . 720.  
 Primo modo di cavare la radice quadrata . . . 721.  
 Secondo modo con sua prova . . . 721.  
 Estrarre la radice, e formare il rotto . . . 724.  
 Riformare il rotto, che dia poco meno . . . 725.  
 Che dia una volta più, l'altra meno . . . 725.  
 Misto rotto di due rotti . . . 725.  
 Come si trovi la radice per linea . . . 726.  
 Altro modo di riformare il rotto di Raffaello Bombelli . . . 726.  
 Quando un numero di meno non può essere quadrato . . . 727.  
 Cavare la radice de' numeri rotti quadrati . . . 727.  
 Da rotto non quadrato, due metodi . . . 728.  
 Causa vera ignorata dal Tartagliola . . . 728.  
 Altro

# I N D I C E

Altro modo da Me trovato .	729.	Origine de' numeri quadrati	747.
Da' intieri , e rotti non qua-	729.	quadrati .	747.
Due modi di Oronzio Fineso .	730. 731.	Trovare la differenza .	748.
Origine de' numeri cubi .	731.	Cavare la radice quadrata	748.
Quanti , e quali numeri impari	732.	quadrata per i numeri pro-	748.
fanno il numero cubo .	732.	pri , e sue prove . da	750.
Diversi modi di trovare la diffe-	732.	Avvicinarsi più nella radice	750.
renza di due cubi .	732.	non discreta .	750.
Stradere la radice cuba d' un cubo	734. 735.	Cavare la radice da rotti qua-	751.
Estirpare la radice cuba per i nu-	736.	drati quad.	751.
meri propri .	736.	Cavare la radice da' rotti non	752.
Formare il rotto per i numeri	737.	quad. quad.	752.
non cubi .	737.	Trovare la differenza de' relati	753.
Osservazioni per le radici de'	738.	immediati .	753.
numeri non cubi .	738.	Cavare la radice relata .	754.
Il detto vale in radici maggiori .	739.	Trovare la radice relata vicina	754.
Riformare il rotto alla radice	740.	ne i numeri non relati , e ri-	755.
cuba .	740.	formare il rotto .	755.
Pigliare un rotto di piccola de-	740.	Cavare la radice da intiero , e	756.
nominatione .	740.	rotto relato .	756.
Trovare la radice di cubi , e non	741.	Cavare la radice da rotto relato	757.
cubi .	741.	e non relato .	757.
Quando il rotto non ha nume-	742.	Cavare la radice propinqua re-	757.
ratore , ne il denominatore cu-	742.	lata .	757.
bo , e causa ignorata dal Tar-	742.	Modo di Raffaello Bombelli .	757.
tuglia .	742.	Cavare la radice propinqua da'	758.
Ridurre il rotto a numeratore	742.	rotti non relati .	758.
cubo .	742.	Falsità del Tartaglia .	759.
Cavare la radice da' intieri , e	743.	Uso delle Tavole .	760.
rotti cubi .	743.	Tavole delle dignità de' numeri	761. 767.
Cavare la radice da' intieri , e	743.	Distinzione Seconda	767.
rotti non cubi .	743.	Della Proporzione , e Pro-	767.
Pratica d' Oronzio Fineso .	744.	porzionalità .	767.
Aggiunta a detta pratica .	744.	<b>P</b> Proporzione , e sua divisio-	767. 768.
Pratica di trovare la radice cu-	745.	ne .	767. 768.
ba per linee appunto di nume-	745.	Sommare , Sottrarre , Multipli-	769.
ro non cubo .	745.	care proporzioni ,	769.
Duplicare il cubo . da	745. 746.	Moltiplicare , e Partire propor-	770.
		zioni ,	770.
		La	La

*La proporzione trà numeri estre-  
mi sopra della somma delle  
proporzioni de' numeri di  
mezzo.* 771.  
*Proporzionalità, e sua diviso-  
ne.* 771. 772.  
*Trovare i termini armonici.* 772.  
*Proporzionalità contrarmonica.* 773.  
*Trovare i termini contrarmoni-  
ci.* 773.  
*Trovare i mezzi proporzionali,  
e l' ascendente nella propor-  
zione per l' estrazione delle  
radici.* 774.  
*Trovare il denominatore, e i  
mezzi proporzionali più bre-  
vemente.* 775.  
*Tavola, e ordine delle potestà  
de' numeri.* 776.  
*Alcune evidenze delle quantità  
proporzionali.* 777.  
*Questi ne i quali si ricerca  
l' estrazione di alcuna radice  
per loro soluzione.* 780.  
*Trovare li studi distinti dati a  
Soldati.* 780.  
*Trovare la ragione per 100. a  
capo d' anno.* 780.  
*Trovarla per 3. anni in più mo-  
di.* 781.  
*Due casi di F. Luca altrimenti  
conclusi.* 782.  
*Questo avuto in Roma.* 782.  
*Trovare li studi spesi.* 783.  
*Trovare le libbre comprate.* 783.  
*Trovare la quantità di fune  
per il volo, e l' altezza  
della Torre.* 783.  
*Questi due di geometria pra-  
tica.* 784.

*Trovare li giulj distinti di tre.* 784.  
*Convertire un quadro in cerchio  
uguale in due modi con la pro-  
va.* 785.  
*Trovare il diametro di una  
quarta sfera composta di tre  
sfere, con la prova.* 785.  
*Come si dia tal diametro di mi-  
sure razionali.* 786.  
*Impossibilità di due sfere di dia-  
metro di misure razionali fa-  
re una terza sfera di misure  
razionali.* 786.  
*Sapendo l' asse d' una sfera tro-  
vare il lato del cubo fatto di  
essa sfera.* 786.  
*Quattro quesiti di partizione di  
danaro.* 786. 787.  
*Trovare i giulj spesi in cera.* 788.  
*Dato qualsivoglia numero mag-  
giore di 2. trovarne un' altro,  
che la somma de' loro quadra-  
ti sia numero quadrato.* 788.  
*Trovare quattro numeri, de'  
quali il primo al secondo sia  
maggiore, che il terzo al  
quarto, e che la somma de'  
quadrati del primo, e se-  
condo sia quadrato; siccome la  
somma de' quadrati del terzo,  
e quarto sia quadrato, e il  
prodotto de' quattro così tro-  
vati sia pure numero quadra-  
to.* 788. 789.  
*Trovare tre numeri quadrati,  
che le tre loro differenze, e le  
differenze de' loro lati, o radici  
sieno numeri quadrati.* 790. 791.  
*Proposizioni del quadrato, del  
cubo, del quadrato quadrato  
del*

# INDICE

del relato primo &c.	791.	Come si trova l' Epatta .	808.
Se la proposizione del cubo sia del Tartaglia .	791.	Cerchio per l' Epatta, & aureo numero .	808.
La proposizione del cubo è di Leonardo Pisano .	792.	Come si trovi il Ciclo solare .	809.
Proposizione per la radice quadrata .	793.	Come si trova la lettera Domenicale per il Calendario vecchio, e nuovo .	809. 816.
Proposizione per la radice cuba .	793.	Come è notato ciascun giorno del Calendario d'una lettera Domenicale .	810.
Proposizione per la radice quadrata .	793.	Come si trova la Fera di ciascun giorno .	810.
Proposizione per la radice relativa .	794.	Come si trova la decima quarta Luna termine Pasquale .	811.
Proposizione per la radice quadrata cuba .	794.	Come si trova il giorno, nel quale si celebra la Pasqua, & l'altre Feste mobili, & il numero delle Domeniche fra la Pentecoste, e l'Avvento, i digiuni de quattro tempi &c. da	811. 812.
Maggiori evidenze di dette proposizioni .	795.	Come si trova la lettera del Martirologio .	813.
Proposizione unita .	795.	Come si trova il numero dell'Indizione .	813.
Origine di dette proposizioni, da	796. a 799.	Notizie de periodi, dell'Ere, dell'Epoche presa dalla Cronologia .	813.
Proposizioni rese universali .	799.	Che cosa, e di quante sorti è il periodo .	813.
Proposizione del quadrato .	799.	Che cosa è periodo Metonico .	814.
Proposizione del cubo .	799.	Che cosa è periodo Calippico .	814.
Proposizione del quad. quad. 800.		Come corrisponde al periodo Giuliano .	814.
Proposizione del relato primo. 801.		Che cosa è periodo Dionisiano. 814.	
Proposizione del quadrato cubo. 802.		Come per questo si trova il Ciclo del Sole, e della Luna, & al contrario .	815.
Proposizione del relato secondo. 803.		Che cosa è periodo Giuliano .	815.
Avvertimenti per fare quante proposizioni universali si vogliono .	804.	Come per esso si trovano i Cicli .	815.
TRATTATO DECIMOQUINTO		Come per i numeri de Cicli si trova	va
Dell'Abaco Ecclesiastico, e Cronologico. 806.			
Come si conosca se l'anno è bisestile. 807.			
Come si trovano i giorni italiani .	807.		
Come si trova il Ciclo lunare, & aureo numero per il vecchio, & nuova Calendaria .	807.		





va l'anno del periodo Giuliano . 815.  
 Come per il periodo Giuliano si trova l'anno di Cristo . 816.  
 Come per l'anno di Cristo si trova l'anno del periodo Giuliano . 816.  
 Che cosa è Era , o Epoca , e di quante forti . 816.  
 L' Era Cristiana quando principia , e da chi fu instituita . 816.  
 Quando cominciò l' Era Diocleziana detta de Martiri . 816.  
 Come per questa Era si trova l'anno di Cristo . 816.  
 Quante sono l'Ere , che si numerano dalla creazione del mondo da Greci . 817.  
 Qual è l'Era de Greci Ecclesiastica , e come si riduce all'anno di Cristo . 817.  
 Qual è l'Era civile de Greci . 817.  
 Qual è l'Era Giudaica . 818.  
 Come per l'anno del periodo Giuliano , e di Cristo si trova l'anno Giudaico , & al contrario . 818.  
 Quante sono le principali Epocche de Gentili . 818.  
 Qual è l' Epoca Trojana . 818.  
 Qual è l' Epoca Romana divisa in Varrioniana , e Capitolina . 818.  
 Come per questa si trova l'anno del periodo Giuliano . 819.  
 Qual è l' Epoca Antichena . 819.  
 In che anno del periodo Giuliano fu celebrata la prima Olimpiade . 819.  
 Come per l'Olimpiade si trova l'anno del periodo Giuliano . 819.  
 Come proposto l'anno del periodo Giuliano si trovano l'Olim-

pidi . 820.  
 In che anno del periodo Giuliano e di Cristo furono instituiti i combattimenti Capitolini da Domiziano . 820.  
 Proposto l'anno Capitolino come si trova l'anno del periodo Giuliano , e di Cristo . 820.  
 In che anno del periodo Giuliano fu riformato l'anno Romano . 820.  
 Proposti gl'anni Giuliani come si trova l'anno del periodo Giuliano , e di Cristo . 820.  
 Quando cominciò l'Era Ispanica . 820.  
 Come per gl'anni di questa Era si trova l'anno del periodo Giuliano , e di Cristo . 820.  
 Quando cominciò l'Era dell'Azziaca vittoria . 821.  
 Come per gl'anni di questa Era si trova l'anno del periodo Giuliano , e di Cristo . 821.  
 Quante sono l'Epocche , che pigliano il nome dalle persone . 821.  
 Quando cominciò l'Epoca Nabonassarea . 821.  
 Come per l'anno Nabonassareo si trova l'anno del periodo Giuliano . 821.  
 Come si riduce l'anno del periodo Giuliano all'anno di Nabonassarre . 821.  
 Quando cominciò l'Epoca Filippica . 822.  
 Quando cominciò l'Epoca Alessandrea . 822.  
 Quando cominciò l'Epoca Isdegerdica . 822.  
 Come per l'anno di Cristo si trova l'anno Isdegerdico . 822.  
 Quan-

# I N D I C E

*Quando cominciò l' Era Maomettana , ò di Egira . 822.*

*Come per l'anno di Egira si trova l' anno di Cristo . 822.*

## I N D I C E B R E V I S S I M O

*Abbaco 1. Ecclesiastico 806. Cronologico 817. Accattare rotti 66.*

*Alfusti 383. seq. Alligazione 486. seq.*

*Baratti 262. 311. seq.*

*Cambio, e ritorno 283. 285. doppio 294. 296. reale per lettere 513.*

*516. seq. Censi 296. 299. Ciclo Lunare 807. Solare 809. 815.*

*Compagnie 428. seq. Commis- sioni de Cambj 572. seq.*

*Diametro della Sfera 775. Dono Mercantile 167.*

*Epatta 808. Era , ò Epoca 813. 816. Ere diverse 817. seq. Estraz-*

*zione di radici 201. 376. 379. 617. seq. 659. seq. 707. seq. 736. 780.*

*False posizioni semplici 602. seq. doppie 625. seq. Feste Mobili 811.*

*seq. Fiera, e suoi Cambj 532. seq. Guadagni , e perdite . 301. seq.*

*Infilzare rotti. 63. 64. Inneftare , rotti di rotti, 65. Indizione 813.*

*Lettera Domenicale 809. seq. del Martirologio 813. Locazioni .*

*383. seq. Meriti . 296. 342. seq. Moltiplica-*

*re . 19. in altri modi 23. seq. 95. seq. Monete diverse 112. 174.*

*187. 527. Numerare 3. 4. Numero 2. 3. 6.*

*piano , e solido 35. 36. rotto 54. seq. proporzionale 205. seq. quad.*

*684. cubo. 688. perfetto 649. ab- bondante 692. diminuto 696. qq.*

*747. seq. relato 753. seq. del Indizione 813.*

*Come proposto l'anno di Egira si trova l'anno di Cristo . 822.*

*Termine Cronologico del libro . 823.*

## O P E R A L F A B E T O .

*Olimpiade 819. Ordine di sommare i numeri quadrati 684.*

*Pasqua , e suo tempo 811. seq. Par- tire 39. 40. varj modi 41. seq.*

*Partitori 119. seq. Partire per apporre 148. prove 150. Parti-*

*re rotti astronomici 199. seq. Perdite , guadagni 301. seq. Pi-*

*gioni 383. seq. Pratica del Ne- pero 37. Provisioni 169. 504.*

*576. seq. Progressioni arimme- tiche 663. Geometriche 678.*

*Quadrato 791. Quadro in cerchio 785.*

*Ragguagli di Piazze 289. 294. 561. seq. Regole del Trè . 203.*

*roverscia 237. composta 246. moltiplice 270. seq. di alligazio-*

*ne 486. per ragguagli 587. Re- care in parte i rotti 60. 61. 62.*

*Ridurre i rotti 59. seq. Rotto V. Numero . Rotti di rotti 63. va-*

*rie risoluzioni 113. Saldi 404. seq. Sconti 296. 342.*

*357. seq. Schifare rotti 57. 58. Sfera misurata 786. Sommare 7.*

*seq. de' rotti 68. seq. astronomici 197. Sottrarre 14. seq. de' rotti*

*76. seq. astronomici 197. Soccite 470. seq. Spacci in Piera 285. 289.*

*Tira 159. seq. Tavola Pitagorica 20. Tavole per meriti , e sconti*

*370. seq. delle dignità de' nume- ri 761. seq. Tirare in resto 417.*

*seq. Traslatate rotti 60. Valutare rotti 60. 61. 62.*

I L F I N E .

T R A T .



# T R A T T A T I D'ARIMMETICA PRATICA.

## T R A T T A T O P R I M O . D E' N U M E R I I N T I E R I .

*Distinzione prima Proemiale.*

1. **D**OMANDA . Che cosa è Arimmetica , detta comunemente Abbaco ?

RISPOSTA . E' una scienza de' Numeri , e delle operazioni , che si fanno circa di essi , de' quali l' unità è l' origine : potrebbe definirsi ancora : l' Arimmetica è un' Arte di fare i conti .

2. D. Da che derivano questi nomi Arimmetica , & Abbaco .

R. Da voci Greche : Arimmetica da *Arithmos*, che significa numero: quasi dicasi *Arithmetica* , *facultas numeratoria*; da Filippo Callandri nel suo Pittagora vien chiamata *Arithmetrica*, cioè che misura i numeri, & Abbaco da *Abacos*, & *Abax* che significa tavola, sopra la quale si facevano i conti, e di più significa l'istessa perizia di farli; e l' istessi calcoli, de i quali si servivano gl' Antichi, per questo detti *Abaculi*; Onde Plin. lib. 26. cap. 36. *Abaculi vocabantur calculi numerales , quibus rudis antiquitas Arithmeticae adhuc ignara in supputationibus , computationibusque utebatur .*

3. D. Chi è stato l' Inventore dell' Arimmetica .

R. Giorgio Purbachio nel suo Algorimmo con altri dice , che ne furono inventori gl' Arabi . Ma Celio Rodigino lib. 10. cap. 34. lect. Antiqu. afferma , che fù trovata da i Sidonj . Isidoro nel lib. 3. dell' Etimologie narra, che Pittagora la trattò prima d'ogn' altro . La verità più certa è, che dal principio del Mondo Nostro . Signore Dio la comunicò con l' altre Scienze ad Adamo : Onde Giuseppe Ebreo ne fa inventore Caino .

A 4.D.

4. D. A che serve l' Arimmetica .

R. Per la sua grande eccellenza , come dice Boezio , ella è la prima delle Scienze Matematiche , senza aver bisogno d' alcune di esse ; benchè tutte l' altre Scienze , & Arti hanno bisogno di lei , come fa conoscere Gio: Battista Zucchetta nel principio della sua Arimmetica . Onde afferma Platone ne i Dialoghi della Repubblica , che se non fusse l' Arimmetica , non sarebbero ancora tante facoltà , e Scienze , che da essa dipendono .

5. D. Di quante sorti è l' Arimmetica ?

R. L' Arimmetica in se stessa è una sola Scienza Speculativa , o Teorica , perchè gl' atti della medesima sono del solo intelletto razionale ; ma considerato , che si applica a diversi negozj del commercio umano , per questo si considera parimente come un' Arte pratica .

6. D. Che cosa è Unità :

R. E' il principio , & origine de' numeri , per la quale ciascuna cosa , che è , si dice una . Eucl. defn. 1. lib. 7. secondo la considerazione del Mattematico in astratto è indivisibile nella quantità discreta , a quella guisa , che è indivisibile il punto nella quantità continua ; Ma in concreto , o si voglia dire applicata a cosa materiale , come uno Scudo , una libbra &c. è divisibile in infinito , vestendosi così della proprietà del continuo .

7. D. Che cosa è Numero ?

R. E' una moltitudine composta di unità . Eucl. def. 2. l. 7. ciascuna delle quali unità costituisce il numero nel suo specifico essere . Altro si dice numerante , e questo può procedere in infinito per venire dalla potenza del nostro intelletto ; Altro si dice numero numerato , o numerabile , e questo è finito , e sono le cose create ; imperocchè si dice nella Sapienza cap. 11. 21. *Omnia in mensura , & numero , & pondere disposuisti* .

8. D. In quante specie si distingue il numero ?

R. In tre : In numero Cardinale , Ordinale , e Distributivo . Il numero Cardinale , & assoluto è uno , due , tre , quattro , cinque , sei &c. seguitando per progressione naturale . Il numero ordinale , e relativo dimostra l' ordine delle cose numerate , come : Primo , secondo , terzo , quarto , quinto &c. Il numero distributivo significa insieme la distribuzione per ordine con la moltitudine delle medesime cose ordinate , come a uno a uno ; a due a due ; a tre a tre ; a quattro a quattro &c.

9. D. Il numero Cardinale di quante sorti è ?

R. Di tre sorti per quello che adesso bisogna . Numero Digno , Articoleso , e Misto . Il numero digno è uno , due , tre , quattro , cinque ,

cinque, sei, sette, otto, nove. Il numero articolo è dieci, venti, trenta, quaranta, cinquanta, sessanta, settanta, ottanta, novanta, cento, ducento, mille &c. e tutti gl' altri numeri decimali. Il numero misto costa dell' uno, e dell' altro; come sedici, ventisette, quattrocento cinque. Questi numeri sono denominati da i diti, & articoli della mano, per li quali erano dimostrati da' nostri Antichi, come si vede in Fra Luca, in Filippo Calandri nel principio del suo Libretto, & in altri.

Di più altro è il numero pari, altro dispari. Il numero pari è quello che nella sua integrità può dividersi in due parti uguali, come due, quattro, sei, otto &c. Il dispari non può dividersi ugualmente, cominciando dall' unità, come tre, cinque, sette &c. e la serie del numerare fa continuamente uno dispari, e l' altro pari con aggiungervi la sola unità.

10. D. Quante figure s' adoprano à descrivere i numeri?

R. Dieci recate nel MCC. da Leonardo Pisano dall' India, come esso dice secondo l' attestato del Calandri, e sono le seguenti 1. uno: 2. due: 3. tre: 4. quattro: 5. cinque: 6. sei: 7. sette: 8. otto: 9. nove: 0. zero. Le prime nove figure trà se distinte significano tante unità, secondo il luogo, che ciascuna tiene. La decima detta zero non significa alcuna cosa, ma occupa il luogo del numero, delle decine, delle centinaia, &c. e decupla per dir così i numeri antecedenti, cioè gli fa significare dieci volte più.

11. D. Avendo detto, che significano le figure distinte, e da se sole considerate, che significano quando sono frà se unite, e come si spiegano?

R. Questo appartiene al numerare così comunemente detto dagli Autori; riponendolo trà le specie, ovvero Operazioni dell' Arimetica. Ma io seguendo Gemma Frisio lo separo da esse, e lo pongo trà i principj, che precedono tali operazioni: E' da sapere, che distinguo le figure in membri, & in periodi.

La prima figura dunque posta dalla mano destra di chi scrive, che occupa il primo luogo rappresenta numero come sopra cioè: tante unità: la seconda figura decine, cioè 1. dieci; 2. venti; 3. trenta; 4. quaranta; 5. cinquanta; 6. sessanta; 7. settanta; 8. ottanta; 9. novanta; 0. nessuna decina. La terza figura rappresenta centinaia: 1. dice cento; 2. dugento; 3. trecento; 4. quattrocento; 5. cinquecento; 6. seicento; 7. settecento; 8. ottocento; 9. novecento; le quali tre figure fanno un membro. La quarta figura rappresenta numero, la quinta decine, la sesta centinaia di migliaia; le quali tre altre fanno un' altro membro, e tutte sei costituiscono un Periodo, perchè sei figure s' esplicano in un sol tratto

4  
 tratto . Pure la settima figura rappresenta numero ; l'ottava decine , e la nona centinaja di milioni , terzo membro . La decima figura numero , l'undecima decine , e la duodecima centinaja di migliaia di milioni ; & è il secondo periodo . Medesimamente , sei altre figure costituiscono il terzo Periodo avvertendo in questo di dire milioni di milioni , cioè la prima volta in retto , l'altra in obliquo ;. Pure sei altre costituiscono il quarto periodo , dicendo in questo milioni di milioni di milioni ; e così si può proseguire di Periodo in Periodo quanto si vuole . Acciò meglio l'ordine sotto l'occhio apparisca , si pone la seguente tavola .

### Tavola del Numerare .

Numero .	1.
Decine .	12.
Centinaja .	123.
Migliaja .	1. 234.
Decine di Migliaja .	12. 345.
Centinara di Migliaja :	123. 456.
Numero di Milioni .	1. 234. 567.
Decine di Milioni .	12. 345. 678.
Centinaja di Milioni .	123. 456. 789.
Numero di Migliaja di Milioni .	1. 234. 567. 891.
Decine di Migliaja di Milioni .	12. 345. 678. 912.
Centinaja di Migliaja di Milioni .	123. 456. 789. 123.
Numero di Milioni di Milioni .	1. 234. 567. 891. 234.
Decine di Milioni di Milioni .	12. 345. 678. 912. 345.
Centinaja di Milioni di Milioni .	123. 456. 789. 123. 456.
Num.di Migliaja di Mil.di Milioni.	1. 234. 567. 891. 234. 567.
Decine di Migliaja di Mil. di Mil.	12. 345. 678. 912. 345. 678.
Centinaja di Migliaja di Mil.di Mil.	123. 456. 789. 123. 456. 789.

Avvertasi , che dappo trè figure si è posto un Punto à distinguere i membri , si come due Punti à distinguere i Periodi .

12. D. Come dunque s'esplicano le seguenti figure poste fra A, e B.

A 24 006 347 935 652 703 574 B

R. Si comincì dal 4. della parte B, e si continuo trè figure, o si faccia un punto dopo , che verrà trà il 5. e il 3. si continuo altre trè , e si segni 1. fuor d'ordine ; e dopo trè altre si segni un Punto , e dopo trè altre si segni 2. , e poi un Punto , e poi un 3. sino al fine . Dove è il punto si dice mila , o migliaia . Dove è il numero si di-

5  
 si dice milioni soggiungendo di milioni, tante volte, quante unità rappresenta il numero sottoscritto meno una volta. Il maggior numero mostra i Periodi intieri, come il trè qui, trè intieri Periodi, e resta 24., che è imperfetto. Che però s' esplicaranno così le figure del detto numero. Ventiquattro milioni di milioni, di milioni; sei mila trecento quaranta sette milioni di milioni; nove cento trenta cinque mila seicento cinquanta due milioni; sette cento trè mila cinquecento settanta quattro; osservando, che il zero occupa il luogo del numero, decine, e centinaia, e non s' esplica. Altri esplicano più brevemente, dicendo: 24. milioni trè volte, 006. mila 347. milioni due volte, 935. mila 652. milioni, 703. mila 574. Finalmente alcuni dicono 24. triloni 006. mila, 347. bilioni, 935. mila 652. milioni, 703. mila 574. e così senza repetizione di milioni, dicono quattrilioni, cinquilioni, seilioni, settilioni, &c. che purchè s' intenda il concetto della mente, poco importa l' usare un modo, ovvero un' altro.

13. D. Il Milliet nel trattato dell' Arimmetica, nella prima, e seconda proposizione, passa dalle centinaia di milioni alli bilioni, e dalle centinaia di questi alli triloni, senza passare per il numero, decine, e centinaia di migliaia; si cerca se sia d' approvarsi? Ecco il suo esempio 412 543 298 754 097. *Quadrìngenti duodecì trilliones, quingenti quadraginta tres billiones, ducenti nonaginta octo milliones, septingenta quinquaginta quatuor millia nonaginta septem.* Così egli lo dichiara. E nel fine della seconda Proposizione così si legge: *Memoria item mandent ordines sedium, incipiendo ab ultima, Unitates, decades, centenaria, millia, decades millium, centenaria millium, milliones, decades millionum, centenaria millionum, billiones, &c.*

R. Non è d' approvarsi, perchè siccome per arrivare al milione si passa per il numero, decine, e centinaia semplici, e per numero decine, e centinaia di migliaia: così per i medesimi gradi si deve passare da i milioni, alli milioni di milioni, ò si voglia dire bilioni: Onde il sopradetto numero così si spiegherà; quattrocento dodici bilioni, cinquecento quaranta trè mila dugento novant'otto milioni, settecento cinquantaquattro mila, novanta sette. Il che è conforme alla spiegazione, che fa il Clavio nel cap. primo di questo numero.

42 329 089 562 800.

*Quadrìngenta duo milliones millionum, trecenta viginti novem millia millionum octoginta novem milliones, quingenta sexaginta duo millia, octingenta.* Cioè 42. bilioni 329. mila 089. milioni 562. mila 800. Parimente Vincenzo Leotaudo in Scholio prop. 16. *Instit. Arithm.* in tal modo pronuncia questo num. 46. 439 425 687 243.

Qua-

*Quadráginta sex mīlliones mīllionum: quadráginta trīginta novem mīllia mīllionum, quadráginti vīginti quīnque mīlliones, sexcenta octoginta septem mīllia, & ducenta quadráginta tria.* Che suona in volgare. Quaranta sei milioni di milioni, ò si vogli dire bilioni, quattrocento trenta nove mila di milioni, quattrocento venticinque milioni sei cento ottanta sette mila, dugento quarantatré. Qui adesso potrei addurre quasi tutti gl' Autori d'Arismetica, che numerano in questo modo, quali per brevità tralascio.

14. D. I Latini, e gl' Oltramontani, che non usano la voce barbara milione; come spiegheranno questo numero qui posto?

36 570 060 005 246.

R. Si dividerà in membri di trè figure con numerarli per ordine restando l' ultimo imperfetto, e si dirà 36. mila di migliaja; di migliaja, di migliaja: 370. mila di migliaja, di migliaja: 060. mila di migliaja: 005. mila, 246.

15. D. Come si scrive, e nota con le dette figure il numero detto in voce: Settanta cinque mila, e quattro milioni, venticinque mila trecento otto.

R. Per quello che si è detto. Il periodo costa di 6. figure fino a i milioni, e di 6. altre figure costa il Periodo de' milioni, cominciando da centinaja di migliaja: le quali centinaja mancando nel detto numero, per non essere Periodo perfetto, che però si segneranno quelle figure, che prima si pronunciano nella parte sinistra di chi scrive per andare verso la destra trà A. e B. cioè, 75. mila; e perchè ci mancano le centinaja, e le decine di milioni, doppo 75. si segnano immediatamente due 00., che occupino due luoghi, e dipoi si segna 4. pronunciato. Ora comincia l' altro Periodo, e mancando centinaja di migliaja, per esse si segna 0., & immediatamente 25. mila: di poi 3. per trecento, 0. per le decine, che mancano, & 8. e così si segneranno altri con l' avvertenza de' Periodi, e membri sopra spiegati.

A 75004025308. B

16. D. I numeri sono rappresentati con altre figure, che le suddette?

R. Si rappresentano con questi sette Caratteri Romani I uno, V cinque, X dieci, L cinquanta, C cento, D cinquecento, M mille. Se al Carattere di maggior numero precederà Carattere di numero minore, tanto meno significherà, come IV. quattro, IX. nove, VL. quarantacinque, XC. novanta, CM. novecento. Volendo dunque rappresentare 1709. i Caratteri staranno così MDCCIX.

17. Quante operazioni s' esercitano circa i numeri?

R. Quattro. Sommare: Sottrarre: Moltiplicare: Partire; perchè ò s' adu-



ò s' adunano più numeri distinti in un sol numero ; ò da un numero si leva un'altro; ò uno via l'altro si moltiplica; ò finalmente, per un numero l'altro si divide. Le quali operazioni si richiedono nell'Algoritmo de' numeri rotti: Nella regola del Trè dritta, roverscia, composta, moltiplice. Nelle regole delle Compagnie; di Soccite; di Baratti; d'Alligazioni; di Meriti, e Sconti semplici, & a capo d' Anno; di guadagni, perdite per 100, di Cambj, raggugli di Piazze, e delle Commissioni; delle false Posizioni, semplice, e doppia; delle Progressioni Arimmetica, e Geometrica; dell'Estrazione di radici quadre, Cube, Quadrate quadrate, Relate; e nelle regole di qualsivoglia computo, che nell' arte Arimmetica si ricerchi.

## DISTINZIONE SECONDA.

### Del Sommare.

18. D. **C** He cosa è sommare ?

R. E' unire più partite proposte di numeri in una sola partita equivalente alle date partite, la quale si chiama Somma.

19. D. Come si fa il sommare ?

R. Prima bisogna sapere à mente queste combinazioni di Numeri semplici, quali qui pongo distribuiti, & ordinati nelle seguenti Tavole.

### Tavole, per il Sommare.

1 e 0 fa 1	2 7 9	4 6 10	6 9 15
1 1 2	2 8 10	4 7 11	6 10 16
1 2 3	2 9 11	4 8 12	
1 3 4	2 10 12	4 9 13	7 e 7 fa 14
1 4 5		4 10 14	7 8 15
1 5 6	3 e 3 fa 6		7 9 16
1 6 7	3 4 7	5 e 5 fa 10	7 10 17
1 7 8	3 5 8	5 6 11	
1 8 9	3 6 9	5 7 12	8 e 8 fa 16
1 9 10	3 7 10	5 8 13	8 9 17
	3 8 11	5 9 14	8 10 18
2 e 2 fa 4	3 9 12	5 10 15	
2 3 5	3 10 13		9 e 9 fa 18
2 4 6		6 e 6 fa 12	9 10 19
2 5 7	4 e 4 fa 8	6 7 13	
2 6 8	4 5 9	6 8 14	10 e 10 fa 20

La

Le quali tavole si devono fare imparare a' semplici Scolari a diritto, & a roverscio; cioè 4. e 7. fa 11. 7. e 4. fa 11. Di più bisogna avvezzarli a combinare ne i numeri maggiori dalla combinazione de i minori, come 8. e 9. fa 17. 8. 19. fa 27. 8. e 99. fa 107. Proposte le partite de' numeri da sommarli s'avverta, che siano bene ordinate talmente, che il numero stia sotto il numero, le decine stiano sotto le decine, le centinaja sotto le centinaja tanto semplici, quanto di migliaja, e milioni &c. con tirare in fine una linea retta, come nell'esempio si vede. Si cominci dalla fila del

numero, principiando a sommare dal 6. all'in-	
sù, ovvero dal 5. all'ingù, risulta 38. Si segni il	13245.
numero 8. sotto il numero 6: le 3. decine si som-	272.
mino con le decine della seconda fila, risulta 32.	1524.
il 2. si segni sotto il 4. e 3. che sono centinaja	90704.
si sommino con le centinaja della terza fila, ri-	3245.
sulta 28. Si segni 8. sotto il 2. e 2. che sono mi-	17245.
gliaja si sommino con le migliaja della quarta	2347.
fila, e risulta 23. si segni 3. sotto il 5. e 2. deci-	45246.
ne di migliaja si sommino con le decine di mi-	
gliaja della quinta fila, risulta 17. si segni 7. sot-	173828. Somma
to il 4. & 1. a canto al 7. e farà la somma	
173828.	

20. D. Se la somma d'alcuna fila arrivasse, ò passasse cento, essendo allora trè figure, quale si segnarebbe sotto la fila?

R. Si segnerà la figura del numero, ovvero 0. l'altre due, che sono decine si sommano con le figure della fila seguente. Sia la somma della fila 136. si segna 6., e 13. decine si sommano con le decine seguenti, se 140. si segna 0. e 14. si sommano, con le figure della seguente fila. E però vero, che tali file così lunghe si potrebbero distribuire in alcune parti, e le somme parziali d'esse sommare per avere la somma totale, benché ciò non è in uso. Occorre alle volte trovarsi nella medesima fila reiterata la medesima figura di numero, come 6. 7. ovvero 8. onde se 8. è reiterato 20. volte, si moltiplica 8. via 20. fa 160. per la somma di tal figura 20. volte reiterata, e così dell'altre.

21. D. Si può sommare in altro modo?

R. Si può sommare al contrario. cominciando a sommare le file dalla parte sinistra procedendo verso la destra, e segnando tutta la somma di ciascuna fila con porre il numero sotto la fila sommata, & hà questo comodo il sommare in questa guisa, che non si deve tenere a mente numero alcuno.

Si deve

La somma dunque della fila delle migliaja è 17. 3652.  
 si segna sotto, in modo che il 7. sia sotto il 5. 4524.  
 L'altra somma è 21., si pone 1. sotto il 6. il 2. 3245.  
 sotto il 7. L'altra somma è 22., il numero 2. sotto 2265.  
 il 9. l'altro sotto il 1., finalmente l'ultima somma 5653.  
 è 19., si segna 9. sotto il 3., e 1. sotto il 2. del-  
 l'antecedente fila. Adesso si sommino al solito i  
 numeri delle somme, sarà tutta la somma 19339.  
 Alcuni Autori si servono di questo modo di  
 sommare per prova dell' altro. Onde fatta la  
 somma al solito, sommano al contrario fila per  
 fila ponendo le somme distinte una sotto l' altra  
 a scala, & in ultimo sommate danno la medesi-  
 ma somma, se si è bene operato. Il che dà più  
 chiaramente a conoscere la ragione di tale ope-  
 rare, essendo che se si somma la fila delle miglia-  
 ja, si veggono sotto 17., che sono migliaja, se la  
 fila delle centinaja sono 21., se la fila delle deci-  
 ne sono 22., se la fila delle unità sono 19. quali  
 somme parziali notate per ordine, come si è det-  
 to, e sommate queste al solito daranno la totale  
 somma cercata.

19220 Somma.

3652.

4524.

3245.

2265.

5653.

Somma 19339.

17.

21.

22.

19.

Somma 19339.

22. D. Come si prova l' operazione del sommare?

R. Con il sottrarre, operazione al sommare opposta; si come il sot-  
 trarre si prova col sommare, il moltiplicare con il partire, e que-  
 sto col moltiplicare. Benche non es-

sendosi insegnato il sottrarre, s'acquen-

na solo tal prova per chi lo sapesse,

e per altri si fa la prova con l' istesso

sommare.

Fatta la somma dell' esempio A, e B. che

si dirà prima somma, che è 29013. si

lascierà la prima partita di numeri da

capo, per commodità, potendosi la

sciare qualsivisa partita, cioè 3752. se

parata dall' altre partite con una linea,

e si sommeranno l' altre, e verrà la se- 1. Sō. 29013.

conda somma 25261. la quale se si sot-

trarrà dalla prima 29013. resterà 3752. 2. Sō. 25261.

partita lasciata da capo dell' esempio

A. o qualsivisa altra, che si fosse lascia-

ta; Ma se la seconda somma 25261. si

Resto 2752.

29013.

B

fomma-

sommerà con la partita lasciata 3752. se verrà la prima somma 29013. quando si è operato bene. La ragione è, perchè la seconda somma è differente dalla prima nella partita lasciata 3752. di sommarla, onde levanda la seconda somma dalla prima, deve necessariamente restare la partita lasciata nell'esempio A. Per la medesima ragione sommando nell'esempio B la seconda somma con la partita lasciata, per la quale è differente dalla prima somma, verrà il numero dell'istessa prima somma, per essere le parti raccolte insieme uguali al suo tutto, altrimenti non si sarebbe operato bene.

23. D. Si può fare altra prova?

R. Molte se ne possono inventare, come quella di sommare la somma con i numeri sommati, e dalla somma venuta pigliare la metà, e verrà la prima somma, e questa Prova s'ordina farsi dalli Scolari per loro esercizio. S'osservi l'esempio C.

24. D. Qual altra Prova si può fare?

R. Oltre la Prova del 9, e del 7. &c. si può fare, 3652.  
 questa, che è assai spedita. Fatta l'operazione, 7526.  
 la somma è 19009, come nell'esempio D. Si 52652.  
 sommi al contrario la sinistra fila per la 21. fa 3652.  
 16., che fino a 19. numero della somma ci è 3. 750. Prima  
 quale si segna sotto il 9, qual 3. col seguente 0. 20845.  
 di sopra dice 30. si sommi l'altra fila per ordi- 41690. Seconda.  
 ne fa 28., che fino a 30. ci è 2. qual si segna sot- 20845.  
 to la fila sommata, che col 0. di sopra seguente D.  
 dice 20., si sommi l'altra fila delle decine fa 19. 3652.  
 fino a 20. ci è 1. qual si segna sotto la fila som- 4527.  
 mata, che col 9. di sopra dice 19. Ora se la ter- 2652.  
 zione è giusta sommando l'ultima fila deve fare 3652.  
 19. si come fa. Dunque la somma è giusta. 4526.  
 Quando la somma fusse errata, facilmente nel 19009. Somma.  
 decorso della Prova si conosce per l'impossibili-  
 tà che occorre come si può sperimentare.

25. D. Come si fa la prova detta del 9.

R. Si fa con levare tutti li 9. dalle partite da som- 3240.  
 marli, e l'avanzo, ovvero tutto si pone da parte. 5345.  
 e levanda pure li 9. dalla somma, deve dare il 2700.  
 medesimo avanzo, se è giusta. 2524.

26. D. Come si levano li 9.

R. Si deve sapere, che il numero 9. per essere l'ulti- 514.  
 ma figura semplice significativa ha questa 79380.  
 A

proprietà di poterli trovare l'avanzo (dovendosi levare da qual che numero) per via di sommare. Per esempio; Volendo sapere con levare tutti li 9. da 78. qual sia l'avanzo; certo è, che levandosi 8. volte 9. l'avanzo, e 6. or questo 6. s'averà per via del sommare. Si sommino le figure del 78. cioè 7. e 8. fa 15. medesimamente si sommino le figure di 15. per essere più di 9. cioè 1. e 5. fa 6. avanzo, che si voleva. Avvertasi di più, che tramutandosi 78. in 87. facendo il numero decine, e le decine numero, pare darà il medesimo avanzo, cioè 6., perche levando 9. volte il 9. da 87. resta 6. dal che la fallacità di questa prova alcune volte deriva. Si venga all' esempio E. e si cominci a sommare dalla prima partita di sopra (benche si può cominciare di dove un vuole, purché tutte le figure delle partite si sommino (dicendo 5. e 3.

E fa 8. e 4. fa 12. levando il 9. resta 3. il quale pure si ha con sommare 1. e 2. del 12. e 3. fa 6., si seguiti alla seconda partita, e dui fa 8. e 7. fa 15. che è 6. d' avanzo; si seguiti alla terza, e 1. fa 7. e 5. fa 12. che 3. e 2. fa 5. e 4. fa 9. cioè 0. si seguiti alla quarta 5. e 2. fa 7. e 4. 11. cioè 2. si seguiti all' ultima partita, e 2. fa 4. e 7. fa 11. cioè 2. e 2. fa 4.

**Somma** 7933. avanzo, quale si ponga da una parte dell' X. Dico adesso, che levandosi li 9. nel medesimo modo dalla somma, deve restare 4. dunque si dica 7. (il 9. si lascia) e 3. fa 10. cioè 1. e 3. fa 4. avanzo uguale al passato, che si pone dall' altra parte dell' X. onde la lezione è ben fatta secondo questa prova, la quale qualche volta è fallace.

27. D. Come si fa la prova del 7. al sommare?

R. Si sappi à mente questa Tavola, che qui pongo, ovvero s' abbia presente, quando si deva provare qualche operazione di sommare, da chi non sapesse il partire, per mezzo del quale si trova l' avanzo. Si voglia provare se è giusta la somma del

*Tavola.*

- Di 7. è 0.
- Di 14. è 0.
- Di 21. è 0.
- Di 28. è 0.
- Di 35. è 0.
- Di 42. è 0.
- Di 49. è 0.
- Di 56. è 0.
- Di 63. è 0.
- Di 70. è 0.

**E** l' esempio E. si parte per 7. la prima partita di sopra 3265. vedendo nella Tavola il numero uguale, ovvero inferiore più vicino al 32. si trova tra il 28. fino al 32. l' avanzo

**Somma** 4683. è 4. che col 6i che segue dice 46. del quale il numero più inferiore è 42. fino al 46. l' avanzo è 4. che col 5. che segue dice il 45. il numero più vicino inferiore è 42. fino al 45. l' avanzo è 3.

che s'opone doppo il 5. tramezzato da una linea. Così si leveranno il 7. da 272. ponendo doppo di esso l'avanzo 6. ; da 452. l'avanzo è 4. ; da 624. l'avanzo è 1. quali avanzi si sommano fanno 14. del quale levando il 7. l'avanzo è o come nella Tavola, qual o. s'opone da una parte dell' X. con sopra 7. per denotare, che è prova del 7. ; Ora se la somma è giusta, levando di 7. da essa l'avanzo deve essere o. ; di 46. l'avanzo è 4. che coll' 1. dice 47. di questo l'avanzo è 6. che col 3. dice 63. del quale l'avanzo è o come nella Tavola, quale o. si vede posto dall'altra parte dell' X. e deve confrontare con l' altro ; si che la lezione stà bene .

28. D. Da che hanno origine le prove del 9. , e del 7. ?

R. Dall' Assioma tanto noto d' Euclide. Se da quantità uguali, si leveranno altre quantità uguali, gl'avanzi saranno uguali, ovvero o. Come da A. 12. levando B. 7. , e da C. 12. levando D. 7. restaranno E. 5. , & F. 5. uguali, e perche le partite de' Numeri sommate sono uguali, pigliandosi assieme, alla loro giusta somma ( per essere il tutto uguale alle sue parti insieme prese, per altro Assioma d'Euclide) se si leverà un numero come 9. ovvero 7. da tali partite quanto si può, l'avanzo sarà il medesimo, ovvero o, che verrà dal levare 9. ovvero 7. dalla somma . Dalche ne segue, che la prova si può fare con levare non solo li 9. ovvero li 7. ma ancora altri numeri : come 4. 5. 8. 12. &c. con l'operazione del partire, perche con l'operazione del sommare si può fare solo quella del 9. per la proprietà detta nella 26. e del 3. dal quale il 9. deriva .

29. D. Perche avviene, che talvolta queste prove del 7. e del 9. sono fallaci, benché derivino da un' Assioma infallibile )

R. Ed' avvertire, che nel far la prova si suppone di levare il 7. il 9. ovvero altro numero da quantità uguali, se si è bene operato, e che per questo secondo il primo Assioma detto devono essere uguali gl'avanzi, perche venendo questi disuguali si conosce qualche errore nell'operazione; ma si possono avere gl'avanzi uguali da quantità disuguali, dunque li soli avanzi uguali non dimostrano sempre d'aver bene operato. Dunque non sempre è fedele tal prova . Per esempio, per la prova del 7. sopra 26. l'avanzo è 5. sopra 33. l'avanzo è ancor 5. che sono avanzi uguali, e pur vengono da quantità disuguali, perche si ha riguardo solo a gl'avanzi, e non a i quozienti, cioè alle volte, che si leva il 7. da 26. e da 33. ; essendo che allora si conoscerebbe chiaro, che si levano quantità disuguali da quantità disuguali; e possono affrontare a dare i medesimi avanzi, come avviene qui, che levando 3. volte 7. da 26. l'avanzo è 5. , e levando 4. volte 7. da 33. l'avanzo è pure 5. ma 3. volte 7. è 21. , e 4. volte 7. è 28. quantità disuguali, come

come dicere. Onde da questo ne segue, che aggiungendo, <sup>13</sup>ò lev-  
vando 7. 14. 21. ò altri numeri settenari da una delle parti ugua-  
li, facendosi poi la prova, daranno il medesimo avanzo; come  
levando da 16. per una parte li 7. l' avanzo è 2., e levando pure  
li 7. da 23. numero composto di 16. e 7. ovvero da 9. numero sce-  
mato di 7. da 16. l' avanzo pure è 2., dalche nasce la fallacità di  
questa prova del 7. la quale fallacità è maggiore nella prova del  
9.; perche oltre à questo la denominazione de' numeri, e l'aggiun-  
ta di zeri da una parte, non altera l' avanzo nel farsi la prova del  
9. Si sappia però, che usandosi tutte due le Prove del 9., e del 7,  
rarissime volte s'incontreranno tali fallacità in tutte due, se non  
si cercassero à bello studio, con aggiungere, ò levare numero com-  
posto, per la moltiplicazione del 7. via 9. come 63. da una del-  
le parti, sopra le quali si fanno le Prove dette.

30. D. Che prova fanno per ordinario i Computisti, e Mercanti,  
per vedere se hanno ben sommato?

R. Avendo la prima volta sommato di sotto in sopra, e trovata la  
somma, la seconda volta sommano di sopra in sotto, e confron-  
tando i Numeri della somma prima, e giudicano avere operato  
bene; mà venendo qualche figura di numero differente, fanno di  
nuovo diligenza con sommare, come la prima volta, sinche s'ac-  
corgono dell' errore. Questo modo in pratica giudico buono;  
Perche se nel sommare di sotto in sopra avesse alcuno errato, con  
dire 9. e 7. 13., sommando poi di sopra in sotto, per non darli la  
medesima combinazione s' accorgerà dell' errore.

31. D. Dove si fondano le regole del sommare?

R. Si fondano in questi Assiomi. 1. Il tutto è maggiore di qualsi-  
voglia sua parte. 2. La parte è minore del tutto. 3. Ogni tutto è  
uguale à tutte le sue parti prese insieme, ò in una sola somma.  
4. Tutte le parti insieme sono uguali al suo tutto. 5. Qualunque  
numero è uguale alle unità tutte, che contiene. 6. Sono l'istessa  
somma tutto il numero, e le unità di essa messe insieme. 7. Non si  
trova cosa più uguale, che l'istesso numero a se medesimo. 8. Due  
numeri uguali ad un terzo numero, frà di loro sono uguali. 9. Le  
partite di numeri sommate bene, sono uguali alla sua somma.  
10. Se dalli uguali si levano gl'uguali numeri, quelli che restano,  
sono uguali. Quali Assiomi sono ancora fondamenti, e principj  
di ragione per le altre Operazioni Arimetiche.

**DISTIN**

# DISTINZIONE TERZA.

## Del Sottrarre.

32. D. Che cosa è Sottrarre?

**C** Il Sottrarre, detto anche restare, & abbattere, è levare un numero minore da un maggiore, con trovare la differenza, che è tra quelli due Numeri: Come sottraendo da 8. 5. resta 3. differenza da 5. fino ad 8. qual 3. si dice anche Resto, Residuo, & Avanzo.

33. D. Come si fa l'operazione del Sottrarre?

R. Bisogna sapere le seguenti Tavole a mente.

### Tavole per il Sottrarre.

leva resta			5	3	2	10	5	5	15	7	8
Da 0	0	0	6	3	3	11	5	6	16	7	9
1	1	0	7	3	4	12	5	7	leva resta		
2	1	1	8	3	5	13	5	8	Da 8	8	0
3	1	2	9	3	6	14	5	9	9	8	1
4	1	3	10	3	7	leva resta			10	8	2
5	1	4	11	3	8	Da 6	6	0	11	8	3
6	1	5	12	3	9	7	6	1	12	8	4
7	1	6	leva resta			8	6	2	13	8	5
8	1	7	Da 4	4	0	9	6	3	14	8	6
9	1	8	5	4	1	10	6	4	15	8	7
10	1	9	6	4	2	11	6	5	16	8	8
leva resta			7	4	3	12	6	6	17	8	9
Da 3	2	1	8	4	4	13	6	7	leva resta		
4	2	2	9	4	5	14	6	8	Da 9	9	0
5	2	3	10	4	6	15	6	9	10	9	1
6	2	4	11	4	7	leva resta			11	9	2
7	2	5	12	4	8	Da 7	7	0	12	9	3
8	2	6	13	4	9	8	7	1	13	9	4
9	2	7	leva resta			9	7	2	14	9	5
10	2	8	Da 5	5	0	10	7	3	15	9	6
11	2	9	6	5	1	11	7	4	16	9	7
leva resta			7	5	2	12	7	5	17	9	8
Da 3	3	0	8	5	3	13	7	6	18	9	9
4	3	1	9	5	4	14	7	7			

AVANZO

Dipoi



Di poi il numero maggiore, dal quale si deve sottrarre si pone sopra, e sotto si pone il minore, avvertendo di porre sempre numero sotto numero, decine sotto decine, centinaia sotto centinaia, tanto semplici, quanto di migliaia, e di milioni, &c. Come si

G vede nell' esempio G, e si comincia a man destra  
 Da 8764. dicendo da 4. leva 2. resta 2., che si pone sotto  
 Sottra 5232. il 2.; da 6. leva 3. resta 3., che si pone sotto il 3.;  
 da 7. leva 2. resta 5., che si pone sotto il 2., e  
 Resto 3532. finalmente da 8. leva 5. resta 3., che posto sotto il  
 5. è finita l'operazione, essendosi trovata la differenza di quei numeri, cioè 3532.

34. D. Quando alcune figure di numero sono maggiori di sotto, che di sopra, come si sottra?

R. Allora alla figura minore di sopra s'aggiunge 10., e da quella somma si leva la figura del numero da sottrarsi, e la differenza, o resto si segna sotto la figura sottratta. Il 10. aggiunto alla figura minore di sopra è una decina, un centinaio, un migliaio, una decina di migliaia, &c. secondo il luogo, e posto, dove si trova la figura minore di sopra, dalla quale si deve fare la sottrazione; che però la figura che immediatamente segue di sopra s'intende meno 1. per la decina imprestata come si suol dire. Di poi si seguita a sottrarre nel medesimo modo. E per essere più inteso sia

l' Esempio H. si cominci dal numero semplice, e si dica da 3. leva 0. resta 3. qual si pone sotto il 0.,  
 Da 186523. si seguita da 2. leva 4. non si può, aggiunto 10.  
 48240. al 2. fa 12., da 12. leva 4. resta 8. qual si scrive sotto il 4.; Ora il 5. che immediatamente segue di  
 138283. sopra è restato 4. per un centinaio, o vogliasi dire  
 10. decine imprestate alle due decine; onde si dica da 4. leva 2. resta 2., qual si segna sotto il 2.; dipoi da 6. leva 8. non si può; aggiunto 10. fa 16., ora da 16. leva 8. resta 8., qual si nota sotto l'8., e per la ragione detta l'8. di sopra s'intende 7., per esser si imprestate 10. migliaia alle 6. migliaia; per il che si dice da 7. leva 4. resta 3., qual si pone sotto il 4., e finalmente da 1. leva nulla resta 1., qual si segna sotto a canto al 3., & è finita l'operazione, essendo la differenza di quei due numeri 138283.

35. D. Quando fussero di sopra più zeri, come si fa a levare la decina, che s'impresta?

R. Allora si pigliano li zeri per tanti 9. formando finalmente d'una la figura significativa di numero, che segue dopo d'essi, e s'operi come si è detto. La ragione di far questo è, perche 1. che si leva dalla

dalla figura significativa, accompagnato con zeri così: 1000. dice mille, dal quale levato 1., che s'impresta, resta 999. Si veda l'Esempio I. Da 4. leva 8. non si può, aggiunto 10. al 4. fa 14. da questo leva 8. resta 6., si segna sotto; ora per ragione detta si dica da 9. leva 2. resta 7. : da 9. leva 6. resta 3., da 9. leva 4. resta 5., e l'8. è restato 7., dunque da 7. leva 3. resta 4., e da 1. leva 1. resta nulla, & è finita la lezione, e la differenza è 45376. come si vede.

36. D. Come si fa il sottrarre in altro modo?

R. Si abbia da fare il medesimo sottrarre dell'Esempio I. si dica da 4. leva 8. non si può; s'aggiunge, come si è detto, 10. al 4. fa 14. da questo leva 8. resta 6., qual si segna sotto. Ora per la decina aggiunta non si scemi di 1. la figura seguente di sopra, ma si cresca di 1. la figura seguente di sotto a mente, si come a mente si scema il numero seguente di sopra, senza toccare le figure de i Numeri, che per essere 2. cresciuta di 1. sarà 3., e così farassi sempre, quando s'aggiunta la decina al numero antecedente di sopra, per levare quel di sotto. Ora si seguiti da 0. leva 3. non si può, aggiunto 10. da 10. leva 3. resta 7., qual si segna, & a mente si cresce di 1. il numero 6., e dirà 7. da 0. leva 7. non si può, aggiunto 10., da 10. leva 7. resta 3., qual si segna; il 4. s'intende per 5., per la ragione detta; da 0. leva 5. non si può, da 10. leva 5. resta 5. qual si segna; il 3. s'intende per 4. da 8. leva 4. resta 4. qual si segna; e finalmente da 1. leva 1. resta nulla, e la differenza è 45376. come prima. Il primo modo d'operare è secondo la verità, questo è secondo l'uso, per riuscire più facile.

37. D. Si può usare altro modo nel fare l'operazione del sottrarre?

R. Sicuro, e questo modo è bene insegnarlo a gli Scolari, perche serve a fare il Partire a danda brevemente, per farsi a mente il Sottrarre, come a duo luog si vedrà. Sia l'Esempio K.

Esempio K  
 Ora in cambio di dire, da 3. leva 0., si dica da 0. 186523. a trovar il 3. di sopra ci è 3., qual si segna sotto  
 48240. il 0.; dipoi dal 4. al trovar il 2. (non dovendosi tornare indietro) non si trova il 2. espresso insino  
 138283. al 12., perche essendo maggiore la figura del numero di sotto, di quella di sopra, allora s'intende a quella di sopra aggiunto 10., & ogni volta s'aggiungerà a mente 1. alla figura seguente di sotto, secondo il modo antecedente. Dunque si torni a dire da 4. a trovar 12. ci è 8. qual si segna sotto il 4. & aggiunto a mente 1. al 2. dice 3. ora da 3. a 5. di sopra ci è 2., qual si segna; da 8. a 6. non si può

pub: da 2. à 16. ci è 8. qual si segna, & aggiunto 1. à mente al 4.  
dice 5. da 5. à 8. ci è 3. qual si segna, e finalmente da nulla ad 1.  
ci è 1. qual si segna, e sarà la differenza 138283.

Alcuni usano, quando il numero di sopra è minore, trovare la differenza del maggiore di sotto sino al 10. & à quella differenza, aggiungono il numero minore di sopra, e verrà il numero che resta. Per esempio da 15. leva 8. dicono da 8. à dieci ci è 2: al quale aggiunto 5. di sopra fa 7. per la differenza, è numero restato; ma meglio in una volta, come si è detto da 8. à 15. ci è 7. Tuttavia hò voluto ciò avvisare, per non lasciare cosa alcuna, & ancora perche può apportare qualche facilità nel sottrarre Monete, Pesi, e misure diverse, come sono per dire nel Trattato de' Rotti.

38. D. Ci è altro modo di Sottrarre?

R. Per allettamento, e curiosità de' Giovani nell' Esempio L. overo in altro, si pigliano tutte le figure di sopra, come se fossero tutti 9. da i quali facilmente si levano le figure di sotto, per essere ciascuna ò minore, overo uguale al 9, e restano 951759. quali si sommano con le figure di sopra per ordine, dalle quali si

Esempio L

186523.  
48240.  
-----  
951759.

deve sottrarre 1. per aggiungerlo alla somma delle prime due figure, cioè à 12. farà 13. qual' 1. si lascia di segnare nel fine della somma, e verranno le figure della differenza, e del resto, che si volevano.

39. D. essendosi sommato con cominciare dalla Resto 138283. parte sinistra di chi scrive, si può così anche sottrarre?

R. Volendo cominciare dalla parte sinistra s'offervi l'Esempio M. e si dica da 1. leva niente resta 1. e si segna sotto; da 8. leva 5. (perche al 4. s'aggiunge 1., e ciò si deve avvertire di fare ogni volta che il numero seguente di sotto è maggiore di quel di sopra, come qui 8. è maggiore di 6.) dunque da 8. leva cinque resta 3. e si segna sotto, e per quello 1. aggiunto al numero di sotto, aggiunge 10. al 6. seguente di sopra, e farà 16.; ora

Esempio M.

186523.  
48240.  
-----  
138283.

da 16. leva 8. resta 8. e si segna sotto e da 5. leva 3. per la ragione detta, resta 2. e si segna sotto; da 12. leva 4. resta 8. e si segna, e da 3. leva 0. resta 3. che segnato sotto è finita l' operazione del sottrarre, e la differenza è 138283.

40. D. Come si prova l' operazione del sottrarre, se sia giusta?

R. Si prova con un' altro sottrarre, perche sottrando la partita rimasta, chiamata differenza dalla partita superiore, resterà la partita prima.

prima sottratta, essendosi operato bene. Nell' Esempio M. da 2428. è stato sottratto 1746., & è restato 682. Ora per prova si sottrà 682. da 2428. dovrà restare 1746. se si è bene operato. La ragione di questo è, perchè il numero superiore 2428. per il sottrarre vien diviso in due parti, & numeri a lui uguali, cioè in 1746. & in 682. onde se si leva da esso 682. deve restare l' altro 1746. si come resta, dunque la lezione è ben fatta. Dalla qual ragione nasce la prova fatta col sommare, che ordinariamente si fa per essere più facile, e per essere operazione al sottrarre contraria.

Esempio N.

2428.

1746.

682.

1746.

La ragione di questo è, perchè il numero superiore 2428. per il sottrarre vien diviso in due parti, & numeri a lui uguali, cioè in 1746. & in 682. onde se si leva da esso 682. deve restare l' altro 1746. si come resta, dunque la lezione è ben fatta. Dalla qual ragione nasce la prova fatta col sommare, che ordinariamente si fa per essere più facile, e per essere operazione al sottrarre contraria.

41. D. Come si fa la prova col Sommare?

R. Si somma insieme il numero sottratto, & il numero restato, che è la differenza, la somma deve essere uguale al numero superiore,

Esempio O

37420.

18694.

18726.

è stato sottratto 18694., & è restato 18726. quale per prova sommato con 18694. la somma sarà 37420. come il numero superiore; Dovendo per la ragione passata, le parti prese insieme uguagliare il loro tutto.

42. D. Si fa altra prova al sottrarre?

37420.

R. Si fa la prova del 9., del 7., e d' altro numero ancora. All' Esempio P. si fa la prova del 9. ponendo 9. sopra X. si levano li 9. per la 26. dal numero 3728. sottratto, e resta 2. qual si pone al capo sinistro della traversa del X. si levino pure li 9. dal numero restato 3517. resta 7. quale si pone sotto il 2. all' altro capo dell' X. si sommano questi avanzi 7., e 2. fan 9. del quale la prova è, che si pone alla destra del 2. all' altro capo dell' X. Ora se l' operazione del sottrarre è fatta bene levandosi

Esempio P.

7245.

3728.

3517.

Il 9. dal numero superiore 7245. deve restare 0. si come resta, qual si pone sotto all' altro nel capo di sotto del l' X. è la lezione sta bene.

Esempio Q

6594.

2638.

3956.

Il medesimo ordine si terrà nel fare la prova del 7. levando li 7. col partire per la 27. nell' esempio Q. da 2638. l' avanzo è 6. levando li 7. da 3956. l' avanzo è 1. qual sommato con 6. fa 7. e la prova è o. Ora levando li 7. da 6594. pure è o. si che sta bene; Si faccia la prova nell' istesso esempio per altro numero; Si levino li 12. da 2638. l' avanzo è 10. si segni come si è detto, si levino li 12. da 3956. l' avanzo è 8. si segni

7.  
X

10. **X** 6. *Il seguita, e si sommi con 10. fa 18., e levato 12. l' avanzo è 6. di prova, quale si segna, Or levandosi li 12. da 6554. l' avanzo deve essere 6. come è, quale si segna sotto. Dunque la lezione è giusta.*

43. D. Quali sono i fondamenti della sottrazione?

R. Sono questi Affiomi, che la comprovano secondo la ragione: 1. Il maggior numero non si può sottrarre, ò levare dal numero minore. 2. Se da numero uguale si leva l'uguale, resta zero, e nullità. 3. Da zero leva zero, resta zero. 4. Se da numero pari si leva numero pari, resta pari. 5. E se da numero dispari si leva numero pari, resta dispari. 6. Ma se da numero dispari si leva minor numero dispari, resta pari. 7. E se dalli uguali maggiori si levano uguali minori, quelli che restano sono uguali. 8. E se da' disuguali maggiori si levano uguali parti; restano parti disuguali. 9. Il residuo della sottrazione è minore del numero, da cui si fa la sottrazione. 10. Il residuo, ò differenza col numero sottratto insieme è uguale a tutto il numero, da cui si è fatta la sottrazione.

## DISTINZIONE QUARTA.

### *Del Moltiplicare.*

44. D. **C**he cosa è moltiplicare, terza operazione dell' Arimetica?

R. Secondo la definizione xv. del 7º d'Euclide, è trovare un numero, che contenga tante volte uno de' due numeri, che si moltiplicano, quante unità sono nell'altro: come moltiplicando 2. via 4. si produce 8. che contiene due volte il 4., ovvero 4. volte il 2. ovvero si può definire così, che il moltiplicare sia trovare un numero, il quale abbia la medesima proporzione ad uno de' due numeri, che si moltiplicano, che hà l' altro all' unità: Come due via 4. fa 8. così 8. al 4. come 2. all' 1.; ovvero così sta l' 8. a 2, come 4. ad 1. la prima è proporzione doppia: la seconda è proporzione quadrupla; ovvero il moltiplicare altro non è, che produrre in un tratto la somma di più numeri uguali, come se quattro volte si finisce il 2. fa la somma di 8.

45. D. Quanti numeri si richiedono per moltiplicare?

R. Due: Uno detto numero moltiplicante, l' altro numero moltiplicato; questo è quello, che si compone di se stesso, e s'accreosce per tutte l'unità, che si ritrovano nel numero moltiplicante, quale viene espresso per la proposizione per. Il così accresciuto, si

C 6

chia-

chiama numero prodotto, & anche compollo globale causato da quei due numeri, i quali in astratto possono cambiarsi, e chiamarsi il moltiplicante moltiplicato, & il moltiplicato moltiplicante; mentre si ha il medesimo prodotto, & da moltiplicarsi 3. per 2., che 2. per 3.; ma in pratica ciascuno è determinato ad essere moltiplicato, & moltiplicante.

46. D. Avanti di fare il moltiplicare, che cosa si deve sapere?

R. Bisogna avere imparato prima a mente le seguenti Tavole di numeri, come onninamente necessarie a chi non volesse servirsi della Tavola Pitagorica.

### Tavole per il Moltiplicare.

1 via 1 fa 1	2	7	14	4	7	28	7 via 8 fa 56				
2	2	4	2	8	16	4	8	32	7	9	63
3	3	9	2	9	18	4	9	36	7	10	70
4	4	16	2	10	20	4	10	40	<hr/>		
5	5	25	<hr/>			<hr/>			8 via 9 fa 72		
6	6	36	3 via 4 fa 12	5	via 6 fa 30	8	10	80	<hr/>		
7	7	49	3	5	15	5	7	35	<hr/>		
8	8	64	3	6	18	5	8	40	9 via 10 fa 90		
9	9	81	3	7	21	5	9	45	<hr/>		
10	10	100	3	8	24	5	10	50	<hr/>		
<hr/>			3	9	27	<hr/>			Il zero via		
2 via 3 fa 6	3	10	30	6 via 7 fa 42	<hr/>			zero, fa zero, fa			
2	4	8		6	8	48	come zero via				
2	5	10	4 via 5 fa 20	6	9	54	qualifica nume-				
2	6	12	4	6	24	6	10	60	ro fa zero.		

Altre Tavole sono nel Libretto a parte, che s' imparano per più prontamente fare i conti.

47. D. Qual'è la Tavola Pitagorica, e come serve all' operazione del moltiplicare?

R. E' la seguente, della quale l'uso circa il moltiplicare è questo: Volendo per esempio sapere quanto fa 4. via 5., si trovi 4. nella fila à mano sinistra, & il 5. nella fila trasversale superiore; Dipoi s' offervi il quadrato comune, che corrisponde all' uno, & all' altro numero, nel quale è notato 20., e tanto fa 4. via 5.; ovvero trovato il 4. à man sinistra si contino 5. quadrati a traverso, che pure si troverà 20. per il prodotto di 4. via 5. o finalmente pigliando il cinque si contino 4. quadrati che sempre s' incontrerà 20.; Così per trovare altro prodotto delle figure de' numeri che si trovano nella fila superiore, e nella fila à man sinistra. Raimondo



**5.10.2.2. Compila il moltiplicatore detto "Crocetta"**

R. Si pongono i numeri gl'uni sotto gl'altri, con l'ordine più vol-  
 -le detto. La prima sia da moltiplicarsi 87. per. 34. posto di sopra.  
 -Ba di sotto 34. si dica 4. via 7. fa 28. : si segna sotto 8. e si ten-  
 -gono a mente le decine s'aggiunge al prodotto seguente. Ades-  
 -so in trece 4. via 8. fa 32. : e di decine fa 24. e 3. via 7. fa 21.  
 : aggiunto a 24. fa 55. si segna 5. e si canta all'8. finalmente 3. via  
 -8. fa 24. e 6. fa 29. qual si segna. e farà finito. essendo il pro-  
 -dotto 2958. come nell' Esempio D.

Si abbia da moltiplicare 846 per 52, si moltiplica 2. via 6. fa 12. si segna 2. si serba 1. e poi 2. via 4. fa 8. aggiunto 1. fa 9. dipoi si moltiplica 2. via 5. fa 10. e 9. di prima fa 39. si segna 9. e si serba 3. Ora si moltiplica 2. via 8. fa 16. aggiunto 3. fa 19. Si moltiplica 5. via 6. fa 30. con 19. fa 39. si segna 9. e si serba 3. Finalmente si moltiplica 5. via 8. fa 40. aggiunto 3. fa 43. quale si segna, e farà il prodotto, come nell' Esempio E.

Si abbia pure da moltiplicare 846. per 458. si moltiplica 2. via 6. fa 12. si segna 2. si via 4. fa 8. , aggiunto 1. fa 9. & in croce 5. via 6. fa 30. e 9. di prima fa 29. si segna 9. e si serba 3. si moltiplica 2. via 8. fa 16. , e 3. serbato fa 19. si moltiplica in croce 4. via 6. fa 24. con 19. fa 43. si moltiplica 5. via 4. fa 20. con 43. fa 63. si segna 3. e si serba 6. si moltiplica 5. via 8. fa 40. con 6. fa 46. si moltiplica in croce 4. via 4. fa 16. con 46. fa 62. si segna 2. e si serba 6. : finalmente si moltiplica 4. via 8. fa 32. con 6. fa 38. si segna , e fa il prodotto 382392. come nell' Esempio F.

### Esempio D.

$$\begin{array}{r} 87 \\ \times 34 \\ \hline 2958 \end{array}$$

### Esempio E.

846.  
IX.  
521.  

---

43992.

### Esempio F.

8 4 6.  
: X : X :  
4 5 2.  

---

382392.

**52. D. Come si fa il moltiplicare detto per ripiego?**

R. Quando due, è più numeri, per lo più digiti, fra le moltiplicati producono un numero, rispetto a questo, quelli si dicono numeri di ripiego, come del 24. i numeri di ripiego sono 3. e 8. pure 4. e 6. ovvero 2. e 12. ancora 2. 3. e 4. finalmente 2. 2. 2. e 3. quali fra le moltiplicati producono 24.; Onde volendosi moltiplicare 368. per 24. il 368 si può moltiplicare per li numeri di ripiego del 24. cioè per 3. e fa 1104. e questo per 8.



e fa 8832. è tanto avèrebbe fatto moltiplicandosi 368. per 24. e così avverrà con adoprare gl' altri numeri di ripiego, come si vede nell' Esempli G. H. I. K.

G	H	I	K
368 — 3	368 — 4	368 — 2	368 — 2
1104 — 8	1472 — 6	736 — 3	736 — 2
8832.	8832.	2208 — 4	1472 — 2
		8832.	2944 — 3
			8832.

La ragione di tal moltiplicare si ricava dalla prima proposizione del 2° d'Euclide applicata a i numeri; Tal modo è assai comodo, e breve nell' avere a moltiplicare diverse Monete, Pesi, e Misure, come a suo luogo; benchè non è universale, perche molti numeri non hanno ripiego, per essere numeri. primi, cioè misurati dalla sola unita, per la definizione x1. del 7° d' Euclide. Tuttavia si potrebbe moltiplicare per ripiego, anche quando si dovesse moltiplicare per numero primo, con questa industria, pigliando il numero suo prossimo antecedente, ovvero seguente, come torna comodo per i numeri di ripiego, per essere numeri composti. Come si abbia a moltiplicare 3876. per 29. numero primo, cioè, che è solo misurato dall' unità; Si pigli il numero prossimo antecedente 28. del quale 4. e 7. son numeri di ripiego, per questi si moltiplichì 3876. & al prodotto s'aggiunga 3876. per uno di meno, che si è moltiplicato, e la somma farà l'intero prodotto; ovvero si pigli 30. numero prossimo seguente, del quale 10. e 3. ovvero 5. e 6. sono numeri di ripiego, per questi si moltiplichì 3876. dal prodotto si sottrì 3876. per uno di più, che si è moltiplicato, e resterà il prodotto come prima. Si vedano gl'Esempli P. Q.

A' Scala.	P'	Q
3876. — 29	3876 — 4	3876 — 10
34884	15504 — 7	38760 — 3
7752	108528	116280
112404.	3876	3876. Sottra.
	Somma.	112404.
	112404	E per
	D	

E per rendere maggiormente universale il moltiplicare per ripiego; qui pongo il moltiplicare spezzato, che nasce dalla medesima proposizione prima del 2.<sup>o</sup> d' Euclide, che gli può servire, come dirò, & anche lo pongo per alcune evidenze, che a suo luogo si faranno manifeste; e si faciosi. Proposti due numeri da moltiplicarsi, per esempio 386. per 19. si parta 19 in alcune parti, che sommate restituiscano il medesimo 19. come qui in 4. 7. e 8. per queste si moltiplichino 386. i prodotti si sommino, la somma sarà il prodotto di tale moltiplicazione.

19		
4	→ 386	1544
7	→	2702
8	→	3088
Prodotto		7334

A Scala. Si possono dividere tutti 386 — 19 due i numeri in alcune parti, per l'istessa proposizione prima ampliata da Federico Comandino, e moltiplicare ciascuna parte d'uno via tutte le parti dell' altro, e sommare i

prodotti, e la somma sarà il prodotto della moltiplicazione di quei due numeri. Sia da moltiplicarsi 12. per 8. diviso il 12. in 3. 4. e 5. e il numero 8. in 6. e 2. per queste si moltiplichino l' altre, e si sommino i prodotti, sarà la somma, per il prodotto totale 96.

12 per 8	
3	6 — 18
4	2 — 24
5	— 30
	6
	8
	10
Somma	96.

8064 — 143
8064 — 10
80640 — 7
564480 — 2
1128960
24192
1153152.

Per tornare al moltiplicare per ripiego, s'abbia da moltiplicare 8064. per 143. il 143. non ha numeri di ripiego, ma levando 3. resta 140. il quale ha molti numeri di ripiego. Si pigliano adesso 10. 7. e 2. e per questi si moltiplichino 8064. come si è insegnato, all'ultimo prodotto s'aggiunga il prodotto di 8064. per 3. parte levata da 143. e verrà 1153152. come si vede nell'Esempio posto qui sopra.

93. D. Come si fa il moltiplicare per scapezzo, o per tronco?

R.

R. Allora si può fare, quando ci sono zeri nelli numeri da moltiplicarsi in fine ; perche si troncano quei zeri dall'altre figure di numeri, e le figure restate si moltiplicano, & al loro prodotto s'aggiungono li zeri tagliati. Come se si voglia moltiplicare 300. per 20. si moltiplica 3. per 2. fa 6. al quale s'aggiungono tre zeri. fa 6000. per il prodotto di tale moltiplicatione. Così 1200. per 800. si moltiplica 12. per 8. fa 96. con quattro zeri, dice 960000. Finalmente si moltiplichj 40600. per 500., cioè 406. per 5., fa 2030. con l'aggiunta di quattro zeri, dice 20300000. S'osservi che i zeri in mezzo a i numeri non si tagliano, come è il zero in mezzo al 4., & al 6. del 406. Di più s'avverta, che a moltiplicare numero per 10. s'aggiunge un zero à tal numero. Per 100. s'aggiungono due zeri, per 1000. s'aggiungono tre zeri, &c. S'osservino gl'esepj L.M.N.O.

L	M	N	O
3100 — per 210	12100 — 8100	406100 — 5100	26 — 100
6000.	960000.	20300000.	2600.

54. D. Come si moltiplica per Quadrato , ò per Quadrilatero ?

R. Questi, & altri modi s'accennano più per bizzarria, curiosità, e spasso , che per necessità, mescolando così il dolce con l'utile . Si deva moltiplicare 586. per 9464.; fatta la figura quadrata , che contenga altri 16. quadrati piccoli , si moltiplichj per 4. il 589. ponendo il prodotto nelli quadrati superiori per ordine ; dipoi per l'altre figure 6. 4., e 9. collocando i prodotti nel 2.º 3.º e 4.º ordine de' quadrati, e sommandoli diametralmente cominciando di sopra à man destra come si è fatto nell' Esempio R.

R	586	S	586	
	9464		9464	
2	3	4	4	4
3	5	1	6	0
2	3	4	4	9
5	2	7	4	5
5	5	4		
			9	0
				4

Si averà il prodotto intorno al Quadrato 5545904. Ma chi avesse moltiplicato 586. per il 9. numero di migliaia , e per l'altre figure per ordine , allora i prodotti si sommano di sotto diametralmente à mano destra, come nell' Esempio S. D 2 Se

T 9464  
586

5	6	7	8	4	4
7	5	7	1	2	0
4	7	3	2	0	9

Se poi si fosse moltiplicate 9464. per 586. allora si farebbe formato un Quadrilatero di 5. quadrati per un verso, e per l'altro di 3. e per regola generale li quadrati per un verso devono essere un più delle figure da moltiplicarsi, e per l'altro verso uguali alle figure moltiplicanti, come si vede nell' Esempio T.

55. D. Come si fa il moltiplicare per Gelosia?

R. Questo è poco differente da i passati. Si abbia da moltiplicare 4868. per 3645. Si faccia un Quadrilatero, che contenga tanti quadrati per lungo, quante sono le figure da moltiplicarsi, e tanti quadrati per largo, quante sono le moltiplicanti, che faranno 4. quadrati per ogni parte. Dipoi volendosi cominciare a moltiplicare numero via numero semplice, si tirano i diametri, dall'angolo superiore sinistro, all'angolo inferiore destro di ciascuna quadrato, per distinguere i numeri da sommarli, come nell' Esempio V. Ma volendo cominciare a moltiplicare dal numero di migliaia di sotto via il numero dimigliaja di sopra, i diametri, o linee

V

4	8	6	8	
3	6	4	5	
0	0	0	0	0
2	4	3	4	6
1	3	2	3	8
4	8	6	8	3
2	4	3	4	
1	2	1	2	

1 7 7 4

X

	4	8	6	8
	3	6	4	5
1	1	2	1	2
7	2	4	8	4
7	4	8	6	8
7	1	3	2	3
4	6	2	4	2
	2	4	3	4
	0	0	0	0

3 8 6 0

transversali si tirano al contrario, come si vede nell' Esempio X. Dicasi poi nell' Esempio V. 5. via 8. fa 40. ponendo 0. nel Triangolo superiore, & il 4. nell'inferiore del primo quadrato superiore a mano destra, dipoi 5. via 6. fa 30. ponendo 0. sopra, & il 3. sotto

sotto nel secondo quadrato per ordine, e così si procede negli altri numeri, Si sommano i prodotti numeri compresi dalle linee trasversali, cominciando di sopra dalla parte destra, e la somma 17743860. è il prodotto totale. Nell' Esempio X. si dica 3. via 4. fa 12. ponendo 1. nel Triangolo inferiore del Quadrato di sopra sinistro, il 2. di sotto: Poi 3. via 8. fa 24. ponendo il 2. di sopra & il 4. di sotto nel secondo Quadrato, Così 3. via 6. fa 18. ponendo 1. di sopra, & 8. di sotto nel terzo Quadrato per ordine, & in questo modo s'opera con gl'altri numeri, e sommati i prodotti, cominciando dalla parte destra inferiore, verso la sinistra sarà 17743860. prodotto totale.

56. D. Come si fa il moltiplicare à Piramide, & à Calice?

R. Il moltiplicare à Piramide si fa così. Si abbia da moltiplicare 6868. per 4646. posti uno sotto l'altro per Piedestallo, dicasi 6. via 8. fa 48. qual si segna sopra i numeri distinti con una linea retta alquanto infuora, dipoi dicasi 6. via 6. fa 36., il 6. si pone sopra

Y	Z	il 4. & il 3. à canto nella fila inferiore ; così 6. via 8. fa 48. si segna 8. sopra il 3. & il 4. à canto nella fila di sotto ; dipoi 6. via 6. fa 36., il 6. si segna sopra il 4. il 3. à canto di sotto. Ora con il 4. numero di decine di sotto via 8. fa 32. e per essere decine il 2. si segna sopra il 6. decine, & il 3. sopra l'8. centinaja. Dipoi 4. via 6. fa 24., il 4. si pone sopra il 3. centinaja, & il 2. sopra il 6. miglaja ; e così di mano, in mano si va avvanzandosi con il medesimo ordine, secondo la
Y	Z	45. i prodotti si sommano, e la somma sarà 31908728. prodotto totale della moltiplicazione, e servirà di
0	23234348	
42	343686	
36	464232	
2848	2324	
2324	2848	
464232	36	
343686	42	
23234348	0	
<hr/> 6868	<hr/> 6868	
<hr/> 4646	<hr/> 4646	
<hr/> 31908728	<hr/> 31908728	

basse al Piedestallo della Piramide, come nell' Esempio Y. così si fa il moltiplicare à Calice, ponendo solo i Prodotti di sopra, acciò venga la Piramide, & Triangolo rivoltato, e ne formi figura di Calice, come nell' Esempio Z. si vede, stimando superfluo di dare altra esplicatione.

Finalmente si noti, che dalla moltiplicazione deriva l' espressione de' numeri avverbiali ; cioè delle veci, & delle volte, che un numero contiene l'altro, come interrogandosi *Quoties?* Quante volte, & veci? si risponde *Toties*; Tante volte, & veci: cioè *semel* una sola volta; *bis* due volte; *ter* tre volte; *quater* quattro volte; *quin-*

*quinqüies* cinque volte, &c. *centies* cento volte; *millies* mille volte, ò mille veci, &c. E quindi deriva il numero Moltiplice, perche il numero preso una sola voce, si dice semplice, latinamente *simplex*, *vel simplex*: preso due volte, dicefi numero doppio, *duplex*, *vel duplex*: preso trè volte, dicefi triplo, ò pure triplice, ò triplicato; *triplex*, *vel triplus*: quattro volte preso, quadruplo, quadruplice, *quadruplex*, *quadruplus*: cinque volte preso, quintuplo, *quintuplex*; e così con iterare il medesimo numero più volte, viene moltiplicato, replicato, e raccolto insieme tante volte, quanto bisogna, per chiamarsi decuplo, centuplo, millecuplo, &c. Onde si dice v. g. trè via quattro fa dodici, cioè trè volte quattro produce 12. *ter quatuor efficit duodecim*; e così il numero 12. al 4. è triplo; & il numero stesso 12. al 3. è quadruplo.

57. D. Come si fa la prova del Moltiplicare?

R. La prova propria si fa col partire, perche partendo il prodotto; per uno de' due numeri, che si sono moltiplicati, ne risulterà l'altro numero lasciato: dalla moltiplicazione di 2. via 4. il prodotto è 8. se si partirà l'8. per 2. ne verrà 4. ovvero l'8. per 4. ne verrà 2. ma non essendosi parlato ancora del partire, questa prova, per adesso si tralascia.

58. D. Si prova il moltiplicare altrimente.

R. Con la prova del 9. del 7. e d'altro numero, come volendo provare l'Esempio A. si levino li 9. da 3074. numero moltiplicato, l'avanzo 5. si ponga dalla parte sinistra dell' X. si levino li 9. da 365. l'avanzo 5. si ponga di sotto. Si moltiplichino gl'avanzi 5. via 5. fa 25. dal quale levati li 9. resta 7. qual si pone dalla parte destra dell' X. Dico adesso, che levando li 9. dal prodotto 1122010. l'avanzo deve essere 7. se si è operato giustamente, si come è; qual 7. si pone sotto all'altro. Nell'istessa maniera si fa la prova del 7. del 5. e del 12. avvertendo di levare tali numeri col partire, potendosi solo li 9. & anche li 3. levare con il sommare.

Esempio A

3074  
per 365

1122010. Prod.

$\overset{9}{5} \overset{7}{X} \overset{1}{7}$    
  $\overset{7}{1} \overset{7}{X} \overset{1}{1}$    
  $\overset{5}{4} \overset{5}{X} \overset{0}{0}$    
  $\overset{12}{2} \overset{12}{X} \overset{10}{10}$   
 $\overset{5}{5} \overset{7}{X} \overset{7}{7}$    
  $\overset{1}{1} \overset{7}{X} \overset{1}{1}$    
  $\overset{0}{0} \overset{5}{X} \overset{0}{0}$    
  $\overset{10}{5} \overset{10}{X} \overset{10}{10}$

La ragione di queste Prove è, perche i numeri, che trà se si moltiplicano sono uguali virtualmente al prodotto; onde di quei numeri, moltiplicati gl'avanzi, vengono à dare un numero prodotto, dal quale levando, per le prove dette li 9. li 7. &c. l'avanzo deve essere uguale all'avanzo, che verrà dal levarsi tali numeri dal.

dal prodotto della moltiplicazione, per la 28.

59. D. si dà altra prova del moltiplicare?

R. Si come la prova del sommare si è fatta col sommare, del sottrarre col sottrarre, così ancora si può provare il moltiplicare col

Esempio B	Prova.
3654	1827
per 356	712
<hr/>	<hr/>
21924	3654
18270	1827
10962	12789
<hr/>	<hr/>
1300824. Uguali.	1300824.

moltiplicare dato in proporzione. E questa prova ho usata nelle Scuole, dando doppia lezione agli Scolari, acciò s'industriaessero in emendar l'errore, quando tutte due non avessero dato il medesimo prodotto.

Si voglia provare il moltiplicare dell' Esempio B. si

pigli la metà del numero moltiplicato 3654. che è 1827. e si raddoppi il numero moltiplicante 356. che sarà 712. per il quale si moltiplichino 1827. ne doverà venire il medesimo prodotto, come viene; cioè 1300824.

Se i numeri da moltiplicarsi fossero uno pari, l'altro dispari, è caso; allora si piglierà la metà del pari, e si raddoppierà il dispari come nell' Esempio C.

Esempio C.	Prova.
3457	6934
896	448
<hr/>	<hr/>
20802	55472
31203	27736
27736	27736
<hr/>	<hr/>
3106432. Uguali.	3106432.

Mà se saranno tutti due dispari; S' offervi, se uno di quelli è misurato da 3; dal 5. dal 7. &c. e per uno d'essi si parta, e per il medesimo si moltiplichino l' altro, e s'averanno due numeri, che moltiplicati doveranno fare prodotto uguale a quello della lezione.

Siano da moltiplicarsi 1401. per 267. per il 3. si parte 1401. e viene 467. Per 3. si moltiplichino 467. e verrà 801. Si moltiplichino 467. per 801. es' averà il medesimo prodotto 374067. che per la lezione. S' offervi l' Esempio D.

Esemp. D. 1401.	Prova.	
267	467	
<hr/>	<hr/>	
9807	801	
8406	467	
2802	3736	
<hr/>	<hr/>	
374067. Uguali.	374067.	

Essendo numeri dispari non misurati, che dall' unità, allora si raddoppi uno di quelli, per l' altro si moltiplichino il raddoppiato: il prodotto sarà doppio di quello.

## Esempio E

$$\begin{array}{r}
 3751 - 947 \\
 \hline
 26257 \\
 15004 \\
 \hline
 33759 \quad \text{per } 2. / 7104394 \\
 \hline
 3552197. \text{ Uguali } 3552197
 \end{array}$$

Prova.

$$7502 - 947$$

$$32514$$

$$30008$$

$$67518$$

quello della lezione, il quale partendosi per 2. verrà uguale. S'abbia a moltiplicare 3751. per 947. e fatta la moltiplicazione è il prodotto 3552197. Volendone far prova si raddoppi 3751. e sarà 7502. e questo si moltiplichi per 947. produrrà 7104394. la metà del quale è 3552197. quanto il pro-

dotto della lezione. Si veda l'Esempio E.

La ragione della prova di quest'ultima lezione è, perche raddoppiandosi uno de' due numeri da moltiplicarsi, allora l'altro numero doppiamente vien preso, e causa il prodotto duplicato. Parimente, se uno di quelli si triplicasse, quadruplicasse, &c. verrebbe il prodotto della moltiplicazione triplicato, quadruplicato, &c. E se tutti i due numeri si raddoppiassero, pure il prodotto sarebbe quadruplicato; che però partendosi per 4. il Quoziente sarebbe uguale al prodotto della lezione. Ecco l'Esempio F.

Prova.

## Esempio F

$$829 - 347$$

$$\hline$$

$$5803$$

$$3316$$

$$2487$$

$$\hline$$

$$287663.$$

$$\hline$$

## Doppio. 1658 — 694 Doppio.

$$6632$$

$$14922$$

$$9948$$

$$\hline$$

$$\text{per } 4. / 1150652$$

$$\hline$$

$$287663.$$

$$\hline$$

La ragione poi, che pigliando la metà, il terzo, il quarto, &c. d'uno de' numeri da moltiplicarsi, e raddoppiando, triplicando, quadruplicando l'altro, fatta la moltiplicazione, danno il medesimo prodotto, che li primi numeri, è, perche questi secondi numeri con i primi fanno quattro numeri proporzionali, ponendo uno de i secondi nel primo luogo, e l'altro nel quarto. Per esempio, siano da moltiplicarsi 6. e 4. pigliando la metà di 6. e 3. che si porrà in primo luogo, e il doppio di 4. che è 8. che si porrà in quarto luogo, e saranno così 3. 6. 4. 8.: e si poteva mettere ancora in primo luogo l'8. e ordinarli così: 8. 6. 4. 3. sono proporz-



proporzionali, per la definizione xx. del 7.<sup>o</sup> d'Euclide: Onde per la Proposizione 19. del medesimo Libro; il primo moltiplicato via il quarto fa il medesimo prodotto, che il 2.<sup>o</sup> via il terzo; cioè 24. nell' esempio dato. Pure partendo 6. per 3. vien 2. e moltiplicando 4. per 3. fa 12. e staranno così: 2. 4. 6. 12. ovvero 12. 6. 4. 2. e sono proporzionali per la medesima definizione; sicchè appare chiaro per la Proposizione detta il perchè causino il medesimo prodotto 4. via 6., che 12. via 2., cioè 24.

Queste prove, che si possono chiamare proporzionali, fanno un bel comodo al Maestro con dare le lezioni in proporzione in molte regole, con avvertire li Scolari, che il risultato da quelle lezioni ha da essere il medesimo; onde s'industrino a ben' operare; dalche nascerà, che rare volte porteranno le lezioni mal fatte.

60. D. Qual modo si tiene, acciò il prodotto d' una moltiplicazione costi d' una medesima figura 1. 2. 3. 4. &c.

R. Volendo, che ciascuna figura del prodotto sia 1. 2. 3. 4. &c. Si pigli il doppio centinaja, e tre volte decine, e sommate, alla somma s' aggiunga la figura, che ha da venire nel prodotto, e questo numero per regola ferma si moltiplichi per 481. e si averà l' intento. Per esempio si voglia, che il prodotto costi d' unità, si pigli il doppio centinaja, sono 200. unità, piglia 3. volte decine sono 30. unità, sommate fanno 230. con 1. fa 231. quale moltiplicato per 481. il prodotto sarà 111111. Se ora si raddoppierà 231. ovvero 481. e si moltiplicherà per l'altro numero restato, verranno tutti 2. se uno de' due si triplicherà, verranno tutti 3. se si quadruplicherà, tutti 4. &c. La ragione di questo è, perchè è come se si raddoppiasse il prodotto, triplicasse &c. Si vedano gl' Esempj G. H. I.

G

$$\begin{array}{r} 231 - 481 \\ \hline 231 \\ 1848 \\ 924 \\ \hline 111111. \end{array}$$

H

$$\begin{array}{r} 462 - 481 \\ \hline 462 \\ 3696 \\ 1848 \\ \hline 222222. \end{array}$$

I

$$\begin{array}{r} 1443 \\ 693 \\ \hline 4329 \\ 12987 \\ 8658 \\ \hline 999999. \end{array}$$

Si piglino pure 777. e 143. si moltiplichino insieme, verranno tutti uni, e raddoppiando, ò triplicando, &c. uno de' due numeri, i prodotti saranno tutti 2. ovvero 3. &c.

E

777

$$\begin{array}{r}
 34 \\
 777 - 143 \\
 \hline
 2331 \\
 3108 \\
 777 \\
 \hline
 11111.
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 1554 - 143 \\
 \hline
 4662 \\
 6216 \\
 1554 \\
 \hline
 22222.
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 6216 - 143 \\
 \hline
 18648 \\
 24864 \\
 6216 \\
 \hline
 88888.
 \end{array}$$

In questi prodotti le figure sono 6. ma volendone 5. sole, li pigliano al doppio centinaia, cioè se la figura che si vuole far venire è 1. si piglia 200. unità, sei volte decine, cioè 60. unità, e si somma con 11. viene 271. quale per regola ferma si moltiplichi per 41. verranno 5. figure, cioè 11111. con raddoppiare, triplicare, &c. verranno 2. 3. &c.

$$\begin{array}{r}
 271 - 41 \\
 \hline
 271 \\
 1084 \\
 \hline
 11111.
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 542 - 41 \\
 \hline
 542 \\
 2168 \\
 \hline
 22222.
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 271 - 369 \\
 \hline
 369 \\
 2583 \\
 738 \\
 \hline
 99999.
 \end{array}$$

61. D. Che modo si tiene per avere un prodotto tramezzato di sei figure, come à dire 373737.

R. Si pigliano decine al doppio del numero, che rappresentano quelle due figure 37. cioè 740. unità, al quale s'aggiungano 27. fanno 777. qual somma si moltiplichi per regola ferma per 481. verrà il proposto numero, e così degli'altri: Ma per chi sa il partire s' insegna questo modo: Si partano le figure 6. tramezzate, per 481. il quoziente sarà numero intero, per il quale moltiplicato 481. verrà il prodotto ricercato. Come partendo 686868. per 481. il quoziente è 1428. onde moltiplicandosi per 481. verrà il prodotto detto.

$$\begin{array}{r}
 777 - 481 \\
 \hline
 777 \\
 6216 \\
 3108 \\
 \hline
 373737.
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 1428 \\
 481 \\
 \hline
 1428 \\
 11424 \\
 5712 \\
 \hline
 686868
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 2037 \\
 481 \\
 \hline
 2037 \\
 16296 \\
 8148 \\
 \hline
 979797.
 \end{array}$$

Chi

Chi volesse il prodotto di 5. figure si moltiplichi 481. per 21., e verrà 10101., raddoppiando 21. per 42., verrà 20202., per 63: verrà 30303. &c.

Finalmente volendo un prodotto di dodici figure medesime, ò tramezzate, si partano per regola ferma quelle dodici figure per 900991., e il quoziente farà l'altro numero. Come partendo 222222222222. ne viene 246642. qual moltiplicato per 900991. produrrà il prodotto di 12. 2. si possono variare i prodotti con raddoppiare, triplicare, &c. uno de' numeri come sopra.

$$\begin{array}{r}
 900991 \\
 246642 \\
 \hline
 1801982 \\
 3603964 \\
 5405946 \\
 5405946 \\
 3603964 \\
 1801982 \\
 \hline
 222222222222. \\
 \hline
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 900991 \\
 257853 \\
 \hline
 2702973 \\
 4504955 \\
 7207928 \\
 6306937 \\
 4504955 \\
 1801982 \\
 \hline
 232323232323. \\
 \hline
 \end{array}$$


62. D. Come s'intende numero piano prodotto da due numeri detti laterali, che si siano moltiplicati secondo la definizione xvi. del 7.<sup>o</sup> d' Euclide.

R. Secondo il mio parere il numero piano prodotto dalla moltiplicazione di due numeri è una disposizione d'unità per larghezza, e lunghezza a guisa di parallelogrammo rettangolo. Come è uno Squadrone di Soldati, che per lunghezza fussero 30. e per larghezza 20., il numero piano di quei Soldati sarebbe 600.

II Tartaglia nel cap. ix. del 2.<sup>o</sup> lib. dice: che quando il numero delle misure d'una linea sarà dutto nel numero delle misure d'un'altra linea, il suo prodotto non sarà numero della medesima specie, cioè non sarà numero di misure lineali, anzi sarà di misure superficiali, &c.

Io però simo, che il numero, ò prodotto di misure superficiali, non venga da' numeri lineali, mà da' numeri superficiali; come chiaro appare in un rettangolo per lunghezza di 6. palmi, e per larghezza di palmi 4. che sono superficiali, onde moltiplicati producono il rettangolo di 24. palmi superficiali; à quella guisa, che uno volesse sapere quanti Vetri

d'un palmo, andassero ad una Finestra lunga palmi 6. larga 4. per di dentro; che si moltiplicherebbero 6. Vetri di lunghezza, e 4. di larghezza, e verrebbero 24. Vetri per tale Finestra. Ol-



tre che la definizione del moltiplicare anche ciò dimostra, che è pigliare un numero tante volte, quante unità sono nell'altro; onde chi pigliasse sei palmi lineali quattro volte, averebbe 24. palmi lineali, è non superficiali, come vorrebbe il Tartaglia. Ma più manifestamente si conosce questa per la seconda definizione del moltiplicare apportata dal Clavio nella definizione xv. del lib. 7. d'Euclide, con queste parole: *Multiplicatio numeri in numerum, est inventio numeri, qui ad alterutrum multiplicantium eandem proportionem habet, quam alter multiplicantium ad unitatem.*

Ora se da' numeri lineali venisse numero superficiale, questo non direbbe la medesima proporzione ad uno de' numeri, che si moltiplicano, come l'altro all'unità, anzi non direbbe alcuna proporzione; stante che questa si ha con fare comparazione trà due quantità d'un medesimo genere, cioè trà linea, e linea, trà superficie, e superficie, trà corpo, e corpo, e non trà linea, e superficie; come si ha nel quinto Libro d'Euclide, e lo dice il medesimo Tartaglia, dove tratta delle proporzioni. Per il che dicendo palmo 1. lineale, dice a 4. palmi lineali proporzione sub-quadrupla, 6. palmi a quanti palmi diranno la medesima proporzione; certo che verranno 24. palmi, che sono lineali, e non superficiali, altrimenti seguirebbe l'inconveniente detto.

Q. D. Come s'intende il numero solido prodotto di tre numeri, che siano successivamente trà se moltiplicati, secondo la definizione xvij. del lib. 7.º d'Euclide?

R. Il medesimo Tartaglia dice: Similmente quando tal numero di misure lineali sarà dutto in numero di misure superficiali, il suo prodotto non sarà di misure superficiali anzi sarà di misure corporee, e questo credo sarà sufficiente a sostenere il sopradetto mio parere, &c. così il medesimo Tartaglia.

Io però non concorro nel parere del Tartaglia; Imperocchè il moltiplicare accresce moltitudine, e non varia specie al numero applicato a linea, superficie, e corpo. E così li tre numeri, che moltiplicati trà loro producono numero solido, stimo non essere lineali, se non significativamente, in quanto per misura lineale di lunghezza, larghezza, e altezza, danno cognizione di tre numeri

numeri corporei, che moltiplicati producono un numero solido; per esempio: Sia un corpo detto Parallelepipedo di 2. palmi di larghezza, di 3. di lunghezza, e di 4. altezza, quale costerà di 24. cubi palmari. (Un cubo palmare è un corpo, che per ogni parte è un palmo, come è il Dado perfetto, con cui si gioca.) Onde quei numeri di misure, sono effettivamente corporei, importando 2. palmi di larghezza 2. cubi d'un palmo per ogni verso, e così li 3. palmi di lunghezza, e parimente li 4. palmi d'altezza, importando tanti cubi, quali trà di loro moltiplicati fanno un solido di 24. cubi detto parallelepipedo.

Se fusse vero, che moltiplicando numero applicato à linea via numero applicato à superficie, ne venisse numero corporeo; ne seguirebbe, che numero corporeo dicesse la medesima proporzione à superficie, che numero lineale all'unità, che è assurdo. Per esempio, 1. palmò lineale à 3. palmi lineali dice proporzione subtripla. Si cerca: 4. palmi superficiali à che dirà la medesima proporzione? Si moltiplichino 3. palmi lineali via 4. superficiali, verranno 12. palmi superficiali, e non corporei, al dire del Tartaglia, per quello che hò detto. Se questo sia sufficiente fondamento à sostentare il suo parere contro il Campano, circa il verbo ducere, e moltiplicare, ne lascio il giudizio ad altri.

64. D. Che pratica è quella del Nepero per moltiplicare qualsivia numero, per altro numero.

R. E' la seguente: Bisogna tenere preparate à sufficienza alcune Schedole di Cartoncino, o d'altra materia, le quali siano divise in nove quadrati con il diametro; & in questo siano notati i numeri della Tavola Pittagorica in modo, che il numero digitò, ovvero zero, sia nel triangolo di sotto al diametro; il numero di decine sia nel triangolo di sopra. Alcune Schedole siano notate di soli zeri nel triangolo di sotto, come si vedono le qui descritte

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
2	4	6	8	10	12	14	16	18	0
3	6	9	12	15	18	21	24	27	0
4	8	12	16	20	24	28	32	36	0
5	10	15	20	25	30	35	40	45	0
6	12	18	24	30	36	42	48	54	0
7	14	21	28	35	42	49	56	63	0
8	16	24	32	40	48	56	64	72	0
9	18	27	36	45	54	63	72	81	0

Si abbia

Si abbia da moltiplicare 7384. per 2056. Si dispongano le figure, come si fa per moltiplicare a scala, e s'ordinino le Schedole, che in cima mostrino 7384. numero da moltiplicarsi; e perche si moltiplica per 6. si veda nel 6.<sup>o</sup> quadrato a mano destra di chi scrive, cominciando di sopra, si troverà notato 4. nel Triangolo di sotto; si segna 4. sotto il 4. delle figure da moltiplicarsi come nell'

Esempio K. Adesso il numero del Triangolo di sopra si somma col numero del Triangolo seguente di sotto, o si voglia dire, che si sommano i numeri della figura detta Romboide, fanno 10. si segna 0. e si tiene 1. quale s'aggiunge a 12.

La somma della seguente Romboide fa 13. si segna 3. e si tiene 1. quale s'aggiunge a 3.

La somma della seconda seguente Romboide fa 4. qual si segna, e finalmente si segna 4. che sta nel superiore Triangolo. Medesimamente si moltiplica per 5. decine, nel Triangolo di sotto del quinto quadrato a mano destra vi è 0. quel si segna sotto 0. luogo delle decine; dipoi si segna 2. della prima Romboide, poi 9. della seconda, e poi 6. della terza Romboide, e finalmente 3. del Triangolo superiore. In ultimo si moltiplica per 2. migliaia. Nel Triangolo inferiore del secondo Quadrato è 8. qual si segna sotto il 9. luogo del numero di migliaia, tralasciando il luogo delle centinaia per essere 0. nel numero moltiplicante. Dipoi si segna 6. della prima Romboide, poi 7. somma della seconda Romboide, poi 4. della terza Romboide, e finalmente 1. del Triangolo superiore; e così si seguirebbe se ci fossero altre figure: del resto s'opera secondo l'ordinario, sommando i prodotti, che la somma 15181504. farà il prodotto totale di quella moltiplicazione.

65. D. In quali massime, o affiomi si fonda il Moltiplicare?

R. In queste: 1. Ogni numero preso una sola volta è uguale a se stesso: 2. Ogni numero misura se stesso per l'Unità: 3. Ogni numero prodotto è maggiore del moltiplicante, e del moltiplicato. 4. Il numero pari, moltiplicato per pari, o dispari, produce numero pari: 5. Il numero dispari moltiplicato per dispari, produce

numero

	7	3	8	4
1	4	6	8	8
2	1	9	4	2
3	8	2	2	6
4	5	5	0	0
5	2	8	8	4
6	9	1	6	8
7	6	4	4	2
8	3	7	2	6

numero dispari : 6. Ogni ordinata, e continuata moltiplicazione procede per progressione Arimmetica equiforme, non interrotta, ne diminuita de suoi termini, come si vede nella Tavola Pitagorica : 7. Il numero moltiplicato da numero intero, o dalle parti di esso, produce moltiplice uguale: 8. Sono uguali quei prodotti moltiplici, che procedono da uguali moltiplicanti, e moltiplicati, come sia moltiplicante A. moltiplicato B. sarà il prodotto C, in tutti gl' esempj delle somme D. E. F. G. uguali.

A. 7.		B. 20.		C. 140.	
2	140	7	49	140	140
3	210	8	56	140	140
4	280	9	63	140	140
5	350	10	70	140	140
6	420	11	77	140	140
7	490	12	84	140	140
8	560	13	91	140	140
9	630	14	98	140	140
10	700	15	105	140	140
11	770	16	112	140	140
12	840	17	119	140	140
13	910	18	126	140	140
14	980	19	133	140	140
15	1050	20	140	140	140

## DISTINZIONE QUINTA.

### Del Partire.

66. D. **C**he cosa è partire, quarta operazione dell' Arimmetica?

R. A partire, dividere, e misurare ci vogliono due numeri, uno detto partitore, divisore, e misura; l'altro numero da partirsi, dividersi, e misurarsi. Onde il partire è trovare quante volte il numero partitore misura il numero da partirsi: o pure è distribuire il numero da partirsi in tante parti uguali, quante unità sono nel partitore, una delle quali parti è il numero risultato da tal' operazione detto Quoziente, perchè dimostra quante volte il partitore abbia misurato il numero già diviso. Et essendo il partire un'operazione opposta al moltiplicare, e provandosi un'operazione per l'altra, si definisce, che sia trovare un numero detto Quoziente, che moltiplicato per il numero partitore, produca il numero partito a punto. Per esempio partendo 12. per 2. viene 6. quoziente per denotare quante volte il numero 2. partitore si contenga nel 12. il qual 6. moltiplicandosi per 2. produce a punto 12. Finalmente vien definito, il partire è trovare un numero al quale abbia la medesima proporzione il numero partito, che il numero partitore all'unità; come è manifesto per l'esempio

40  
 pio detto; mentre 12. numero partito ha proporzione doppia al  
 numero 6. quoziente, che il numero 2. partitore ha all' unità.  
 67. D. Che bisogna sapere per fare il partire?  
 R. Bisogna sapere à mente le seguenti tavole.

### Tavola per il Partire.

in entra avanza				4	14	3	2	7	7	1	0
1	0	0	0	4	19	4	3	7	15	2	1
1	1	1	0	4	20	5	0	7	23	3	2
1	2	2	0	4	25	6	1	7	31	4	3
e così degl' altri				4	30	7	2	7	39	5	4
				4	35	8	3	7	47	6	5
in entra avanza				4	36	9	0	7	55	7	6
2	4	0	1					7	56	8	0
2	2	1	0	in entra avanza				7	64	9	1
2	5	2	1	5	4	0	4	in entra avanza			
2	6	3	0	5	5	1	0	8	7	0	7
2	9	4	1	5	11	2	1	8	8	1	0
2	10	5	0	5	17	3	2	8	17	2	1
2	13	6	1	5	23	4	3	8	26	3	2
2	14	7	0	5	29	5	4	8	35	4	3
2	17	8	1	5	30	6	0	8	44	5	4
2	18	9	0	5	36	7	1	8	53	6	5
in entra avanza				5	42	8	3	8	62	7	6
				5	48	9	3	8	71	8	7
3	2	0	2	in entra avanza				8	72	9	0
3	3	1	0	6	5	0	5	in entra avanza			
3	7	2	1	6	6	1	0	9	8	0	8
3	11	3	2	6	13	2	1	9	9	1	0
3	12	4	0	6	20	3	2	9	19	2	1
3	16	5	1	6	27	4	3	9	29	3	2
3	20	6	2	6	34	5	4	9	39	4	3
3	21	7	0	6	41	6	0	9	49	5	4
3	25	8	1	6	48	7	1	9	59	6	5
3	29	9	2	6	49	8	1	9	69	7	6
in entra avanza				6	56	9	2	9	79	8	7
4	3	0	3	in entra avanza				9	89	9	8
4	4	1	0	7	6	0	6	9	90	10	0
4	9	2	1								



In cambio delle dette Tavole può servire la Tavola Pitagorica posta di sopra. Per esempio: si voglia sapere a partire 60. per 7. che numero viene, e l'avanzo; si trovi nella prima fila superiore a traverso il 7. dipoi a dirittura all'ingiù si trovi il quadretto, nel quale sia il numero più vicino al 60. e non lo passi, che sarà 56. al quale corrisponde 8. nella prima fila a mano sinistra di chi scrive, che è il numero quoziente, & avanza 4. differenza da 56. fino a 60. Ovvero si trovi il 7. nella fila a mano sinistra, & a traverso si trovi il numero 56. nel suo quadretto, che nella fila superiore mostrerà corrispondente il numero 8. che è il quoziente, e l'avanzo 4. come prima.

Avvertasi, che le Tavole per il moltiplicare, servono ancora per il partire; Onde perche 8. via 9. fa 72. l' 8. in 72. entra 9. volte, & il 9. in 72. entra 8. volte, e così degl' altri numeri moltiplicati.

68. D. Come si fa il partire a Colonna.

R. Il partire a Colonna, detto anche a Testa, s' eseguisce in una sola fila di numeri, che posti tra due linee, rappresentano una Colonna a giacere; e si fa così; Si abbia da partire 3705. per 2. Posto il numero partitore da mano sinistra, & a canto il numero da partirsi, separato con una linea, come nell'Esempio A. Si veda quante volte entra il partitore 2. nel 3. entra 1. che si segna sotto il 3. & avanza 1. Qui avvertasi, che l'avanzo pigliasi per tante decine: 1. per 10. 2. per 20. 3. per 30. &c. & aggiunta la seguente figura, si seguita a partire; onde qui 1. d'avanzo con 7. fa 17. ma più speditamente s' intenda il numero avanzato a canto alla seguente figura, e si seguiti dicendo 2. in 17. entra 8. volte, si segna 8. sotto il 7. l'avanzato 1. a canto il 0. dice 10. ora 2. in 10. entra 5. volte, il quale si segna sotto il 0. e finalmente 2. in 5. entra 2. volte, e avanza 1. quale si pone sopra una linea con sotto 2. numero partitore così  $\frac{1}{2}$  dice un mezzo. Qui accenno, che dal partire nascono i rotti, ponendo l'avanzo da ultimo sopra una linea con sotto il partitore, che essendo 3. faranno terzi: 4. quarti: 5. quinti: 6. sesti: 7. settimi: 8. ottavi: 9. noni; ma se il partitore è 10. ovvero più, allora si dice il numero dell'avanzo, e dipoi il numero partitore, aggiungendo questa parola esimi.: come  $\frac{7}{12}$  sette dodici esimi,  $\frac{9}{20}$  nove venti esimi, &c. Or tornando a quello, che dicevo, il quoziente sarà 1852.  $\frac{1}{2}$ .

Per 3. s' abbia da partire 1742. si dica 3. in 17. entra 5. volte, che si segna sotto il 7. e avanza 2. col 4. dice 24. il 3. in 24. entra 8. volte, che si segna sotto il 4. finalmente il 3. nel 2. entra 0. qual si segna sotto il 2. e l'avanzato 2. si pone sopra linea con sotto 3. partitore, così  $\frac{2}{3}$ . dirà due terzi, & il quoziente è 580.  $\frac{2}{3}$ . come nell'Esempio B.

F

Per 4.

4<sup>a</sup>  
 Per 4. si parta 834 il 4. in 8. entra 2. volte, qual si segna sotto l'8. e non avanza: il 4. in 3. entra 0. qual si segna sotto il 3. & avanza 3. che à canto al 4. dice 34. il 4. in 34. entra 8. volte, qual si segna sotto al 4. & avanza 2. che col 4. partitore sotto fa  $\frac{2}{4}$  & il quoziente è 208  $\frac{2}{4}$  come nell' Esempio C.

$$\begin{array}{r} \text{A} \\ \text{per } 2 \ / \ 3705 \\ \hline 1852 \ \frac{2}{4} \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{B} \\ \text{per } 3 \ / \ 1748 \\ \hline 580 \ \frac{2}{3} \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{C} \\ \text{per } 4 \ / \ 834 \\ \hline 208 \ \frac{2}{4} \\ \hline \end{array}$$

69. D. Come si fa la prova al partire à Colonna ?

R. Si moltiplica il quoziente per il numero partitore, che venendo il prodotto uguale al numero partito, si dice esser fatta giusta-  
 mente l' operazione del partire.

$$\begin{array}{r} \text{D} \\ \text{per } 5 \ / \ 3749 \\ \hline 749 \ \frac{2}{5} \\ \hline 3749 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{per } 8 \ / \ 27574 \\ \hline 3446 \ \frac{2}{8} \\ \hline 27574 \\ \hline \end{array}$$

Si voglia provare il partire dell' Esempio D. dove il quoziente è 749.  $\frac{2}{5}$ . Si moltiplichino 749. per 5. al prodotto s' aggiunge 4. avanzo dicendo : 5. via 9. fa 45. e 4. fa 49. si segna 9. e si tiene 4: 5. via 4. fa 20. e 4. fa

24. si segna 4. e si tiene 2. Finalmente 5. via 7. fa 35. e 2. fa 37. che segnato, il prodotto è 3749. uguale al numero partito; si che l' operazione è giusta.

70. D. Si fa altra prova al partire à Colonna ?

R. Da me è stata usata questa di dare altra lezione in proporzione, acciò ne venga il medesimo quoziente, che per li Scolari è utile assai; per esempio, avendo partito 3784. per 4. il quoziente è 946.  $\frac{2}{4}$ . Volendone far prova, si pigli il doppio di 4. partitore,

$$\begin{array}{r} \text{E} \\ \text{per } 4 \ / \ 3786 \\ \hline 946 \ \frac{2}{4} \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{F} \\ \text{per } 6 \ / \ 5740 \\ \hline 956 \ \frac{2}{6} \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{G} \\ \text{per } 12 \ / \ 11480 \\ \hline 956 \ \frac{2}{12} \\ \hline \end{array}$$

Prova per il doppio.  
 per 8 / 7572

$$\begin{array}{r} \\ \hline 946 \ \frac{2}{8} \\ \hline \end{array}$$

Prova per metà.  
 per 3 / 2870

$$\begin{array}{r} \\ \hline 956 \ \frac{2}{3} \\ \hline \end{array}$$

Per il quarto.  
 per 3 / 2870

$$\begin{array}{r} \\ \hline 956 \ \frac{2}{3} \\ \hline \end{array}$$

cioè

cioè 8. & il doppio del numero partito 3786. cioè 7572. questo si parta per 8. verrà 946  $\frac{1}{2}$ . che benchè pajà differire nel rotto non è così, come si vedrà nel trattato de' Rotti, e si come si è raddoppiato il partitore, & il numero da partirsi; così si poteva triplicare, e quadruplicare, &c. & ancora pigliare la metà, il terzo, il quarto, &c. del partire, e del numero da partirsi, come torna meglio, che sempre verrà il medesimo quoziente. Vedansi gl' Esemplj E. F. G.

71. D. Che partire è quello detto à Tavoletta?

R. E' un replicato partire à Colonna con riportare l' avanzo al principio del quoziente, quale si parte per il medesimo numero, per esercizio delli Scolari, come negl' Esemplj H. I. si pone il partitore di sopra.

H	per 4.						I	per 12.					
	5	7	2	4	5	3		9.	6	5	2	4	0
1.	1	4	3	1	1	3		8.	8	0	4	3	6
1.	2	8	5	7	7	8		8.	7	3	3	6	9
2.	3	2	1	4	4	4		9.	7	2	7	8	0
0.	5	8	0	3	8	1		0.	8	1	0	6	5
1.	1	4	5	0	9	5		1.	0	6	6	7	2

Io hò usato però nelle Scuole, per prattica delli Scolari il non riportare l'avanzo al principio, mà metterlo doppo, e di nuovo far partire il quoziente, e porre dopo l'avanzo, e di nuovo far partire il quoziente, finche non ci sia numero da partire: e per vedere poi se dette operazioni sono giuste; si fanno sommare gl'avanzi, & i quozienti; la somma di questi si moltiplica per il numero partitore levato uno, cioè se il Partitore è 8. si moltiplica per 7. aggiungendo al prodotto la somma degl'avanzi, e doverà venire il numero proposto da principio da partirsi. Si vedano gl' Esemplj K. L. M.

per 2 / 175	per 8 / 9724	per 12 / 65265
K	L	M
87 — 1	1215 — 4	5438 — 9
43 — 1	151 — 7	453 — 2
21 — 1	18 — 7	37 — 9
10 — 1	2 — 2	3 — 1
5 — 0	— 2	— 3
2 — 1	1386 — 22	5931 — 24
1 — 0	7	11
— 1	9702	65241
169 — 6	22	24
6	9724	65265
175	9724	75. D.

72. D. Quale è il Partire per ripiego?

R. Il partire per ripiego è un duplicato, triplicato &c. partire à colonna; per esempio si abbia da partire 178752. per 48. i numeri di ripiego di 48. sono 6. e 8. ovvero 2. 4. e 6. per la 52. Ora si parta 178752. per 6. il quoziente 29792. si parta per 8. verrà 3724. come si fosse partito per 48. pure si parta 178752. per 2. il quoziente 89376. si parta per 4. il quoziente si parta per 6. verrà 3724. come prima; e s'avverta, che si può partire prima per qual numero piace, e poi per gl'altri. Si vedano gl' Esempj N. & O.

N

per 48.	per 6 / 178752
	per 8 / 29792
	<u>3724</u>

O

	per 2 / 178752
	<u>89376</u>
	per 4. 89376
	per 6. 22344
	<u>3724</u>

73. D. Come si fa la prova à questo partire?

R. Col moltiplicare per ripiego per la 52. Onde moltiplicandosi 3724. per 8. & il prodotto per 6. tornerà 178752. numero partito. Si veda P. Q.

P

3724 — 8
<u>29792 — 6</u>
<u>178752</u>

Q

3724 — 4
<u>14896 — 6</u>
<u>89376 — 2</u>
<u>178752</u>

Accade per lo più nel partire per ripiego, che avanza qualche numero; acciò si sappia operare, accennerò qui il modo: Si abbia per 56. da partire, 2548. i numeri di ripiego sono 8. e 7. si parta 1548. per 8. il quoziente è 318.  $\frac{4}{8}$  perche il 4. che avanza si pone sopra una linea con sotto 8. partitore, e fa  $\frac{4}{8}$ . Ora si parta 318.  $\frac{4}{8}$  per 7. il quoziente intero è 45. & avanza 3. per il quale si moltiplica 8. che stà sotto la linea al prodotto 24. s'aggiunge 4. che stà di sopra fa 28. tanto è tutto l'avanzo, quale sopra una linea, con sotto 56. prodotto di 7. via 8. dice  $\frac{28}{56}$  che schifato è  $\frac{2}{7}$ . come si dirà a suo luogo, con 45. il quoziente sarà 45.  $\frac{2}{7}$ .

per 8 / 2548

per 7 318 $\frac{4}{8}$
<u>45 <math>\frac{2}{7}</math> schif. <math>\frac{2}{7}</math></u>

74. D.

74. D Che cosa è Partire a Danda, e comè si fa ?

R. Il partire a Danda è un partire universale, che si opera con quante si voglia figure nel numero partitore, e con quante si siano nel numero da partirsi; E s' eseguisce con tre operazioni.

La prima è trovare il numero delle volte, che il numero partitore entra nelle figure prese dal numero da partirsi, con segnarsi da parte.

La seconda operazione è moltiplicare il numero trovato via il numero partitore, con porre il prodotto sotto le figure partite.

La terza operazione è sottrarre tal prodotto dalle sopracritte figure, e deve restare un numero minore del numero partitore.

Al qual numero restato si va dando la figura seguente del numero da partirsi; e per questo stimo si chiami partire a Danda; e fatto questo si comincia da capo a trovare il secondo numero, ovvero figura, e quando è data, è calata la figura, & il partitore non vi entra, s'aggiunge o al quoziente, e si cala un'altra figura, e di nuovo si osserva quante volte entra il partitore; il numero trovato si moltiplica; il prodotto si sottra, e così fino al fine. Il numero che avanza si pone sopra una linea, con sotto il numero partitore, e fa numero rotto, quale si scrive col quoziente.

Per 46. si abbia da partire 9862. si pone da mano sinistra 46. come nell'Esempio R. E poi 9862. separato con una linea. S'osservi quante volte il 4. entra nel 9. entra 2. volte, & avanza 1. che con l'8. dice 18. nel quale il 6. del 46. non entra meno di 2. volte, però tutto il partitore 46. nel 98. entra 2. quale si segni sotto il partitore. Di là dal 4. del 46. essendo, che ne devono venire altre due figure nel quoziente. Per la seconda operazione per 2. si moltipichi 46. il prodotto 92. si ponga sotto 98. e per la terza operazione si sottri, resta 6. al quale dando 6. cioè calando 6. a canto, dice 66. e si comincia da capo: il 4. nel 6. entra una volta, & avanza 2. che col 6. dice 26. il 6. del partitore non entra meno d'una volta; però si segnerà 1. dopo il 2. del quoziente, e dirà 21. per 1. si moltiplica 46. e si sottra da 66. resta 20. e calato 2. dirà 202. e di nuovo si comincia da capo, dicendo il 4. in 20. 5. volte, ma il 6. in 2. non entra alcuna volta; si scali dicendo il 4. in 20. 4. volte, & avanza 4. che col 4. dice 42. ora il 6. in 42. non entra meno di 4. volte, però si segna 4. nel quoziente, per il quale si moltiplica 46. & il prodotto 184. si sottra da 202. resta 18. e perche non vi è altra figura da calare; si pone 18. sopra una linea con sotto il partitore 46. così  $\frac{18}{46}$ . che con 214. farà il quoziente 214.  $\frac{18}{46}$ . come si scili tal rotto, si dirà a suo luogo.

75. D. Come si prova se è giusta l'operazione del partire?

R. Con l'operazione contraria del moltiplicare: Onde moltiplicando il quoziente  $214 \frac{2}{3}$  per il partitore 46. ne verrà il numero partito 9862. ma perchè ancora non si è parlato di moltiplicare con rotti; però si moltiplichino 214. per 46. al prodotto s'aggiunga 18. e verrà il numero partito, se il partire sarà stato fatto giustamente; benché sommando i prodotti fatti nella Danda, e così à scala disposti con il numero avanzato, s'averà il numero partito, essendosi bene operato. Altre prove s'anderanno foggiungendo ad altre operazioni. Si veda l'esempio R.

	R	Prova.
	per 46 / 9862	214
Prova col Sommare...	214 $\frac{2}{3}$ 92	46
92	66	1284
46	46	856
184	202	18
18	184	9862
Num. 9862 partito	18	

76. D. Si opera in altra maniera nel partire à Danda?

R. Certamente; nel partire à Danda alla breve: Ma prima per 2948. si parta 652454. alla lunga; dicendo il 2. nel 6. entra 3. volte, ma il 9. in 5. non entra alcuna volta; si scali, e si dica, il 2. nel 6. entra 2. volte, & avanza 2. che col 5. dice 25. adesso il 9. nel 25. entra pure 2. volte, & avanza 7. che col 2. dice 72. il 4. nel 72. entra 2. volte, & avanza 64. con l'altro 4. dice 644. nel quale l'8. non entra meno di 2. volte, ma assai volte più. Dunque si dirà, che il partitore 2948. in 6524. entra 2. volte, qual 2. si segna sotto il 9. del partitore; per 2. si moltiplichino 2948. il prodotto 5896. si sottra da 6524. resta 628. che con il 5. che si cala dice 6285. e si comincia da capo; si vade quante volte il partitore 2948. entra in 6285. entra 2. volte, il 2. si segna nel quoziente sotto il 4. per il qual 2. si moltiplica 2948. il prodotto 5896. si sottra da 6524. resta 389. che con il 4. calato dice 3894. nel quale 2948. entra una volta, e segnato 1. sotto l'8. e fatta la moltiplicazione il prodotto si sottra da 3894. e resta 946. & è finito il Partire. Si veda l'Esempio S. con la sua prova.

Prova

	S	47
	per 2948 / 652454	Prova .
	5896	2948
Prova col Sommare.	221	221
5896	6283	
5896	5896	2948
2948		5896
946	3894	5896
	2948	946
Nũ. 652454 Partito		652454
	946	

77. D. Come si fa il partire à Danda alla breve .

R. Nel partire à Danda alla breve si fa il sottrarre à mente. Per 628. si abbia da partire 94242. Disposti i numeri come si è detto, si veda quante volte il 628. entra nel 942. e vi entra una volta, si segna 1. sotto il 6. del partitore : si moltiplichì 1. via 8. fa 8. ora non si segni sotto il 2. come alla lunga, mà si dica dall' 8. à trovare il 2. ci vuole 4. perche non si torna à dietro, mà si segue avanti, fino al 12. si pone 4. sotto al 2. e si tiene à mente 1. per la decina, che si è passata : se si fossero passate due, trè, ò più decine, tante se ne farebbero tenute à mente ; di nuovo si dica 1. via 2. fa 2. & uno della decina tenuta à mente fa 3. ad andare à trovare il 4. ci è 1. qual si segna sotto il 4. e non si tiene à mente cosa alcuna, per non essersi passate decine ; finalmente si dica 1. via 6. fa 6. à trovare il 9. ci vuol 3. qual si segna sotto il 9. si che ne è venuto 1. & è avanzato 314. che con il 4. calato dice 3144. Vedasi 628. quante volte entra in 3144. e sarà 5. quale si segna sotto il 2. del numero partitore, si moltiplica 5. via 8. fa 40. à trovare 44. ci vuol 4. che si segna sotto l'ultimo 4. e si tiene 4. per le decine, di nuovo 5. via 2. fa 10. e 4 fa 14. fino al 14. ci è 0. quale si segna sotto il 4. e si tiene 1. finalmente 5. via 6. fa 30. & 1. fa 31. à trovare 31. ci è 0. si cala 2. e dirà 42. quale non si può partire per 628. onde si pone 0. nel quoziente, che farà 150. & avanzerà 42. Nel partire à Danda alla breve, volendo fare la Prova col sommare, perche non vi si mettono i prodotti, mà gl'avanzi, bisogna ritrovare i prodotti col sottrarre, sottraendo i numeri di sotto da quei di sopra, e ponendo gl'avanzi, che sono i prodotti da parte à scala, e poi si sommano ; e così da 942. si sottra 314. resta 628. primo prodotto, che si segna da parte ; da 3144. si sottra 4. e resta 4140. secondo prodotto, che si pone à scala con sotto 42. avanzato, e si sommano : la somma farà il numero partito 94242.

Prova

Prova col Sommare.

628

37482

42

N<sup>o</sup>. 94242. partito.

628 94242

37482

150 42

Prova.

628

150

94200

42

94242

78. D. Come si fa il partire detto per Galera?

R. L'operazione del partire per Galera differisce dal partire à Danda alla breve in questo, che gl'avanzi si pongono sopra il numero da partirsi, con mettere sotto il partitore, con avanzarlo successivamente ad ogni partizione, con scancellare le figure adoperate, benché senza scancellare si opera ancora, come si fa qu<sup>a</sup>; Per 37482. si parta 65295204. si ponga il partitore sotto talmente, che il 3. sia sotto il 6. e l'altre figure per ordine. Si veda, che il partitore entra una volta, si segna 1. dopo il numero da partirsi separato da una linea, quale si moltiplica via 2. del partitore, fa 2. ad andare al 5. quale si segna sopra il 5. di nuovo 1. via 8. fa 8. fino al 9. ci è 1. qual si segna sopra il 9. à canto al 3. di nuovo 1. via 4. fa 4. fino al 12. ci è 8. qual si segna sopra il 2. e si tiene à mente 1. di nuovo 1. via 7. fa 7. & 1. della decina fa 8. fino al 15. ci è 7. qual si segna sopra il 5. e si tiene à mente 1. finalmente 1. via 3. fa 3. & 1. della decina fa 4. fino al 6. ci è 2. quale si segna sopra il 6. si scrive al pari dell'avanzo 27813. il 2. e s'avvantaggia il partitore 37482. con operare come si è detto, verrà di quoziente 1742. & avanzerà 1560. come si vede nell'Esempio V.

Avanzo.

1560

- 76524

157580

278132

V. Numero da partirsi 65295204 / 1742. Quoziente.

37482

37482

37482

37482

Partitore.

79. D. Quando, e come si fa il Partire à tronco, ò scapezzo?

R. Questo si può ogni volta, che nel partitore ci sono zeri, per esempio; per 9000. si parta 7940000. Nel partitore si troncano con



con una linea trè zeri, pure nel numero da partirsi da mano destra, e per 9. à Colonna si parte 7940. e verrà il quoziente 882.  $\frac{2}{3}$ . Quando nel numero da partirsi non ci sono zeri, si tagliano tante figure; come per 10800. si parta 345246156. tagliati due zeri nel partitore, e 56. nel numero da partirsi, si parte per 108. le figure rimaste, e verrà il quoziente 3196. & avanza 78. al quale aggiunte le figure tagliate, sarà l'avanzo 7856.

$$\begin{array}{r} \text{per } 91000 / 79401000 \\ \hline 882 \frac{2}{3} \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{per } 108100 / 345246156 \\ \hline 3196 \quad 212 \\ \quad 1044 \\ \quad 726 \\ \quad 7856 \end{array}$$

80. D. Come si prepara il numero partitore per fare un'operazione assai lunga di partire con facilità?

R. Si abbia da partire 965 265 265 26. per 3928. Questo si moltiplichi per 2. per 3. per 4. sino al 9. ponendo i prodotti uno sotto l'altro dirimpetto al suo numero. Adesso s'osservi quale di quei prodotti, si avvicini più senza passare al 9652. e sarà 7856. quale si scrive sotto il 9652. & il 2. si pone per quoziente sopra il numero da partirsi, e si sottra come nella Danda alla lunga, e resta 1796. e si cala il 6. e dice 17966. al quale il prodotto più vicino è 15712. che dirimpetto ha 9. che si scrive nel quoziente, e 15712. posto sotto 17966. si sottra, e resta 2254. e si cala al pari il 5. e dice 22545. al quale il prodotto più vicino è 19640. che dirimpetto ha 5. che si pone nel quoziente, e 19640. si sottra da 22545. e resta 2905. e nel medesimo modo si continua.

Partitore .	Quoziente 24573962
1 — 3928	/ 96526526526
2 — 7856	7856
3 — 11784	17966
4 — 15712	15712
5 — 19640	22545
6 — 23568	19640
7 — 27496	29052
8 — 31424	27496
9 — 35352	15566
	11784
	37825
	35352
	24732
	23568
	11646
	7856
Avanzo .	3790.
	G

chi per 2. per 3. per 4. sino al 9. ponendo i prodotti uno sotto l'altro dirimpetto al suo numero. Adesso s'osservi quale di quei prodotti, si avvicini più senza passare al 9652. e sarà 7856. quale si scrive sotto il 9652. & il 2. si pone per quoziente sopra il numero da partirsi, e si sottra come nella Danda alla lunga, e resta 1796. e si cala il 6. e dice 17966. al quale il prodotto più vicino è 15712. che dirimpetto ha 9. che si scrive nel quoziente, e 15712. posto sotto 17966. si sottra, e resta 2254. e si cala al pari il 5. e dice 22545. al quale il prodotto più vicino è 19640. che dirimpetto ha 5. che si pone nel quoziente, e 19640. si sottra da 22545. e resta 2905. e nel medesimo modo si continua.

50  
medesimo modo si seguita fino al fine, & il quoziente sarà 24573962. e l' avanzo 3789. come qui si vede.

**Qui** avverto, che avendo le Schedole, nelle quali siano notati i numeri della Tavola Pitagorica, senza moltiplicare il partitore per 2. per 3. &c. basta preparare quelle Schedole, che in cima rappresentino le figure del partitore, e poi facilmente con qualche avvertenza si opera come si è detto. Si veda la 64.

**21. D.** Come si prova l' operazione del partire, se è giusta?

**R.** Oltre la prova di moltiplicare il numero partitore per il quoziente, & aggiungere l' avanzo al prodotto, e vedere se viene numero uguale al numero partito; che venendo sarà chiaro l' operazione essere giusta. Da questa ne nasce il fondamento di fare la prova del 9. del 7. o d' altro numero: Perche levandosi questi numeri da quantità uguali, per l' assioma detto, quanto si può; gl'avanzi devono essere uguali, e si fa così. Vogliasi provare il partire fatto di sopra nella 76. dove partitore fu 2948. numero partito 652454. Quoziente 221. & avanzo 946. sopra la lettera X. si scriva, o noti la Prova che si fa o del 9. o del 7. &c. Dipoi dal numero partitore 2948. si levino per esempio li 7. con partire il medesimo 2948. per 7. l' avanzo sarà 1. quale si ponga sopra la traversa sinistra dell' X. si levino li 7. dal quoziente 221. l' avanzo sarà 4. quale si ponga sopra la traversa destra dell' X. si levino ancora li 7. dall' avanzo 946. l' avanzo sarà 1. quale si ponga nel mezzo alle traverse di sopra dell' X. Ora si moltiplichì 1. avanzo del partitore via 4. fa 4. & aggiunto 1. avanzo dell' avanzo 946. fa 5. quale si segna sotto la traversa sinistra dell' X. Finalmente levandolo li 7. da 652454. resta 5. come deve restare, quando l' operazione del Partire è giusta, qual 5. si scrive sotto la traversa destra dell' X. confrontando con il 5. della traversa sinistra di sotto. Nel medesimo modo è fatta la prova dell' 8. del 12. &c.

Partitore: 2948		Numero da partirsi.	
Quoziente: 221	<hr/>	1.	652454.
			6285.
			3894.
			946.
		Avanzo:	

Prova del 7.

1  
X 4  
5

Prova dell' 8.

2  
X 5  
6

Prova del 12.

10  
X 5  
2

82. D.

**32. D. Qual' altra Prova si fa al Partire?**

**R.** Si fa la prova con un'altro partire, facendo numero partitore il Quoziente, e partendo il medesimo numero partito prima, ne verrà il numero partitore. Come si sia partito 2173260. per 6245. Il quoziente è 348. dico che partendo il medesimo 2173260. per 348. ne verrà 6245. come qui si vede.

$\begin{array}{r} \text{Partitore } 6245 \text{ / } 2173260 \\ \hline 29976 \\ \text{Quoziente } 348 \quad 49960 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} \text{Partitore } 348 \text{ / } 2173260 \\ \hline 852 \\ \text{Quoziente } 6245 \quad 1566 \\ \hline 1740 \\ \hline \end{array}$
---	---

Pur medesimamente Partitore 1304. numero partito 36524. Quoziente 28. e l'avanzo 12.; e perche l'avanzo è meno del 28. se si partirà 36524. per 28. verrà il Quoziente 1304. che era prima partitore, & avanzerà pure 12.

$\begin{array}{r} \text{Partitore } 1304 \text{ / } 36524 \\ \hline 10444 \\ \text{Quoziente } 28 \quad 12 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} \text{Partitore } 28 \text{ / } 36524 \\ \hline 85 \\ \text{Quoziente } 1304 \quad 124 \\ \hline 12 \\ \hline \end{array}$
---	--

Mà se l'avanzo superasse il Quoziente, come accade alle volte; Allora l'avanzo si sottra dal numero partito, & il restato numero si parte per il numero quoziente, e verrà il numero primo partitore. Sia stato partitore 384. numero partito 24520. Quoziente 63. avanzo 328. maggiore di 63. Adesso si sottri 328. da 24520. resta 24192. quale si parta per 63. ovvero per 7. e per 9., numeri di ripiego del 63., verrà 384. appunto primo partitore. La ragione di questa Prova è chiara per la definizione del moltiplicare; essendo il numero partitore, & il numero quoziente numeri, che si moltiplicano; & il numero partito viene ad essere prodotto.

Prova	
$\begin{array}{r} \text{Partitore } 384 \text{ / } 24520 \\ \hline 1480 \\ \text{Quoziente } 63. \quad 328 \text{ Avanzo} \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 24520 \\ 328 \\ \hline 63 \text{ / } 24192 \\ \hline 529 \\ \text{torna } 384 \quad 252 \\ \hline \end{array}$

**33 D. Nella 39. essendosi insegnato a fare la prova al moltiplicare, con un'altra operazione di moltiplicare data in proporzione, si può fare così la prova al partire, con dare un'altra operazione di partire?**

**R. Certamente.** Con moltiplicare per 2. per 3. &c. il numero partitore,

titore, e per il medesimo numero moltiplicare il numero da partirsì, e risulteranno due altri numeri, con i quali facendo il Partire, ne verrà il medesimo quoziente, che per i primi numeri. Per 189: sia partito 148243. il Quoziente fu 784. l'avanzo 67. Or si moltiplichì per 2. il partitore 189. fa 378. pure si moltiplichì per 2. il numero partito 148243. e fa 296486. questo si parta per 378. verrà 784. bene è vero, che avanza 134. doppio numero di 67. facendone rotto con schisarlo, come si dirà a suo luogo, verrà l'istesso quoziente 784.  $\frac{67}{189}$ .

Avendo proporzionato il partitore al numero partito, con il moltiplicare, si proporziò adesso col partire; Sia Partitore 672. da partirsì 123648. molti sono i numeri che partono senza avanzo l'uno, e l'altro numero, e però si partino per 8. verranno 84. e 15456. Ora partendo 123648. per 672. il quoziente sarà 184. si come sarà con partire 15456. per 84. come si vede.

$$\begin{array}{r} \text{per } 672 / 123648 \\ \hline 184 \quad 2688 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{per } 84 / 15456 \\ \hline 184 \quad 336 \end{array}$$

34. D. Quale è la ragione di questa prova?

R. La ragione, che moltiplicandosi, o dividendosi per un medesimo numero il partitore, & il numero partito, o da partirsì, risultino due numeri, con i quali operandosi il partire, diano uguale quoziente, è perche il numero partitore al numero partito dice la medesima proporzione, che l'uno al quoziente: Ma col moltiplicarsi, e partirsì per un medesimo numero i primi due numeri, i risultati non variano proporzione per la Proposizione 17. del lib. settimo d'Eucide. Dunque devono dare il medesimo quoziente. Per esempio: sia 4. partitore, 8. numero partito, 1. e quoziente 2. sta 4. ad 8. come 1. a 2. in proporzione subdupla. Ora si moltiplichì 4. e 8. per 2. vengono 8. e 16. così pure sta 8. a 16. che 1. a 2. e pure partendosi il 4. e l'8. per 2. vengono 2. e 4. Medesimamente sta 2. a 4. come 1. a 2. e questa è la ragione di questa prova da me usata spesso, non solo in questa operazione del partire, ma in molte regole d'Abbaco, per utilità degli Scolari.

35. In quali massime si fondano le regole del Partire?

R. Oltre le dette, nelle seguenti: 1. Ogni numero si può risolvere in quelle parti da cui si è composto. 2. Il Zero nè può dividere, nè può essere diviso. 3. Il numero minore è misura del maggiore, quando il Divisore si contiene nel numero composto tante volte senza l'avanzo. 4. L'Unità è misura di tutti i numeri, che senza l'avan-

avanzo di parte. 5. Il numero binario, cioè il 2. divide tutti i numeri partenzia l'avanzo. 6. Ogni divisione regolata di numeri si fa dal medesimo divisore in parti uguali. 7. L'avanzo della Divisione non può essere uguale, è maggiore del numero Divisore, è Partitore. 8. Se un numero misurerà un'altro numero, per quel numero quoziente sarà parimente misurato l'istesso numero: come se per 3. viene misurato il 12. quattro volte, così per 4. il medesimo numero viene misurato tre volte. 9. Se il quoziente si moltiplica per il Divisore, risulta l'istesso numero Diviso, e Composto. 10. Se un numero misurerà più numeri, misurerà parimente i composti da detti più numeri: come se il 4. misura il 12. il 16. & il 20. parimente il 4. misura il 28. il 36. & il 48. 11. Il numero, che misura il tutto, e la parte del tutto, misura parimente il resto: come il 4. che misura il 28. & il 12. misura parimente il 16. resto del 28. fino a 28. *Ex Eucl. lib. 7.* 12. Più Divisori, è Partitori non possono dare il medesimo quoziente partendo il medesimo numero.

Finalmente da tutto il Trattato si offervi, che tutto l'Abbaco consiste in Operazioni di unire insieme unità, e numeri; è pure dividerli. Quando si uniscono, e si mettono insieme, dicesi Operazione Compositiva, come numerare, sommare, e moltiplicare. Quando si dividono, e si separano in parti diverse, si chiama Operazione Risolutiva, come sottrarre, e partire: Ma perche l'unire i numeri fra di loro può essere di parti disuguali, è di parti fra loro uguali; perciò a mettere insieme le parti disuguali si dà l'Operazione del sommare, e a mettere insieme le parti uguali si dà l'Operazione del moltiplicare. Così parimente perche tutto il numero si può disciogliere, è separare in parti disuguali, & uguali; per dividerlo in parti disuguali, si richiede il sottrarre; come per partirlo in parti uguali, ci vuole l'operazione del Partire. Quindi è, che se alcuno domandasse, che si dividesse un numero dato in tante parti disuguali, per esempio, il 51. in due parti, l'una delle quali fosse più 5.; questo si farà d'ogni sottrarre prima da 51. 5. e resta 46. quale diviso per 2. dà di quoziente 23. la prima parte minore, & cui aggiunto il 5. fa la seconda parte 28. e 23. con 28. sommati rifanno il numero 51. diviso. O pure se al 51. si aggiunge il 5. fa 56. quale diviso per 2. dà di Quoziente 28. la parte maggiore richiesta, e da essa sottratto il 5. resta per la parte minore 23. come prima. Dalche si vede, che in simili quesiti, è domande si devono adoprare l'operazioni miste dell'Abbaco; e nel sapere bene intrecciare le dette Operazioni Arimetiche, secondo le domande possibili a farsi, consiste tutto il maneggio, & arte de' Numeri.

TRAT.

54  
**TRATTATO SECONDO**  
**DE' NUMERI ROTTI.**  
**DISTINZIONE PRIMA.**

**Delle speciali notizie per le operazioni  
de' Rotti.**



Opo aver trattato de' Numeri intieri, e delle operazioni di Sommare, Sottrarre, Moltiplicare, e partire, bisogna trattare de' Numeri rotti, e divisi in parti, e detti anche minuzie, e frammenti; non potendosi proseguire senza cognizione di essi, e delle loro operazioni, i Trattati dell'Arithmetica.

1. D. Che cosa è Numero rotto?

R. Il Numero rotto è una, ò più parti uguali d' un' intiero tutto. Una parte: come un mezzo, un terzo, un'ottavo. Più parti: come trè quarti, quattro settimi, cinque ottavi. Ho detto *parti uguali*, perche un quarto è uguale ad un'altro quarto rispetto alla medesima cosa, ò sia moneta, peso &c. Dove si noti, che un'intiero tutto è divisibile, rispetto alla quantità continua, sopra la quale si applica il numero rotto.

2. D. Di quante sorti sono i Rotti, e di dove nascono?

R. Altri Rotti sono reali, che effettivamente si danno; come sono le Monete inferiori in riguardo delle maggiori; così i Pesi, e le Misure minori, in riguardo delle maggiori. Per esempio, della Lira in Fiorenza il mezzo, due terzi, il terzo, il quarto, il sesto, il dodicesimo, il ventesimo, il trentesimo, e il sessantesimo: cioè, la mezza Lira detta Carlinio, il Paolo, il Grosso, mezzo Grosso, la Crazia, il Soldo, il Duetto, e il Quattrino. Altri poi non si danno realmente, ma derivano tali rotti dall'operazione del Partire, come sono il quinto, il settimo, il nono della Lira v.g. partendo Lire 12. per 5. vengono Lire 2. e trè quinti, ovvero si voglia dire la quinta parte di trè Lire; perche il 3. che avanza si pone sopra una linea con il 5. partitore sotto, così  $\frac{3}{5}$ , e significa questo rotto trè parti d' una Lira divisa in cinque; ovvero la quinta

quinta parte di tre Lire; e questo è più secondo la verità, benchè l'altro sia più commune per l'uso. Tuttavia l'uno, e l'altro significato importa il medesimo.

3. D. Come si chiama il numero sotto la linea?

R. Denominatore: Perchè da il nome specifico alle parti, e significa in quante parti è diviso il tutto, cioè se è un 4., dimostra, che il tutto è diviso in quattro parti.

4. D. Come si chiama il numero sopra la linea?

R. Numeratore: Perchè numera le parti, che d'un tutto diviso in più parti, si pigliano; e questo numero deve essere minore di quello di sotto; acciò sia numero rotto il risultato da questi due.

5. D. Il numero rotto come s'esprime, essendo formato da due numeri?

R. Ordinariamente prima si dice quel di sopra, e poi quello di sotto, se di sotto è 2. mezzo: se 3. terzi: se 4. quarti: se 5. quinti: se 6. sesti: se 7. settimi: se 8. ottavi: se 9. noni: e se sarà più di 9. prima si dice quello di sopra, e immediatamente quello di sotto, aggiungendo la parola *esimi*, che significa parti; come:  $\frac{17}{17}$  sette quindici esimi, cioè del tutto partito in 15. parti uguali, se ne pigliano 7. Dunque si legga, così  $\frac{2}{2}$  un mezzo,  $\frac{2}{3}$  due terzi,  $\frac{3}{4}$  tre quarti,  $\frac{4}{5}$  due quinti,  $\frac{5}{6}$  cinque sesti,  $\frac{4}{7}$  quattro settimi,  $\frac{3}{8}$  tre ottavi,  $\frac{7}{9}$  sette noni,  $\frac{13}{10}$  tredici venti esimi,  $\frac{100}{100}$  cento ventitre novècento venticinque esimi, &c. Hò detto ordinariamente essendo così l'uso; tuttavia  $\frac{1}{8}$  si può dire l'ottava parte di 5. medesimamente  $\frac{7}{10}$  la ventesima parte di 7. &c.

6. D. In che modo cresce il valore del numero rotto?

R. Quando s'accresce il Numeratore, lasciando intatto il Denominatore, come  $\frac{2}{2}$ ,  $\frac{3}{2}$ ,  $\frac{4}{2}$ ,  $\frac{5}{2}$ . Overo quando col medesimo Numeratore si scema il Denominatore, come  $\frac{2}{2}$ ,  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{2}{4}$ ,  $\frac{2}{5}$ , e più di  $\frac{2}{2}$ , e  $\frac{3}{2}$  è più di  $\frac{2}{2}$ .

7. D. In che modo si diminuisce il valore del numero rotto?

R. Quando si scema il Numeratore, rimanendo il medesimo Denominatore, come  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{5}$ . Overo col medesimo Numeratore s'accresce il Denominatore, come  $\frac{2}{2}$ ,  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{2}{4}$ ,  $\frac{2}{5}$ . La ragione di queste due Risposte è chiara, e si prova per la seguente Domanda.

8. D. Come si conosce di due rotti l'uguaglianza, essendo di diverso Denominatore?

R. Col partire il Denominatore del primo per il suo Numeratore, e il Denominatore del secondo per il suo Numeratore; perchè se verrà il medesimo quoziente, saranno uguali, come  $\frac{2}{4}$  e  $\frac{3}{6}$  il 4. in 2. entra 3. volte, pure il 3. in 9. entra 3. volte; dunque sono uguali; e di due altri, quello sarà maggiore, che il Numeratore

non

nel Denominatore entra meno, e minore quello che entra più, come  $\frac{1}{2}$  e  $\frac{1}{3}$  è maggiore  $\frac{1}{6}$ . perchè il 3. in 6. entra 2. volte, & il 4. in 12. entra 3. volte.

9. D. Si può sapere per altro modo, quale di due rotti sia il maggiore?

R. Certo: Come di  $\frac{1}{4}$  e  $\frac{1}{5}$ . si moltiplica il Numeratore 3. del primo via il Denominatore 12. del secondo, & il prodotto si pone sopra il Numeratore del primo; Dipoi si moltiplica il Numeratore del secondo via il Denominatore del primo, & il prodotto si pone sopra il Numeratore del secondo, e perchè quei rotti che hanno ugual prodotto sono uguali, e d' altri due quello è maggiore, che ha maggior prodotto, e quello minore, che ha minor prodotto sopra di se.

Uguale  $\frac{36}{4} \times \frac{36}{5}$  Uguale      Minore  $\frac{8}{3} \times \frac{9}{4}$  Maggiore

Pure si sappia, che due rotti sono uguali, quando il Numeratore d'uno dice la medesima proporzione al Numeratore dell'altro, che il Denominatore al Denominatore; Come è chiaro che 9. a 3. sta come 12. a 4. cioè in tripla proporzione; dunque sono uguali. E quando d' un rotto il Numeratore dice maggiore proporzione al Numeratore dell'altro, che il Denominatore al Denominatore; Quel rotto è maggiore &c. come di  $\frac{1}{4}$ , e di  $\frac{2}{5}$  maggiore è  $\frac{1}{4}$  &c.

10. D. Come si rende il numero rotto intiero?

R. Con farli il Numeratore uguale al Denominatore, come  $\frac{2}{3}$  e  $\frac{1}{2}$  due mezzi, e trè terzi, se il Numeratore sarà maggiore del Denominatore, allora sarà più d'uno intiero: e però per sapere quanto è, si parta il Numeratore, per il Denominatore; come  $\frac{14}{3}$  partito 14. per 3. il quoziente è 4.  $\frac{2}{3}$  e tanto importa  $\frac{14}{3}$ .

11. D. Come si possono produrre più rotti uguali ad un rotto?

R. Se si moltiplica il Numeratore del rotto per qualsivis numero, & il prodotto si pone sopra una linea, & il Denominatore si moltiplica per il medesimo numero, con porre sotto la linea il prodotto s'averà un rotto uguale al primo; per esempio, sia il rotto  $\frac{1}{2}$  si moltiplichino il 3. per qualsivis numero, ora per 2. fa 6. per l'istesso 2. si moltiplichino il 5. fa 10. che questo sotto una linea, con sopra 6. fa  $\frac{10}{6}$  rotto uguale a  $\frac{1}{2}$  come si può provare per la 8. e per la 9. e così se ne producono degl'altri; dal che appare chiaro poter darli in infinito numeri rotti fra se uguali, rappresentati con diversi numeri. E benché questa operazione da altri venga traslasciata, tuttavia io l'hò posta, per essere opposta all'operazione dello schifare, e per servirli di prova.

12. D.



12. D. Come si ridurrà un rotto rappresentato con numeri fra se composti ad un rotto di medesimo valore rappresentato con numeri fra se primi?

R. Bisogna sapere, per la definizione 12. del settimo d'Euclide, che numeri fra se primi, si dicono quelli, che dalla sola unità sono misurati; siccome per l'xi. del medesimo Libro, numero primo è quello, che solo è misurato dall'unità; come 3. 5. 7. 11. &c. non dandosi di questi numeri altre parti aliquote, che l'unità, perche sola essa misura tali numeri senza avanzo; chiamandosi gl'altri numeri parti aliquante, perche misurano con rotto; come il 2. del 7. è parte aliquanta; misurando il 7. 2. volte, e mezzo. Osservisi però, che i numeri fra se primi, cioè comparativamente considerati, sono misurati dalla sola unità; ma ciascuno considerato da se può essere numero composto, e così,  $\frac{1}{2}$  l'8. e il 15. non hanno comune misura, che 1. ma l'8. da se ha il 2. & il 4. siccome il 15. ha il 3. & il 5. parti aliquote oltre l'unità. Numero composto poi è quello, che è misurato da numero, e tal numero che misura, si dice parte aliquota; come 12. e 15. il 12. è misurato da 2. 3. 4. e 6. parti aliquote del 12. siccome il 15. da 3. e 5. parti aliquote del medesimo. I numeri fra se composti, sono quelli, che intieramente sono misurati da qualche numero, come loro comune misura, e tali bisogna che siano i numeri del rotto da schisarsi; altrimenti non si potrebbero schisare, ma bisognerebbe lasciarli in quel modo. E tornando alla domanda dico, che tal rotto si ridurrà con lo schisare, che è abbreviare, e diminuire i numeri, che formano il rotto senza mutargli valore, e si fa col partire il Numeratore, e Denominatore per un numero, che sia comune loro misura; cioè che gl'i parta senza avanzo. Il quoziente, che viene dal partire il Numeratore si pone sopra una linea, siccome il quoziente, che viene dal partire il Denominatore si pone sotto l'istessa, e forma il rotto cercato. Per esempio, volendo schisare  $\frac{6}{10}$ . per 2. come comune misura, chiamato numero schisatore si parte il 6. e viene 3. che si pone sopra una linea così  $\frac{3}{5}$ . Si parte per l'istesso 2. il Denominatore 10. e viene 5. che si pone sotto la medesima linea così  $\frac{3}{5}$ , e questo è il rotto, che si voleva, ma la difficoltà consiste in trovare il numero schisatore.

13. D. Come si trova il numero schisatore, cioè che parta intiere volte il Numeratore, e Denominatore del rotto?

R. I Mercanti lo trovano a tastoni, schisando i rotti in più volte, per pratica. Onde volendo schisare  $\frac{6}{10}$ . perche tutti due i numeri sono pari li partono per 2. e viene  $\frac{3}{5}$ , e questi per 3. ne viene  $\frac{1}{1}$ , e così

così in due volte, e più ancora eseguiscano lo schisare con numeri schisatori parziali. Volendosi servire di questa pratica, si avverta se il Numeratore, e Denominatore sono numeri pari, perchè essendo tali si partono per 2. ma prima si veda se si possono partire per 4. per 6. per 8. &c. Come si abbia a schisare  $\frac{3}{4}$ . sarà 6. lo schisatore, e verrà  $\frac{1}{2}$ . se poi il Numeratore, o Denominatore sarà dispari, allora lo schisatore sarà numero dispari, o casso; Si come quando saranno tutti due numeri dispari allora si prova a partirli per 3. per 5. per 7. per 9. &c. Sia il rotto  $\frac{5}{6}$ . sarà lo schisatore 3. e 9. onde si schiserà per 9. 5. e verrà  $\frac{5}{9}$ . Pure sia  $\frac{5}{15}$ . lo schisatore sarà 7. e schisato verrà  $\frac{1}{3}$ . &c.

14. D. Come si troverà per regola il maggiore schisatore, o maggior partitore del Numeratore, e Denominatore del rotto?

R. Si troverà col sottrarre per la seconda Proposizione del lib. 7. d'Euclide. Volendo dunque trovare il maggiore schisatore di  $\frac{24}{40}$ . si sottra 24. numeratore, da 40. denominatore, resta 16. Il 16. si sottra da 24. resta 8. si sottra 8. da 16. resta 8. uguale all'altr'8. qual sottratto da 8. resta nulla. Onde 8. si dirà essere il maggiore schisatore di  $\frac{24}{40}$ , e schisato viene  $\frac{3}{5}$ . Ma se avverrà, che avanzi 1. sarà segno tal rotto non poterli schisare, per essere il Numeratore, e Denominatore del rotto numeri tra se primi, come si ha dalla prima Proposizione del libro settimo d'Euclide. Per esempio.  $\frac{24}{40}$ . sottratto 18. da 29. resta 11. questo da 18. resta 7. questo da 11. resta 4. questo da 7. resta 3. questo da 4. resta 1. Onde tal rotto non si può schisare.

$$\begin{array}{r} 24 \\ 40 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 40 \\ 24 \\ \hline 16 \\ 8 \\ \hline 8 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 18 \\ 29 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 29 \\ 18 \\ \hline 11 \\ 7 \\ \hline 4 \end{array}$$

Schisatore 8

$$\begin{array}{r} 24 \\ 40 \end{array}$$

schisato  $\frac{3}{5}$

Benchè da Euclide si abbia il ritrovamento della maggior misura di due numeri composti, per via di sottrarre, tuttavia più brevemente si trova per il partire.

15. D. Come si trova il maggiore schisatore per il partire?

R. Si parte il Denominatore per il Numeratore, & il numero che avanza si fa Partitore del primo Partitore, & il numero, che

avan-

avanza si fa Partitore del secondo Partitore, e così si seguita infino, che non avanzi alcuna cosa, e quell'ultimo Partitore è il maggiore schifatore. Per esempio, sia il rotto da schifare  $\frac{1}{2} \frac{1}{3}$  si parte 24. per 18. avanza 12. Si parte 18. per 12. avanza 6. Si parte 12. per 6. avanza 0. fiche il 6. è lo schifatore, schifato  $\frac{1}{2} \frac{1}{3}$ . dunque per 6. viene  $\frac{1}{12}$ .

Rotto $\frac{1}{2} \frac{1}{3}$	Schifatore $\frac{2}{6} / \frac{1}{12} / \frac{4}{18} / \frac{4}{24}$
Schifato per 6. $\frac{1}{12}$	-- 6 12

Avvertasi, che i quozienti si pongono sopra il partitore, per non impedire gl'avanzi.

Si schifi pure  $\frac{5}{2} \frac{7}{3} \frac{2}{5}$ . si parte 2520. per 672. avanza 504. si parte 672. per 504. avanza 168. si parte 504. per 168. avanza 0. Dunque lo schifatore maggiore è 168. Onde per esso schifato  $\frac{5}{2} \frac{7}{3} \frac{2}{5}$ . viene  $\frac{1}{168}$ .

Rotto $\frac{5}{2} \frac{7}{3} \frac{2}{5}$	Schifatore $\frac{3}{168} / \frac{1}{504} / \frac{3}{672} / \frac{3}{2520}$
Schifato per 168. viene $\frac{1}{168}$	--- 168 504

16. D. Come si schifa per icapezzo, ò tronco?

R. Quando nel numeratore, e Denominatore del rotto sono uguali zeri. Quelli si tagliano per primo schifamento. I numeri restati si schifano per le regole date; Si abbia da schifare  $\frac{2}{3} \frac{0}{2} \frac{0}{5}$ . tagliati li zeri, resta  $\frac{2}{31}$ . quale schifato per 3. viene  $\frac{2}{3}$ . La ragione è, perche lo schifatore è 300. onde tagliando due zeri, è come fusse schifato per 100. il restato rotto si schifa per 3. essendo 100. e 3. rip. ego di 300 e viene  $\frac{2}{3}$ . &c.

$\frac{2}{31} \frac{0}{2} \frac{0}{5}$  schifato per 3. viene

S'abbia pure da schifare  $\frac{3}{1} \frac{7}{2} \frac{0}{5}$ ; Si taglia un zero del Numeratore, e Denominatore; Dipoi si parte 370. per 17. avanza 13. per questo si parte 17. avanza 4. per questo si parte 13. avanza 1. che è segno  $\frac{3}{1} \frac{7}{2}$ . non poterli schifare, per essere formato il rotto di numeri fra le primi, per la definizione xij. del settimo d' Euclide.

$$\frac{3}{1} \frac{7}{2} \frac{0}{5}$$

$$\frac{3}{1} / \frac{4}{13} / \frac{21}{17} / 370.$$

17. D. Come si riducono gl' intieri a modo di rotto di qualsivias specie?

R. Si moltiplica il numero intiero con il Denominatore del rotto, nel quale si vuol ridurre, & il prodotto si pone sopra una linea per Numeratore, & il medesimo Denominatore si pone sotto. Sia 4. da ridursi in settimi, il Denominatore de' settimi è 7. moltiplicato per 4. fa 28. il quale posto sopra una linea, e sotto 7. dice  $\frac{28}{7}$ .

H 2

uguale

uguale à 4. e si prova per la 10. perche partendo il Numeratore, per il Denominatore, viene 4.

4. in settimi sono  $\frac{2}{7}$  6. in noni sono  $\frac{2}{9}$ .

18. D. Come si riduce l'intero, e rotto all'istesso rotto?

R. Moltiplicando il numero intero per il Denominatore del rotto, con aggiungere il Numeratore al prodotto, e la somma si pone sopra una linea, e sotto il Denominatore del rotto. Sia 6.  $\frac{2}{3}$  da ridursi in terzi, moltiplicasi 6. per 3. fa 18. al quale s'aggiunge 2. fa 20. che si pone sopra una linea con sotto 3. così  $\frac{20}{3}$ . e dice venti terzi, ò veramente la terza parte di 20.

6.  $\frac{2}{3}$ . sono  $\frac{20}{3}$ . 4.  $\frac{2}{3}$ . sono  $\frac{8}{3}$ . 7.  $\frac{2}{3}$ . sono  $\frac{14}{3}$ .

19. D. Come si riduce un rotto d' un Denominatore ad altro rotto di diverso Denominatore?

R. Con l'operazione detta dagli'Antori traslatore; perche trasfere un rotto da una Denominazione ad un'altra, con moltiplicare il Numeratore del rotto, per il Denominatore del rotto, nel quale si hà da traslatore, & il prodotto si parte per il Denominatore del rotto, che si traslata, e viene il Numeratore, che con il

$$\begin{array}{r} \frac{4}{3} \quad 20 \quad \text{sono } \frac{8}{3} \\ 3 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5 \cdot 60 \\ \hline 12 \end{array}$$

suo Denominatore s'averà il rotto di nuova denominazione. Volendosi di  $\frac{2}{3}$ . fare ventefimi, si moltiplica 20. per 3. Numeratore del rotto, e fa 60. quale si parte per 5. Denomina-

tore, e vien 12. che posto sopra una linea con sotto il 20. dice  $\frac{12}{20}$ . e tanti ventefimi sono  $\frac{2}{5}$ .

20. D. Come si chiama in Fiorenza quest' operazione, e à che serve?

R. Si chiama primo modo d'arrecare in parte; perche dandosi molti rotti di Moneta, Peso, e Misura, che non hanno quelle parti reali, nelle quali si divide tal Moneta, Peso, e Misura; bisogna recare quei rotti ad altri, che abbiano quelle parti, nelle quali realmente è divisa la Moneta con Monete inferiori, il Peso con Pesi inferiori, e la Misura con misure inferiori: Come  $\frac{1}{2}$ . di Scudo, ò Piastra Fiorentina, La Piastra non si divide in 8. parti, bensì in 7. che sono Lire; Però  $\frac{1}{2}$ . si rechino in settimi moltiplicando il 5. via 7. fa 35. quale partito per 8. viene 4. che sono  $\frac{4}{8}$ . di Scudo cioè lire 4.  $\frac{1}{8}$ . e perche la Lira non si divide in ottavi, mà in ventefimi, che sono Soldi, però in questi si riducano  $\frac{1}{8}$ . moltiplicando 20. per 3. fa 60. quale si parte per 8. ne viene  $\frac{7}{8}$ . cioè Soldi 7. e  $\frac{1}{8}$ . e perche il Soldo si divide in 12. Denari, moltiplicando 12. per 4. fa 48. quale partito per 8. viene  $\frac{6}{8}$ . cioè 6. Denari,

61  
nari. Sicche  $\frac{1}{4}$  di Piastra Fiorentina, sono ridotti in  $\frac{1}{4}$ . e  $\frac{1}{2}$ . di un settimo, e  $\frac{1}{4}$ . d'un ventesimo; cioè in Lire 4. Soldi 7. Denari 6. e così si procederà in altre sorti di Monete d'altri paesi. Chiamasi da altri tale operazione, Valutare de' rotoli, siccome in Roma; perche si trova il loro valore, e prezzo. Si rechi  $\frac{1}{4}$  di Piastra in Lire; Soldi; e Denari. Denari 12. fanno un Soldo. Soldi di 20. una Lira, Lire 7. una Piastra.

$$\begin{array}{r} \text{Di Piastra } \frac{1}{4} \quad \frac{1}{4} \quad \frac{1}{4} \quad \frac{1}{4} \\ \hline 7 \quad 20 \quad 12 \\ \hline 35 \quad 60 \quad 12 \\ \hline 3 \quad 4 \end{array}$$

Lire 4. 7. 6.

S'offervi come si è riportato avanti  $\frac{1}{4}$ . e quando si può schifare si schifa, e si riporta il rotto schifato, come si è fatto di  $\frac{1}{4}$ . di Soldo, essendosi riportato  $\frac{1}{2}$ . e questo

Di Piastra  $\frac{1}{4}$  — 7

$$\begin{array}{r} 5 \\ 3 \text{ — } 20 \\ \hline 60 \\ 4 \text{ — } 12 \\ \hline 48 \\ \hline \end{array}$$

Lire 4. 7. 6.

riportare si è fatto per occupare meno luogo; del resto ordinariamente l'avanzato 3. si moltiplica per 20. il prodotto 60. si parte per 8. e vengono 7. Soldi, il 4. che avanza si moltiplica per 12. il prodotto 48. si parte per 8. e vengono 6. Denari; come qui si vede.

Qui si soggiungono alcuni Esempj della Moneta, Peso, e misura, secondo l'uso di Fiorenza; la regola però serve per tutte le Monete, Pesi, e Misure d'altri Paesi.

Si rechi  $\frac{1}{4}$  di Piastra in Lire, Soldi, e Denari.

$$\begin{array}{r} \text{Di Piastra. } \frac{1}{4} \text{ — } 7 \quad \frac{1}{4} \text{ — } 20 \quad \frac{1}{4} \text{ — } 12 \quad \frac{1}{4} \text{ — } 6 \text{ Schifato } \frac{1}{4} \\ \hline 28 \quad 20 \quad 24 \\ \hline 1 \quad 2 \quad 6 \end{array}$$

Sono Lire 3. 2. 2.  $\frac{1}{4}$ .

Si rechi  $\frac{1}{4}$  di Lira in Soldi, e Denari.

$$\begin{array}{r} \text{Di Lira } \frac{1}{4} \text{ — } 20 \quad \frac{1}{4} \text{ — } 12 \\ \hline 100 \quad 24 \\ \hline 4 \end{array}$$

Sono Soldi 16. 8.

Si rechi  $\frac{1}{4}$  di Lire in Soldi; e Denari.

$$\begin{array}{r} \text{Di Lira } \frac{1}{4} \text{ — } 20 \quad \frac{1}{4} \text{ — } 12 \quad \frac{1}{4} \\ \hline 100 \quad 36 \quad 1 \\ \hline 12:60 \quad 36 \quad 1 \end{array}$$

Sono Soldi 12. 7.  $\frac{1}{4}$ .

Si re-

68.

Si rechi  $\frac{2}{3}$  di Libbra in Once, Denari, e Grani.  
 Grani 24. fanno un Denaro, Denari 24. un' Oncia, Once 12. una Libbra.

$$\begin{array}{r} \text{Di Libbra } \frac{2}{3} \text{ — } \frac{12}{10} \text{ — } \frac{1}{5} \text{ — } \frac{24}{108} \text{ — } \frac{1}{5} \text{ — } \frac{24}{96} \text{ — } \frac{4}{24} \text{ — } \frac{4}{4} \\ \hline \end{array}$$

Sono Once 10. Denari 19. 4.  $\frac{2}{3}$ .

Si rechi  $\frac{1}{3}$  d' Anno in Mesi, Giorni, e Ore.  
 Ore 24. fanno un Giorno; Giorni 30. alla Mercantile fanno un Mese, Mesi 12. un Anno.

$$\begin{array}{r} \text{D' Anno } \frac{1}{3} \text{ — } \frac{12}{9} \text{ — } \frac{1}{3} \text{ — } \frac{30}{84} \text{ — } \frac{30}{30} \\ \hline \end{array}$$

Mesi 9. Giorni 10.

Si rechi  $\frac{1}{4}$  di Moggio in Sacca, Staja, e Metadelle.  
 Metadelle 16. fanno un Stajo; Staja 3. un Sacco. Sacca 8. un Moggio; essendo il Moggio St. ja 24.

$$\begin{array}{r} \text{Di Moggio } \frac{1}{4} \text{ — } \frac{16}{88} \text{ — } \frac{1}{2} \text{ — } \frac{3}{2} \text{ — } \frac{1}{2} \text{ — } \frac{16}{16} \\ \hline \end{array}$$

Sono Sacchi 5. Stajo 1. Metadelle 8.

Si rechi  $\frac{1}{4}$  di Barile d' Olio in Fiaschi, e Mezzette.  
 Mezzette 4. fanno un Fiasco, Fiaschi 16. un Barile.

$$\begin{array}{r} \text{Di Barile d' Olio } \frac{1}{4} \text{ — } \frac{16}{6} \text{ — } \frac{1}{2} \text{ — } \frac{4}{3} \text{ — } \frac{1}{3} \\ \hline \end{array}$$

Fiaschi 13. Mezzette 1.  $\frac{2}{3}$ .

Si rechi  $\frac{1}{4}$  di Barile di Vino in Fiaschi, e Mezzette.  
 Mezzette 4. sono un Fiasco. Fiaschi 20. un Barile.

$$\begin{array}{r} \text{Di Barile di Vino } \frac{1}{4} \text{ — } \frac{20}{8} \text{ — } \frac{1}{2} \text{ — } \frac{4}{4} \\ \hline \end{array}$$

Fiaschi 17. Mezzette 2.

Si rechi  $\frac{1}{4}$  di Canna in Braccia. Braccia 4. fanno una Canna.

$$\begin{array}{r} \text{Di Canna } \frac{1}{4} \text{ — } \frac{4}{12} \text{ — } \frac{1}{3} \text{ — } \frac{4}{28} \text{ — } \frac{4}{4} \\ \hline \end{array}$$

Braccia 2.  $\frac{2}{3}$ .

21. D.

21. D. Quest'operazione di traslatore il numero rotto è di recarlo in parte, ò di valutarlo, si può provare?

R. Sicuro, in due maniere: Con lo schifare, quando il rotto è traslatato in un'altro semplice rotto  $\frac{1}{2}$  di Lira recati in Soldi 12. che sono  $\frac{1}{2}$  di Lira: se si schifaranno per 4. ritornerà  $\frac{1}{2}$  rotto di prima. Ma se il rotto sarà recato in parte, & abbia l'avanzo; allora perche verranno parti di parte, bisogna prima fare Crocetta, come si dice in Fiorenza, ovvero infilzare quei rotti di rotto, come dicono gl'Autori d'Arimmetica, per ridarli ad un semplice rotto, quale schifato sarà il rotto, che si traslatò.

22. D. Come si fa Crocetta, ovvero s'infilzano rotti di rotto.

R. Questa operazione del tutto è opposta alla passata, perche se nella passata si recò il rotto di Moneta, Peso, e Misura in varj rotti di rotto; Come  $\frac{1}{2}$  di Scudo, ò Piastra in Lire 4. Soldi 7. Denari 6. che a modo di rotto si dicono di Scudo  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{7}{20}$ , d'un settimo, e  $\frac{6}{100}$  d'un ventesimo; Ora si riducono quei rotti di rotto a  $\frac{1}{2}$  di Scudo come prima, che però in Fiorenza si chiama secondo modo di recare in parte; e si fa così. Posti per ordine  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{7}{20}$ , e  $\frac{6}{100}$ , ovvero schifato  $\frac{1}{2}$ , avvertendo di non schifare, se non l'ultimo rotto, benchè si potessero schifare, perche si varierebbe valore; Si moltiplichì il Numeratore 4. del primo rotto via 20. Denominatore del secondo, fa 80. al quale s'aggiunge 7 Numeratore del secondo, fa 87. quale si moltiplica via 2. Denominatore dell'ultimo schifato, fa 174. al quale s'aggiunge 1. Numeratore del terzo, fa 175. quale si pone sopra una linea per Numeratore; dipoi si moltiplicano i Denominatori de' rotti, cioè 7. via 20. fa 140. e questo via 2 fa 280. quale si pone sotto la linea per Denominatore così  $\frac{175}{280}$ , quale schifato per 35. viene  $\frac{5}{8}$  di Scudo, e così s'opera in tutti gl'altri.

Si rechino Lire 4. Soldi 7. e Denari 6. in parti di Scudo, ò Piastra.

$\frac{4}{1}$  —  $\frac{7}{20}$  —  $\frac{6}{100}$  viene  $\frac{175}{280}$  schifato per 35. sono  $\frac{5}{8}$  di Scudo.

Si rechino Lire 2. 2. 2. in parti di Scudo, ò Piastra.

$\frac{2}{1}$  —  $\frac{2}{20}$  —  $\frac{2}{100}$  viene  $\frac{224}{280}$  schif. per 56. sono  $\frac{4}{7}$  di Scudo.

Si rechino Soldi 16. Denari 8. in parte di Lira.

$\frac{16}{20}$  —  $\frac{8}{100}$  viene  $\frac{50}{60}$  schifato per 10. sono  $\frac{5}{6}$  di Lira.

Si rechif.

Si rechino Soldi 12. Denari 7.  $\frac{7}{12}$ . in parti di Lira .

$$\frac{12}{20} - \frac{7}{12} - \frac{1}{5} \text{ viene } \frac{256}{1200} \text{ schif. per 12. sono } \frac{63}{100} \text{ di Lira.}$$

Si rechino Once 10. Denari 19. Grani 4.  $\frac{4}{19}$  in parti di Libbra .

$$\frac{10}{12} - \frac{19}{24} - \frac{4}{24} - \frac{4}{5} \text{ viene } \frac{3104}{34560} \text{ schif. per 3456. sono } \frac{9}{10} \text{ di lib.}$$

Si rechino Mesi 9. Giorni 10. in parti d'Anno .

$$\frac{9}{12} - \frac{1}{3} \text{ viene } \frac{28}{36} \text{ schifato per 4. sono } \frac{7}{9} \text{ d'Anno.}$$

Si rechino Sacchi 5. Staja 1.  $\frac{2}{3}$  in parte di Moggio .

$$\frac{1}{8} - \frac{1}{3} - \frac{1}{2} \text{ viene } \frac{23}{48} \text{ schifato per 3. sono } \frac{11}{16} \text{ di Moggio.}$$

Si rechino Fiaschi 13. Mezzette 1.  $\frac{1}{2}$ . d' Olio in parti di Barile .

$$\frac{13}{16} - \frac{1}{4} - \frac{1}{3} \text{ viene } \frac{160}{192} \text{ schifato per 32. sono } \frac{5}{6} \text{ di Barile.}$$

Si rechino Fiaschi 17. Mezzette 2. di Vino in parti di Barile .

$$\frac{17}{20} - \frac{1}{2} \text{ viene } \frac{35}{40} \text{ schifato per 5. sono } \frac{7}{8} \text{ di Barile.}$$

Si rechino braccia 2.  $\frac{1}{3}$ . in parti di Canna .

$$\frac{2}{4} - \frac{1}{3} \text{ viene } \frac{7}{12} \text{ di Canna.}$$

Ecco provate tutte l'operazioni dell'altro recate in Parte .

S' infalzano questi rotti di rotti non applicati a materia , cioè  $\frac{1}{2}$ .  $\frac{2}{3}$ .  $\frac{3}{4}$ .  $\frac{4}{5}$ . nel modo insegnato .

$$\frac{3}{8} - \frac{2}{5} - \frac{3}{7} - \frac{1}{2} \text{ viene } \frac{245}{560} \text{ schifato per 35. sono } \frac{7}{16}$$

Per farne prova  $\frac{1}{2}$ . si ritornino per la passata in  $\frac{1}{2}$ .  $\frac{2}{3}$ .  $\frac{1}{4}$ .  $\frac{7}{8}$ .

$$\frac{7}{16} - \frac{8}{56} - \frac{1}{2} - \frac{5}{5} - \frac{1}{2} - \frac{7}{7} - \frac{1}{2}$$

$$\text{Sono } \frac{3}{8} - \frac{2}{5} - \frac{3}{7} - \frac{1}{2}$$



23. D. Effendo stato detto, che l'infilzare rotti, è ridurre rotti di rotto ad un semplice rotto; quando il rotto seguente è d'una parte dell'antecedente, si domanda, se fusse rotto di tutte le parti dell'antecedente. Per esempio  $\frac{1}{3}$ . e  $\frac{2}{5}$ . di tre quarti, dove prima si disse di un quarto; come si richiederebbe ad un semplice rotto?

R. Con l'operazione detta innestare di rotti per differenziarla dalla passata, & è recare più rotti di rotti ad un rotto, ovvero a numero sano, e rotto, quando i seguenti rotti sono di tutte le parti del suo antecedente rotto. Come  $\frac{1}{3}$ . e  $\frac{2}{5}$ . è  $\frac{2}{3}$ . cioè due terzi, e  $\frac{1}{5}$ . di due terzi, e  $\frac{1}{3}$ . di tre quarti di due terzi; per ridargli ad un semplice rotto, moltiplicasi il Numeratore 2. del primo via il Denominatore 4. del secondo fa 8. & a questo s'aggiunge il prodotto della moltiplicazione del Numeratore 2. via il Numeratore 3. del secondo, che è 6. fa 14. e questo si moltiplica via il Denominatore 5. del terzo fa 70., a questo s'aggiunge il prodotto della moltiplicazione de i tre numeratori, che è 12. fa 82. Dipoi si moltiplicano i tre Denominatori 3. 4. 5. fanno 60. quale si pone per Denominatore sotto una linea con sopra 82. così  $\frac{82}{60}$ . cioè  $1\frac{11}{30}$ . schifato  $\frac{11}{30}$ . e quei rotti sono recati ad  $1\frac{11}{30}$ . dove nell'infilzare, non mai viene intiero, benché fossero quanti si voglia rotti di rotto, perche sempre si va in diminuzione di parte, che manca al primo rotto.

$$\begin{array}{r} 14 \quad 82 \\ \frac{2}{3} - \frac{3}{4} - \frac{2}{5} \text{ viene } \frac{82}{60} \text{ cioè } 1\frac{11}{30} \text{ schifato } \frac{11}{30} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9 \quad 33 \quad 138 \\ \text{S' innestino } \frac{3}{5} - \frac{1}{2} - \frac{2}{3} - \frac{1}{4} \text{ viene } \frac{138}{120} \text{ cioè } 1\frac{23}{20} \end{array}$$

24. D. Come si prova, che quei rotti fanno  $1\frac{23}{20}$ ?

R. Supposto che siano rotti di Lira  $\frac{1}{4}$ . di Lira per la 20. sono Soldi 12. la metà di Soldi 12. è Soldi 6. due terzi di Soldi 6. sono Soldi 4. & un quarto di Soldi 4. è Soldo 1. Si sommino soldi 12. 6. 4. & 1. fanno Soldi 23. cioè Lira 1. Soldi 3. che è il medesimo che  $1\frac{23}{20}$ . ficche è stato operato bene.

25. D. Effendo stato detto, che l'infilzare è ridurre rotti di rotto ad un semplice rotto, quando il rotto seguente è d'una parte dell'antecedente; e l'innestare essere una riduzione di rotti di rotti ad un semplice rotto, quando il seguente è di tutte le parti dell'antecedente: quando poi sono rotti di rotti, senza congiunzione; per esempio  $\frac{2}{3}$ . di  $\frac{1}{5}$ . di  $\frac{1}{4}$ . di  $\frac{1}{3}$ . di Lira come si riducono a semplice rotto?

R. La difficoltà è conoscere essere differenti da i passati, perche nell'

nell' infilzare si diceva  $\frac{2}{3}$ . e  $\frac{3}{4}$ . d'un mezzo, e  $\frac{1}{2}$ . d' un terzo d' un mezzo, e  $\frac{2}{3}$ . d' un quarto d' un terzo d' un mezzo: e nell'innestare si diceva  $\frac{2}{3}$ . e  $\frac{3}{4}$ . di un mezzo, e  $\frac{1}{2}$ . di due terzi d' un mezzo, e  $\frac{2}{3}$ . di tre quarti di due terzi d'un mezzo: mà qui si dice  $\frac{2}{3}$ . di  $\frac{2}{3}$ . di  $\frac{1}{2}$ . di  $\frac{1}{4}$ . che però si moltiplicano i Numeratori insieme, il prodotto 24. si pone sopra una linea, e si moltiplicano i Denominatori; il prodotto 120. si pone sotto così  $\frac{24}{120}$ . che schifato per 24. viene  $\frac{1}{5}$ . per il semplice rotto; facilmente si prova, perchè  $\frac{1}{5}$ . di Lira, per la 20. sono Soldi 4. Ora  $\frac{1}{4}$ . di Lira per la medesima 20. sono Soldi 16.,  $\frac{1}{3}$ . di Soldi 16. sono Soldi 12.,  $\frac{2}{3}$ . di Soldi 12. sono Soldi 8., & il  $\frac{1}{5}$ . di Soldi 8. sono Soldi 4., sicchè è stato bene operato.

26. D. Che operazione è quella detta dagli Autori accattare?

R. E' trovare un numero, che abbia tante parti aliquote, d' intiere diverse, quante bisognano, e si trova così. Si moltiplicano successivamente i Denominatori di quelle parti, & il prodotto è il numero cercato; per esempio: Si trovi un numero, che abbia parti mezze, terze, quarte, e septe intiere, d' aliquote; si moltiplichino i Denominatori delle parti mezze, e terzo, cioè 2. via 3. fa 6. questo via 4. Denominatore delle quarte fa 24., e questo via 6. Denominatore delle 6. fa 144., e questo è il numero cercato, quale partendosi per 2. viene 72. metà d' esso, partendosi per 3. viene 48. terza parte, per 4. viene 36. quarta parte, e partendosi per 6. viene 24. sesta parte.

Mà per averè il minor numero, che abbia tali parti, come insegna Euclide nella Proposizione 38. e 41. del settimo speculativamente, s'osservi nel moltiplicare i Denominatori, se hanno comune misura, per la maggiore uno di loro si parte, e per il quoziente si moltiplica l'altro, e di nuovo si vede se il prodotto numero, e l'altro Denominatore hanno comune misura, e per la maggiore misura, quale si trova per la 14. ovvero per la 15. si parte uno di loro, e per il quoziente si moltiplica l'altro, & il prodotto farà il numero che averà le parti cercate, e sarà il minimo nell'esempio dato; Si moltiplichino 2. via 3. per non avere comune misura, fa 6. quale si dovrebbe moltiplicare per 4., mà perchè di 6. e di 4. il 2. è comune misura, si parta uno di essi per 2. Adesso il 6. viene 3. quale si moltiplichino via 4. fa 12. quale si dovrebbe moltiplicare per 6. mà perchè 6. è comune misura, si lascia, e 12. farà il minimo numero, che averà le cercate parti. Ora si parta per 2. il 12. viene 6. metà, si parta per 3. viene 4. terza parte, si parta per 4. viene 3. quarta parte, si parta per 6. viene 2. sesta parte, &c. e questo serve per prova.

27. D.

27. D. Come si pigliano diverse parti d' un Numero .

R. Questa operazione occorre alcune volte, e serve di prova all'ac-  
cattare , come si è accennato;perche essendosi trovato il numero  
12. che hà quelle diverse parti integrali, pigliandosi poi tali par-  
ti , non deve avanzare alcuna cosa, altrimenti non si sarebbe tro-  
vato il vero numero . Ora però si parla di pigliare le parti in ge-  
nerale d'un numero , siano integrali , o no , aliquote , ovvero ali-  
quante , per esempio; di 30. si pigliano  $\frac{2}{3}$ . e  $\frac{1}{2}$ . si fa in due modi ,  
i quali danno il medesimo numero; di 30. volendo  $\frac{2}{3}$ . si moltiplica  
30. per 2. Numeratore fa 60. il quale si parte per 3. Denominatore,  
viene 12. parte aliquota; ovvero il 30. si parte per 3. viene 10. il qua-  
le si moltiplica per 2. fa 20. come per l'altro modo , e 12. è  $\frac{2}{3}$ . di  
30. si prova con lo schifare ;perche posto 12. sopra una linea con  
sotto 30. così  $\frac{12}{30}$ . schifato per 6. viene  $\frac{2}{3}$ . che si voleva .

Si pigli ancora  $\frac{1}{2}$ . di 30. nel medesimo modo verrà 7.  $\frac{1}{2}$ . parte non  
integrale , ne aliquota , ma aliquanta , della quale volendo fare  
prova per lo schifare , per la 18. si riduce 7.  $\frac{1}{2}$ . in mezzi 15. che  
si pone sopra una linea con sotto 60. che è 30. ridotto in mezzi ,  
per la medesima dice  $\frac{15}{60}$ . schifato per 15. viene  $\frac{1}{2}$ . che si voleva .

28. D. Come si riducono i rotti di diverso Denominatore a' rotti  
d'un medesimo Denominatore ?

R. Se sono due rotti soli come  $\frac{2}{3}$ . e  $\frac{1}{4}$ . si moltiplica il Numeratore  
2. del primo via il Denominatore 4. del secondo fa 8. quale si po-  
ne sopra una linea; si moltiplica in croce il Numeratore 3. del se-  
condo via 5. Denominatore del primo, fa 15. quale si pone sopra  
un'altra linea ; dipoi si moltiplicano i Denominatori 5. via 4. fa  
20. il quale si pone sotto la linea dell'8. e del 15. e verrà  $\frac{8}{20}$ . per  $\frac{2}{3}$ .  
e  $\frac{15}{20}$ . per  $\frac{1}{4}$ . e averanno il medesimo Denominatore 20. e così  
degli altri .

$$\begin{array}{r} \frac{2}{3} \quad \times \quad \frac{1}{4} \\ \hline \frac{8}{20} \quad \frac{15}{20} \end{array}$$

Mà essendo più di due rotti di vario Denominatore da ridursi all'  
istesso Denominatore , si moltiplicano i Denominatori di tutti  
quei rotti, per avere un numero che abbia tutte quelle parti, per  
la 26., per esempio : s'abbiano da ridurre  $\frac{2}{3}$ .  $\frac{1}{4}$ .  $\frac{1}{5}$ . si moltiplichino  
2. via 3. fa 6. e questo via 5. fa 30. il quale sarà il Denominatore  
comune di tutti ; di questo per la 27. si pigli  $\frac{2}{3}$ . sarà 15. che  
si pone sopra la linea con sotto 30. dice  $\frac{15}{30}$ . di 30. si pigli  $\frac{1}{4}$ . sarà  
20. con sotto 30. tramezzato dalla linea dice  $\frac{20}{30}$ . di 30. si pigli  $\frac{1}{5}$ .  
che è 24. il quale posto sopra una linea con sotto 30. dice  $\frac{24}{30}$ . Dun-  
que

que ridotti  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{3}{4}$ ,  $\frac{5}{8}$ , ad un medesimo Denominatore sono  $\frac{4}{8}$ ,  $\frac{6}{8}$ , e  $\frac{5}{8}$ . Per più comodo s'offerì ne l moltiplicare i Denominatori quello, che si è detto nella 26. e si trovi il minimo numero, che abbia quelle parti integrali: Onde volendo ridurre  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{3}{4}$ ,  $\frac{5}{8}$ , ad un medesimo Denominatore, si troverà il 12. che però si ridurranno a dodicesimi, e faranno  $\frac{6}{12}$ ,  $\frac{9}{12}$ ,  $\frac{5}{12}$ . si come a ventefimi questi  $\frac{1}{5}$ ,  $\frac{2}{5}$ ,  $\frac{3}{5}$ , verranno  $\frac{4}{20}$ ,  $\frac{8}{20}$ ,  $\frac{12}{20}$ .

29. D. Quest' operazione come si prova?

R. Con lo schifare: perche schifando i rotti, che già ridotti sono ad un medesimo denominatore, per il maggiore schifatore, per la 12. Domanda, &c. ritorneranno i rotti primieri: come  $\frac{6}{12}$ ,  $\frac{9}{12}$ ,  $\frac{5}{12}$  schifati vengono  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{3}{4}$ ,  $\frac{5}{8}$ .

30. D. Si prova altrimenti questa operazione?

R. Si può provare per la Domanda 8. e 9. perche il rotto da ridursi, e il ridotto ad un medesimo Denominatore devono essere uguali; che però moltiplicandoli in croce devono dare quei rotti il medesimo numero, per esempio  $\frac{1}{2}$  ridotto a  $\frac{3}{6}$ , moltiplicandoli in croce il prodotto è 60. e così degli altri.

$$\begin{array}{ccccc} \frac{1}{5} \times \frac{12}{10} & \frac{1}{2} \times \frac{10}{20} & \frac{3}{10} \times \frac{14}{10} & \frac{3}{4} \times \frac{15}{20} \\ 60 & 60 & 140 & 140 & 60 & 60 \end{array}$$

## DISTINZIONE SECONDA.

### Del Sommare, e Sottrarre Numeri Rotti.

31. D. Che cosa è sommare Numeri rotti?

R. È un raccogliere più rotti distinti l'uno dall'altro in un rotto, ò in un numero intero, ò pure in intero, e rotto. Come sommando  $\frac{1}{2}$ , e  $\frac{3}{4}$ , ne viene  $\frac{5}{4}$ , sommando  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{3}{4}$ ,  $\frac{4}{6}$ ,  $\frac{2}{3}$ , ne viene 2, e sommando  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{3}{4}$ , ne viene 1,  $\frac{4}{12}$ .

32. D. Come si fa il sommare di soli rotti?

R. Se hanno i rotti un medesimo Denominatore, come  $\frac{2}{7}$ ,  $\frac{3}{7}$ ,  $\frac{4}{7}$ ,  $\frac{3}{7}$ , allora si sommano i Numeratori 2. 1. 4. 3. fanno 10. che posto sopra una linea con sotto il 7. Denominatore comune, così  $\frac{10}{7}$  sono dieci settimi, onde partiso 10. per 7. viene 1,  $\frac{3}{7}$ , per la somma di quei rotti.

$$\text{Si sommino } \frac{2}{7} \quad \frac{3}{7} \quad \frac{4}{7} \quad \frac{3}{7}$$

2

1

4

3

10

7

10

7

10

7

Somma 1,  $\frac{3}{7}$ .

33. D.

33. D. Come si sommano i rotti di diverso Denominatore?

R. Prima si riducono ad un medesimo Denominatore per la 28. e poi si sommano come nella passata; Si devano sommare  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{8}$  di libbra; si riducono in 24. esimi faranno  $\frac{12}{24}$ ,  $\frac{6}{24}$ ,  $\frac{3}{24}$ . sommati i Numeratori, la somma 21. si parte per 24. e vengono libbre 2.  $\frac{3}{24}$ . i quali  $\frac{3}{24}$  recati in once per la 19. sono once 2.  $\frac{1}{19}$  &c.

Si sommino  $\frac{2}{3}$   $\frac{3}{4}$   $\frac{5}{8}$   $\frac{1}{6}$  ridotti à  $\frac{16}{24}$   $\frac{18}{24}$   $\frac{15}{24}$   $\frac{4}{24}$

$$\begin{array}{r} 16 \\ 18 \\ 15 \\ 4 \\ \hline 53 \end{array}$$

Somma 2.  $\frac{5}{24}$ .

34. D. Si sommano in altra maniera i rotti di diverso Denominatore?

R. Si possono sommare per gl' incrociamenti: Si devano sommare  $\frac{1}{2}$  e  $\frac{1}{4}$ . si moltiplichino 1. via 4. fa 4. o si moltiplichino in croce; 2. via 3. fa 6. che sommato col 4. fa 10. 8 si pone sopra una linea con sotto 8. prodotto di due via 4. Denominatori, e dirà  $\frac{10}{8}$ . cioè 1.  $\frac{2}{8}$ . schifato  $\frac{1}{2}$  & 1.  $\frac{1}{4}$ . è la somma di  $\frac{1}{2}$  e  $\frac{1}{4}$ .

Si sommino  $\frac{1}{2}$   $\frac{3}{4}$

$$\begin{array}{r} 10 \\ 8 \\ \hline 18 \end{array}$$

via 3. fa 6. che sommato col 4. fa 10. 8 si pone sopra una linea con sotto 8. prodotto di due via 4. Denominatori, e dirà  $\frac{10}{8}$ . cioè 1.  $\frac{2}{8}$ . schifato  $\frac{1}{2}$  & 1.  $\frac{1}{4}$ . è la somma di  $\frac{1}{2}$  e  $\frac{1}{4}$ .

Nell'istessa maniera se fossero più di due rotti; Si sommino  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{8}$ . sommati come sopra  $\frac{1}{2}$  e  $\frac{1}{4}$ . viene  $\frac{10}{8}$ . cioè 1.  $\frac{2}{8}$ . schifato  $\frac{1}{2}$  per la somma.

$\frac{10}{8}$   $\frac{3}{4}$

$$\begin{array}{r} 30 \\ 8 \\ \hline 50 \end{array}$$

$\frac{66}{40}$   $\frac{15}{8}$

$$\begin{array}{r} 396 \\ 200 \\ \hline \end{array}$$

Così ancora si sommino  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{8}$  sommati come prima  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{8}$  sono  $\frac{6}{8}$ . con questo senza ridurre, ò levare l'intiero si sommi  $\frac{1}{2}$ . è verà  $\frac{1}{2}$  &  $\frac{6}{8}$ . cioè 2.  $\frac{3}{4}$ . schifato per 4. sono  $\frac{3}{4}$ . dunque la somma è 2.  $\frac{3}{4}$ .

$\frac{396}{240}$  cioè 2.  $\frac{3}{4}$ . sch. per 4. viè.  $\frac{3}{4}$ .

Così ancora si sommino  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{8}$  sommati come prima  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{8}$  sono  $\frac{6}{8}$ . con questo senza ridurre, ò levare l'intiero si sommi  $\frac{1}{2}$ . è verà  $\frac{1}{2}$  &  $\frac{6}{8}$ . cioè 2.  $\frac{3}{4}$ . schifato per 4. sono  $\frac{3}{4}$ . dunque la somma è 2.  $\frac{3}{4}$ .

S'avver-

<sup>70</sup>  
 S'avverta, che si può levare l'intiero, & il rotto si somma con l'altro rotto. Si sommino come prima  $\frac{1}{2}$ . e  $\frac{1}{4}$  viene 1.  $\frac{3}{4}$ .  $\frac{1}{4}$  si sommi con  $\frac{3}{4}$ . viene  $\frac{4}{4}$ . questo si sommi con  $\frac{1}{2}$ . ne viene 1.  $\frac{1}{2}$ . al quale per tutto i. di prima, fa 2.  $\frac{1}{2}$ . per la somma.

$$\begin{array}{r} \frac{1}{2} \times \frac{3}{4} \\ \hline \frac{3}{4} \\ 4 \\ \hline 8 \end{array}$$

$$8 / 10$$

$$1 \frac{2}{8}$$

$$\text{schifato } \frac{1}{4}$$

$$\begin{array}{r} \frac{3}{4} \times \frac{2}{5} \\ \hline \frac{6}{20} \\ 5 \\ \hline 10 \end{array}$$

$$13$$

$$20$$

$$\begin{array}{r} \frac{12}{10} \times \frac{5}{6} \\ \hline \frac{60}{60} \\ 78 \\ \hline 100 \end{array}$$

$$120 / 178$$

$$1 \frac{58}{110} \text{ schifato } \frac{29}{60}$$

$$\begin{array}{r} 1 \frac{29}{60} \\ \hline 1 \end{array}$$

$$\text{Somma } 2 \frac{29}{60}$$

35. D. Come si sommeranno intieri, e rotti con intieri, e rotti?  
 R. Si sommano i rotti, come si è insegnato, dipoi si sommano gli intieri, aggiungendo quelli, che fossero venuti dal sommare

$$\begin{array}{r} \frac{2}{3} \times \frac{3}{4} \\ \hline \frac{6}{12} \\ 9 \\ \hline 18 \end{array}$$

$$18 / 17$$

$$1 \frac{1}{12}$$

$$\text{Lire } 14$$

$$25$$

$$1 \frac{1}{12}$$

$$\text{Lire } 40 \frac{1}{12}$$

i rotti. Siano da sommarli Lire 14.  $\frac{1}{2}$ . e Lire 25.  $\frac{1}{4}$ . sommati  $\frac{1}{2}$ . e  $\frac{1}{4}$ . la somma è 1.  $\frac{1}{12}$ . la quale con Lire 14. e Lire 25. sono Lire 40.  $\frac{1}{12}$ . per la cercata somma.

Si abbiano à sommare  $\frac{1}{2}$ . e  $\frac{1}{4}$ . 12.  $\frac{1}{2}$ . e 6.  $\frac{1}{2}$ .

Si sommino prima i rotti &c.

$$\frac{1}{2} \frac{1}{4} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \text{ ridotti } \frac{36}{60} \frac{45}{60} \frac{30}{60} \frac{30}{60}$$

$$\begin{array}{r} 36 \\ 45 \\ 30 \\ 20 \\ \hline 131 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 60 / 131 \\ \hline 2 \frac{11}{60} \\ 12 \\ \hline 6 \end{array}$$

$$\text{Somma } 20 \frac{11}{60}$$

36. D.

36. D. Come si sommano intieri, e rotti di rotti, con intieri, e rotti di rotti di Moneta, Peso, e Misura, con la sua prova?

R. Benche altri mettano queste operazioni di sommare nel principio, dopo il sommare di numeri assoluti, tuttavia il suo luogo è questo. Si capisca bene quello, che si dice d'un'operazione di sommare d'una sorte di Moneta, Peso, e misura d'un Paese, perchè il medesimo s'intende nel sommare altre forti di Monete, Pesi, e Misure d'altri Paesi, e questo per non avere a ripetere le medesime cose; E perchè il sommare di Lire, Soldi, e Denari è à molti Paesi comune, si cominci da esso, come si è detto nella 20. Denari 12. fanno un Soldo, Soldi 20. una Lira; onde i Denari sono dodicesimi di Soldo, siccome i Soldi sono ventesimi di Lira: che però si pongono i numeratori d'una specie gl'uni sotto gl'altri senza Denominatore, il quale s'accenna sopra i numeratori distinto con una linea; dipoi si sommano i Numeratori, e quante volte questi compiranno il Denominatore, tante unità si contano con la fila de' numeri seguenti, ponendo l'avanzo sotto la fila de' numeri antecedenti. Siano dunque da sommarli le seguenti partite di Lire, Soldi, e Denari, disposti ordinatamente in modo, che i Denari siano sotto i Denari, i Soldi sotto i Soldi, e le Lire sotto le Lire. Si ponga sopra i Denari il 12. sopra i Soldi il 20. sopra le Lire il 10.; si sommano i Denari, de i quali la somma è 30.,

	10	20	12
Lire	24.	13.	4
	17.	14.	2
	17.	9.	8
	45.	2.	10
	27.	15.	4
	18.	19.	2

poi le decine, dicendo 2. e Prima soma Lire 151. 14. 6.

9. fa 11. e 5. fa 16. e 2. fa 18. e

9. fa 27. e 4. fa 31. e 3. fa 34. Seconda somma 127. 1. 2.

adesso s'aggiungano le 4. decine

ne ad una per volta, dicendo: Prova 151. 14. 6.

e 10. fa 44. e 10. fa 54. e 10.

fa 64. e 10. fa 74. nel quale il sopraposto 20. si contiene 3. volte, e

avanzano 14. Soldi, i quali si segnano sotto, e 3. che sono Lire si

sommano con le Lire; ovvero sommati i numeri digiti de i Soldi

de i quali la somma è 34. si segni 4. sotto i digiti de i Soldi, le 3. de-

cine si sommino con le 4. decine, saranno 7. decine di Soldi; e

perche sono dispari, una decina s'aggiunge alli 4. Soldi posti

sotto,

sotto la metà di 6. decine restate cioè 3. sono Lire da sommar-  
 si con i numeri delle Lire, delle quali la somma sarà 41. si segna  
 1. sotto, e 4. decine si sommano con le decine, delle quali la som-  
 ma è 15. che si segnano sotto, e la somma è di Lire 151. Sol. 14.  
 Danari 6. Per prova si facciano gli Scolari sommare le partite di  
 nuovo con lasciare la prima partita da capo; benché si possa la-  
 sciare qualsivoglia partita; che se la prima volta hanno somma-  
 to di sotto in sopra, la seconda volta sommino di sopra in sotto,  
 e la seconda somma parziale sarà di Lire 127. Soldi 1. Danari 2.  
 la quale si sommi con la partita lasciata di Lire 24. 13. 4. e verrà,  
 la prima somma, se si è ben sommato; la qual somma si fa porre  
 agli Scolari sotto la seconda somma per maggior loro capacità.  
 37. D. Come si sommano Piastre, ovvero Scudi, Lire, Soldi, e Da-  
 nari?

R. Le Lire sono settemila di Piastra, perche 7. Lire fanno una di esse  
 in Fiorenza; però sopra le Lire si ponga 7. per Denominatore,  
 e nella somma delle Lire quante volte li contiene il 7. tante Pia-  
 stre, o Scudi si sommano con essi, ponendo le Lire d'avanzo sot-  
 to; del resto s'opera come nella passata. La prova si faccia con  
 sommare con le partite di prima la somma, è questa seconda  
 somma sarà doppia della prima, che però pigliandosene la metà  
 con partire per 2. verrà la prima somma, essendosi ben sommato.

Piastre	26.	3.	8.	4
	18.	4.	6.	8
	75.	6.	9.	8
	32.	2.	18.	4
	16.	3.	4.	8

---

Prima somma di Piastre 169. 6. 7. 8

---

Seconda somma per 2. 339. 5. 15. 4

---

Prova 169. 6. 7. 8

---

38. D. Come si sommano Libbre, Once, Denari, e Grani con  
 altra differente prova?

R. Grani 24. fanno un Denaro, Denari 24. un' Oncia, Once 12.  
 una Libbra, che però i Grani sono 24 esimi del Denaro, i De-  
 nari sono 24 esimi dell'Oncia, e l'Once sono 12 esimi della Libbra  
 che però nel numero sommato de' Grani si vede, quante volte si  
 contiene il 24. o tanti denari si sommano con i Denari, ponendo  
 i Grani d'avanzo sotto essi, &c.

Spedi-



Spedita prova è sommare come s' in-  
segnò nella 24. del primo Trattato.  
Avendo già fatto la somma di lib-  
bre 39. 5. — 18.; Si sommino le de-  
cine delle Libbre, sono 4.; fino al 5.  
di sopra ci è 1. qual si segna sotto il  
5. che col 9. superiore dice 19. Si  
sommino i numeri delle Libbre  
sono 16.; fino a 19. ci è 3., quale si se-  
gna sotto il 9. quali 3. Libbre fatte  
Oncè sono 36. e once 5. della sōma

Libbre	31.	4.	17.	21.
	4.	3.	17.	14.
	14.	10.	16.	20.
	5.	9.	20.	11.
	2.	4.	14.	16.
		6.	9.	18.
<hr/>				
Lib.	59.	5.	—	18.
<hr/>				
Prova	13.	4.	3.	—

sono once 41. Ora si sommino l'once sono 37. fino a 41. ci sono  
once 4., qual si segna sotto il 5., quali once 4. moltiplicate per 24.  
sono Denari 96. Ora si sommino i Denari sono 93., fino a 96. ci  
sono Denari 3. che si segnano, quali fatti Grani con moltipli-  
carsi per 24. sono Grani 72., a i quali aggiunti 18. della somma  
fanno 90. Ora dico, che sommando i Grani devono essere 90. a  
punto, quando si sia ben sommato; ficcome sono.

39. D. Come si sommano Libbre, Oncè, Ottave, e Terze?

R. In Roma si divide l'Oncia in Ottave, e l'Ottava in Terze, che  
e l'istesso, che dividere l'oncia in 24. Denari.

In questo esempio si è sommato al  
contrario in due volte, come s'in-  
segnò nella 21. del primo. Si sono  
sommate le Libbre, che sono 11.  
quali si sono segnate sotto; Pure  
si sono sommate l'Oncè, che sono  
60. e perchè il 12. si contiene 5. vol-  
te appunto, si segna 5. sotto l'Oncè.  
e Libbre 5. sotto 11. Ancora si so-  
no sommate l'Ottave, che sono 28.  
l'8. si contiene 3. volte, che sono  
Oncè, quali si sono segnate a suo  
luogo, e 4. Ottave sotto esse, e fi-  
nalmente si sono sommate le Terze, sono 7. cioè 2. Ottave, che  
si sono segnate sotto il 4. e 1. sotto le terze, e tirata la linea  
sotto, e sommate le due partite al solito han dato di vera somma  
Libbre 16. 3. 6. 1. Questo modo non è da dispregzarsi, partico-  
larmente quando il Computista può essere interrotto, non doven-  
dosi tenere a mente alcuna cosa.

Libbre	12.	12.	8.	3.
	2.	10.	4.	1.
	1.	11.	7.	2.
	3.	9.	4.	—
	2.	10.	2.	1.
	3.	9.	6.	1.
		11.	5.	2.
<hr/>				
	11.	—	4.	1.
	5.	3.	2.	—
<hr/>				
	16.	3.	6.	1.

40. D. Come si sommano alcune partite di Anni, Mesi, e Giorni  
con altra prova?

K

R. Gior-

R. Giorni 30. fanno un Mese Mercantile, e Mesi 12. un Anno, che però si porranno sotto gl'avanzi sopra 30. e sopra 12., e tanti Mesi, o Anni si sommeranno con la seguente fila.

	10	11	30
Anni	7.	8.	20

Per prova si fommi la seconda volta con lasciare una partita, qui si lascia la prima superiore, e la seconda somma sarà Anni 17. Mesi 10. quali sottratti da Anni 25. 6. 20. restano Anni 7. 8. 20. partita lasciata, essendo bene operato.

4.	2.	17
7.	4.	8
2.	10.	26
3.	4.	9

Somma Anni	25.	6.	20
------------	-----	----	----

17.	10.	—
-----	-----	---

Anni	7.	8.	20
------	----	----	----

41. D. Come si sommano Stajora, Panora, Pugnora, e braccia quadre di Terreno con la prova del 9.?

R. Si segnano sotto gl'avanzi sopra gli 12. e quante volte è contenuto il 12. nella somma della fila, tante unità si sommano con la seguente fila; perchè 12. braccia quadre fanno un Pugnoro;

Pugnora 12. un Panoro, Panora

12. un Stajoro di Terreno in Fio-

renza: La somma sarà Stajora 23.

9. 3. 4. Per fare la prova del 9. si

levino gli 9. per la 26. del primo

dalla partita superiore, dicendo:

di Stajora 23. levando 9. l'avanzo

è 4. quale si moltiplica per 12. per

farne Panora, e vengono 48. aggiunte 6. fanno 54. levati gli 9.

avanza 0. levati gli 9. da 4. Pugnora, avanza 4. che si moltiplica

per 12. per farne braccia quadre, e vengono 48. aggiunte 8.

fanno 56. da queste levati gli 9. avanza 2. quale si segna dopo 8.

braccia quadre distinto da una linea; Così si levano gli 9. dalle

altre partite, ponendo gl'avanzi dopo esse; qualiavanzi si som-

mano, e della somma si levano gli 9. e resta 4. quale si segna da

una parte del X. Ora dico, che levandosi gli 9. dalla somma di

Stajora 23. 9. 3. 4. come si è detto, l'avanzo deve essere 4. come è,

il quale si pone dall'altra parte dell'X. Dunque è stato bene

sommato.

Non differentemente si fanno le Prove del 7. ovvero d'altro numero, levando gli 7. da ciascuna partita sommata, e sommando gl'avanzi, e della somma di nuovo levando gli 7. il numero, che

avan-

	10	11	12	12
Stajora	14.	6.	4.	8.
	2.	3.	6.	5.
Prova del 9	4.	2.	9.	7.
4 X 4	3.	8.	6.	8.
Somma	23.	9.	3.	4.

avanza, che è 4. si pone da una parte dell'X. e levando gli 7. dalla somma deve avanzare 4. come avanza, quale si pone dall'altra parte dell'X. e farà segno d'essere giusta la somma.

Prova del 7.

**X**

Stajora 13. 6. 4. 8. — 4  
2. 3. 6. 5. — 3  
4. 2. 9. 7. — 0  
3. 8. 6. 8. — 4

Somma 23. 9. 3. 4.

22. D. Nel fare la Prova del 7. del 9. e d'altro numero, ci è alcuna industria per renderla facile.

R. L'industria sia di levare prima il numero, per il quale si fa la prova da quello, per il quale si dovrebbe moltiplicare l'avanzo, e con il resto moltiplicarlo. Dovendosi provare, se la somma è giusta di Lire, Soldi, e Denari; l'avanzo delle Lire, facendo la prova del 9. si moltiplica per 2. in cambio di 20. perchè da questo levati gli 9. resta 2. e l'avanzo de' Soldi si moltiplica per 3. perchè da 12. levato 9. resta 3. e così facendo la prova del 7. l'avanzo delle Lire si moltiplica per 6. perchè levando gli 7. da 20. resta 6. e l'avanzo de' Soldi si moltiplica per 5. perchè levando 7. da 12. resta 5. Si venga all'esempio; la prima partita è di Lire 624. 16. 8. levati gli 9. da 624. avanza 3. Lire; si moltiplicano per 2. fa 6. aggiunto 16. della partita fa 22. levati gli 9. restano 4. Soldi; si moltiplicano per 3. fa 12., aggiunto 8. fa 20., dal quale levati gli 9. restano Denari 2., quali si segnano dopo Denari 8. come si è detto nella passata, e così si seguita a fare nell'altre partite, anche per la prova del 7.

Lire 624. 17. 8. — 2

Lire 624. 16. 8. — 6

Prova del 9. 127. 13. 4. — 4

Prova del 7. 127. 13. 4. — 1

**3 X 3**

84. 6. 8. — 8

**3 X 3**

84. 6. 8. — 3

156. 4. 4. — 7

156. 4. 4. — 0

Lire 993. 1. —

Lire 993. 1. —

Nell'istessa maniera si fa la prova alle operazioni di sommare altre Monete, Pesi, e Misure. Onde nella passata Lezione di Stajora, Panora, &c. facendosi la prova del 9. in cambio di moltiplicare per 12. l'avanzo, si moltiplichi per 3. siccome per 5. facendosi quella del 7.

23. D. Come si sommeranno diversi rotti di rotti con altri rotti di rotti di diverso Denominatore?

R. Si recheranno rotti di rotti a semplice rotto per la 22. del secondo trattato, e si sommano per la 33. Si abbia da sommare  $\frac{1}{2}$  di Lira, e  $\frac{2}{3}$  d'un quarto con  $\frac{2}{3}$  e  $\frac{2}{5}$  d'un quinto di Lira. S'infila-

K 2

no  $\frac{1}{4}$

no  $\frac{1}{2}$  con  $\frac{2}{3}$  e verrà  $\frac{1}{2} + \frac{2}{3}$ . S'infilzano  $\frac{2}{3}$  con  $\frac{1}{2}$  e verrà  $\frac{5}{6}$  qual sommato con  $\frac{1}{2}$  verrà Lire 1.  $\frac{1}{2}$  per tal somma, quali  $\frac{1}{2}$  recati a soldi, e Denari per la 20, sono Soldi 8, Denari 4.

S'infilzano  $\frac{3}{4} - \frac{2}{3}$  viene  $\frac{1}{12}$  s'infilza  $\frac{2}{3} - \frac{1}{12}$  vien.  $\frac{5}{12}$  schif.  $\frac{1}{2}$

Si sommino  $\frac{11}{12} - \frac{1}{2}$   $\frac{22}{12}$

24. 34

1  $\frac{5}{12}$  schifato  $\frac{1}{2}$ .

44. D. Che cosa è sottrarre di numeri rotti?

R. E' un levare da un rotto maggiore un rotto minore, o uguale; da intiero un rotto, da intiero, e rotto un rotto; o finalmente da intiero; e rotto con trovare la differenza di quelle quantità.

45. D. Come si sottra un rotto da un rotto?

R. Se hanno un medesimo Denominatore, si sottra il minore Numeratore del maggiore, e il resto si pone sopra una linea col medesimo Denominatore sotto; come da  $\frac{4}{5}$  sottra  $\frac{2}{5}$  dà 5. si levi 3. resta 2. il quale posto sopra una linea con sotto il 5. dice  $\frac{2}{5}$ . così ancora da  $\frac{5}{7} - \frac{2}{7}$  si sottrino  $\frac{3}{7}$  restano  $\frac{3}{7}$  schifato  $\frac{1}{2}$  da  $\frac{3}{7}$  sottratti  $\frac{1}{7}$  restano  $\frac{2}{7}$ , da  $\frac{5}{7} - \frac{2}{7} - \frac{1}{7}$  restano  $\frac{2}{7}$  schifato  $\frac{1}{2}$ .

46. D. Come si sottra un rotto da un rotto di diverso Denominatore?

R. Si riducono ad un medesimo denominatore per la 28. del secondo, e poi s'opera come nella passata; Da  $\frac{1}{2}$  si sottrino  $\frac{2}{3}$  ridotti  $\frac{3}{6}$  a  $\frac{4}{6}$  e  $\frac{2}{3}$  a  $\frac{4}{6}$  da 9. si levi 8. resta 1. che col 12. sotto dice  $\frac{1}{12}$ . e tanto resta.

In pratica si fa così: Moltiplicasi il Numeratore 3. del rotto, dal quale si deve sottrarre, via 3. Denominatore dell'altro fa 9. dipoi in croce il Numeratore 2. via il Denominatore 4. fa 8. quale si sottra da 9. resta 1. che posto sopra una linea, si moltiplicano i Denominatori insieme, cioè 4. via 3. fanno 12. e si pone sotto la linea, e dice  $\frac{1}{12}$  come prima.

$$\text{Da } \frac{3}{4} \times \frac{2}{3} = \frac{9}{8}$$

resta  $\frac{1}{12}$

$$\text{Da } \frac{5}{6} \times \frac{3}{8} = \frac{40}{18}$$

resta  $\frac{22}{18}$  schif.  $\frac{11}{9}$

47. D. Come si sottra da intiero il rotto?

R. L' intiero si fa a modo di rotto così 1. sotto la linea, e s'opera come nella passata. Si abbia dal 6. a sottrarre  $\frac{1}{6}$  il 6. a modo di rotto

rotto sia così  $\frac{2}{4}$ , onde moltiplicando in croce 6. via 4. fa 24. dipoi  
 1. via 3. fa 3. qual sottratto da 24. resta 21. con sotto il 4. dice  
 $\frac{21}{4}$ . cioè 5.  $\frac{1}{4}$ . per la differenza.  
 In pratica però, si moltiplica 6. via 4. Denominatore fa 24., dal  
 quale si sottra 3. Numeratore: 21. restato si parte per 4  
 e viene 5.  $\frac{1}{4}$ . come prima, per la differenza; Ancora si può levare  
 1. da 6. resta 5. di quel 1. se ne fa  $\frac{1}{4}$ . dal quale levati  $\frac{1}{4}$ . resta  $\frac{3}{4}$ . che  
 col 5. dice 5.  $\frac{3}{4}$ . per la differenza.

$$\frac{6}{1} \times \frac{3}{4} = \frac{24}{4}$$

resta  $\frac{21}{4}$  cioè 5.  $\frac{1}{4}$

$$\frac{6 \cancel{1} \frac{3}{4}}{\times \frac{3}{4}} = \frac{24}{4}$$

Differenza 24

---

3

---

4 / 21

---

5  $\frac{1}{4}$

48. D. Come da intero si sottra intero, e rotto?  
 R. Si riduce l'intero, e rotto all'istesso rotto, per la 18. del secon-  
 do ne l'intero, dal quale si deve sottrarre al medesimo rotto per  
 la 17. e si sottra come si è detto; da 7. si sottra 2.  $\frac{1}{2}$ . ridotto que-  
 sto è  $\frac{1}{2}$ . e 7. è  $\frac{14}{2}$ . da 14. levato 5. resta  $\frac{9}{2}$ . cioè 4.  $\frac{1}{2}$ . per la diffe-  
 renza.

Da 7.  $\frac{1}{2}$  resta  $\frac{9}{2}$  cioè 4.  $\frac{1}{2}$

$$\frac{14}{2} - \frac{5}{2} = \frac{9}{2}$$

49. D. Come si sottra da intero, e rotto l'intero, e rotto?  
 R. Si riduce, come nella passata, l'intero al suo rotto; e se han-  
 no un medesimo Denominatore si sottra per la 45.

Come da 9.  $\frac{1}{3}$  resta  $\frac{26}{3}$  cioè 8.  $\frac{2}{3}$  schiavo

Ma se hanno diverso Denominatore si sottra per la 46.

Come da 6.  $\frac{1}{2}$  resta  $\frac{11}{2}$  cioè 5.  $\frac{1}{2}$  schiavo

Ridotti  $\frac{3}{1} \times \frac{2}{2} = \frac{96}{40}$

---

15 / 53

3  $\frac{1}{2}$  differenza;

Pro-

Provandosi il sommare de' rotti con il sottrarre, è stato d' uopo il differire la prova d'esso al fine dell'operazione del sottrarre de' rotti; la quale pure si prova col sommare; siccome si proverà il moltiplicare col partire, e questo col moltiplicare.

50. D. Come si prova il sommare de' rotti col sottrarre?

R. Dalla somma si sottra uno de' rotti sommati, e deve restare l'altro rotto. Si siano sommati  $\frac{1}{2}$  e  $\frac{1}{4}$ , la somma sia  $1. \frac{3}{4}$ . se da questa si sottra  $\frac{1}{2}$ , resta  $\frac{1}{4}$ . ma se si sottra  $\frac{1}{4}$  da  $1. \frac{3}{4}$ , resta  $\frac{1}{2}$ .

Somminfi

$$\begin{array}{r} \frac{1}{2} \times \frac{3}{4} \quad 6 \\ \hline \frac{3}{4} \quad 4 \end{array}$$

per 8. 10

Somma  $1. \frac{3}{4}$

Da  $1. \frac{3}{4}$  si sottri  $\frac{1}{2}$

$$\begin{array}{r} \frac{3}{4} \times \frac{1}{2} \quad 10 \\ \hline \frac{1}{2} \quad 4 \end{array}$$

$\frac{6}{8}$  schifat.  $\frac{3}{4}$

Da  $1. \frac{3}{4}$  si sottrino  $\frac{3}{4}$

$$\begin{array}{r} \frac{3}{4} \times \frac{3}{4} \quad 12 \\ \hline \frac{9}{4} \quad 4 \end{array}$$

$\frac{12}{4}$  schif.  $\frac{3}{4}$

51. D. Quando si sono sommati più rotti, come si fa la prova?

R. Si siano sommati  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{8}$  la somma è  $2. \frac{7}{8}$ . Di nuovo si sommino tre rotti, lasciato uno qualsivoglia, qui si lasci  $\frac{1}{8}$ . e si sommino  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{4}$ , la somma è  $2. \frac{3}{4}$ . Ora se dalla prima somma si sottra la seconda resterà  $\frac{1}{8}$ . ovvero se si sottra  $\frac{1}{8}$  dalla prima somma resterà la seconda cioè  $2. \frac{3}{4}$ . se si è bene operato.

Somminfi  $\frac{2}{3}$   $\frac{3}{4}$   $\frac{5}{8}$   $\frac{1}{2}$

somminfi  $\frac{2}{3}$   $\frac{3}{4}$   $\frac{5}{8}$

Somma 2.  $\frac{5}{24}$

Somma 2.  $\frac{1}{24}$

Da 2.  $\frac{5}{24}$  si sottrino 2.  $\frac{1}{24}$

Da 2.  $\frac{5}{24}$  si sottri  $\frac{1}{6}$

resta  $\frac{4}{24}$  schifato  $\frac{1}{6}$

resta 2.  $\frac{1}{24}$

E così si proveranno altre somme di rotti, se sono state fatte giuste.

52. D. Come si prova il sottrarre de' rotti col sommare?

R. Si sommi il rotto-sottratto col rotto restato, e verrà per somma il rotto, dal quale si è fatta la sottrazione. Sia stato sottratto questo rotto  $\frac{1}{2}$  da  $\frac{3}{4}$ , resta  $\frac{1}{4}$ . questo si sommi con  $\frac{1}{2}$ , verrà  $\frac{3}{4}$ . Medesimamente da  $8. \frac{2}{3}$  sia stato sottratto  $\frac{1}{3}$ , resta  $7. \frac{1}{3}$ . quale sommato con  $\frac{1}{3}$ , torna  $8. \frac{2}{3}$ . e sta bene la lezione.

Da

$$\text{Da } \frac{5}{6} \underline{\underline{\text{X}}} \frac{2}{3} \quad \frac{15}{12}$$

$\frac{3}{18}$  sch.  $\frac{1}{6}$  resta

$$\text{Da } 8. \quad \frac{1}{2} \quad \frac{4}{5}$$

$$\frac{17}{2} \underline{\underline{\text{X}}} \frac{4}{5} \quad \frac{85}{8}$$

$$\frac{10}{1} / 77$$

7  $\frac{7}{10}$  resta

$$\text{Prova.} \quad \frac{2}{3} \underline{\underline{\text{X}}} \frac{1}{6} \quad \frac{12}{3}$$

$\frac{15}{18}$  schif.  $\frac{5}{6}$

Prova.

$$7 \quad \frac{7}{10} \quad \frac{4}{5}$$

$$\frac{77}{10} \underline{\underline{\text{X}}} \frac{4}{5} \quad \frac{385}{40}$$

$$50 / 425$$

8  $\frac{29}{30}$  sch.  $\frac{1}{2}$

53. D. Si prova il sottrarre de rotti in altro modo?

R. Si prova con un'altro sottrarre; Perche se si sottrarrà il rotto rimasto dal medesimo rotto, dal quale si è fatta la prima sottrazione, resterà il rotto prima sottratto; per esempio, da  $\frac{2}{3}$  si sottrai  $\frac{2}{3}$  resta  $\frac{2}{3}$ ; se ora  $\frac{2}{3}$  si sottra da  $\frac{2}{3}$ . resta  $\frac{2}{3}$ . operando bene.

$$\text{Da } \frac{8}{9} \underline{\underline{\text{X}}} \frac{2}{3} \quad \frac{24}{18}$$

$\frac{6}{17}$  schif.  $\frac{2}{9}$

Prova.

$$\text{Da } \frac{8}{9} \quad \frac{2}{9}$$

resta  $\frac{6}{9}$  schifato  $\frac{2}{3}$

54. D. Come si sottrano i rotti di rotti, da rotti di rotti di Moneta, Peso, e Misura?

R. Si pongano i rotti di rotti da sottrarsi sotto quelli, da i quali si deve fare la sottrazione per ordine. Da Lire 456. Soldi 13. Denari 4. si levino Lire 272. Soldi 6. Denari 8. Si pongano le Lire sotto le Lire, i Soldi sotto i Soldi, i Denari sotto i Denari, e sopra i Denari si ponga il Denominatore 12. cioè quanti Denari fanno un Soldo; e sopra i Soldi il 20. quanti fanno una Lira, come si disse nella 36. del secondo; Dipoi si dica: Chi da Denari 4. leva 8. non può, s'aggiunge 12. Denominatore al 4. fa 16. dal quale levato 8. quale si segna sotto i Denari, e perche si è aggiunto al 4. Denari 12. che sono un Soldo., che si è inteso levato da Soldi 13. e sono restati 12. Or chi da Soldi 12. leva Soldi 6. restano Soldi 6. che si segnano sotto il 6. Avvertasi però, che comunemente, in cambio di levare un Soldo da quei di sopra, l'aggiun-

89.

L'aggiungono à quei di sotto, e dicono Soldi 7. Or ch'ida Soldi 13. leva Soldi 7. restano Soldi 6. come prima; Si seguita, chi da 6. leva 4. resta 2. e si segna sotto il 4. e chi da 5. leva 7. non si può, aggiunto 10. al 5. fa 15. dal quale levato 7. resta 8. e si segna sotto il 7. e s'aggiunge 1. à mente al seguente 2. e fa 3. Finalmente chi da 4. leva 3. resta 1. il quale segnato sotto il 2. farà finita l'operazione, con essere restate Lire 184. Soldi 6. Den. 8.

	<sup>10</sup>	<sup>10</sup>	<sup>12</sup>
Da Lire	456.	13.	4
	272.	6.	8

Lire 184. 6. 8

Avvertasi, che facilita l'operazione del sottrarre il modo seguente, dicendo: Da Denari 4. si levino 8. non si possono levare, allora si dica da 8. ad andare al 12. Denominatore, ci sono Denari 4. à i quali s'aggiungono Denari 4. di sopra, fanno Denari 8. quali si segnano sotto; ovvero si aggiungono à mente à i Denari 4. di sopra Denari 12. Denominatore, fanno Denari 16. Ora da 8. à trovare 16: ci vogliono Denari 8. quali si segnano come prima; e ogni volta, che s'arriva, si passa il Denominatore, per sottrarre, si leva 1. dal numero seguente di sopra, ovvero si aggiunge 1. al numero seguente di sotto, e si seguita à sottrarre nel medesimo modo, come si disse nella 30. del primo.

55. D. Come si prova questa operazione?

R. Facilmente, col sommare per la 36. di questo; perche sommando la partita sottratta, e la rimasta, ne verrà la partita maggiore, dalla quale si è sottratto; e così sommando Lire 272. 6. 8. e Lire 184. 6. 8. verrà la partita di Lire 456. 13. 4.

Da Scudi	456.	13.	4	) Som.
	272.	6.	8	
Resto Sc.	184.	6.	8	
Prova	356.	13.	4	

56. D. Come si fanno le Prove del 7. del 9. o d'altro numero à queste, & altre simili operazioni di sottrarre?

R. Si levano gli 7. o 9. o altri numeri da Lire 272. 6. 8. partita sottratta, per la 41. e 42. il numero avanzato si pone dalla parte sinistra di sopra dell'X. Pure si levano da Lire 184. 6. 8. partita rimasta; il numero avanzato si pone dalla parte destra di sopra dell'X. questi due numeri si sommano, e dalla somma si leva il numero per il quale si fa la prova. & il numero, che avanza, ovvero zero, si segna dalla parte sinistra di sotto dell'X. Ora levando gli 7. o 9. o altri numeri, secondo la prova, da Lire 446. 13. 4. deve restare il medesimo avanzo, che si pone dalla parte destra di sotto dell'X. se si è bene operato. Nell'istesso modo si fanno queste prove



82

prove all'operazione del sottrarre altre Monete, Pesi, e Misure.

<p>Da Lire 456. 13. 4. 5.</p> <p style="text-align: right;">272. 6. 8.</p> <hr style="width: 100%;"/> <p>Restano Lire 184. 6. 8.</p>	<p>Prova del 9. del 7.</p> <p style="text-align: right;">2 X 5 1 X 9</p> <p style="text-align: right;">7 X 7 1 X 1</p> <p style="text-align: center;">Uguali.</p>
--	---

57. D. Come si fanno altre operazioni di sottrarre altre Monete, Pesi, e Misure?

R. Si è già detto, che sopra à ciascuna fila si pone il Denominatore; onde quando non si può sottrarre, per essere maggiore il numero di sotto; che quello di sopra, à questo si aggiunge tale Denominatore, e poi si sottra come si è detto. Si avverta di levare

<p>Da Scudi <sup>10 7 20 12</sup> 320. 3. 6. 8</p> <p style="text-align: right;">256. 5. 13. 4</p> <hr style="width: 100%;"/> <p>Restano Scudi 63. 4. 13. 4</p> <p style="text-align: right;">Prova 320. 3. 6. 8</p>	<p>uno al numero della fila seguente di sopra, ò di aggiungere uno al numero della fila seguente di sotto, e si seguiti l'operazione fino al fine.</p> <p>Som. <span style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">)</span> Ecco ne gl' Esempj con la prova del sommare. Da Scudi, ò Piastre 320. Lire 3.</p>
--	---

Soldi 6. Denari 8. si sottrano Scudi 256. Lire 6. Soldi 13. Denari 4.

Da Libbre 250. Once 7. Denari 16. Grani 10. si sottrano Libb. 168. Once 4. Denari 14. Grani 12. La prova si fa con un'altro sottrarre per la 40. del primo.

<p>Da Libbre <sup>10 12 24 24</sup> 250. 7. 16. 10</p> <p style="text-align: right;">168. 4. 14. 12</p> <hr style="width: 100%;"/> <p>Restano Libbre 82. 3. 1. 22</p> <p style="text-align: right;">Prova 168. 4. 12. 12</p>	
--	--

Da Stajora 17. Panora 6. pugnora 4. Braccia quadre 6. di Terreno, si sottrano Stajora 9. Panora 10. Pugnora 5. Braccia quadre 8.

<p>Da Stajora <sup>10 12 12 12</sup> 17. 6. 4. 6</p> <p style="text-align: right;">9. 10. 5. 8</p> <hr style="width: 100%;"/> <p>Restano Stajora. 7. 7. 10. 10</p> <p style="text-align: right;">Prova 17. 6. 4. 6</p>	
--	--

L

Da

Da Anni 18. Mesi 4. Giorni 16. si sottrano Anni 13. Mesi 8. Giorni 20.

Da Anni	$\frac{20}{18.}$	$\frac{11}{4.}$	$\frac{10}{16.}$	
	13.	8.	20.	)
Restano Anni	4.	7.	26.	
Prova 18. 4. 16.				Somma.

Da Moggia 18. Staja 10. si sottrano Moggia 9. Staja 15.

Da Moggia	$\frac{10}{18.}$	$\frac{24}{10.}$	
	9.	15.	)
Restano Moggia	8.	19.	
Prova 18. 10.			Somma.

Da Barili 134. Fiaschi 12. si sottrano Barili 85. Fiaschi 8. di Vino.

Da Barili	$\frac{10}{134.}$	$\frac{10}{12.}$	
	85.	8.	)
Restano Barili	49.	4.	
Prova 134. 12.			Somma.

Da Barili 15. Fiaschi 7. d'Olio si sottrano Barili 8. Fiaschi 10.

Da Barili	$\frac{10}{15.}$	$\frac{10}{7.}$	
	8.	10.	)
Restano Barili	6.	13.	
Prova 15. 7.			Somma.

Da

Da Ducati 384. Grani 15. Piccioli 30. si sottrano Ducati 196.<sup>83</sup>  
 Groffi 8. Piccioli 26. di Venezia.

	<u>10</u>	<u>24</u>	<u>32</u>
Da Ducati	384.	15.	20
	195.	8.	26

Restano Duecento 188. 6. 26

Refano Ducat: 188. 6. 26

**Prova : 384. 15. 20**

**Piccioli 32. fanno un Grosso; Grossi 24. un Ducato in Venezia;**  
 che però il Denominatore de i Piccioli è 32. de' Grossi 24. il qua-  
 le s' accenna di sopra, e s' opera come si è insegnato. Nel mede-  
 simo modo si sottrarranno le Monete, Pesi, e Misure d' altri  
 Paesi.

58. D. Come si sottrarranno rotti di rotti da rotti di diverso Denominatore.

R. Si ridurranno i rotti di rotti ad un semplice rotto per la 22. del secondo, e poi si sottrarrà il semplice rotto dall' altro per la 45. di questo; Da  $\frac{7}{8}$  e  $\frac{3}{4}$  d'un' ottavo si sottrino  $\frac{3}{8}$  e  $\frac{5}{8}$  d' un quarto; ridotti  $\frac{7}{8}$  e  $\frac{3}{4}$  sono  $\frac{1}{4}$  e  $\frac{3}{8}$  e  $\frac{5}{8}$  sono  $\frac{7}{8}$ . questi sottratti da  $\frac{3}{4}$ . re-  
sta  $\frac{1}{4}$ .

$$\frac{7}{8} \underline{\underline{V}} \frac{2}{3} \quad \frac{23}{24} \underline{\underline{X}} \frac{7}{8} \quad \frac{3}{4} \underline{\underline{V}} \frac{1}{2}$$

Resta  $\frac{16}{192}$  schifato per 16.  $\frac{1}{12}$

**59. D. Come si fa la prova di questa operazione?**

R. Si somma  $\frac{1}{4}$  con  $\frac{3}{8}$ . per la 53. di questo verrà  $\frac{7}{8}$ . il quale si riduca in ottavi per la 19. di questo; torneranno  $\frac{7}{8}$  e  $\frac{1}{2}$  d'un'ottavo.

$\frac{1}{11} X \frac{7}{8}$   
 $\frac{84}{96}$   
 schifate  $\frac{23}{24}$   
 Tornano  $\frac{7}{8}$

**L 2**

**DASTIN-**

# D I S T I N Z I O N E T E R Z A .

*Del Moltiplicare Roti con Roti , e con Intieri .*

60. D. Come si moltiplica rotto con altro rotto ?

R. Si moltiplica il Numeratore del rotto, via il Numeratore dell' altro , il prodotto si pone sopra una linea , si moltiplica ancora il Denominatore d' uno, via il Denominatore dell' altro, il prodotto si pone sotto la medesima linea : e si averà un rotto , che è il prodotto di tal moltiplicazione . il qual rotto è minore di ciascuno rotto, che l' ha prodotto ; come moltiplicando  $\frac{1}{2}$  via  $\frac{1}{4}$ . Si moltiplica il 3. via 5. fa. 15. e si pone sopra una linea così  $\frac{15}{24}$ . Si moltiplica pure il 4. via 6. fa. 24. e si pone sotto, e dice  $\frac{15}{24}$ . schi-  
fatto per 3. sono  $\frac{5}{8}$ . rotto venuto per tale moltiplicazione .

Moltiplica  $\frac{3}{4}$  via  $\frac{5}{6}$  fanno  $\frac{15}{24}$  schi-  
fatto  $\frac{5}{8}$

Il senso di tale moltiplicazione è : se con uno Scudo si comprano  $\frac{1}{2}$  di Canna di robba ; con  $\frac{1}{4}$  di Scudo se ne comprano  $\frac{1}{8}$ . o altro simile.

61. D. Si moltiplica in altro modo un rotto via rotto ?

R. Certamente : Et alle volte riesce galante, e presto questo modo. Per il Denominatore d' uno si parta il Numeratore dell' altro rotto, il quoziente si ponga sopra una linea ; medesimamente si parta il Denominatore per il Numeratore, il quoziente si metta sotto la medesima linea , e si averà un rotto prodotto dalla moltiplicazione di quei due rotti . Con  $\frac{2}{3}$  si moltiplichino  $\frac{1}{5}$  per 3. si parta 9. il quoziente 3. si ponga sopra una linea così  $\frac{3}{10}$ . Ora per 2. si parta 10. il quoziente 5. si pone sotto , e dirà  $\frac{3}{50}$  prodotto , che si voleva .

moltiplica  $\frac{2}{3}$  via  $\frac{1}{5}$  viene  $\frac{2}{15}$

Si avverta , che ho detto, che tal modo è galante, e presto alle volte , come si è visto nel dato esempio : alle volte però non è così facile , allora quando dal partire viene qualche rotto : onde moltiplicando  $\frac{1}{2}$  via  $\frac{1}{3}$  più facile è il primo modo, perche per il secondo viene  $\frac{1}{4}$  che bisogna ridurre in mezzi, per levare il rotto, e si averà  $\frac{1}{2}$ . e nel dato esempio di moltiplicare  $\frac{2}{3}$  via  $\frac{1}{5}$  ; chi per il secondo avesse partito il primo , sarebbe venuto  $\frac{1}{10}$  che bisogna ridurre per avere  $\frac{1}{5}$ .

26. D.

62. D. Come si riduce a semplice rotto quello, che è formato da due rotti, come avviene nella detta operazione?

R. Si moltiplica il Numeratore del rotto, che sta sopra la linea, via il Denominatore dell'altro rotto, che sta sotto la linea; il prodotto, che ne viene, è il Numeratore del rotto semplice; che però si pone sopra una linea: di nuovo si moltiplica il Denominatore del rotto sopra la linea, via il Numeratore dell'altro rotto sotto la linea; il prodotto, è il Denominatore del rotto semplice, che si pone sotto la medesima linea. E si avrà il ceduto semplice rotto espresso con numeri intieri. Per esempio, di sopra è venuto  $\frac{1}{2}$ . Si moltiplica uno via 3. fa 3. che si pone sopra una linea:

dipoi 5. via 1. fa 5. che si pone sotto. Il istesso fatto cost  $\frac{1}{2}$ . Pare a moltiplicare  $\frac{2}{3}$  via  $\frac{3}{4}$  per il secondo modo viene  $\frac{2}{3}$  cioè  $\frac{2}{3}$  facendo per la 17. & 18. il Numeratore, & Denominatore a modo di rotto: Onde operando come si è detto, verrà  $\frac{2}{3}$ . E questo voglio che basti per sapere tale operazione, che da altri non viene accennata.

63. D. Perché causa il prodotto è minore di ciascuno de' due rotti, che si sono moltiplicati?

R. La causa, facilmente si intende per la definizione del moltiplicare data da Euclide nel settimo, che è pigliare tante volte il numero moltiplicato, quante unità sono nel numero moltiplicante: Come a moltiplicare 2. via 4. vuol dire pigliare il 2. due volte, & viceversa moltiplicare 4. quattro volte, che dà il numero 8. così è moltiplicare  $\frac{1}{2}$  via  $\frac{1}{2}$  è pigliare una mezza volta  $\frac{1}{2}$  che è  $\frac{1}{4}$  prodotto di tal moltiplicare; Perchè moltiplicare  $\frac{1}{2}$  via  $\frac{1}{2}$  è pigliare  $\frac{1}{2}$  del  $\frac{1}{2}$ , che pure il prodotto è  $\frac{1}{4}$ : perchè riducendo il  $\frac{1}{2}$  al  $\frac{2}{4}$  del quale  $\frac{1}{2}$  sono  $\frac{2}{4}$  rispetto al  $\frac{1}{2}$  cioè  $\frac{1}{2}$ . Ora non è da dubitare, che  $\frac{1}{4}$  ha meno di  $\frac{1}{2}$  e di  $\frac{1}{2}$ . Questo dice ancora Friliani da Bologna S. Sepolcro, nell' Articolo terzo della quarta Diffinitione del primo Trattato d'Arismetica carta 34. Benchè nell' Articolo antecedente carte 52. nella moltiplicazione dice, via  $\frac{1}{2}$  che il prodotto è  $\frac{1}{2}$  dice, che in modo  $\frac{1}{2}$  moltiplicato per  $\frac{1}{2}$  è maggiore di  $\frac{1}{2}$  adducendo la ragione, la quale io stimo falsa, perchè dice egli, che  $\frac{1}{2}$  è lineare &  $\frac{1}{4}$  è superficiale, che è confermare questo. Considero facilmente, con addurre un quadrato superficiale, del quale moltiplicare  $\frac{1}{2}$  nel detto lineare prodotto di via  $\frac{1}{2}$  del suo finisse per la lunghezza, che ne venga il superficiale del detto quadrato. Nel che s'inganna, & ha dato occasione al suo doppio errore ingannarsi, come al Taraglio & contradiquie ho detto qualche cosa nella

nella Domanda 62. 63. del primo Trattato; perche chiara cosa è, che moltiplicando  $\frac{1}{2}$  via  $\frac{1}{2}$  senza applicazione à materia viene  $\frac{1}{4}$  assolutamente minore di  $\frac{1}{2}$ . Se poi s'applica à linea, viene  $\frac{1}{4}$  di linea; Come moltiplicando  $\frac{1}{2}$  lineale di un palmo via  $\frac{1}{2}$  lineale d'un palmo; viene  $\frac{1}{2}$  lineale d'un palmo: se si applica à superficie, come intendo di fare Fr. Luca; non si moltiplica  $\frac{1}{2}$  lineale via  $\frac{1}{2}$  lineale, che ne venga  $\frac{1}{2}$  di quadrato; ma bensì  $\frac{1}{4}$  quadrato via  $\frac{1}{2}$  quadrato, che sono quantità superficiali fanno  $\frac{1}{4}$  di quadrato. E' lo sbaglio di Fr. Luca, del Tartaglia, di Vincenzo Lentando lib. 1. prop. 29. *Antem. Inst.* e d'altri è, perche vogliono, che i numeri chiamati da Euclide laterali siano lineali, il che non s'imo vero, come hò di sopra detto nelle citate Domande, lo medesimo sbaglio ha pigliato Gio: Battista Benedetto in alcuni suoi Teoremi Arimmetici; il primo de' quali è questo: *Interrogatio me Serenissimus Dux Sabaudia, quâ ratione cognosti posset Scientias et speculatives, ut dicitur, productum ex duobus fractis quocumque, quilibet productum minus esse. Cui respondit Alant, & respondit: conclusum esse fractos producentes esse fractis productis non unius, ejusdemque natura esse, imò longè diverse.* E secondo tal risposta suppone, che i rotti producenti siano lineali, & il rotto prodotto superficiale, e così suppone in altri Teoremi, à quelle essenti: & essendo l'ipotesi falsa, le speculazioni sue fondate sopra essa non sono vere: E se deve dire l'unità la medesima proporzione al rotto moltiplicante, che il rotto moltiplicato al rotto prodotto per la moltiplicazione; Negl' Esemplj detti si dice ad  $\frac{1}{2}$  rotto moltiplicante la medesima proporzione doppia, che  $\frac{1}{2}$  rotto moltiplicato ad  $\frac{1}{4}$  rotto prodotto: Pure si dice la medesima proporzione ad  $\frac{1}{4}$  che  $\frac{1}{2}$  ad  $\frac{1}{2}$ . Onde se il rotto prodotto fusse omniamente di diversa natura da i rotti producenti, non direbbe mai un di questi proporzione al prodotto, essendo indubitato appresso tutti, che la linea non dice proporzione à superficie, perche la comparazione, come si hà da Euclide nel settimo, devt essere fra quantità della medesima specie, e non di diversa natura.

64. D. Come si moltiplica con rotto numero intero?

R. Si pone l'intero à modo di rotto sopra una linea con sotto 1. & è tanto il rotto, e per il modo della 60. Si moltiplicano i Numeratori, e verrà il Numeratore; ancora si moltiplicano i Denominatori, e verrà il Denominatore del prodotto; per esemplio, una libbra di Zucchero vale  $\frac{1}{4}$  di Lira, che valeranno libbre 372 cioè si moltiplichì 372 con  $\frac{1}{4}$  viene 93 cioè Lire 297  $\frac{1}{4}$ .

Alto

In prat-

In pratica però si moltiplica l'intero per il Numeratore del rotto, il prodotto si parte per il Denominatore &c. Si moltiplichino 684 con  $\frac{5}{8}$  e 324 con  $\frac{7}{12}$ .

$$\begin{array}{r} 684 - \frac{5}{8} \\ 5 \quad \frac{5}{8} \\ \hline \end{array}$$

per 8 / 3420

Prodotto 427  $\frac{1}{2}$  Schilato  $\frac{1}{2}$

$$\begin{array}{r} 324 - \frac{7}{12} \\ 7 \quad \frac{7}{12} \\ \hline \end{array}$$

per 12 / 2268

Prodotto 189

65. D. Come si moltiplica intero, e rotto con numero intero? R. Si riduce l'intero, e rotto al suo rotto per la 18, e si opera come nella passata; come il Braccio del Panno vale Lire 6, che valeranno Braccia 53.  $\frac{2}{3}$ , cioè si moltiplichino 53.  $\frac{2}{3}$  con 6.

$$53 \frac{2}{3} - 6.$$

$$\begin{array}{r} 161 - 6 \\ 3 - 1 \\ \hline \end{array} \text{viene } \frac{966}{3} \text{ cioè Lire 322.}$$

In pratica si moltiplica il numeratore del rotto 2. con 6. il prodotto 12. si parte per 3. Denominatore, viene 4. quale s'aggiunge al prodotto di 6. via 53. cioè a 318. e verrà come sopra 322.

$$\begin{array}{r} 53 \frac{2}{3} - 6 \\ 2 \\ \hline \end{array}$$

per 3 / 12

$$\begin{array}{r} 4 \\ 318 \\ \hline 322 \end{array}$$

Moltiplica 726.  $\frac{3}{4}$  con 28

per 4 / 84

$$\begin{array}{r} 21 \\ 5808 \\ 1452 \\ \hline 20349 \end{array}$$

Avvertasi, che si può partire l'intero, per il Denominatore del rotto, il quoziente si moltiplica per il Numeratore; tuttavia quando si deve un numero moltiplicare per un numero, e per un' altro partire, meglio è moltiplicare prima, e il prodotto partire, che partire, e il quoziente moltiplicare; benché l'uno, e l'altro faccia l'istesso effetto. E' ovvio gli Esempi.

Molti

Moltiplica  $325 \frac{1}{2}$

con  $125 \frac{1}{2}$

per 6  $14 \frac{1}{2}$

$20 \frac{1}{2}$

1625

650

8142  $\frac{1}{2}$

Moltiplica  $325 \frac{1}{2}$  e 25

1955

9775

3910

per 6  $48875$

8145  $\frac{1}{2}$

66. D. Come si moltiplica intiero, e rotto con rotto?

R. Si riduce l'intiero, e rotto al suo rotto per 12, 18, del resto si opera come si è detto. Se una Libbra costa  $\frac{1}{2}$  di Scudo, che costeranno libbre 8  $\frac{1}{2}$  al medesimo prezzo?

Moltiplica 8  $\frac{1}{2}$  con  $\frac{1}{2}$

$17 \frac{3}{4}$  viene  $5 \frac{1}{2}$  cioè Scudi 6  $\frac{3}{8}$

Qui è d'avvertire esser falso quello che dice Rr. Luca nel fine dell' Articolo primo del moltiplicare rotti a car. 50. cioè, che a moltiplicare sani, e rotti con rotti, essere impossibile, che il prodotto sia senza rotti; come appare chiaro, che moltiplicando  $23 \frac{1}{2}$  per  $\frac{1}{2}$  viene 14. prodotto senza rotto, ed è facile trovarne moltissimi; perchè partendo un numero intiero, per un rotto, che il quoziente sia intiero, e rotto; moltiplicando poi il quoziente intiero, e rotto, per il rotto partitore, verrà sempre il numero intiero partito.

$23 \frac{1}{2}$  e  $\frac{1}{2}$

$70 \frac{3}{4}$

$3 \frac{1}{2}$

viene  $210$  cioè 14. numero intiero

67. D. Come si moltiplica intieri, e rotti via intieri, e rotti?

R. Si riducono intieri al suo rotto, e si opera al solito: Con Scudo uno si comprano libbre 4  $\frac{1}{2}$  con Scudi 6  $\frac{1}{2}$  quante libbre si compreranno alla medesima ragione?

Moltiplica 4  $\frac{1}{2}$  e 6  $\frac{1}{2}$

$19 \frac{3}{4}$

$4 \frac{1}{2}$

viene  $589$  cioè Libbre 29  $\frac{1}{2}$

In altro modo Una Mercanzia costa Soldi 226  $\frac{1}{2}$  quanti Soldi costeranno Mercanzie 425  $\frac{1}{2}$  cioè moltiplica 425  $\frac{1}{2}$  via 226  $\frac{1}{2}$ .

Si par-



Si partirà  $425 \frac{3}{4}$  per 3. Denominatore dell'altro rotto, e verrà  $141 \frac{1}{4}$  il quale si moltiplicherà per il numeratore 2. e verrà  $283 \frac{1}{2}$  e si piglierà  $\frac{2}{4}$  di 226. che è  $56 \frac{1}{2}$  il quale si fommerà con  $283 \frac{1}{2}$  e con il prodotto di 226. via  $425$ . e verrà  $66390$ . che sono Soldi.

$$\begin{array}{r}
 3 \overline{) 425 \frac{3}{4}} - 226 \frac{1}{2} \\
 \underline{141 \frac{1}{4}} \\
 283 \frac{1}{2} \\
 56 \frac{1}{2} \\
 \hline
 2550 \\
 850 \\
 \hline
 850 \\
 \hline
 \text{Soldi } 96390 \text{ Prodotto.}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 4 \overline{) 226 \frac{1}{2}} - 425 \frac{3}{4} \\
 \underline{56 \frac{1}{2}} \\
 141 \frac{1}{4} \\
 \hline
 283 \frac{1}{2} \\
 56 \frac{1}{2} \\
 \hline
 1130 \\
 452 \\
 \hline
 904 \\
 \hline
 96390.
 \end{array}$$

Qui avvertisco pure esser falso quello, che dice Fr. Luca nel luogo citato di sopra carte 86. cioè esser impossibile, che il prodotto sia senza rotti della moltiplicazione d'intieri, e rotti via intieri, e rotti, mentre nella passata si vede il prodotto senza rotti.

68. D. Come si moltiplicano intieri con rotti di rotti?

R. Si riducono i rotti di rotti a semplice rotto, per la 22. il quale si moltiplica con l'intieri per la 65. Ecco la pratica. Quante Canne di roba s'averanno a  $\frac{7}{4}$  di Canna per Scudo, con Scudi 284?

$$\frac{7}{8} \text{ V } \frac{3}{4} \text{ con Scudi } 284$$

$$\begin{array}{r}
 \frac{7}{8} \text{ V } \frac{3}{4} \\
 \hline
 31 \\
 284 \\
 852 \\
 \hline
 \text{per } 8 \quad 8804 \\
 \text{per } 4 \quad 1100 \frac{1}{2} \\
 \hline
 \text{Canne } 275 \frac{1}{4} \text{ Prodotto.}
 \end{array}$$

Qui si avverta, che partendo per 4. il quoziente  $1100 \frac{1}{2}$  viene  $256 \frac{1}{2}$ . quali rotti si riducono ad un semplice rotto, che è  $\frac{1}{2}$  per la 22.

69. D. Come si moltiplicano rotti di rotti con rotto?

R. Si riducono i rotti di rotti a semplice rotto, il quale si moltiplica per l'altro per la 60. Pratica.

Canna 1. di roba vale  $\frac{8}{7}$  e  $\frac{1}{4}$  d'un settimo di Piastra, che valerà  $\frac{2}{5}$  di Canna?

$$\frac{6}{7} \text{ V } \frac{3}{4} \text{ viene } \frac{27}{28} - \frac{1}{2} \text{ prodotto } \frac{27}{56}$$

56 recato in Lire, &c. faranno Lire 3. Sold. 7. Denari 6.

70. D. Come si moltiplica numero intero, e rotto con rotte di rotte?  
 R. Si riduce l'intero al suo rotto, e s'infilzano i rotte di rotte, e s'opera al solito. Pratica: Una Libbra di Seta vale Lire 35.  $\frac{3}{4}$ . che varranno  $\frac{3}{4}$  di Libbra?

$$24 \frac{3}{4} \text{ con } \frac{2}{5} \text{ } \bigvee \frac{1}{4}$$

$$\frac{99}{4} \text{ } \frac{9}{10} \text{ viene } \frac{891}{80} \text{ cioè Lire } 11 \frac{11}{80}$$

71. D. Finalmente, come si moltiplica numero intero, con rotte di rotte, per intero con rotte di rotte? Pratica:

Una Canna di Raso vale Lire 26.  $\frac{3}{4}$   $\frac{1}{2}$ . che valeranno Canne 58.  $\frac{5}{8}$  al medesimo prezzo?

R. Il più facile modo è ridurre le Lire 26.  $\frac{3}{4}$  in 107. quarti, e 107. in 322. terzi, con l'aggiunta di tali rotte, medesimamente ridurre le Canne 58.  $\frac{5}{8}$  in 469. ottavi, e questi in 939. mezzi, e moltiplicati à scala 939. via 322. il prodotto 302358. si parte per 8. e viene 37794  $\frac{1}{4}$ . questo si parte per 2. e viene 18897  $\frac{1}{2}$ . Si avverta, che il rotto si forma così per l'infilzare: avanza o quale moltiplicato per 4. Denominatore de'  $\frac{3}{4}$  fa 3. con 3. Numeratore de'  $\frac{1}{2}$  fa 2. quale si pone sopra una linea per Numeratore; ora si moltiplica 2. Partitore via 4. Denominatore de'  $\frac{1}{2}$  fa 8. quale si pone sotto la linea, e dice  $\frac{1}{2}$ . meglio s'intenderà il formare il rotto a quest'altra divisione. Di nuovo si parte 18897.  $\frac{1}{2}$  per 4. il quoziente intero è 4724. ed avanza 1. col quale si moltiplica 8. Denominatore del rotto fa

$$\text{anne } 58 \frac{5}{8} \frac{1}{2} \text{ con Lire } 26 \frac{3}{4} \frac{1}{2}$$

$$\begin{array}{r} \text{---} \\ 469 \\ \text{---} \\ 939 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{---} \\ 107 \\ \text{---} \\ 322 \\ 939 \\ \text{---} \\ 2898 \\ 966 \\ \text{---} \\ 2898 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{per } 8 \quad 032358 \\ \text{per } 2 \quad 37794 \frac{1}{4} \\ \text{per } 4 \quad 18897 \frac{1}{2} \\ \text{per } 3 \quad 4724 \frac{1}{2} \end{array}$$

Lire 1574  $\frac{1}{2}$  sch.  $\frac{2}{3}$  fatto per 3. viene  $\frac{1}{3}$  e tante

8. e s'aggiunge 8. Numeratore fa 11. quale si pone sopra una linea per Numeratore; Ora si moltiplica 4. partitore via 8. Denominatore del rotto fa 32. il quale si pone sotto la linea, e dice  $\frac{1}{2}$ . e così tutto il quoziente è 4724  $\frac{1}{2}$  il quale di nuovo si parte per 3. ultimo Denominatore de' rotte formando da ultimo il rotto sempre, come ho detto viene 1574  $\frac{1}{2}$  sch.  $\frac{2}{3}$  fatto per 3. viene  $\frac{1}{3}$  e tante

tante Lire valeranno dette Canne, cioè 1574.  $\frac{2}{3}$  qual rotto recato à Soldi, e Denari, per la 20. faranno Soldi 15. Denari 7.  $\frac{2}{3}$ . Nel partire che si fa con i Denominatori de' rotti, non si tiene ordine, purchè si parta con tutti successivamente. Di più si saprà, che l'avanzo da principio si poteva ridurre in Soldi, e Denari, e partire; mà perchè ancora di questo partire Lire, Soldi, e Denari non si è parlato, hò stimato bene tralasciarlo.

72. D. Come si moltiplicano Lire, Soldi, e Denari con numero intiero?

R. Questa moltiplicazione appartiene à i rotti, essendo che i Denari sono dodicesimi di soldo, e i Soldi ventefimi di Lira, che però moltiplicando per il numero i Denari, il prodotto numero si parte per 12. il quoziente sono Soldi, l'avanzo sono Denari, che si segnano; e per il numero moltiplicando i Soldi, al prodotto numero s'aggiungono i Soldi ricavati dal partire il prodotto de' Denari, e la somma de' Soldi si parte per 20. il quoziente sono Lire, l'avanzo sono Soldi, che si segnano, e finalmente moltiplicando per il numero le Lire, al prodotto s'aggiungono le Lire ricavate dal partire i Soldi, e la somma si segna. Per esempio:

Lo Stajo del Grano vale Scudi 7. 13. 4. quanto valeranno Staja 8. ? Si moltiplicano Denari 4. per 8. fanno 32. Denari, che partiti per 12. sono Soldi 2. e avanzano Denari 8. quali si segnano. Dipoi si moltiplicano Soldi 13. per 8. fanno Soldi 104. e aggiunti Soldi 2. di prima fanno Soldi 106. che partiti per 20. sono Lire 5. ed avanzano Soldi 6. quali si segnano sotto il 13. Finalmente

Esempio.

$\frac{10}{\text{Lire}} \quad \frac{20}{7.} \quad \frac{12}{13.4.} \text{ — Staja 8.}$

61. 6. 8.

si moltiplicano Lire 7. per 8. fanno Lire 56. ed aggiunte Lire 5. di prima fanno Lire 61. quali si segnano sotto Lire 7. ed è finita la moltiplicazione; Valendo le Staja 8. Lire 61. 6. 8. e così si fanno le simili.

73. D. Come si moltiplicano Lire, Soldi, e Denari, per numero composto di due, trè, quattro, e più figure?

R. Essendo questa Moneta la più comune, che s'usi in diverse Città; e quelle che non l'usano, pure dividono lo Scudo appartenente al Cambio in 20. Soldi, e 12. Denari: Come Roma lo Scudo d'oro Stampe: La Fiera lo Scudo Marche: Lione lo Scudo del Sole, &c. Però hò diversi modi di moltiplicare, acciò ciascuno si serva di quello che gli parerà più commodo; e prima pongo due modi facili, e distinti, de i quali si servono in Fiorenza i Computisti.

74. D. Quale è il primo modo di moltiplicare Lire, Soldi, e Denari? per esempio, Libbre 24076. quanto valeranno à Lire 1. 15. 4. la Libbra?

M a

R. R

R. Il primo modo è moltiplicare per decina, cioè; Si moltiplica per 10. Lire 1. 15. 4. prezzo d'una Libbra, e si comincia da i Denari dicendo 4. via 10. fa 40. Denari, che partiti per 12. sono Soldi 3. da aggiungersi il prodotto de' Soldi, ed avanzano Denari 4. quali si segnano sopra à Denari 4. Di nuovo à i Soldi si dice 15. via 10. fa 150. e Soldi 3. fa 153. che partiti per 20. sono Lire 7. da aggiungersi al prodotto delle Lire, ed avanzano Soldi 13. quale si segnano sopra Soldi 15. Di nuovo alle Lire si dice 1. via 10. fa 10. e 7. fa 17. le quali si segnano con ordine sopra Lire 1. e Lire 17. 13. 4. sono prezzo di Libbre 10., e se Lire 17. 13. 4. si moltiplicano per 10. nell'istesso modo verranno Lire 176. 13. 4. da porsi sopra, prezzo di Libbre 100. e se queste si moltiplicano per 10. verranno Lire 1766. 13. 4. prezzo di Libbre 1000. e se queste si moltiplicano per 10. verranno Lire 17666. 13. 4. prezzo di Libbra 10000. e così seguitando, se bisognasse più, verranno Lire, &c. prezzo di Libbre 100000. poi di 1000000. secondo l' esigenza delle figure, che sono nel numero, per il quale si devono moltiplicare le Lire: Soldi, e Denari; acciò ogni figura abbia la sua fila distinta di Lire, Soldi, e Denari da moltiplicare, e per questo si moltiplicano per 10. le Lire, Soldi, e Denari una volta meno, che non sono le figure del numero per il quale devono essere moltiplicate, e perche nell'Esempio sono 5. si moltiplicherà per 10. quattro volte; e allora si comincia da qualsivoglia figura, purchè non sia zero, à moltiplicare la sua fila corrispondente: Ma per tenere un'ordine, si cominci da 2. numero di decine di migliaia, e per esso si moltiplichino Lire 17666. 13. e 4. per la 73. il prodotto di Lire 32333. 6. 8. si ponga sotto Lire 1. 15. 4. separato da una Linea retta, ed è prezzo di Libbre 20000. Poi per 4. numero di migliaia, si moltiplichino Lire 1766. 13. 4. per la 73. il prodotto di Lire 7066. 13. 4. prezzo di Libbre 4000. si pone sotto le Lire 35333. 6. 8. per ordine. Poi per 7. numero di decine (perche il zero non moltiplica, si lascia la sua fila di Lire 176. 13. 4. prezzo di 100.) si moltiplichino Lire 17. 13. 4. prezzo di Libbre 10. per la 73. il prodotto di Lire 123. 13. 4. si pone sotto, e finalmente per 6. si moltiplichino Lire 1. 15. 4. prezzo di Libbre 1. il prodotto di Lire 10. Soldi 12. — si pone sotto, e si sommano questi quattro prodotti per la 36. di questo Trattato, farà la somma di Lire 42534. 5. 4. prodotto totale di tale moltiplicazione, e prezzo di Libbre 24076. S'offervi, oltre la facilità, la distinzione de' prezzi delle parti, che non si trova negli' altri modi di moltiplicare nell'Esempio qui posto, e già dichiarato; e così si faranno simili moltiplicazioni di Lire, Soldi, e Denari.

Prava .

	17666. 13. 4. Prezzo di 10000	
	1766. 13. 4. Prezzo di 1000	
Prova del 7.	176. 13. 4. Prezzo di 100	Prova dell'8.
4 X 3	17. 13. 4. Prezzo di 10	0 X 0
5 X 5	Lire 1. 15. 4. ——— 24076	0 X 0
	35333. 6. 8. Prezzo di 20000	
Prova del 9.	7066. 13. 4. Prezzo di 4000	Prova del 13
1 X 1	123. 13. 4. Prezzo di 70	8 X 0
1 X 1	10. 12. -- Prezzo di 6	0 X 0
	Prod. Lire 42534. 5. 4. Prezzo di 24076	

75. D. Come si prova se il prodotto è giusto della moltiplicazione di Lire, Soldi, e Denari, per la prova del 7. del 9. &c. ?

R. Si levano gli 7. da Lire 1. 15. 4. per la 41. e 42. di questo, il 4. avanzo si pone dalla parte sinistra di sopra dell'X. dipoi si levano gli 7. dal numero moltiplicante delle Libbre 24076. per la 27. del primo, il 3. avanzo si pone dalla parte destra di sopra dell' X. si moltiplica poi 4. via 3. avanzi fa 12. da questo si levi 7. resta 5. quale si segna dalla parte dell'X. Ora levando gli 7. per la 42. del secondo da Lire 42534. 5. 4. prodotto, deve restare 5. come resta, Si che è giusto. Così parimente si fa la prova del 9. o d'altro numero; e la ragione di queste prove si addotta nel fine della 74. del primo. S' osservino dette prove appresso l' esempio posto del moltiplicare Lire, Soldi, e Denari, e serve per altre sorti di Monete, &c.

76. D. Il moltiplicare per decina si può usare con altre sorti di Monete ?

R. Non solo si può usare con altre sorti di Monete, ma ancor nel moltiplicare diversi Pesi, e Misure, e non solo questo modo, ma ancora gl'altri, che sono per insegnare; Onde volendo moltiplicare Scudi, Lire, Soldi, e Denari, per esempio; La Libbra della Seta vale Scudi 3. Lire 2. 16. 8. che valeranno libbre 256. al medesimo prezzo ?

Si moltiplicheranno Scudi 3. Lire 2. 16. 8. per 10. gli Denari, e Sol. di per la 75. avvertendo alle Lire di partire per 7. stante che Lire 7. fanno uno Scudo, & il prodotto di Scudi 34. Lire — Soldi 6. 8. si pone sopra, che è prezzo di Libbre 100. li quali se di nuovo si moltiplicheranno per 10. verranno Scudi 340. 3. 6. 8. prezzo di Libbre 100. Onde moltiplicando questi per 2. figura di centinaia, e Scud,

è Scudi 34. — 6. 8. per 5. figura di decine, e Scudi 3. 2. 16. 8. per 6. numero semplice, e sommando i prodotti per la 37. di questo, verranno Scudi 871. Lire 4. 6. 8. prezzo di Libbre 256. di Seta, e prodotto di tal moltiplicazione. La prova si faccia per la 56. del primo Trattato, raddoppiando il prezzo della Libbra della Seta, e pigliando la metà del numero delle Libbre, e si faccia un' altra moltiplicare, che darà il medesimo prodotto di Scudi 871. 4. 6. 8. per la ragione assegnata nella 56. del primo.

340. 3. 6. 8	680. 6. 13. 4
124. — 6. 8	68. — 13. 4
Scudi 3. 2. 16. 8. — Lib. 256.	Scudi 6. 5. 13. 4 — Lib. 128.

680. 6. 13. 4	680. 6. 13. 4
170. 1. 13. 4	136. 1. 6. 8
20. 3. —	54. 3. 6. 8
Scudi 871. 4. 6. 8	Scudi 871. 4. 6. 8

77. D. Per questo modo come si moltiplicheranno Ducati, Grossi, e Piccioli, Moneta di Venezia? per esempio: Una Mercanzia vale Ducati 3. Grossi 10. Piccioli 28. che valeranno Mercanzie 58. alla medesima ragione?

R. Si moltiplicano Piccioli 28. per 10. vengono 280. Piccioli, li quali partiti per 32. che tanti fanno un Grosso, vengono Grossi 8. & avanzano 24. Piccioli, li quali si segnano sopra a 28. dipoi si moltiplichino Grossi 10. per 10. vengono Grossi 100. a i quali aggiunti Grossi 8. sono 108. li quali partiti per 24. perche tanti Grossi fanno un Ducato, vengono Ducati 4. & avanzano Grossi 12. li quali si segnano sopra 10. finalmente si moltiplichino Ducati 3. per 10. vengono Ducati 30. con 4. di prima fanno 34. il quale si segna sopra i Ducati 3. e sono Ducati 34. 12. 24. prezzo di 10. Mercanzie, li quali si moltiplichino per 5. numero di decine, il prodotto di Ducati 172. 15. 24. si segni sotto; Medesimamente si moltiplichino Ducati 3. 10. 28. per 8. numero semplice, verranno Ducati 27. 15. — prezzo di 8. Mercanzie; onde si sommino questi due prodotti, con porre sotto i Piccioli l'avanzo sopra 32. e porre sotto i Grossi, l'avanzo sopra 24. &c. sono Ducati 200. Grossi 6. Piccioli 24. per il prezzo di Mercanzie 58. e prodotto di tale moltiplicazione. Si avverta, che quando i Piccioli si possono schifare, sarà più facile l'operazione: come si fa qui nel se-

nel secondo Esempio, riducendo li 32. essi in ottavi, li quali in ultimo si moltiplicano per 4., per farne Piccioli.

Secondo Esempio.

	$\frac{10}{34}$	$\frac{24}{12}$	$\frac{12}{24}$	
Ducati	3.	10.	28	— 58

172.	15.	24
27.	15.	—

Ducati 200.    6.    24

	$\frac{10}{34}$	$\frac{24}{12}$	$\frac{8}{6}$	
Ducati	3.	10.	7	— 58

172.	15.	6.
27.	15.	—

Ducati 200.    6.    6

78. D. Quale è il secondo modo di moltiplicare Lire, Soldi, e Denari?

R. Il secondo modo in Fiorenza si chiama moltiplicare per Castelluccio, usato dagli antichi Autori, come è Filippo Calandri, e Francesco Galigai, per non avere notizia del passato moltiplicare per decina, è questo, il quale si dichiara con questo Esempio. Quanto valeranno Libbre 146. d'alcuna cosa à Lire 5. 13. 4. la Libbra? Collocati i numeri come si vedono sotto, si partono Libbre 146. per 20. e poi per 12. s'avverta alla ragione; perche si suppone, che quelle Libbre 146. s'apprezzino ad un Soldo la Libbra; onde vagliono Soldi 146. che partiti per 20. vengono Lire 7. Soldi 6. che si pongono sotto 146. Dipoi si suppone, che si valutino ad un Denaro la Libbra; valeranno Denari 146. che partiti per 12. vengono Soldi 12. Denari 2. che si pongono sotto Lire 7. Soldi 6. per ordine, distinti con linea; e questi numeri formano il Castelluccio, che dà il nome à questo moltiplicare, come penso. Ora si moltiplicano per Lire 5. Libbre 146. vengono Lire 730. che si segnano sotto Lire 5. e perche le Libbre 146. valutate ad un Soldo la Libbra, costano Lire 7. Soldi 6. ora si devono valutare à Soldi 12. per questo: si moltiplicano Soldi 6. per 12. fanno Soldi 78. si segnano Soldi 18. sotto Soldi 12. e Lire 3. s'aggiungono al prodotto seguente. Dipoi si moltiplicano Lire 7. per 12. fanno Lire 91. aggiunte Lire 3. fanno 94. quali si segnano sotto Lire 730. onde Lire 94. Soldi 18. sono prezzo di Libbre 146. à Soldi 12. la Libbra. Finalmente si moltiplicano Denari 2. per 4. fanno 8. il quale si segna sotto Denari 2. e per Denari 4. si moltiplichino Soldi 12. vengono Soldi 48. Soldi 8. si segnano sotto Soldi 18. e Lire 2. sotto Lire 4. onde Lire 2. Soldi 8. Denari 8. sono prezzo di Libbre 146. à Denari 4. la Libbra.

Si som-

Si sommino questi prodotti; la somma di Lire 827. 6. 8. è il prodotto della moltiplicazione, e prezzo di Libbre 146.

Si avverta nel secondo Esempio, che i quozienti si sono messi sopra le Lire, Soldi, e Denari, li quali vengono da partire il numero delle Mercanzie per 20. e per 12. come fa il Galigai; onde allora non viene Castelluccio; Di più, che partendo per 12. in Cambio di partire il numero delle Mercanzie, per più facilità, si parta il quoziente venuto dal partire per 20.

Castelluccio.
Lire. 5. 13. 4 — Libbre 146
per 20 7. 6
730. —. — per 12
94. 18.
27. 8. 8
12. 2

Lire 827. 6. 8

Secondo Esempio del Galigai.

Lire 39.3--3.5.3

Lire 576. 16. 8 — 783

1728
46080
403200
626. 8
26. 2

Lire 451660. 10. —

79. D. Questo secondo modo si può usare nel moltiplicare altre Monete?

R. Già hò detto, che questi modi, non solo servono nel moltiplicare Monete, mà anche diversi Pesi, e Misure; Basta operare secondo l'esigenza de' numeri; onde volendo moltiplicare Piastre, Lire, Soldi, e Denari; il numero delle Mercanzie, si parte prima per 7. poi per 20. e per 12. perchè 7. Lire fanno una Piastra; Per esempio: La Libbra della Seta vale Piastre 3. Lire 2. 6. 8. che valeranno Libbre 45. e &c. e valeranno Piastre 150.

Piastre 3. 2. 6. 8 — lib. 45

Esempio di Moneta Veneziana.

135	per 7. 6. 3	Duc. 17. 18. 12. — 74
18. 6	per 20. 2. 5	1258. per 24. 3. 2.
1. 6	per 12 3. 9	55. 12. per 32. 2. 10
1110		1. 3. 24

Piaf. 150.0.0

1314. 15. 24

80. D.



80. D. Ci è altro modo di moltiplicare Lire, Soldi, e Denari?

R. Certamente: E questo terzo modo è facile per qualsivoglia sorte di Moneta, & alle volte l'operazione è lunga, e si fa così: Si riducono le Monete superiori all'infima Moneta, la quale si moltiplica per il numero delle Mercanzie a scala per la 50. del primo, il prodotto si parte per li numeri, che si è moltiplicato nel fare la riduzione per la 74. del primo; avvertendo di ridurre gl'avansi nelle Monete inferiori, e di seguitare à partire; per esempio: La Libbra del Pepe vale Lire 3. Soldi 17. Denari 8.; che valeranno Libbre 365. di Pepe al medesimo prezzo?

Si moltiplicano Lire 3. via 20. per farne Soldi, fa 60. à i quali s'aggiungono Soldi 17. fanno 77. i quali si moltiplicano via 12. per farne Denari, con l'aggiunta di Denari 8. fanno Denari 932. infima Moneta, li quali moltiplicati per la 50. del primo con Libbre 365. vengono Denari 340180. partiti per 12. vengono Soldi 28348. Denari 4. questi per 20. vengono Lire 1417. 8. 4. prezzo di Libbre 365. di Pepe, e prodotto di tale moltiplicazione. Avvertasi, che quando i Denari, che sono dodicesimi si possono schiarare, verrà più breve l'operazione, come nel secondo esempio in cambio di Denari 8. ponendo  $\frac{1}{3}$  di Soldo; onde si riducono in terzi.

Lire 3. Soldi 17. Denari 8.

$$\begin{array}{r}
 20 \\
 \hline
 60 \\
 17 \\
 \hline
 77 \text{ — } 12 \\
 932 \text{ — } \text{Libbre } 365 \\
 \hline
 730 \\
 1095 \\
 3285 \\
 \hline
 \text{per } 12. \quad 340180 \\
 \hline
 \text{per } 20. \text{ Soldi } 28348. 4 \\
 \hline
 \text{Lire } 1417. 8. 4
 \end{array}$$

Secondo Esempio.

$$\begin{array}{r}
 \text{Lire } 3. 17 \frac{2}{3} \\
 20 \quad \frac{2}{3} \\
 \hline
 77 \text{ — } 3 \\
 233 \text{ — } \text{Libbre } 365 \\
 \hline
 1095 \\
 1095 \\
 730 \\
 \hline
 \text{per } 3. \quad 85045 \\
 \hline
 \text{per } 20. \text{ Soldi } 28348. 4 \\
 \hline
 \text{Lire } 1417. 8. 4
 \end{array}$$

81. D. Ci è altro modo di moltiplicare Lire, Soldi, Denari?

R. Si può fare un moltiplicare spezzato; valutando le Mercanzie à Denari, poi à Soldi, e finalmente à Lire, come nell'Esempio di sopra.

N

sopra. Si moltiplichino lib. 365. per Denari 8. vengono Denari 2920. li quali si partono per 12. vengono Soldi 243. 4. di nuovo Libbre 365. per 17. Soldi vengono Soldi 6205. e si aggiungono Soldi 243. 4. fanno Soldi 6448. 4. li quali si partono per 20. vengono le Lire 322. Soldi 8. 4. e finalmente si moltiplicano Libbre 365. per Lire 3. fanno Lire 1094. alle quali aggiunte Lire 322. Soldi 8. 4. vengono, come sopra, Lire 1417. 8. 4. prodotto della moltiplicazione.

Lib. 365 - Den. 8	Lib. 365 Sol. 17	Lib. 365 - Lire. 3
per 12. 2920	6205	1095
per 17. 243. 4	243. 4	322. 8. 4
Sol. 243. 4	per 20. 6448. 4	Lire 1417. 8. 4
	Lire 322. 8. 4	

82. D. Si moltiplicano in altro modo Lire, Soldi, e Denari?

R. Si moltiplicano non pigliando in parte il numero delle Mercanzie, che si apprezzano; che però bisogna saper pigliare le parti per i Soldi, e per i Denari.

Per Soldo 1. si piglia il ventesimo; cioè si parte per 20. il numero delle Mercanzie, e dal partire vengono Lire, Soldi, e Denari,

Per Soldi 2. si piglia il decimo; cioè si parte per 10.

Per Soldi 3. si piglia il decimo, e la metà di esso.

Per Soldi 4. si piglia il quinto; cioè si parte per 5.

Per Soldi 5. si piglia il quarto; cioè si parte per 4.

Per Soldi 6. si piglia per 4. il quinto, e per 2. la metà di esso.

Per Soldi 7. si piglia per 5. il quarto, e per 2. il decimo.

Per Soldi 8. si piglia per 4. il quinto, e per 4. l'istesso.

Per Soldi 9. si piglia per 5. il quarto, e per 4. il quinto.

Per Soldi 10. si piglia la metà; cioè si parte per 2.

Per Soldi 11. si piglia per 10. la metà, per 1. il ventesimo.

Per Soldi 12. si piglia per 10. la metà, e per 2. il decimo.

Per Soldi 13. si piglia per 10. la metà, per 3. il decimo, e la metà di esso.

Per Soldi 14. si piglia la metà, e per 4. il quinto.

Per Soldi 15. si piglia per 10. la metà, e per 5. la metà di esso.

Per Soldi 16. si piglia quattro volte il quinto.

Per Soldi 17. si piglia per 10. la metà, per 5. il quarto, e per 2. il decimo.

Per Soldi 18. si piglia per 10. la metà, e per 8. due volte il quinto.

Per Soldi 19. si piglia per 10. la metà, per 5. il quarto, per 4. il quinto.

Del

## Del pigliare le parti per i Denari .

99

Per Denaro 1. si piglia il dodicesimo , cioè si parte per 12. e vengono Soldi . 2. Denari .

Per Denari 2. si piglia il sesto ; cioè si parte per 6.

Per Denari 3. si piglia il quarto ; cioè si parte per 3.

Per Denari 4. si piglia il terzo ; cioè si parte per 4.

Per Denari 5. si piglia il quarto , ed il sesto .

Per Denari 6. si piglia la metà ; cioè si parte per 2.

Per Denari 7. si piglia la metà , ed il dodicesimo .

Per Denari 8. si piglia due volte il terzo .

Per Denari 9. si piglia la metà , ed il quarto .

Per Denari 10. si piglia la metà , ed il terzo .

Per Denari 11. si piglia due volte il terzo , ed una volta il quarto .

Alle volte le parti si pigliano altrimenti .

Si voglia moltiplicare come di sopra Lire 5. 13. 4. per 146. si moltiplicano Lire 5. per 146. vengono Lire 730. le quali si segnano sotto Lire 5. per Soldi 10. si piglia la metà di 146. cioè Lire 73. per Soldi 2. il decimo ; cioè Scudi 14. 12. per Soldo 1. si piglia il ventesimo di 146. ovvero la metà di Lire 14. Soldi 12. cioè Lire 7. 6. per Denari 4. si piglia il terzo d'un ventesimo ; cioè di Lire 7. 6. e faranno Lire 4. 8. 8. e sommate queste partite fanno Lire 827. 6. 8.

Pure si voglia moltiplicare Lire 3. 17. 4. per 386. Lire 3. si moltiplichino per 386. fanno Lire 1158. per Soldi 10. si piglia la metà di 386. cioè Lire 193. per Soldi 3. la metà di Lire 193. ovvero la quarta parte di 386. cioè Lire 96. 10. per Soldi 2. la decima parte di 386. ovvero la quinta parte di Lire 193. cioè Scudi 38. 12. e per Denari 4. la sesta parte di Lire 38. 12. che viene ad essere un terzo di 386. venendone Soldi ; cioè Lire 6. 8. 8. e sommate queste partite , fanno Lire 1492. 10. 8.

146	386	
Lire 5. 13. 4	Lire 3. 17. 4	

730	1158	
-----	------	--

Per Sol. 10. 73	— la metà	193	in 2. metà
Per Sol. 2. 14. 12	decimo	96. 10	quarta parte
Per Sol. 1. 7. 6	ventesimo	28. 12	decima parte
Per Den. 3. 2. 88	terzo di 146	6. 8. 8	la sesta del 146

Lire 827. 6. 8.	Lire 1492. 10. 8

Nelli medesimi Esempj si pigliano le parti in altro modo.

146  
 Lire 5. 13. 4.  
 730  
 per sol. 10. 73 — la metà  
 per sol. 3. 4. 24. 6. 8 — il sesto  
 Lire 827. 6. 8.

146  
 5. 13. 4  
 730.  
 48. 13. 4. il terzo  
 48. 13. 4. il terzo  
 827. 6. 8.

386  
 3. 17. 4  
 1158  
 per sol. 10. 193 — la metà  
 per sol. 4. 77. 4 — quinto  
 per sol. 3. 4. 64. 6. 8 — sesto  
 Lire 1492. 10. 8

386  
 Scudi 3. 17. 4  
 1158  
 128. 13. 4. il terzo  
 128. 13. 4. il terzo  
 77. 4. — il quinto  
 Lire 1492. 10. 8

Del pigliare le parti del numero delle Mercanzie,  
 per gli Soldi, e Denari insieme.

- Per Soldi 1. Denari 3. si piglia il sedicesimo, cioè si parte per 16.  
 Per Soldi 1. 4. si piglia il quindicesimo; cioè si parte per 15.  
 Per Soldi 1. 8. si piglia il dodicesimo.  
 Per Soldi 2. 6. si piglia l'ottavo; cioè si parte per 8.  
 Per Soldi 3. 4. si piglia il sesto.  
 Per Soldi 6. 8. si piglia il terzo; cioè si parte per 3.  
 Per Soldi 8. 4. si piglia 5. volte il 12 esimo; cioè si parte per 12.  
 e l'avvenuto si moltiplica per 4. e si somma.  
 Per Soldi 12. 6. si piglia cinque volte l'ottavo.  
 Per Soldi 13. 4. si piglia 2. volte il terzo.  
 Per Soldi 16. 8. si piglia 5. volte il sesto.  
 Per Soldi 17. 6. si piglia 7. volte l'ottavo.  
 Per Soldi 18. 4. si piglia 11. volte il 12 esimo.  
 Che valeranno Libbre 356. à Lire 17. 1. 8. la Libbra? e Mercanzie  
 726. à Lire 3. 18. 4. la Mercanzia? S' osservino gl'Esempj ope-  
 rando

ando come si è detto, e verranno, per le Libbre Lire 6081. 13. 4  
e per le Mercanzie Lire 2843. 10.

$\begin{array}{r} 356 \\ \text{Lir. } 17. 1. 8. \\ \hline \end{array}$		$\begin{array}{r} 726 \\ \text{Lir. } 3. 18. 4 \\ \hline \end{array}$	
Prova del 9.		Prova del 7.	
$\begin{array}{r} 5 \text{ X } 5 \\ 29. 13. 4 \text{ il } 12 \text{ ef.} \\ \hline 6052 \\ \hline \end{array}$		$\begin{array}{r} 2178 \\ 60. 10. -- \text{ per } 10 \\ \hline 605 \\ \hline \end{array}$	
Uguali. L. 6081. 13. 4		Uguali. L. 2843. 10.	

83. D. Si moltiplicano in altro modo Lire, Soldi, e Denari?

R. In altra maniera si trova il valore d'alcuni Soldi, e Denari; Di Soldi 13. 4. si sottra il terzo del numero delle Mercanzie, che s' apprezzano dall' istesso numero, e resta il prezzo di tali Mercanzie à Soldi 13. 4. l' una; così di Soldi 16. 8. si sottra il sesto; di Soldi 18. 4. si sottra il dodicesimo; di Soldi 17. 6. l'ottavo. Soldi 18. 8. il quindicesimo; per Soldi 18. 9. il sedicesimo; e per Soldi 19. 2. il ventiquattresimo, e resta il prezzo di tali Mercanzie apprezzate per quei Soldi, e Denari. Per le Lire s' apprezzano le Mercanzie al solito; Che valeranno Libbre 675. di robba à Soldi 17. 6. la Libbra? Che Mercanzie 264. à Lire 2. 18. 8. la Mercanzia? S' operi come si è detto, verranno Lire 590. 12. 6. per le Libbre; e Lire 774. Soldi 8. per le Mercanzie.

$\begin{array}{r} \text{Lire } 17. 6. 675 \\ \text{per } 3 / 675 \\ \hline \end{array}$		$\begin{array}{r} \text{Lire } 2. 18. 8 \\ \text{per } 15. 264 \text{ Mercanzie} \\ \hline \end{array}$	
$\begin{array}{r} 84. 7. 6 \text{ sottra} \\ \hline \end{array}$		$\begin{array}{r} 17. 12. \text{ sottra} \\ \hline \end{array}$	
$\begin{array}{r} \text{Lire } 590. 12. 6 \\ \hline \end{array}$		$\begin{array}{r} 246. 8 \\ 528. \\ \hline \end{array}$	
		$\begin{array}{r} \text{Lire } 774. 8 \\ \hline \end{array}$	

84. D. Si moltiplicano in altro modo Lire, Soldi, e Denari?

R. Si moltiplica il numero delle Mercanzie per la metà de' Soldi, il primo numero del prodotto raddoppiato sono Soldi, e gl' altri numeri del prodotto sono Lire. Il numero della Mercanzia si moltiplica per le Lire, quando ci sono, al solito, quali si sommano con l' altre, e viene il prodotto, che si cerca. La ragione di questo è, perche moltiplicando il numero delle Mercanzie per la metà de' Soldi, si moltiplica per decimi di Lira, e così il prodotto sono decimi di Lira; levata la prima figura restano Lire, stante

stante che è, come se si partisse per 10. la figura tagliata si raddoppia, acciò di decimi di Lira tenghino ventessimi, che sono Soldi.

Mà essendo i Soldi dispari si lascia Soldo 1. e con gr<sup>a</sup> altri s'opera come si è detto; per il Soldo lasciato si parte il numero delle Mercanzie per 20. e verranno Lire, e Soldi d'aggiungersi all'altre. **Quanto valeranno Libbre 724. a Lire 5. Soldi 18. la Libbra?** e quante Mercanzie 325. a Lire 6. Soldi 17. la Mercanzia? e verranno Lire 5071. 12. per le Libbre, e Lire 2226. Soldi 5. per le Mercanzie.

Libbre 724  
 Lire 5. 18  
 Prova del 7.  
 3 X 6 651. 12  
 4 X 4 3640  
 Lire 4271. 12

Merc. 325  
 per 20 / 6. 17  
 Prova del 7.  
 3 X 4 260  
 5 X 5 16. 5.  
 1950  
 Lire 2226. 5

Per li Denari poi, stante che di questi si ricercano 240. per una Lira: Da 240. si leva il zero, resta 24. il quale ha molte parti aliquote, & intiere; Pure dal numero delle Mercanzie si leva una figura, e delle restate figure si pigliano quella parte, ò parti, che sono i Denari posti nel quesito; di 24. e verranno Lire, l'avanzo sono decime, che accompagnate con la figura tagliata, si partirà il risultato per la metà del Denominatore della parte, ò parti; E se il Denominatore è numero dispari, allora per esso si parte il doppio del numero risultato, e verranno Soldi; l'avanzo si riduce in Denari, moltiplicandosi per 12. il prodotto si parte per il medesimo partitore, e verranno Denari. **Quanto valeranno Libbre 364. a lire 5. 10. 4. la Libbra?** Il numero 364. si moltiplica per Lire 5. vengono Lire 1820. per 5. metà di Soldi 10. si moltiplica pure 364; vengono lire 188. con l'avvertenza detta; Ora per li Denari 4. che sono la sesta parte di 24. si parte 36. intendendosi tagliato 4. prima figura del numero delle Mercanzie, per 6. Denominatore della sesta parte, viene 6. che sono Lire, & avanza 0. a canto al 5. dice pure 5. il quale si parte per 3. metà di 6. Denominatore viene 1. che è un soldo, & avanza 1. il quale 1. via 12. fa 12. che partito pure per 3. viene 4. che sono Denari; sommate le partite, sono Lire 2008. 1. 4.

Si avverta nel secondo Esempio; che si lascia Denaro 1. e s'opera al solito; pigliando poi per il Denaro lasciato il quarto di quello, che appartiene a Denari 4. si poteva ancora aggiun-

aggiungere, e venivano Denari 6, ed operare come è detto, sottraendo il fello da quello che appartiene a Denari 6.

Libbre 364

Mercanzie 426

5. 10. 4

Lire 3. 16. 3

1828

182

6. 1. 4

Lire 2008. 1. 4

1278

340. 16

7. 2

1. 15. 6

Lire 1627. 13. 6

85. D. Si moltiplichino in altro modo Lire, Soldi, e Denari. R. Si riducono i Soldi, e Denari ad un rotto, che sia parte, di parti della Lira, con infilzargli per la D. 22. del secondo, e poi si moltiplica per la 64. ovvero 66. del medesimo, e verrà il prodotto di tale moltiplicazione.

Quanto costeranno Libbre 385, di Rabba a Lire 3. 17. 4. la Libbra? per la 66.

$\frac{17}{20} V \frac{1}{3}$  viene  $\frac{52}{60}$  Schifato  $\frac{13}{15}$

Lire 3.  $\frac{13}{15}$  385

58

3080

1925

per 15. 22330

Lire 1488  $\frac{2}{3}$

Avvertasi, che si può infilzare anche il numero delle Lire, con porre sotto effo 1. à modo di rotto, e moltiplicare il Numeratore del rotto, che viene per il numero delle Mercanzie, ed il parte per il Denominatore il prodotto, e verrà il numero che si cerca.

Lire  $\frac{3}{1} V \frac{17}{20}$  232  $\frac{1}{3}$

viene  $\frac{232}{60}$  Libbre 385

232

770

1155

770

per 60 / 893210

Lire 1488  $\frac{2}{3}$

2  $\frac{3}{2}$  Si poteva schifare, e veniva  $\frac{1}{2}$  e s'operava come nella passata.

Questo

Questo modo può servire a moltiplicare qualsivoglia sorte di Moneta, Peso, e Misura.

86. D. Si moltiplicano in altro modo Lire, Soldi, e Denari?

R. In Roma per tramutare li Scudi d'oro Stampe immaginarij, che servono per i Cambj, in Scudi correnti di Giulj x. l'uno, e questi in Scudi d'oro Stampe; perche detto Scudo d'oro Stampe è diviso in Soldi, e Denari, riducono i Cambisti detti Soldi, e Denari in centesimi, per più facilità in questo modo: Moltiplicano i Soldi per 5, ed al prodotto aggiungono la metà de i Denari, e vengono centesimi di Scudo d'oro Stampe; e perche tal riduzione non è esatta, rispetto a i Denari, il risultato dall'operazione non è giusto, ma s'varia di qualche poco, delche non curano i Cambisti, come si mostrerà a suo luogo. Tuttavia nell'apprezzare Mercanzie, quando non si faccia la riduzione a punto, viene s'vario danno, e taneræ conto. Per esempio: La Libbra d'alcuna cosa vale Soldi 15. Dan. 8. che valeranno al medesimo prezzo Lib. 327. Si moltiplichino Sol. 15. per 5. vengono 75. ed aggiunto 4. metà di Dan. 8. fanno 79. centesimi, per 79. si moltiplicano Libre 327. e viene 25833. dal qual prodotto si levano le due ultime figure per li centesimi, e restano Lire 258. li 33. centesimi si moltiplicano per 2. dal prodotto 66. puntano una figura cioè 6. per li Den. e restano 6. per li Sol. sicchè valerebbero quelle Lib. secondo questo conto Lire 257. Sol. 6. Den. 6. e pure non devono esser che Lire 256. Sol. 3. Per aver il conto giusto, si riducano i Soldi, e Den. à giusti centesimi così: Si moltiplichino i Den. e Sol. per 5. e verranno centesimi; onde moltiplicando Den. 8. per 5. viene 40. il quale partito per 12. viene 2.  $\frac{8}{3}$  schif.  $\frac{2}{3}$  e Sol. 15. per 5. viene 75. con  $3\frac{2}{3}$  fa 77.  $\frac{2}{3}$  centesimi; onde 78.  $\frac{2}{3}$  via Lib. 327. per la 66. di questo, fa 25615. e levate due figure cioè 15. per i centesimi, restano Lire 256. gli 15. centesimi si partono per 5. e vengono Soldi 3. Dunque Libbre 327. valgono Lire 256. Soldi 3.

*Modo non giusto.*

Soldi 15. 8

$$\begin{array}{r}
 5 \\
 \hline
 79 \quad \text{Libbre } 327 \\
 \hline
 2843 \\
 2289 \\
 \hline
 \text{Lire } 258. 33 \\
 2 \\
 \hline
 \text{Soldi } 6. 6
 \end{array}$$

*Modo giusto.*

Soldi 15. 8. — 5

$$\begin{array}{r}
 78 \frac{2}{3} \\
 \hline
 \text{per } 3. \text{ Libbre } 327 \\
 \hline
 109 \\
 2616 \\
 2289 \\
 \hline
 \text{Lire } 256. 15 \\
 3 \text{ Soldi}
 \end{array}$$

Per



Per ridurre i Soldi, e Denari in centesimi si moltiplicano per 5. medesimamente per ritornare i centesimi in Soldi, e Denari, si partono i centesimi per 5. ma in Roma moltiplicano i centesimi per 2. e tagliano una figura, che è partire per 10. pigliano la metà della figura tagliata per Denari, l'altre figure per Soldi; ma il modo esatto è moltiplicare la figura tagliata per 12. e di nuovo partire per 10. ovvero moltiplicare per 6. e partire per 5. e vengono Denari, Come centesimi 23.  $\frac{1}{2}$  di Lira; si moltiplicano per 2. e vengono Soldi 4.  $7\frac{1}{2}$ . ora  $7\frac{1}{2}$  si moltiplicano per 12. fanno 90. si partono per 10. e vengono Denari 9. appunto. Si può ancora  $7\frac{1}{2}$  moltiplicare per 6. fa 45. il quale si parte per 5. e vengono i medesimi Denari 9. e così di tutti gl' altri.

87. D. Oltre alle prove del 7. del 9. d' d' altro numero, si dà altra prova, per vedere se è giusto il prodotto della Moltiplicazione di Lire. Soldi, e denari?

R. La prova principale si fa col partire à Danda, ovvero col partire per apporre, delle quali operazioni à suo luogo: qui solo l'accenno. Di sopra si sono moltiplicate Lire 2. 19. 3. per Libbre 47. ne sono venute Lire 139. 4. 9; Ora per provare, che tal prodotto è giusto, si partono à Danda Lire 139. 4. 9. per Libbre 47. e devono venire Lire 2. 19. 3. à punto, se si è bene operato; Overo si partono Lire 139. 4. 9. per Lire 2. 19. 3. per apporre, come s' insegnerà, e devono venire Libbre 47. à punto, come vengono; e per chi già le sapesse, si pongono l' operazioni.

per Libbre 47 / Lire 139. 4. 9.      29. 12. 6

45      per Lir. 2. 19. 3. — Li. 139. 4. 9  
tornano Lire 2. 19. 3.      118. 10. —

20      Lib. 47 tornano

20. 14. 9

934      20. 14. 9

434

11 — 12

141

88. D. Nella 59. del primo, fu insegnato à provare l' operazione del moltiplicare con un' altro moltiplicare dato in proporzione, si può usare ancora per provare il moltiplicare di Lire, Soldi, e Denari?

R. Non solo si può provare di Lire, Soldi, e Denari, ma di qualsivoglia sorte di Moneta, Peso, e Misura; e però quello, che si dice di Lire, Soldi, e Denari, si applichi ancora ad altre moltiplica-

plicazione di varie Monete, Pesi, e Misure; e verranno provate. Si pigli dunque la metà, ò il terzo, il quarto, ò altra parte delle Lire, Soldi, e Denari, e si raddoppj, ò si triplichi, ò quadruplichi, &c. il numero delle Mercanzie; e con tali numeri si faccia la moltiplicazione, darà il medesimo prodotto, che diede l'altra moltiplicazione; & al contrario si può pigliare il mezzo, ò il terzo, ò il quarto del numero delle Mercanzie, e raddoppiare, ò triplicare, ò quadruplicare le Lire, Soldi, e Denari; che sempre quelle moltiplicazioni daranno il medesimo prodotto; per esempio: Si siano moltiplicate Lire 18. 16. 8. per 37. e siano venute Lire 696. Soldi 16. 8. dico, che verranno le medesime, se si moltiplicano Lire 9. 8. 4. metà delle Lire 18. &c. per 74. doppio di 37. Le moltiplicazioni sono per decina all'insù per la 75. del secondo.

$$\begin{array}{r} 188. \quad 6. \quad 8 \\ \text{Lire } 18. 16. 8 \text{ — } 37 \\ \hline 565. \text{ — } \\ 131. 16. 8 \\ \hline \text{Lire } 696. 16. 8 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 94. \quad 3. \quad 4 \\ \text{metà Lire } 9. \quad 8. \quad 4 \text{ — } 74 \\ \hline 659. \quad 3. \quad 4 \\ 37. 13. 4 \\ \hline \text{Lire } 696. 16. 8 \end{array}$$

Mà se si moltiplicassero le Lire 18. 16. 8. per 74. allora verrebbe doppio prodotto, il quale si partirebbe per 2. per averlo giusto. Chi vuole maggiore cognizione di questa prova, veda la 59. del primo, dove sono le ragioni &c.

## DISTINZIONE QUARTA.

*Del Partire Rotto, per Rotto, e per Intieri,  
e Rotto, &c.*

89. D. **C**ome per rotto si parte numero rotto?

R. **C**Quando i numeri del rotto partitore misurano à punto i numeri del rotto da partirsi: Si parte il Numeratore per il Numeratore, e viene il Numeratore del quoziente, e si parte il Denominatore, e viene il Denominatore del quoziente v. g. per  $\frac{2}{3}$  si parta  $\frac{2}{3}$  per 2. si parte il 4. e viene 2. che si pone sopra una linea così  $\frac{2}{3}$  per 3. si parte 9. e viene 3. che si pone sotto in medesima linea, e dice  $\frac{2}{3}$  quoziente, che viene da tale partire. Mà perchè per lo più i numeri del rotto partitore non sono misura delli numeri del rotto da partirsi; Chi vuole il medesimo modo, che

che si usò nel moltiplicare i rotti, cambj al rotto partitore, che ha la particola, per il Numeratore in Denominatore, ed allora operi come nel moltiplicare i rotti per la 60. e verrà il quoziente; per esempio: Con  $\frac{4}{5}$  di Scudo si hanno  $\frac{1}{3}$  di Canna di Robba: si domanda con quodscudo quanta robba s'averà; cioè per  $\frac{4}{5}$  si parta  $\frac{1}{3}$  si metti il luogo, ponendo il 4. sopra, il 3. sotto la linea; dipoi li moltiplichì il 4. via 5. fa 20. ed il 3. via 6. fa. 18. che posto il 20. sopra il 18. sotto la linea, si parte 20. per 18. ne viene Canna  $1\frac{2}{9}$  di robba.

per  $\frac{3}{4}$  si parta  $\frac{7}{6}$        $\frac{4}{3} \text{ --- } \frac{5}{6} \text{ viene } \frac{20}{18}$  cioè  $1\frac{2}{9}$

90. D. In altro modo, come per rotto si parte il rotto?

R. Bisogna sapere, che il partitore deve essere della medesima specie, e natura, che il numero da partirsi; onde se i rotti averanno un medesimo Denominatore, faranno della medesima specie, e natura, ed allora per il Numeratore del rotto Partitore si parte il numeratore del rotto da partirsi, ed il quoziente sarà quella quantità, che viene da tal partire; Come per  $\frac{1}{3}$  si parta  $\frac{7}{3}$  per 3. si parte 7. il quoziente 2.  $\frac{2}{3}$ . è quello, che si cerca.

per  $\frac{3}{8}$  si parta  $\frac{7}{8}$  per 3. si parta 7. viene 2.  $\frac{1}{3}$

91. D. Ma se i rotti hanno diverso Denominatore, come si parte l'uno per l'altro?

R. Si riducono i rotti ad un medesimo Denominatore per la 28. del secondo, e s'opera come nella passata. Per  $\frac{2}{3}$  si parta  $\frac{2}{3}$  il 2. che sono terzi si riducono in quinti moltiplicandogli per 5. fa 10. terzi, e quinti: il 4. che sono quinti, si riducono in terzi moltiplicandoli in croce per 3. vengono 16. quinti, e terzi: Ora per 10. si parta 12. verrà di quoziente  $1\frac{2}{3}$  schisato: così si parte viceversa  $\frac{2}{3}$  per  $\frac{4}{5}$  e ne viene  $\frac{2}{3}$ .

per  $\frac{2}{3}$  si parta  $\frac{4}{5}$        $\frac{2}{3} \times \frac{4}{5}$  viene  $\frac{12}{15}$  cioè  $1\frac{2}{3}$  schisat.  $\frac{2}{3}$

per  $\frac{4}{5}$  si parta  $\frac{2}{3}$        $\frac{4}{5} \times \frac{2}{3}$  viene  $\frac{10}{12}$  schisato  $\frac{5}{6}$

92. D. Come si parte il numero intiero per rotto, ed al contrario?

R. Si moltiplica il numero intiero per il Denominatore del rotto, per ridurlo alla medesima specie, il prodotto si parte per il Numeratore, e viene il quoziente. Si sono comprati  $\frac{2}{3}$ . di braccio per uno Scudo: si domanda quanti Scudi si spenderanno in braccio 6? cioè partasi 6. per  $\frac{2}{3}$ . e verrà 9. e tanti Scudi, &c.

Per  $\frac{2}{3}$  si parta 6.       $\frac{2}{3} \times \frac{6}{1}$  viene  $\frac{12}{2}$  cioè 9.

Q 2

1

Per

Per 6. si parta  $\frac{2}{3}$   $\frac{6}{1} \times \frac{2}{3}$  viene  $\frac{2}{18}$  Shifato  $\frac{1}{9}$

93. D. Come si parte il numero intero per intero, e rotto?

R. Si riduce il Partitore al suo rotto, per la 18. del secondo, ed il numero da partirsi alla medesima specie di rotto con moltiplicar.

si per il Denominatore per la 17. del medesimo, e si parte al solito.

Il Moggio del Grano vale Lire 58,  $\frac{2}{3}$ . si domanda con Lire 10920. quante Moggia s'averanno? cioè si parta 10920. per 58  $\frac{2}{3}$ . e verrà 186.  $\frac{2}{3}$ .

per 58  $\frac{2}{3}$  Lire 10920 per 2.

$$\begin{array}{r} 117 \\ \hline \text{Quoziente } 186 \frac{2}{3} \end{array} \quad \begin{array}{r} 21840 \\ 1014 \\ 780 \\ 78 \\ \hline 117 \end{array} \text{schifato per 39. viene } \frac{2}{3}$$

94. D. Come si parte intero e rotto per rotto.

R. Si riduce l'intero al suo rotto per la 18. del secondo, e s'opera come si è detto di sopra.

La Libbra d'alcuna cosa vale  $\frac{4}{3}$  di Lira: domando quante Libbre s'averanno per Lire 42  $\frac{2}{3}$  cioè si parta 42  $\frac{2}{3}$  per  $\frac{4}{3}$  e verranno 53  $\frac{1}{3}$  per Libbre cercate?

Per  $\frac{4}{3} \times \frac{128}{3}$  viene  $\frac{640}{12}$  cioè 53  $\frac{4}{12}$  schifato  $\frac{1}{3}$

95. D. Come per intero, e rotto si parte il rotto?

R. S'opera come nella passata.

Braccia 3  $\frac{1}{4}$  di Robba costano uno Scudo, che costaranno  $\frac{4}{3}$  di braccio? cioè parti 3  $\frac{1}{4}$  per  $\frac{4}{3}$  e viene  $\frac{2}{3}$  di Scudo, valutato sono Bajocchi 21  $\frac{2}{3}$ .

Per 3.  $\frac{3}{4}$   $\frac{4}{5}$   $\frac{15}{4} \times \frac{4}{5}$  viene  $\frac{16}{75}$

96. D. Come per intero, e rotto si parte intero, e rotto?

R. Se i rotti hanno il medesimo Denominatore; si riduce l'intero al suo rotto, per la 18. del secondo, e si parte. Il Barile dell'Olio vale Lire 17  $\frac{2}{3}$ . domando spendendosi Lire 502  $\frac{2}{3}$ . quanti Barili d'Olio s'averanno?

Si moltiplica 17. per 3. e s'aggiunge 1. fa 52. Partitore. Si moltiplicano Lire 502. per 3. e s'aggiunge 2. fa 1508. num. da partirsi, e partito a Danda alla breve per la 76. del primo verrà 29. che sono Barili d'Olio. per Lire 17  $\frac{2}{3}$  Lire 502  $\frac{2}{3}$ .

$$\begin{array}{r} 52 \\ \hline 29 \text{ Quoz.} \end{array} \quad \begin{array}{r} 1508 \\ 468 \\ \hline 79. \end{array}$$

97. D. Ma se gl' intieri hanno rotti di diverso Denominatore, come s' opera la partizione?

R. Si riducono gl' intieri al suo rotto per la 18. del secondo, e reciprocamente si moltiplicano per il Denominatore del rotto, imprestandoselo; per esempio, Libbre 24.  $\frac{1}{4}$  d'una Mercanzia si pagano Lire 584. Soldi 2. Domando quante Lire sù pagata la Libbra?

Come nella passata si moltiplica 24. per 4. e s' aggiunge 3. fa 99. quarti; Si moltiplica 584. per 10. e s' aggiunge 1. pigliandosi Soldi 2. per un decimo di Lira, fa 5841. quinti; Ora 99. si moltiplica per 10. e fa 990. partitore; Si moltiplica 5841. per 4. fa 23364. numero da partire, e fatto il partire a Danda alla breve, vengono Lire 23.  $\frac{1}{4}$ .

Libbre 24  $\frac{1}{4}$  ——— Lire 584  $\frac{1}{4}$

99 — 10

5841 / 4

990

23364

Lire 23  $\frac{1}{4}$

3564

594 schifato per 198. è  $\frac{3}{5}$

98. D. Come si partono rotti di rotti, per rotti di rotti? Per esempio: si è speso uno Scudo in  $\frac{2}{3}$  e  $\frac{1}{4}$  d'un terzo di Canna di Panno; domando, che si spenderà in  $\frac{2}{3}$  e  $\frac{1}{4}$  d'un nono di Canna del medesimo Panno?

R. Si riducono i rotti di rotti a semplici rotti, per la Domanda 22. del secondo, infilzandogli, e s' operi come si è insegnato nelle passate risposte, quì si vede, & averai il rotto di Scudo.

$$\frac{2}{3} \vee \frac{3}{4}$$

$$\frac{2}{3} \times \frac{23}{27}$$

$$\frac{7}{9} \vee \frac{2}{3}$$

$\frac{345}{392}$  schifato per 3. e  $\frac{215}{317}$  di Scudo

99. D. Si opera in altro modo?

R. Si opera ancora così; perche si non ha avanti di se numero intero, col quale si moltiplichi il Denominatore 3. si dice 3. via 0. fa 6. e s' aggiunge 2. Numeratore fa 2. quale si moltiplica per 5. Denominatore del secondo rotto fa 10. e s' aggiunge 3. Numeratore fa 13. terzi, e quinti. Pure per i rotti da partirsi, si dice 9. via 0. fa 0. e s' aggiunge 7. il quale si moltiplica per 3. Denominatore del secondo rotto, e s' aggiunge 2. Numeratore fa 23. noni, e terzi, e perche il Partitore deve essere, come hò detto di

sopra,

sopra , della medesima specie , il 13. partitore si	Per $\frac{2}{3}$	$\frac{3}{5}$	Si partino $\frac{7}{9}$	$\frac{2}{3}$
moltiplica per 9. fa 117. e	<u>3</u>	<u>5</u>	<u>9</u>	<u>3</u>
23. da partirsi per 5. fa 115.	2		7	
questo partito per 117. ne	<u>13 — 9</u>		<u>23 — 5</u>	
viene il rotto medesimo , si	117		115	
lascia di moltiplicare per			117	
3. vicendevolmente , per			Quoziente	
essere il 3. da ciascuna				
parte .				

100. D. Se à partire il numero intiero , ò rotto per numero rotto, il quoziente è maggiore del numero intiero , ò rotto partito ?

R. Benche alcuni Arimmetici , come Fr. Lorenzo Forestani à carte 28. si persuadano il quoziente non essere maggiore , perchè vogliono , che non costi d' unità intiere , mà di parti del rotto partitore ; tuttavia deve essere onninamente maggiore . Si parta per  $\frac{1}{2}$  il numero 6. per la 92. di questo viene 12. e queste sono 12. unità intiere ; benche dicano , che siano mezze , avendo riguardo al partitore ; mà che ciò non sia vero , prima si consideri , che quando per 2. si parte 10. ne viene 5. questo 5. si dice assolutamente , e non 5. due volte , avendo riguardo al partitore 2. perchè allora il quoziente farebbe 10. partito , e non 5. Così se il 12. fussero 12. mezzi , e non intiere unità , farebbero 6. unità numero partito ; Dunque secondo loro verrebbe superflua la divisione , ò partizione , essendo la quantità da partirsi la medesima , che il quoziente , il che non è da dirsi .

Questo si conosce per via di proporzione ; Perchè il partitore all' unità dice la proporzione medesima , che la quantità partita al quoziente ; come è chiaro , che  $\frac{1}{2}$  ad 1. dice proporzione subdoppia , come la medesima dice 6. à 12. ; medesimamente negl' intieri , 2. partitore ad 1. dice proporzione doppia , siccome 8. numero partito al quoziente 4. Ora se 12. di sopra non fussero 12. unità intiere , à quelle il 6. non direbbe quella proporzione che  $\frac{1}{2}$  ad 1. Di più , essendo quelle quattro quantità proporzionali cioè  $\frac{1}{2}$  . 1. 6. 12. Per la proposizione 19. del settimo d' Euclide , tanto deve fare à moltiplicare la prima via la quarta , quanto la seconda via la terza ; e perchè 1. via 6. fa 6. così  $\frac{1}{2}$  via 12. fa 6. mà se fussero 12. mezzi à moltiplicarli per  $\frac{1}{2}$  il prodotto farebbe 3. per la 60. di questo , e non 6. dunque sono 12. unità intiere .

Oltre di che ho detto di sopra , che il partitore , & il numero da partirsi , devono essere della medesima specie , nonche devano essere applicati alla medesima materia di Monete , ò Mercanzia ; anzi , per lo

per lo più sono applicati a diversa; mà che se il partitore è diviso in mezzi, anche il numero da partirsi sia diviso in mezzi, e così in altre parti; Ora per partire 6. per  $\frac{2}{3}$ . si riduca 6. a' mezzi, per la 17. del secondo, sono 12. mezzi, per la 91. di questo, si parte 10. per 1. mezzo, viene 12.

Si manifesta questa verità ancora, per questo esempio: Uno con  $\frac{2}{3}$  Scudo compra un braccio di Panno: con Scudi 6. quante braccia di Panno comprerà? Qui non ci è altra operazione, che partire 6. per  $\frac{2}{3}$  e viene 12. se quali sono braccia intiere, e non mezze, che si compreranno per Scudi 6.

Nella 64. mostrai il prodotto di due rotti essere minore di quelli per il moltiplicare, e perche il partire è operazione contraria, il quoziente deve essere necessariamente maggiore della quantità partita per numero rotto; essendo la quantità partita il prodotto dal moltiplicare.

101. D. Come si prova l'operazione del moltiplicare rotti, se il prodotto sia giusto?

R. Si prova propriamente per il partire, operazione opposta, e però è stato d'uopo differirla dopo il partire de' rotti. Si sia moltiplicato  $\frac{3}{4}$  via  $\frac{5}{8}$  il prodotto è  $\frac{15}{32}$  per provare, che  $\frac{3}{4}$  sia il vero prodotto, si parte  $\frac{15}{32}$  per  $\frac{5}{8}$  rotto moltiplicante, e viene  $\frac{3}{4}$  rotto moltiplicato; Overo per  $\frac{3}{4}$  si parte  $\frac{15}{32}$  ne viene  $\frac{5}{8}$  rotto moltiplicante, altrimenti non si sarebbe bene operato. Esempi:

$\frac{3}{4}$  via  $\frac{5}{8}$  prodotto  $\frac{15}{32}$  schifato per 3. è  $\frac{5}{8}$

Per  $\frac{3}{4}$  si parta  $\frac{15}{32}$  quoziente  $\frac{26}{32}$  schifato  $\frac{3}{4}$

Overo per  $\frac{5}{8}$  si parta  $\frac{15}{32}$  quoziente  $\frac{30}{40}$  schifato  $\frac{3}{4}$

Si potrebbe provare con un'altro moltiplicare di rotti, come si disse nella 59. del primo, per la moltiplicazione de' rotti intieri; per esempio: Si sia moltiplicato  $\frac{3}{4}$  con  $\frac{4}{9}$ . il prodotto è  $\frac{12}{36}$  si pigli adesso  $\frac{3}{4}$  metà di  $\frac{12}{36}$ . e  $\frac{3}{9}$  doppio di  $\frac{3}{9}$  e si moltiplichino  $\frac{3}{9}$  via  $\frac{4}{9}$  e dovrà essere il prodotto  $\frac{12}{36}$ . come per l'altro moltiplicare.

$\frac{3}{4}$  via  $\frac{4}{9}$  prodotto  $\frac{12}{36}$  schifato  $\frac{1}{3}$

Prova  $\frac{3}{9}$  via  $\frac{4}{9}$  prodotto  $\frac{12}{81}$  schifato  $\frac{1}{3}$

La prova, rispetto alla moltiplicazione di due rotti. S'applica alla moltiplicazione di rotti via intieri; d'intieri, e rotti via rotti, e d'intieri, e rotti, via intieri, e rotti &c.

102. D. Come si fa la prova del partire i rotti, se il quoziente sia giusto?

R. Primieramente col moltiplicare, perche moltiplicandosi il numero quoziente via il numero partitore, ne verrà il numero partito a punto, se si farà operato bene; per esempio: per  $\frac{2}{3}$  si parta  $\frac{4}{5}$  viene  $\frac{8}{15}$  schifato  $\frac{6}{5}$ . Ora se questo si moltiplicherà via  $\frac{3}{2}$  partitore, ne verrà  $\frac{8}{5}$  schifato  $\frac{4}{1}$  rotto partito; e così si farà la prova all'altre operazioni del partire i rotti.

103. D. Si prova in altro modo il partire de' rotti?

R. Si saria potuto provare con la prova del 7., e del 9. &c. siccome l'operazione del sommare, Sottrarre, e Moltiplicare de' rotti; ma per non essere tal prova in uso, si è tralasciata; Più tosto si provi con un'altro partire, come s'insegnò nella 82. del primo a provare il partire de' numeri intieri: cioè, si parta la quantità partita per il quoziente, e doverà venire il partitore; e così per l'esempio passato partendo  $\frac{4}{5}$  per il quoziente  $\frac{2}{3}$  ne verrà  $\frac{2}{3}$  partitore.

Per  $\frac{2}{3}$  si parta  $\frac{4}{5}$   
 Quoziente  $\frac{12}{10}$  schifato  $\frac{6}{5}$

Prova per il moltiplicare.  
 $\frac{6}{5}$  via  $\frac{3}{2}$  torna  $\frac{12}{10}$  sch.  $\frac{4}{5}$

Prova con un'altro Partire.

Per  $\frac{6}{5}$  si parta  $\frac{4}{5}$  torna  $\frac{20}{30}$  cioè  $\frac{2}{3}$

104. D. Come si partono varie Monete v. g. Lire, Soldi, e Denari?

R. Prima si partono le Lire, e vengono Lire, il numero delle Lire, che avanza si moltiplica per 20. per farne Soldi, al prodotto s'aggiungono i Soldi, quando ci sono, e si partono, e vengono Soldi; il numero de' Soldi, che avanza si moltiplica per 12. al prodotto s'aggiungono i Denari, quando ci sono, e si partono e vengono Denari; e questa operazione serve di prova al moltiplicare. Nella 74. di questo, si trovò, che Staja 8. di Grano costavano Lire 61. Soldi 6. Denari 8. Volendo sapere quanto costi uno Stajo; si partono Lire 61. per 8. vengono Lire 7. ed avanzano Lire 5. le quali si moltiplicano per 20. fanno Soldi 100. ed aggiunti Soldi 6. fanno Soldi 106. li quali si partono per 8. vengono Soldi 13. ed avanzano Soldi 2: li quali si moltiplicano per Denari 12. fanno Denari 24. a i quali aggiungonsi Denari 8. fanno Denari 32. li quali partiti per 8. vengono Da- Per 8 / Lire 61. 6. 8  
 nari 4. e tutto il quoziente è Lire 7. Sol. 13.  
 Denari 4. prezzo d'uno Stajo.

Lire 7. 13. 4  
 105. D.



105. D. Come si partono altre sorti di Monete?

R. Nella 77. del secondo si moltiplicarono Ducati 3. Grossi 10. Piccioli 28. per Mercanzie 58. ne vennero Ducati 200. 6. 24. loro prezzo. Ora si rivolti il quesito dicendo: Se Mercanzie 58. costano Ducati 200. 6. 24. che costa una Mercanzia?

Per sapere il costo si partono Ducati 200. per 58. per la 77. del primo, vengono Ducati 3. & avanzano Ducati 26. li quali si moltiplicano per 24. fanno Grossi 624. & aggiunti 6. sono Grossi 630. li quali si partono per 58. e vengono Grossi 10. & avanzano Grossi 50. li quali si moltiplicano per 32. e vengono Piccioli 1600. & aggiunti 24. sono 1624. li quali si partono per 58. e vengono Piccioli 28. sicche costa Ducati 3. Grossi 10. Piccioli 28.

## DISTINZIONE QUINTA.

*Di varie risoluzioni sopra i Rotti.*

106. D. **D**A qual quantità è stato sottratto  $\frac{1}{2}$ , & è restato  $\frac{2}{3}$ ?

R. Si sommi  $\frac{1}{2}$  con  $\frac{2}{3}$  per la 34. del secondo, ne viene 1.  $\frac{7}{6}$  quantità cercata.

107. D. Due Mercanti hanno diviso una pezza di Panno; il primo ne ha avuto braccia 26.  $\frac{1}{4}$ . il secondo braccia 32.  $\frac{1}{2}$ . si ricerca quante braccia portava detta Pezza?

R. Si sommino braccia 26.  $\frac{1}{4}$ . e braccia 32.  $\frac{1}{2}$  per la 35. del secondo, vengono braccia 59.  $\frac{3}{4}$  per la portata di detta Pezza.

108. D. A qual rotto si deve aggiungere  $\frac{2}{3}$  acciò la somma sia  $\frac{5}{6}$ .

R. Si sottri  $\frac{2}{3}$  da  $\frac{5}{6}$ . per la 49. del secondo resta  $\frac{1}{6}$  rotto cercato.

109. D. Che differenza si trova fra Libbre 26.  $\frac{1}{6}$  e Libbre 93.  $\frac{5}{6}$ ?

R. Si sottrino per la 49. del secondo, Libbre 26.  $\frac{1}{6}$  da Libbre 93.  $\frac{5}{6}$ . restano Libbre 66.  $\frac{4}{6}$ . per la differenza cercata.

110. D. Che rotto è  $\frac{2}{3}$  di  $\frac{1}{6}$  o pure, che è l'istesso  $\frac{2}{3}$  di  $\frac{2}{3}$ ?

R. Si moltiplichino  $\frac{2}{3}$  via  $\frac{1}{6}$  per la 60. del secondo, ne verrà  $\frac{2}{9}$  schi-  
sato  $\frac{2}{9}$  per il rotto cercato.

111. D. Qual numero è stato partito per  $\frac{1}{3}$ . & il quoziente sia stato 23.  $\frac{2}{3}$ ?

R. Si moltiplichino 23.  $\frac{2}{3}$  via  $\frac{1}{3}$  per la 66. del secondo, il prodotto 17.  $\frac{2}{3}$  è il numero cercato per il quoziente.

112. D. Si cerca, che parti siano  $\frac{2}{3}$  di  $\frac{2}{3}$ ?

R. Si parte  $\frac{2}{3}$  per  $\frac{1}{3}$  per la 90. del secondo, vengono  $\frac{4}{9}$  per le parti, che sono  $\frac{4}{9}$  di  $\frac{2}{3}$ .

113. D. Per qual rotto si moltiplica 1.  $\frac{1}{3}$  che faccia  $\frac{2}{3}$ ?

R. Si parte  $\frac{1}{3}$  per 1.  $\frac{1}{3}$  per la 95. di questo, il quoziente è  $\frac{2}{3}$  rotto cercato.

P

114. D.

114. D. Questo rotto  $\frac{5}{4} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2}$  di quanti sestî, quarti, terzi, e mezzi infilzati costa?

R. Per il primo modo si trovano i sestî, poi i quarti, i terzi, e mezzi così: Per la 20. del secondo si moltiplica 143. Numeratore, per 6. e si parte il prodotto 858. per 144. il quoziente 5. sono sestî; il numero che avanza 138. si moltiplica per 4. il prodotto 552. si parte per il medesimo 144. il quoziente 3. sono quarti; il numero che avanza 120. si moltiplica per 3. fa 360. si parte per 144. il quoziente 2. sono terzi, il numero che avanza 72. si moltiplica per 2. fa 144. il quale partito per 144. viene 1. che è  $\frac{1}{2}$ . e non avanza alcuna cosa, e così sempre.

Si che quel rotto costa di  $\frac{5}{4} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2}$  infilzati, essendo il seguente rotto d'una parte dell' antecedente.

$$\begin{array}{r}
 \frac{5}{4} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} \\
 \hline
 \text{osta di } \frac{5}{4} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2}
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 143 \text{ ————— } 6 \\
 144 \\
 \hline
 858 \\
 138 \text{ — } 4 \\
 \hline
 552 \\
 120 \text{ — } 3 \\
 \hline
 360 \\
 72 \text{ — } 2 \\
 \hline
 144
 \end{array}$$

115. D. Quale è il secondo modo?

R. Si comincia dall' ultimo; e si trova  $\frac{1}{2}$  poi  $\frac{2}{3}$   $\frac{3}{4}$  e  $\frac{5}{4}$  così avvertendo, che il rotto non sia schifato, che si propone; Sia il medesimo rotto  $\frac{5}{4} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2}$ . il Numeratore 143. si parte per 2. viene 71.  $\frac{2}{3}$  si tiene da parte, e si parte 71. per 3. viene 23.  $\frac{3}{4}$  si tiene da

$$\begin{array}{r}
 143 \\
 144
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l}
 \text{per 2} & 143 \\
 \text{per 3} & 71 \\
 \text{per 4} & 23 \\
 \text{per 6} & 5
 \end{array}
 \left| \begin{array}{l}
 \frac{5}{4} \\
 \frac{3}{4} \\
 \frac{2}{3} \\
 \frac{1}{2}
 \end{array} \right.$$

parte, e si parte 23. per 4. e viene 5.  $\frac{4}{5}$  si tiene da parte, e finalmente si parte 5. per 6. e viene  $\frac{5}{6}$ . sicche sono i rotti infilzati  $\frac{5}{4} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2}$  come sopra.

Quando il rotto è schifato è d' uopo ritornarlo nel primo risultato dall' infilzare; v. g. si sono infilzati tanti terzi, quarti, e quinti, che il rotto risultato è  $\frac{5}{4}$  si cerca quanti terzi, quarti, e quinti siano stati? Si moltiplichino i Denominatori delle parti; cioè 3. via 4. fa 12. e questo via 5. fa 60. Denominatore del rotto risultato dall' infilzare, senza schifare. Ora per trovare il Numeratore si mol,

si moltiplichi 60. per 4. Numeratore di  $\frac{4}{5}$  il prodotto 240. si parta per 5. Denominatore, il quoziente 48. è il Numeratore, e starà così  $\frac{48}{5}$ . Si trovino 3 quinti, partendo 48. per 5. viene 9. ed avanza 3. che sono 3. quinti, cioè  $\frac{3}{5}$  il 9. si parta per 4. viene 2. ed avanza 1. che è un quarto, cioè  $\frac{1}{4}$ . finalmente si parte il 2. per 3. viene 0. ed avanza 2. che sono 2. terzi, cioè  $\frac{2}{3}$ . Dunque sono  $\frac{48}{5} \frac{3}{5} \frac{1}{4} \frac{2}{3}$  &c.

Primo modo.

Secondo modo.

$$\begin{array}{r} 4 \quad \text{---} \quad 3 \\ \hline 5 \quad \quad 12 \\ \hline \text{Sono } \frac{4}{5} \quad \frac{1}{4} \quad \frac{3}{5} \quad \frac{2}{3} \quad \text{---} \quad 4 \\ \hline 8 \\ \hline 3 \quad \text{---} \quad 5 \\ \hline 15 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \frac{4}{5} \text{ 3. via 4. fa 12. via 5. } \\ \hline \text{fa } 60 \text{ --- } 4 \\ \hline \text{per 5 / } 240 \\ \hline \text{per 5 } 48 \\ \text{per 4 } 9 \\ \text{per 3 } 2 \end{array} \quad \left| \begin{array}{l} \frac{3}{5} \\ \frac{1}{4} \\ \frac{2}{3} \end{array} \right|$$

116. D.  $\frac{7}{8}$  di Lira quanti Soldi, e Denari sono?

R. Per la 114. di questo si moltiplica 7. via 20. fa 140. il quale si parte per 8. e vengono Soldi 17. ed avanza 4. il quale si moltiplica per 12. fa 48. il quale si parte per 8. vengono Denari 6.

$$\begin{array}{r} \frac{7}{8} \quad \text{---} \quad 20 \\ \hline 140 \\ \hline 4 \quad \text{---} \quad 12 \\ \hline 48 \end{array}$$

Sono Soldi 17. 6 Overo per la 115. del secondo si moltiplica 12. via 20. fa 240. il quale si moltiplica per 7. fa 1680. il quale si parte per 8. vengono 210. Denari, li quali partiti per 12. vengono Soldi 17. Denari 6. come per l' altro modo.

$$\begin{array}{r} 20 \text{ --- } 12 \\ \hline 240 \text{ --- } 7 \\ \hline \text{Per 8. } 1680 \\ \text{Per 12. } 210 \\ \text{Soldi } 17. 6 \end{array}$$

117. D. Quale è la somma di  $\frac{2}{3}$  di  $\frac{1}{2}$  di Lira aggiunti à i medesimi  $\frac{1}{3}$ ?

R. Per la 23. del secondo s'innesti  $\frac{1}{2}$  e  $\frac{1}{3}$  di trè quinti, e s'a verà la somma. Si moltiplica 3. via 4. in croce fa 12. e 3. via 3. Numeratori fa 9. sommato con 12. fa 21. Numeratore; si moltiplica 5. via 4. Denominatori fa 20. Denominatore, e sta così  $\frac{21}{20}$ . cioè 1  $\frac{1}{20}$  dunque la somma è Lira 1. Soldo 1.

Primo modo.

$$\begin{array}{r} \frac{3}{5} \quad \frac{1}{2} \quad \frac{1}{3} \\ \hline \frac{3}{5} \quad \frac{12}{4} \quad \frac{9}{12} \\ \hline \frac{21}{20} \text{ cioè } 1 \frac{1}{20} \end{array}$$

In altro modo si fa così : s'aggiunge

*Secondo modo.*

1. a  $\frac{3}{4}$  fa  $\frac{1}{4}$ , il quale si moltiplica  $\frac{3}{4}$  con 1. fa  $\frac{3}{4} = \frac{3}{4}$  viene  $\frac{21}{20}$  via  $\frac{1}{4}$  viene  $\frac{17}{20}$  come sopra.

118. D. Si sommi  $\frac{2}{7}$  con  $\frac{1}{7}$  di 1300. e si assegni la somma?

R. Per la 34. del secondo si somma  $\frac{2}{7}$  con  $\frac{1}{7}$  viene  $\frac{3}{7}$  il qual rotto si moltiplichì via 1300. per la 65. del medesimo; verrà  $817\frac{2}{7}$  per la somma assegnata; Ovvero si moltiplichì 1300. per  $\frac{3}{7}$  fa 260. e 1300. si moltiplichì per  $\frac{1}{7}$  per la detta 65. fa 557  $\frac{2}{7}$  il quale sommato con 260. verrà come sopra  $817\frac{2}{7}$ .

*Primo modo.*

*Secondo modo.*

$$\begin{array}{r} \frac{1}{5} \times \frac{3}{7} \\ \hline \frac{3}{7} \\ 15 \\ \hline 22 \\ \hline 35 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 1300 \\ 22 \\ \hline 2600 \\ 2600 \\ \hline \end{array}$$

per 5. 28600

per 7. 5720

$817\frac{2}{7}$

$$\begin{array}{r} \frac{1}{5} \times 1300 \\ \hline 260 \\ 557\frac{2}{7} \\ \hline 817\frac{2}{7} \end{array} \quad \begin{array}{r} \frac{3}{7} \times 1300 \\ \hline 3900 \\ 557\frac{2}{7} \\ \hline \end{array}$$

119. D. Si levi  $\frac{2}{3}$  di  $\frac{1}{2}$  dal medesimo  $\frac{1}{2}$  e si trovi il resto?

R. Si moltiplica  $\frac{2}{3}$  via  $\frac{1}{2}$  fa  $\frac{1}{3}$  per la 60. del secondo  $\frac{1}{3}$  si sottra da  $\frac{1}{2}$  per la 40. del medesimo resta  $\frac{1}{6}$ . ovvero si sottra  $\frac{1}{3}$  da 1. per 47. del secondo resta  $\frac{1}{3}$  il quale si moltiplica via  $\frac{1}{2}$  viene  $\frac{1}{6}$  per il resto.

*Primo modo.*

*Sottra.*

*Secondo modo.*

$$\frac{2}{3} \times \frac{1}{2} \text{ viene } \frac{1}{3} \text{ cioè } \frac{10}{18}$$

$$\frac{1}{2} \text{ da } \frac{1}{2} \text{ } \frac{5}{9} \text{ da } \frac{5}{6}$$

$$\frac{2}{3} \text{ da } 1. \frac{1}{3} \text{ da } \frac{5}{6}$$

$$\begin{array}{r} 45 \\ 30 \\ \hline \end{array}$$

$$\text{Resto } \frac{5}{18}$$

$$\begin{array}{r} 15 \\ 54 \\ \hline \end{array} \text{ fch. } \frac{5}{18}$$

120. D. Si levi  $\frac{1}{2}$  di  $\frac{2}{3}$  da  $\frac{1}{2}$  di  $\frac{2}{3}$ . e si trovi il resto?

R. Si moltiplichì  $\frac{1}{2}$  via  $\frac{2}{3}$  fa  $\frac{1}{3}$  e  $\frac{1}{2}$  via  $\frac{2}{3}$  per la 60. del secondo fa  $\frac{2}{3}$  da questo si sottrì  $\frac{1}{3}$  per la 40. del medesimo resta  $\frac{1}{6}$ .

Ovvero si sottrì  $\frac{1}{2}$  da  $\frac{1}{2}$  resta  $\frac{1}{2}$  il quale si moltiplica via  $\frac{2}{3}$  viene  $\frac{1}{3}$  per il resto.

121. D.

121. D. Da quanti ottavi è stato sottratto  $\frac{1}{2}$ . & il resto sommato con  $\frac{1}{2}$ . e la somma moltiplicata per  $\frac{1}{2}$ . & il prodotto partito per  $\frac{1}{2}$  e ne sia venuto  $\frac{1}{2}$ ?

R. Per soddisfare à questa domanda vi vogliono molte operazioni; Si cominci da ultimo, e si moltiplica  $\frac{1}{2}$ . via  $\frac{1}{2}$  per la 60. del secondo, fa  $\frac{1}{2}$ . il quale si parta per  $\frac{1}{2}$  per la 89. del medesimo, viene  $\frac{1}{2}$  somma, dalla quale si sottra  $\frac{1}{2}$  per la 46. del secondo, resta  $\frac{1}{2}$ . col quale si somma  $\frac{1}{2}$  per la 34. dell' istesso, ne viene  $\frac{1}{2}$  schisato  $\frac{1}{2}$ . il quale ridotto in ottavi per la 19. del detto sarà  $\frac{1}{2}$  e  $\frac{1}{2}$  d' un' ottavo.

122. D. Si trovino due tali numeri, che li  $\frac{1}{2}$  d' uno fiano tanto, quanto li  $\frac{1}{2}$  dell' altro?

R. Se ne possono trovare quanti un vuole; i minori sono questi: Si moltiplichino in croce 3. via 5. fa 15. e 2. via 4. fa 8. numeri minori cercati, perchè  $\frac{1}{2}$  di 8. è 6. e  $\frac{1}{2}$  di 15. è pur 6. ma pigliando  $\frac{1}{2}$  in vece di  $\frac{1}{2}$  e  $\frac{1}{2}$  in vece di  $\frac{1}{2}$  per la 11. del secondo, e moltiplicati in croce vengono 32. e 60. ora  $\frac{1}{2}$  di 32. è 24. siccome  $\frac{1}{2}$  di 60. è 24. e così se ne possono trovare altri, pigliando rotti di maggior Denominatore uguale a i primi, per la 11. citata.

$$\begin{array}{ccc} \frac{4}{3} \times \frac{2}{5} & \frac{6}{8} \times \frac{4}{10} & \frac{9}{12} \times \frac{2}{5} \\ \text{Di } \begin{array}{cc} 8 & 15 \\ 6 & 6 \end{array} & \text{Di } \begin{array}{cc} 32 & 60 \\ 24 & 24 \end{array} & \text{Di } \begin{array}{cc} 24 & 45 \\ 18 & 18 \end{array} \end{array}$$

123. D. Si trovino due numeri, che  $\frac{1}{2}$ , e  $\frac{1}{2}$  d'uno sia tanto, quanto  $\frac{1}{2}$  e  $\frac{1}{2}$  dell' altro.

R. Si sommino da una parte  $\frac{1}{2}$ , e  $\frac{1}{2}$  sono  $\frac{1}{2}$ . si sommino  $\frac{1}{2}$  e  $\frac{1}{2}$  sono  $\frac{1}{2}$ . ora come nella passata si moltiplichino in croce  $\frac{1}{2}$  e  $\frac{1}{2}$ . verranno 56. e 75. numeri cercati; perchè  $\frac{1}{2}$ . e  $\frac{1}{2}$  di 56. è 70. siccome  $\frac{1}{2}$  e  $\frac{1}{2}$  di 75. è 70.

Se ne possono trovare altri numeri in infinito, che abbiano la medesima condizione, seguendo il modo della passata; o almeno mutarne uno: come qui si vede.

$$\begin{array}{ccc} \frac{5}{4} & \frac{14}{15} & \frac{10}{8} & \frac{24}{15} \\ \text{Di } \begin{array}{cc} 56 & 75 \\ 70 & 70 \end{array} & \text{Di } \begin{array}{cc} 112 & 150 \\ 140 & 140 \end{array} \end{array}$$

124. D. Si trovino trè numeri, che li  $\frac{1}{2}$  del primo fiano tanto quanto li  $\frac{1}{2}$  del secondo, e li  $\frac{1}{2}$  del secondo fiano tanto, quanto li  $\frac{1}{2}$  del terzo numero?

R. Si pongano in ordine li trè rotti, come si vede qui sotto; Dipoi si moltiplichino 3. Denominatore del primo via 3. Numeratore del secondo fa 9. e questo 9. si moltiplichino via 4. Numeratore del terzo rotto, fa 36. primo numero. Di nuovo si moltiplichino 2. Numeratore del primo via 5. Denominat. del secondo fa 10. e questo 10. si moltiplichino via 3. Numeratore del terzo rotto, fa 30. secondo numero. Di nuovo si moltiplichino 3. Denominatore del primo via 5. Numeratore del secondo fa 15. e questo 15. si moltiplichino via 4. Numeratore del terzo rotto, fa 60. terzo numero.

118.

Si moltiplichi via 2. Numeratore del terzo rotto fa 40. secondo numero. Finalmente si moltiplichi 2. Numeratore del primo via 3. Numeratore del secondo fa 6. e questo 6. via 7. Denominatore del terzo rotto fa 42. terzo numero cercato.

$$\frac{2}{3} \bar{X} \frac{3}{5} \bar{X} \frac{4}{7} \frac{36}{40} \frac{42}{48}$$

Si prova, perche  $\frac{2}{3}$  di 36. sono 24. così  $\frac{3}{5}$  di 40., come anco  $\frac{4}{7}$  di 42. moltiplicando il numero per il Numeratore; e partendo il prodotto, per il Denominatore del rotto. Avvertasi, come nella passata s' avvertì, che se ne possono trovare altri numeri, che abbiano tale condizione.

125. D. Si trovino quattro numeri, che li  $\frac{2}{3}$  del primo siano tanto, quanto li  $\frac{3}{5}$  del secondo, e li  $\frac{4}{7}$  del secondo siano quanto li  $\frac{1}{2}$  del terzo, e li  $\frac{1}{2}$  del terzo siano quanto la metà del quarto numero?

R. Si moltiplichi 3. Denominatore del primo via 3. Numeratore del secondo fa 9. via 4. Numeratore del terzo, fa 36. via 1.

$$\frac{2}{3} \bar{X} \frac{3}{5} \bar{X} \frac{4}{7} \bar{X} \frac{1}{2} \frac{36}{40} \frac{42}{48}$$

Numeratore del quarto pure fa 36. numero primo. Di nuovo 2. via 5. fa 10. via 4. fa 40. via 1. fa 40. numero secondo. Di nuovo 2. via 3. Numeratore del secondo, fa 6. via 7. fa 42. via 1. fa 42. numero terzo; Finalmente 2. via 3. fa 6. via 4. fa 24. via 2. Denominatore del quarto rotto fa 48. quarto numero cercato. Così si possono trovare cinque, sei, & altri numeri di tal condizione.

126. D. In quali massime si fondano i numeri rotti?

R. Nelle seguenti: 1. Ogni continuo è divisibile in qualsivoglia parti uguali fra di loro. 2. Ogni numero rotto denomina una sola cosa continua, divisa in tante parti uguali, quante dimostra il Denominatore. 3. Dell'istessa cosa divisa in parti disuguali non si ammette numero rotto. 4. L'istessa cosa continua può essere denominata da diversi numeri rotti. 5. Quanto è maggiore il Denominatore del Rotto, tanto sono dell'istesso minori le parti. 6. E quanto è minore il Denominatore del medesimo Rotto, tanto sono maggiori le parti dell'istesso Rotto. 7. L'unità al numero rotto dice quella proporzione, che il Denominatore del Rotto al suo Numeratore: v. g. come 1. à  $\frac{2}{3}$  così 3. à 2. e come 1. à  $\frac{3}{4}$ . così 5. à 3. e così deg'altri; perche il Denominatore rappresenta l' unità continua, divisa in tante parti. 8. Le cose indivisibili fisicamente non ammettono frazioni di numero, come non si dirà un terzo d' Uomo, nè un quarto d' Anima.

TRAT-

# TRATTATO TERZO<sup>119</sup>

## DELLE REGOLE DE' PARTITORI,

Per Valutare Mercanzie con Rotti .

*Del Partire à Danda con Rotti; Del Partire per Apporre  
in due modi usato in Fiorenza .*

### DISTINZIONE PRIMA.

#### Delle Regole de' Partitori usate in Fiorenza .

1.D. He regola è questa de' Partitori , e come  
si fa ?

R.



Quando nel numero delle Mercanzie, che si apprezzano per Lire, Soldi, e Denari; Ovvero per Scudi, Lire, Soldi, e Denari; ò per altra specie di Moneta ci è un rotto . Il moltiplicare Lire, Soldi, e Denari per il numero delle Mercanzie con un rotto si

chiama in Fiorenza Regola prima de' Partitori , chiamata così da Francesco Galigai Autore antico d'Arimmetica lib.2. come stimo, perche si partono le Lire, Soldi, e Denari per il Denominatore del rotto , per trovare il prezzo d'una parte denominata , qual prezzo si moltiplica per il Numeratore del rotto , 'è ne verrà il prezzo di effo rotto . Per esempio; Un braccio di Panno vale Lire 5. 13. 4. domando il prezzo di  $\frac{1}{3}$  di braccio ? Si partono Lire 5. 13. 4. per 6. per la 104. del secondo vengono Soldi 18. 10.  $\frac{2}{3}$  quali si moltiplicano per 5. per la 72. del secondo moltiplicando prima il 2. numeratore de' terzi, e 10. prodotto si parte per 3. Denominatore, e vengono Denari 3  $\frac{2}{3}$ . Dipoi Denari 10. per 5. vengono Denari 50. e s'aggiungono Denari 3  $\frac{2}{3}$  fanno Denari 53  $\frac{2}{3}$ . cioè Soldi 4. Denari 6  $\frac{2}{3}$ . Finalmente si moltiplichino Soldi 18. per 5. con aggiungere Soldi 4. fanno Soldi 94. cioè Lire 4. 14. 5  $\frac{2}{3}$  in tutto, prezzo di  $\frac{1}{3}$  di braccio . per

Per prova Lire 4. 15. 5.  $\frac{5}{8}$  si partono per 6. il quoziente si moltiplica per 6. e torneranno Lire 5. 13. 4. &c.

$$\begin{array}{r} \text{Lire } 5. 13. 4 - \frac{5}{8} \\ \text{per } 6 / \quad 18. 10 \frac{2}{3} \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{Lire } 4. 14. 5 \frac{5}{8} \\ \hline \end{array}$$

*Prova.*

$$\begin{array}{r} \text{Lire } 4. 14. 5 \frac{5}{8} \\ \text{per } 5 / \quad 18. 10 \frac{2}{3} - 6 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{Lire } 5. 13. 4 \\ \hline \end{array}$$

2. D. La Canna del Panno vale Lire 14. 6. 8. che valeranno Can. 26. braccia 3. al medesimo prezzo ?

R. Si Moltiplichino Lire 14. 6. 8. per la 74. del secondo via 26. per braccia 3. Si partono Lire 14. 6. 8. per 4. stante che à Fiorenza Braccia 4. fanno una Canna, e vengono Lire 3. 11. 8. prezzo di un braccio, li quali si moltiplicano per braccia 3. e vengono Lire 10. Soldi 15. li quali si sommano con l'altre, e sono Lire 383. 8. 4. prezzo cercato.

Torna commodò al Maestro il dare la prova, facendo allo Scolaro altra lezione data in proporzione come si disse nella 59. del primo, e si accennò nella 88. del secondo; Però qui si piglia la metà del prezzo, e il doppio delle Mercanzie, ed operando bene torneranno Lire 383. 8. 4. come nell'altra.

Due altre prove reali fatte col partire à Danda con i rotti, e col partire per apporre s' insegnano a suo luogo.

$$\begin{array}{r} 143. 6. 8 \\ \text{Lire } 14. 6. 8 \rightarrow 26. 3 \\ \text{per } 4. / \quad 3. 11. 8 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 286. 13. 4 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 86. - \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10. 15. - \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{Lire } 383. 8. 4 \\ \hline \end{array}$$

*Prova.*

$$\begin{array}{r} 71. 13. 4 \\ \text{Lire } 7. 3. 4 - 53 \frac{5}{8} \\ \text{per } 2 / \quad 3. 11. 8 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 358. 6. 8 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 21. 10. - \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3. 11. 8 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{Lire } 383. 8. 4 \\ \hline \end{array}$$

3. D. La Libbra della cera vale lire 1. 15. 8. che valeranno Libbre 256. once 7. alla medesima ragione ?

R. Si moltiplicano Lire 1. 15. 8. per 256. con dare la decina à modo della 74. del secondo Lire 1. 15. 8. si partono per 12. e vengono Soldi 2. 11.  $\frac{2}{3}$  li quali si moltiplicano per 7. per la prima di questo, vengono Lire 1. —. 10. avvertendo, che frà Mercanti il rotto de' Denari, ò si lascia, ò si piglia per un Denaro, come si fa qui, e sommate le partite venute dal moltiplicare verranno

Lire



Lire 457. 11. 6. prezzo di Libbre 256. once 7. La prova si fa per la metà del prezzo, e per il doppio della Mercanzia, per la 88. del secondo.

$$\begin{array}{r} 178. 6. 8 \\ 17. 16. 8 \\ \text{Lire } 1. 15. 8 - 256. 7 \\ 12 \quad 2. 11 \frac{2}{3} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 356. 13. 4 \\ 89. 3. 4 \\ 10. 14. - \\ 1. - . 10 \end{array}$$

$$\text{Lire } 457. 11. 6$$

$$\begin{array}{r} 89. 3. 4 \\ 8. 18. 4 \\ \text{Lire } - 17. 10 - 513 \frac{2}{3} \\ 6 \quad 2. 11 \frac{2}{3} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 445. 16. 8 \\ 8. 18. 4 \\ 2. 13. 6 \\ 3. - \end{array}$$

$$\text{Lire } 457. 11. 6$$

### Regola seconda de' Partitori .

4. D. Quando sono due rotti nella Mercanzia, che si apprezza, come si opera ? per esempio: Il Barile del Vino vale Lire 12. 13. 4. quanto valeranno Barili 14. Fiaschi 12.  $\frac{2}{3}$  ?

R. Per la seconda de' Partitori : si partono Lire 12. 13. 4. per 20. effendo Fiaschi 20. un Barile, e vengono Soldi 12. Denari 8. prezzo d'un Fiasco; Soldi 12.8. si partono per 3. e vengono Soldi 4. 2.  $\frac{2}{3}$ . Ciascuna fila si moltiplica per il numero suo corrispondente; si sommano i prodotti, e vengono Lire 185. 7. 1. prezzo del detto Vino. La prova si faccia così; Si moltiplichino la Mercanzia come fusse prezzo, facendo Denari 8. in cambio di  $\frac{2}{3}$ . & il prezzo come fusse Mercanzia, riducendo Soldi 13. 4. in  $\frac{2}{3}$ .

$$\text{Lire } 12. 13. 4 - 14. 12. \frac{2}{3}$$

$$\begin{array}{r} 20 \quad 12. 8 \\ 3 \quad 4. 2 \frac{2}{3} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 177. 6. 8 \\ 7. 12. - \\ 8. 5. \end{array}$$

$$\text{Lire } 185. 7. 1$$

Prova.

$$14. 12. 8 - 12 \frac{2}{3}$$

$$\text{Per } 3 / \quad 4. 17. 6 \frac{2}{3}$$

$$\begin{array}{r} 175. 12. - \\ 9. 15. 1 \end{array}$$

$$\text{Lire } 185. 7. 1$$

5. D. Il cento della Lana vale Lire 57. 13. 4. che valeranno Libbre 826 ?

R. Le valutazioni delle Mercanzie per 100. appartengono a questa regola, cioè alla seconda de Partitori . Dovendosi partire Lire

Q

57.

57. 13. 4. prezzo di Libbre 100. per 10. e vengono Lire 5. 15. 4. prezzo di Libbre 10., le quali Lire si partono di nuovo per 10. e vengono Soldi 11. Denari 6.  $\frac{2}{3}$  prezzo d'una libbra. Ora si moltiplicano le file con i numeri corrispondenti, i prodotti si sommano, e vengono Lire 476. 6. 6. prezzo di Libbre 826. di Lana. Per prova a gli Scolari si faccia fare un'altra lezione simile, pigliando doppio prezzo, e la metà del numero delle Mercanzie, e così nell'altre, e verrà il medesimo prodotto.

Lire 57. 13. 4 — Libb. 826

10 5. 15. 4.  
10. 11. 6  $\frac{2}{3}$

---

461. 6. 8

11. 10. 8

3. 9. 2

---

Lire 476. 6. 6

*Prova.*

Lire 115. 6. 8 — 413

10 11. 10. 8

10 1. 3. —  $\frac{2}{3}$

---

461. 6. 8

11. 10. 8

3. 9. 2

---

Lire 476. 6. 6

6. D. Un' Argentiere ha Libbre 26. Once 5. Denari 16. a peso d'Argento mescolato con Rame, & in ogni Libbra ci sono Once 8. Denari 10. Grani 6. d'Argento fino; Si domanda quanto Argento fino sarà in dette Libbre?

R. E da sapere, che Grani 24. fanno un Denaro, Denari 24. un'Oncia, Once 12. una Libbra: che però Once 8. 10. 6. si moltiplica per 10. mettendo di sopra il prodotto di Libbre 7. Onzie. — 6. 12. si partono Once 8. 10. 6. per 12. à modo della 104. del secondo, vengono Denari 16. Grani 20.  $\frac{2}{3}$ . i quali si partono per 3. per la medesima pigliando  $\frac{2}{3}$  per Denari 16. e vengono Denari 5. Grani 14. & avanza 2. il quale i Mercanti pongono sopra una Linea, con sotto il partitore 3. dice  $\frac{2}{3}$  il qual rotto non è il suo vero, per non essersi partito  $\frac{2}{3}$ . Onde volendo il vero rotto, si moltiplica per 2. avanzato il 2. Denominatore del  $\frac{2}{3}$  e s'aggiunge 1. Numeratore del medesimo; dipoi si moltiplica per 3. partitore il Denominatore 2. del  $\frac{2}{3}$  fa 6. Denominatore, e dice  $\frac{1}{3}$  vero rotto; si potrebbe mettere  $\frac{2}{3}$ , e dopo  $\frac{2}{3}$ , e verrebbero Denari 5. Grani 14.  $\frac{2}{3}$   $\frac{2}{3}$ ; mà infilzati  $\frac{2}{3}$   $\frac{2}{3}$  per la 22. del secondo, torna  $\frac{1}{3}$  ora si moltiplichino le file per i numeri corrispondenti, i prodotti si sommino; e fanno Libbre 18. Once 7. 2. —  $\frac{1}{3}$  per l'Argento fino, che è in dette Libbre. Nel secondo esempio il numero moltiplicato si fa moltiplicante, e viene il medesimo prodotto.

*Primo*

*Primo.*

Libbre 7. — 6. 12  
 — 8. 10. 6 — 26. 3. 4  
 12      16. 20  $\frac{1}{2}$   
 3      5. 14  $\frac{1}{2}$

14. — 13. —  
 4. 2. 13. 12  
 3. 12. 6  $\frac{1}{2}$   
 11. 5  $\frac{1}{2}$

Libbre 18. 7. 2. —  $\frac{1}{8}$

*Secondo.*

Libbre 26. 3. 16. — oncie 8  $\frac{1}{10}$   
 12      2. 2. 11. 8  
 24      1. 2. 11  $\frac{1}{2}$   
 4      6. 14  $\frac{1}{2}$

19. 7. 12. 16  
 11. — 17  $\frac{1}{2}$   
 6. 14  $\frac{1}{2}$

Libbre 18. 7. 2. —  $\frac{1}{8}$

7. D. Una Serva hà di salario l'Anno Lire 23. 16. 8. avendo servito solo mesi 11. giorni 7. quanto deve avere?

R. Si partono Lire 23. 16. 8. per 12. il quoziente di Lire 1. 19. 8  $\frac{1}{2}$  è il Salario d'un mese; questo si parte per 30. il quoziente di Lire — Soldi 1. 3.  $\frac{1}{2}$  è il Salario d'un giorno. Si moltiplichino Lire 1. 19. 8  $\frac{1}{2}$  per mesi 11. e vengono Lire 21. 16. 11. e Soldi 1. 3  $\frac{1}{2}$  per 7. vengono Soldi 9. 3. i quali sommati con Lire 21. 16. 11. vengono Lire 22. 6. 2. che è quanto deve avere la serva.

Si faccia un'altra lezione per prova, pigliando la metà del Salario e doppio tempo; verrà l'istesso prodotto.

Lire 23. 16. 8 — 0. 11. 7  
 $\frac{12}{30}$       1. 19. 8  $\frac{1}{2}$   
 30      1. 3  $\frac{1}{2}$

21. 16. 11

9. 3

Libre 22. 6. 2

Lire 11. 18. 4 — 1. 10. 14  
 $\frac{12}{30}$       1. 19. 8  $\frac{1}{2}$   
 30      7  $\frac{1}{2}$

11. 18. 4

9. 18. 7

9. 13

Libre 22. 6. 2

Avvertasi, che i Mercanti non fanno conto de' sotti di Denari, e però ne meno si sono messi ne i prodotti delle moltiplicazioni, i quali importerebbero  $\frac{1}{2}$  di Denaro.

8. D. Un Mercante fallisce per Scudi 4354. Lire 4. 15. s'accorda con i Creditori di pagare à ragione di Lire 4. Soldi 12. Denari 4. per Scudo; si domanda quanti Scudi gli bisogneranno?

R. Si partano Lire 4. 12. 4. per 7. vengono Soldi 13. 2  $\frac{1}{2}$ . questi si partano per 4. vengono Soldi 3. 3  $\frac{1}{2}$  secondo lo stile de' Mercanti,

Q<sub>2</sub>

per-

pe rche in verità il rotto è  $\frac{1}{2}$ . si dia trè volte la decina all'insù à Lire 4. 12. 4. e ciascuna fila si moltiplichi per il numero corrispondente per la 76. del secondo, i prodotti sommati daranno Scudi 2872. — 1. 11. da trovarsi dal Fallito. Per prova si faccia il numero moltiplicante scambievolmente moltiplicato; partendo Scudi 4354. Lire 4. 15. per 7. i quozienti per 20. il quoziente per 3. e si moltiplichino le file per i numeri corrispondenti, lasciata la prima fila, e si sommino i prodotti, vengono Scudi 2872. — Soldo 1. Denari 11.

659. 3. 13. 4	
65. 6. 13. 4	
6. 4. 3. 4	
Scudi 4. 12. 4	4354. 4. $\frac{1}{4}$
7	13. 2. $\frac{2}{3}$
4	3. 3. $\frac{1}{2}$
1	2638. — 13. 4
	1197. 6. —
	32. 6. 16. 8
	2. 4. 9. 4
	2. 12. 9
	9. 10
Scudi 2972. — 1. 11. 11	
	Scudi 2872. — 1. 11
	Prova.
	Scudi 4354. 4. 15. — — Lire 4. 12. $\frac{1}{4}$
	7. 11. 642. — 13. 6. $\frac{5}{6}$
	20. 31. — 14. 8. $\frac{5}{6}$
	10. 2. 11. 6. $\frac{1}{2}$
	2438. 2. 14. 3
	373. 1. 16. 1
	10. 2. 11. 7

- D. L' oncia dell' Oro filato vale Lire 7. 6. 8. Quanto valeranno Libbre 5. Once 9. Denari 16. Grani 20. alla medesima ragione?
- R. Qui si moltiplicano Lire 7. 6. 8. per 12. per trovare il prezzo d'una Libbra, il quale si pone sopra, come si fa, quando si moltiplica per 10. dipoi si partono le Lire 7. 6. 8. per 24. per trovare il prezzo d'un Denaro, che sarà Soldi 6. 1.  $\frac{5}{6}$ . i quali si partono per 6. per trovare il prezzo d'un sesto, stante che  $\frac{1}{6}$  si pigliano per 20. Grani; Si moltiplichino le file per i numeri corrispondenti, i prodotti si sommano, e vengono Lire 511. 2. 10.
- La prova si faccia con operare per Castelluccio, secondo il modo 78. del secondo, pigliando Once 69. per Libbre 5. Once 9. e qui si veda, che verranno Lire 511. 2. 10.

88. Prezzo di Libbra.

Per Castelluccio.

Lire 7. 6. 8 — 5. 9. 16  $\frac{1}{2}$   
24            6. 1  $\frac{1}{2}$   
6            1. --  $\frac{2}{3}$

Lire 7. 6. 8 — on. 69. 16. 20  
24            6. 1  $\frac{2}{3}$             3. 9  
24            3.  $\frac{5}{6}$             5. 9

440. —  
66. —  
4 17. 9  
5. 1

483.  
20. 14  
2. 6  
4. 17. 9  
5. 1

Lire 511. 2. 10

511. 2. 10

Regola terza de' Partitori.

10. D. Il Moggio del Grano vale Scudi 10. Lire 4. 6. 8. che vale  
ranno Moggia 22. Sacchi 6. Staja 2.  $\frac{2}{3}$  al medesimo prezzo?  
R. Si opera per la terza de' Partitori, per doverli partire tre volte;  
e prima si partono Scudi 10. 4. 6. 8. per 8. stante che Sacchi 8.  
sono un Moggio, e vengono Lire 1. 2. 5. 10. prezzo di un Sacco.  
Si partono per 3. effendo 3. Staja ut Sacco, e vengono Lire 3. 1.  
11.  $\frac{2}{3}$ . e queste si partono per 4. e vengono Soldi 15. 5.  $\frac{3}{4}$ . si dà una  
volta la decina all'insieme, cioè si moltiplichino Scudi 10. 4. 6. 8.  
per 10. e vengono Scudi 106. 1. 6. 8. prezzo di 10. Moggia, que-  
ste file si moltiplicano per i numeri corrispondenti, e si sommano  
i prodotti; e la somma farà di Scudi 242. Lire 5. Soldi 12. pre-  
zzo del detto Grano. La prova si faccia con pigliare la metà del  
prezzo, ed il doppio del Grano, ed operando per Castelluccio  
per la 78. del secondo verranno i medesimi Scudi.

106. 1. 6. 8  
Scu. 10. 4. 6. 8 — 22. 6. 2  $\frac{1}{2}$   
8            1. 2. 5. 10  
3            3. 1. 11  $\frac{2}{3}$   
4            15. 5  $\frac{1}{4}$

Scu. 5. 2. 3. 4 — 45. 5. 2  $\frac{5}{6}$   
8            4. 12. 11            6. 3  
3            1. 10. 11  $\frac{2}{3}$             2. 5  
2            15. 15  $\frac{1}{2}$             3. 9

212. 2. 13. 4  
210. 1. 13. 4  
7. 6. 15. —  
16. 3. 11  
2. 16. 5

225  
12. 6.  
6. 15  
15. —  
3. 2. 4. 7  
3. 1. 11  
15. 6

Scu. 242. 5. 12

Scu. 242. 5. 12. —

11. D.

11. D. Il migliajo d' una Mercanzia vale Lire 156. 17. 6. che valeranno alla medesima ragione Libbre 89567?

R. Quando il migliajo della mercanzia si apprezza per Lire, Soldi, e Denari, la moltiplicazione si fa per la terza de i Partitori, per partirsi tre volte per 10. ; Si parta dunque il prezzo del migliajo per 10. cioè Lire 156. 17. 6. e verrà il prezzo del centinajo, cioè Lire 15. 13. 9. questo si parta per 10. verrà il prezzo d' una decina, cioè Lire 1. 11. 4.  $\frac{2}{3}$ . questo finalmente si parta per 10. verrà il prezzo d'una Libbra, cioè Soldi 3. 1.  $\frac{1}{2}$ . alla Mercantile, e perchè nella Mercanzia sono decine di Migliaja, si moltiplichino per 10. Lire 156. 17. 6. e verrà 1568. 15. — prezzo d'una decina di migliajo. Ora si moltiplichino ciascuna fila per il numero suo corrispondente, i prodotti sommati daranno Lire 14050. 16. 5. prezzo di Libbre 89567. Per prova si facci a modo della 78. del secondo, per Castelluccio.

1568. 15. —  
 Lire 156. 17. 6 — 89567  
 10 15. 13. 9  
 10 1. 11. 4  $\frac{2}{3}$   
 10 3. 1  $\frac{1}{2}$

12550. — —  
 1411. 17. 6  
 78. 8. 6  
 9. 8. 3  
 1. 1. 11

Lir. 14050. 16. 5

Per Castelluccio.  
 Lire 156. 17. 6 — 89. 567  
 10 15. 13. 9  
 10 1. 11. 4  $\frac{2}{3}$  Lir. 4. 9  
 10 3. 1  $\frac{1}{2}$   
 7. 5

1494  
 12480  
 75. 13  
 2. 4. 6  
 78. 8. 9  
 9. 8. 3  
 1. 1. 11

Lire 14050. 16. 5

12. D. Il migliajo della Lana vale Lire 573. 6. 8. domando il prezzo di Libbre 204?

R. Si partono Lire 583. 6. 8. per 10. e vengono Lire 58. 6. 8. prezzo d' un centinajo, i quali si moltiplicano per 2. centinaja, e vengono Lire 116. 13. 4. si partono Lire 58. 6. 8. per 10. e vengono Lire 5. 16. 8. prezzo d' una decina, i quali non si moltiplicano per essere zero nella Mercanzia, ma si partono per 10. e vengono Soldi 11. 9. prezzo d'una Libbra, i quali si moltiplicano per 4. e vengono Lire 2. 6. 8. le quali si sommano con Lire 116. 13. 4. e vengono Lire. 119. prezzo di Libbre 204.

Per

Per prova in altro modo: Lire 583. 6. 8. per la 22. del 2. sono Lire 583.  $\frac{1}{2}$ . che sono terzi 1750. per la 18. del secondo, li quali si moltiplicano per 204. Dal prodotto, si tagliano tre zeri, 357. restato si parte per 3. e vengono le Lire 119. come per l'altro modo.

Lire 583. 6. 8 — 204  
 10 58. 6. 8  
 10 5. 16. 8  
 10 11. 8  
 —————  
 116. 13. 4  
 2. 6. 8  
 —————  
 Lire 119. — —

*Prova in altro modo.*  
 583  $\frac{1}{2}$  — 204  
 —————  
 1750  
 204  
 —————  
 7000  
 3500  
 —————  
 per 3 / 357.000  
 —————  
 Lire 119.  
 —————

131 D. Uno fa il suo conto, e trova, che in certo tempo con una Lira ha guadagnato Lire 3. 16. 7. si domanda quanto averebbe guadagnato con Lire 254. 8. 4?

R. Questo è moltiplicare Lire, Soldi, e Denari via Lire, Soldi, e Denari, per fare il quale il FigateMi insegna tre modi di garbo, tutti tre assai difficili, e forse, per questo riguardo dice: Che chi sa moltiplicare Lire Soldi. e Denari via Lire, Soldi, e Denari può francamente d'Abbaco parlare, li quali modi tralascio; Chi gli vuol vedere guardi a carte 14. e 15. del suo Trattato Arimmetico. Metterò bene il suo esempio doppiamente risoluto per la seconda de' Partitori, dopo questo proposto: per risolvere il quale si partano Lire 254. Soldi 8. 4. per 20. e verranno Lire 12. 14. 5. le quali si moltiplicano poi per li Soldi 16. Le Lire 12. 14. 5. si partono per 12. e vengono Lire 1. Soldi 1. 2. 16. le quali si moltiplicano per Denari 7. siccome da prima si moltiplicano Lire 254. 8. 4. per Lire 3. i prodotti si sommano, e vengono Lire 974. 4. 1. per tale moltiplicazione, e per il guadagno che averebbero fatto Lire 254. 8. 4.

Per prova, le Lire moltiplicate si facciano scambievolmente moltiplicanti; e s'operi con dare due volte il 10, all'insieme, e con moltiplicare per i numeri corrispondenti, e verranno Lire 974. 4.

Lire

Lire 254. 8. 4 — Lir. 3. 36. 7.

So 12. 14. 5  
12 1. 1. 2  $\frac{1}{2}$

763. 5. —  
203. 10. 8  
7. 8. 5

Lire 974. 4. 1

382. 18. 4

38. 5. 10

Lire 3. 16. 7. 0 Lir. 854. 8. 4

20 3. 9  $\frac{1}{2}$   
12 3  $\frac{1}{2}$

765. 16. 8

191. 9. 2

15. 6. 4

1. 10. 7

1. 3

Lire 974. 4. —

**1° Esempio del Figatelli** è di moltiplicare Lire 3. 10. 8. via Lire 4. 5. 9. Si partono Lire 3. 10. 8. per 10. vengono Soldi 3. 6.  $\frac{2}{3}$ . li quali si partono per 2. (perche Denari 6. che sono  $\frac{6}{12}$  di Soldo, è  $\frac{1}{2}$  schifato: siccome nella seconda Lezzione Denari 8. sono  $\frac{2}{3}$ . ma chi non schifasse allora bisognerebbe partire per 12.) e verranno Soldi 1. 9.  $\frac{1}{3}$ . e moltiplicate le file per i numeri corrispondenti, e sommati i prodotti, si averanno Lire 15. 2. 1.  $\frac{1}{3}$ . Ognuno può conoscere quanto sia facile questa operazione in riguardo de i modi del Figatelli.

Lire 3. 10. 8 — 4. 5.  $\frac{1}{2}$

20 3. 6  $\frac{2}{3}$   
3 1. 9  $\frac{1}{3}$

14. 2. 8

17. 8

1. 9  $\frac{1}{3}$

Lire 15. 2. 1  $\frac{1}{3}$

Lire 4. 5. 6 — 3. 10.  $\frac{2}{3}$

20 4. 3  $\frac{1}{3}$   
3 1. 5  $\frac{2}{3}$

12. 16. 6

2. 2. 9

2. 10  $\frac{2}{3}$

Lire 15. 2. 1  $\frac{1}{3}$

**14. D.** Si possono moltiplicare in altro modo Lire, Soldi, e Denari, via Lire, Soldi, e Denari?

**R.** Benchè il terzo modo del Figatelli sia laborioso per suo detto, e per mio quasi impraticabile, tuttavia viene da me alquanto facilitato; e perchè si conosca, mi risolvo di mettere prima il suo modo.

Prima bisogna sapere, dice egli, che

A moltiplicare Lire con Lire, si producono Lire.

A moltiplicare Soldi con Lire, si producono 20 esimi di Lira.

A mol-



A moltiplicare Soldi eo Soldi, si producono 400 esimi di Lira,  
 A moltiplicare Denari con Lire, si producono 240 esimi di Lira.  
 A moltiplicare Denari con Soldi si producono 4800 esimi di Lira.  
 A moltiplicare Denari con Den. si producono 57600 esimi di Lire.  
 A noi si moltiplica come si fa con Pertiche, Piedi, & once.

Lire 4  $\times$  5  $\times$  6

Lire 3  $\times$  10  $\times$  9

Lire 12.  $\frac{33}{20}$   $\frac{30}{400}$   $\frac{301}{240}$   $\frac{100}{480}$   $\frac{48}{57600}$

Cavando gl' interi, e schisando i rotti, si averanno Lire 14.  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   
 $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$  quali rotti tutti sono parte di Lira, e però  
 sommati insieme fanno Lire 15. Soldi 1.  $\frac{1}{2}$ .

Modo da me facilitato; e reso praticabile. Bisogna sapere che:

A moltiplicare Lire con Lire, vengono Lire.

A moltiplicare Lire con Soldi vengono Soldi.

A moltiplicare Lire con Denari, vengono Denari.

A moltiplicare Soldi con Soldi, vengono 20. esimi di Soldo.

A moltiplicare Soldi con Denari, vengono 20 esimi di Denaro.

A moltiplicare Den. con Den. vengono 12 esimi di 20 esimo di Den.

Si moltiplichino Lire 6. di sotto

Lire 6. 10. 10

via 10. Denari di sopra, e ven-

Lire 6. 10. 10.

gono Denari 60. cioè Soldi 5.

Pure Lire 6. via Soldi 10. di so-

39. 5. 0

pra, vengono Soldi 60. con

3. 5. 5

Soldi 5. di prima, Soldi 65.

5. 11.

si segna 5. sotto i Soldi, e si ten-

Lire 42. 15. 10  $\frac{1}{2}$

gono à mente Lire 3. per Soldi

60. Pure Lire 6. via Lire 6. ven-

gono Lire 36. aggiunte Lire 3. di prima fanno Lire 39, che si seg-

gnano sotto le Lire, & è finita la prima fila.

Ora si moltiplichino Soldi 10. di sotto via Denari 10. di sopra, vengono 100. ventefimi di Denari, che partiti per 20. vengono Denari 5. che si segnano nella seconda fila. Pure Soldi 10. via Soldi 10. vengono 100. ventefimi di Soldo, che partiti per 20. vengono Soldi 5. li quali si segnano; Si moltiplicano Soldi 10. via Lire 6. di sopra, vengono Soldi 60. cioè Lire 3. che si segnano, & è finita la seconda fila.

Finalmente si moltiplicano Denari 10. via Denari 10. vengono 100. dodicesimi di ventefi mo di Denari, che partiti per 20. vengono  $\frac{1}{2}$  di Denari, che si segnano. Pure Denari 10. via Soldi 10. di sopra, vengono 100. ventefimi di Denari, che partiti per 20. ven-

R

gono

sono Denari 5. li quali si segnano nella terza fila; Finalmente si moltiplicano Denari 10. via Lire 6. di sopra, vengono Denari 60. cioè Soldi 3. che si segnano. Si sommano le tre file, e vengono Lire 42. 15. 10.  $\frac{1}{2}$ . Nell'Esempio del Figatelli, si opera come in questo; benché ci sia qualche difficoltà di più.

15. D. Come si opera nell'Esempio del Figatelli, per dichiarare le difficoltà che ci vengono.

R. Per Lire 3. si moltiplicano  
 Denari 6. fanno Denari 18. si  
 segnano Denari 6. Soldo 1. si  
 tiene a mente; Per Lire 3. si  
 moltiplicano Soldi 7. fanno  
 Soldi 15. che con Soldo 1. tenuto  
 a mente, sono Soldi 16. li  
 quali si segnano. Pure per Lire  
 3. si moltiplicano Lire 4. fanno

Lire 12. 5. 6

Lire 3. 10. 8.

Lire 12. 16. 6

2. 2. 9

2. 10  $\frac{1}{2}$

Lire 15. 2. 1  $\frac{1}{2}$

Lire 12. che si segnano, & è finita la prima fila.

Per Soldi 10. si moltiplicano Denari 6. fanno 60. ventefimi di Denari, che partiti per 20. sono Denari 3. che si tengono a mente;

Per Soldi 10. si moltiplicano Soldi 5. fanno 50. ventefimi di Soldo, che partiti per 20. sono Soldi 2. li quali si segnano, e Denari 6. che con Denari 3. tenuti a mente, sono Denari 9. li quali pure si segnano sotto i Denari; Per Soldi 10. si moltiplicano Lire 4. fanno Soldi 40. cioè Lire 2. le quali si segnano, & è finita la seconda fila.

Per Denari 8. si moltiplicano Denari 6. fanno  $48$  di Denaro per 48. schisato  $\frac{1}{2}$  il quale si segna; Per Denari 8. Soldi 5. fanno 40. ventefimi di Denari; che partiti per 20. sono Denari 2. che si tengono a mente. Finalmente per Denari 8. si moltiplicano Lire 4. fanno Denari 32. cioè Soldi 2. Denari 8. li quali con Denari 2. tenuti a mente sono Denari 10. che si segnano, & ancora Soldi 2. & è finita la terza fila, le quali file sommate fanno Lire 15. 2. 1.  $\frac{1}{2}$ . come si vede.

16. D. Come si moltiplicano Scudi, Lire, Soldi, e Denari via Scudi, Lire, Soldi, e Denari, per esempio.

Un Mercante trova avere guadagnato Scudi 2. Lire 5. 7. 8. per Scudo in certo traffico: Si vuol sapere quanti Scudi averà guadagnato con Scudi 134. 3. 12. 4.

R. Si opera per la 3. de i Partitori. Si partono Scudi 134. Lire 3. 12. 4. per 7. e vengono Scudi 19. 1. 10. 4. le quali si partono per 20. e vengono Lire 6. 14. 6.  $\frac{1}{2}$  quali si partono per 12. e vengono Soldi 11. 2.  $\frac{1}{2}$ . Ora ciascuna fila si moltiplica per il numero corri-

corrispondente: Si sommano i prodotti, e vengono Scudi 372. 3. 7. 7. che averà guadagnato il Mercante; Per prova si faccia un'altra lezione, mutando li Scudi moltiplicati in moltiplicanti, e dando due volte il 10 all'insù, s'opera del resto come nella prima.

**Prima.**

Scu. 134. 3. 12. 4	—	Sc. 25. 7. 8
7	19. 1. 10. 4	
20	6. 14. 6 $\frac{2}{3}$	
12	11. 2 $\frac{1}{2}$	
<hr/>		
269. 0. 4. 8		
96. 0. 11. 8		
6. 5. 1. 7		
4. 9. 8		
<hr/>		
Scu. 372. 3. 7. 7		
<hr/>		

276. 6. 6. 8	
27. 4. 16. 8	
Scu. 2. 5. 7. 8	Sc. 134. 3. 12. 4
7	2. 15. 4 $\frac{2}{3}$
20	2. 9 $\frac{1}{2}$
12	2 $\frac{1}{2}$
<hr/>	
276. 6. 6. 8	
83. 0. 10. 0	
11. 0. 10. 8	
1. 1. 6. 8	
1. 13. 2	
<hr/>	
11	
<hr/>	
Sc. 372. 3. 7. 7	
<hr/>	

17. D. Un' Argentiere mescola tanto Rame con Libbre 45. once 7. Denari 9. Grani 18. d'Argento puro, che trova, che una Libbra d'Argento puro è tornata Libbre 1. once 5. Denari 10. Grani 16. si cerca quanto faranno tornate le dette Libbre con il Rame?

R. Si opera nel modo della 6. di questo per la terza de i Partitori; Si partono dunque Libbre 45. 7. 9. 18. per 12. vengono Libbre 3. 9. 14. 19  $\frac{1}{2}$ . li quali si partono per 24. e vengono once 1. 24. 14  $\frac{1}{2}$ . che si partono per 24. e vengono Denari 11. 21  $\frac{1}{2}$ . alla Mercantile, le quali quattro purette si moltiplicano per i quattro numeri corrispondenti, e si averanno Libbre 66. once 3. Denari 8. Grani 8. d'Argento mescolato nella somma de i prodotti.

Per prova si faccia una seconda operazione facendo le Libbre moltiplicate moltiplicanti, e dando una volta il 10. all'insù, cioè moltiplicando Libbre 1. once 5. 10. 16. per 10. e partendole per 12. per 24. e per 4. stante, che schifati  $\frac{1}{4}$  sono  $\frac{1}{4}$  per i Grani 18. i risultati si moltiplichino per i numeri corrispondenti, avvertendo di porre gl'avanzi sopra 24. à i Grani, sopra 24. à i Denari, e sopra 12. all'once, e si sommano i prodotti, e verranno Libbre 66. 3. 18. 8. come per la prima.

R 2 Lib-

Lib. 45. 7. 9. 18 — Lib. 1. 5. 10. 16

14. 6. 10. 16

12 3. 9. 14. 19  $\frac{1}{2}$ Lib. 1. 5. 10. 16 — L. 45. 7. 9  $\frac{1}{2}$ 24 1. 21. 14  $\frac{1}{2}$ 18 1. 10. 21  $\frac{1}{2}$ 24 1. 21. 14  $\frac{1}{2}$ 24 1. 10. 21  $\frac{1}{2}$ 

24 8

45. 7. 9. 18

19. 0. 2. 1

1. 7. 0. 4

1. 6. 9

3 58. 1. 18. 16

7. 3. 5. 8

10. 4. 5

113. 2

1. 1

Lib. 66. 3. 18. 8

Lib. 66. 3. 18. 8

18. D. Molto bene torna la prova a cambiare i numeri da moltiplicarsi in numeri moltiplicanti; si può fare questo, quando si valutano Mercanzie?

R. Quando nelle Mercanzie non ci sono rotti, sapendo la regola de' Partitori, non solo si può, ma a gli Scolari è bene farla fare per esercizio. Nella 74. del secondo si propone.

Libbre 24076. quanto valeranno a Lire 1.15.4. la Libbra? ed operato per il 10, all'insù, come si dice in Fiorenza; Vennero Lire 42534. 5. 4. Ma ora ponendo Libbre 24076. come Lire e 1.15.4. come Mercanzia; si operi per la seconda de' Partitori a modo della quarta di questo; cioè si parta 24076. per 20. riducendo l'avanzo in ventesimi, Soldi: vengono 1203. Soldi 16. e quasi per 12. pure riducendo l'avanzo in Soldi, e Denari, vengono 100. 6. 4. le file si moltiplichino per li numeri corrispondenti verranno le medesime Lire 42534. 5. 4. prezzo di Libbre 24076. A.

Nella 76. del secondo si propone: La Libbra della Seta vale Scudi 3. Lire 2. 16. 8. che valeranno Libro 256.?

Si pigliano 256. per Scudi, si pongano dirimpetto 3. 2.  $\frac{1}{2}$ . essendo  $\frac{1}{2}$ . di Lire, Soldi 16. e 8. per la 22. del secondo, e si operi come per la 8. di questo e verranno Sc. 871. 4. 6. 8. prezzo di Lib. 256. B.

★ 23076. 0. 6 — 1. 15. 4. B

256. 0. 0 — 3. 2  $\frac{1}{2}$

20 1203. 16. 0

7 36. 4

12 100. 6. 4

6 6. 0. 18. 4

24076

768.

18057

73. 11

401. 5. 4

36. 31. 6. 8

Lire 42534. 5. 4

Scudi 871. 4. 6. 8

Nella



**Lire 457.11.6**

## Live

Lire 29. 14. 8 — Lib. 482. 10. 16. 15.

12    2. 9. 6  $\frac{1}{2}$     24. 2.  
24    2. 0  $\frac{1}{2}$     2. 0. 2  
24    ————

4338

9640

337. 8

16. 1. 4

24. 15. 7

1. 13. 0

1. 3

14357. 19. 1

4828. 18. 2. 2

482. 17. 9  $\frac{1}{2}$  29  $\frac{1}{2}$

15. ———— 32. 3. 10  $\frac{1}{2}$

9657. 16. 5

4346. 0. 4

354. 2. 4

Li. 14357. 19. 1

**Avvertasi**, che quando, oltre i Denari ci è rotto, come nell'Esempio L. cioè  $\frac{1}{2}$  si dà il 10. all'insù al 5. Numeratore, e si parte il prodotto per 6. Denominatore, e vengono Denari 8. ed avanza 2. che si pone sopra, intendendosi, che abbia il Denominatore 6. **Es.** 22. D. Si trova altra industria nel moltiplicare Mercanzie con rotta, per Moneta in altre Monete inferiori divisa?

**R.** Si può alle volte usare questa, che con la passata industria ancora rende l'operazione breve; cioè di moltiplicare la Moneta, ovvero i numeri della Mercanzia, presi come di Moneta, per il numero intero della Mercanzia, ò preso come tale, accresciuto di una unità, per i rotti, che si lasciano, con sottrarre quella parte di più del prodotto, acciò resti il vero prodotto della moltiplicazione, che si cerca; per esempio: La Libbra di alcuna Mercanzia vale Lire 5. 14. 4. che valeranno Libbre 826. Once 10.  $\frac{1}{2}$ ?

Per l'industria passata, si pigliano Libbre 826. per Lire; Once 10.  $\frac{1}{2}$  si rechino in Soldi 18. Denari 6. per la 19. di questo, li quali si moltiplichino per 6. in cambio di 5. 18. 4. e vengono Lire 2961. 5. da questo prodotto si sottrino Lire 68. Soldi 18. Denari 1.  $\frac{1}{2}$  che è  $\frac{1}{2}$  di 826. 17. 6. e resteranno Lire 4892. 6. 10.  $\frac{1}{2}$  vero prodotto e prezzo di Libbre 826. Once 10.  $\frac{1}{2}$ . à Lire 5. 18. 4. la Libbra.

La passata industria fà, per dir così, da me indovinata nel Glorioso Arismetico del Pisani à carte 92. e 93. ne i seguenti Esempj, senza Digressione.

Se Libbra 1. di Seta vale Lire 11. 18. quanto vagliono Libbre 251.  $\frac{1}{2}$ ?

Se Mar-

Se Marca 1. d' Argento vale Lire 36.  $\frac{1}{4}$ . quanto va gliono Marche  
15.  $\frac{1}{4}$ ?

251. 17. 11

11. 18

3022. 15

25. 3. 9

Lire 2997. 11. 3

15. 16. 8

36. 17. 6

590.

6. 2. 11

Lire 583. 17. 1

Nel primo Esempio, Libbre 251. sono prese per Lire;  $\frac{1}{4}$  di Libbra sono ridotti in Soldi 17. Denari 11. che moltiplicate per 12. cioè per  $\frac{1}{4}$  di più, sono venute Lire 3022. 15. dalle quali sono sottratte Lire 25. 3. 9. che è  $\frac{1}{4}$  di 250. 17. 11: e sono rimaste Lire 2997. 11. 3. prezzo cercato.

Nel secondo Esempio, Lire 36. 17. 6. sono moltiplicate per 16. cioè per  $\frac{1}{4}$  di più, e sono venute Lire 590. dalle quali sono state sottratte Lire 6. 2. 11. che è  $\frac{1}{4}$  di Lire 36. 17. 6. e sono restate Lire 583. 17. 1. prezzo di Marche 15  $\frac{1}{4}$ .

23. D. Come si fanno le moltiplicazioni di misure di Terreno?

R. Benchè di queste moltiplicazioni pensassi dire nel Trattato di Geometria pratica; ad ogni modo considerando, che tali moltiplicazioni appartengono alla regola de' Partitori, mi risolvo di apportare alcune moltiplicazioni di misure di Terreno, secondo la pratica di Firenze, dalle quali s'averà il modo facile; e breve per la regola de' Partitori, di moltiplicare le misure di Terreno di qualsivoglia Paese, il quale da altri non è stato usato.

Gl'Agrimenfori, o Misuratori di Campi adoprano una misura detta Canna di braccia 6. da Terra di lunghezza, le quali braccia 6. moltiplicate via braccia 6. fanno braccia 36. quadrate, che sono una Canna quadrata, e Canne 48. quadrate sono uno Stajoro.

Pure si divide lo Stajoro in 12. Padora, un Panero in 12. Pugnori, e finalmente un Pugnoro in 12. Braccia quadrate da Terra.

Per l'esempio; sia un Prato rettangolo, che il lato maggiore contiene Canne 154. Braccia 3.  $\frac{1}{4}$ . ed il minore Canne 18. Braccia 4.  $\frac{1}{4}$ . Si domanda quante Stajora, Panora, Pugnora, e Braccia quadrate di Terreno contiene detto Prato.

Modo comune è ridurre Canne 154. in braccia, con moltiplicarle per 6. aggiungendo Braccia 3. faranno Braccia 927. queste si moltiplicheranno per 2. aggiungendo 1. e faranno mezze braccia 1855. Pure ridotte Canne 18. in Braccia, moltiplicando per 6. aggiungendo



137

gendo 4. faranno Braccia 112. e queste si moltiplicano per 4. giungendo 3. faranno 451. quar. di braccio . Ora si moltiplichi 1855. via 451. fa 836605. il quale partito per 8. a conto d' emezi, e quarti, vengono Braccia quadre 104375. le quali partite per 12. vengono Pugnora 8714. Braccia quadre 7. le quali partite per 12. vengono Panora 726. Pugn. 2. e Braccia quadre 7. e finalmente per 12. vengono Stajora 60. Panora 6. Pugnora 2. e Braccia quadre 7. per la tenuta di detto Prato .

Canne 154 Braccia  $3 \frac{2}{3}$  — Can. 18. Bracc.  $4 \frac{1}{2}$

927	112
1855	451 — 1855
	1855
	9275
	7420
	per 8 836605
	per 12 104375
	per 12 8714. 7
	per 12 726. 2. 7
	Stajora 60. 6. 2. 7

24. D. Come si moltiplicano queste misure per regola de' Partitori?

R. Le Canne 154. Braccia  $3 \frac{2}{3}$ . le Braccia , e rotto si rechino in 12 esimi , e faranno 7. come se fossero Panora ; per la 20. e 22. del secondo si ponga zero per le Pugnora , e zero per le Braccia quadre ; dirimpetto si pongano Canne 18. Braccia  $4 \frac{1}{2}$ . e si opera per la seconda de' Partitori a modo della 4. di questo , partendo per 6. a conto delle braccia , e per 4. si moltiplicano le file per i numeri corrispondenti , i prodotti si sommano , e la somma si parte per 12. e l' avvenuto per 4. e verranno Stajora 60. Panora 6. Pugnora 2. e Braccia quadre  $7 \frac{1}{2}$ .  
 Pure Canne 18. Braccia  $4 \frac{1}{2}$ . Se braccia  $4 \frac{1}{2}$  si ridurranno come in Panora , e Pugnora , verranno Panora 9. Pugnora 6. con dirimpetto Canne 154. Braccia  $3 \frac{2}{3}$ . operando per la seconda de' Partitori , come l' altra , si averà l'istesso prodotto di Stajora 60. Panora 6. Pugnora 2. e Braccia quadre  $7 \frac{1}{2}$ .

S

Canne

$\begin{array}{r} 11 \ 11 \ 11 \\ \text{Canne } 154. \ 7. \ 0. \ 0. \text{ --- } 18. \ 4 \frac{1}{2} \\ \text{per } 6 \ 25. \ 9. \ 2. \\ \text{per } 4 \ 6. \ 5. \ 3. \ 6. \\ \hline 29821. \ 6. \ 0. \ 0. \\ 203. \ 0. \ 8. \ 0. \\ \hline 19. \ 3. \ 10. \ 6. \\ \hline \text{p. } 12. \ 2904. \ 10. \ 6. \ 6. \\ \text{per } 4 \ 242. \ 0. \ 10. \ 6. \\ \text{Stajora } 60. \ 6. \ 2. \ 7 \frac{1}{2} \end{array}$

$\begin{array}{r} 11 \ 11 \ 11 \\ \text{Canne } 187. \ 11. \ 0. \ 0. \\ \text{per } 6 \ 3. \ 1. \ 7. \ 0 \\ \text{per } 2 \ 1. \ 6. \ 9. \ 6 \\ \hline 2818. \ 9. \ 0. \ 0 \\ 75. \ 2. \ 0. \ 0 \\ 9. \ 4. \ 9. \ 0 \\ 1. \ 6. \ 9. \ 6 \\ \hline \text{p. } 12. \ 2904. \ 10. \ 6. \ 6 \\ \text{per } 4 \ 242. \ 0. \ 10. \ 6 \\ \text{Stajora } 60. \ 6. \ 2. \ 7 \frac{1}{2} \end{array}$

Quei rottiz che seguono alle Canne sono 12. esimi di Canna, e gli altri 12. esimi di 12. esimo, e non Panora, ne Pugnora: mà à quella similitudine, perche nel fine hanno à venire quelle misure. Nel Secondo Bsempro si è dato una volta il 10. all' in sù, il prodotto si è moltiplicato per 15. benchè si poteva dare un' altra volta, e moltiplicare per 1. e per 5.

25. D. Dovendo moltiplicare alle volte Stajora, Panora, Pugnora, e Braccia quadre via Stajora, Panora, &c. come si opera?

R. Si può operare secondo il seguente modo insegnato da Fr. Luca nella Geometria pratica *car. 7. Dist. pr. cap. 5.* Mà prima si deve sapere che moltiplicando Braccia via Braccia vengono Braccia, via Pugnora, vengono Pugnora, via Panora vengono Panora, via Stajora vengono Stajora. Moltiplicando Pugnora via Pugnora vengono Panora, via Panora vengono Stajora, via Stajora, per ogni unità 12. Stajora. Moltiplicando Panora

via Panora fanno per ogni unità 12. Stajora, e via Stajora fanno per ogni unità 144. Stajora; e finalmente moltiplicando Stajora via Stajora,

fanno per ogni unità 1728. Stajora. Pongo il suo Bsempro di moltiplicazione.

Si dice Braccia 4. via Braccia 4. fanno Braccia 16. cioè 1. Pugnora, e Braccia 4. li quali si segnano; Poi Braccia 4. via 4. Pugnora fanno 16. Pugnora;

$\begin{array}{r} \text{Stajor. Panor. Pugn. e Brac. Q.} \\ 2. \quad 3. \quad 4. \quad 4 \\ 2. \quad 3. \quad 4. \quad 4 \\ \hline \quad \quad \quad 1. \quad 4 \\ \quad \quad 2. \quad 8. \quad \text{---} \\ 3. \quad 4. \quad \text{---} \quad \text{---} \\ 40. \quad \text{---} \quad \text{---} \quad \text{---} \\ 300. \quad \text{---} \quad \text{---} \quad \text{---} \\ 1728. \quad \text{---} \quad \text{---} \quad \text{---} \\ 6912. \quad \text{---} \quad \text{---} \quad \text{---} \\ \hline 8983. \quad 6. \quad 9. \quad 4 \\ \text{Un' ala} \end{array}$

un'altra volta in croce, Braccia 4. via 4. Pugnora fanno 16. Pugnora, che aggiunte a 16. Pugnora di Prima fanno Pugnora 32. cioè Panora 2. e Pugnora 8. le quali si segnano; Dipoi Braccia 4. via 3. Panora fanno 12. Pan., & in croce, altre 12. Panora fanno 24. Panora; & à queste s'aggiungano 16. Pan. prodotto di 4. Pugnora via 4. Pugnora fanno 40. Panora; cioè 3. Stajora, e 4. Panora, le quali si segnano. Dipoi moltiplica Braccia 4. via Stajora 2. fanno Stajora 8. in croce, sono Stajora 16. & à queste s'aggiungano Stajora 24. prodotto di 4. Pugnora via 3. Panora in croce, fanno Stajora 40. che si segnano. Dipoi 4. Pugnora via 8. Stajora fanno 16. & aggiunto 9. prodotto di 3. Panora, via 3. Panora, sono 25. volte 12. Stajora; cioè Stajora 300. le quali si segnano. Dipoi moltiplica 5. Panora via 2. Stajora, & in croce, vengono 12. volte 144. Stajora; cioè 1728. Stajora, le quali si segnano; & finalmente moltiplica 2. Stajora via Stajora fanno 4. volte 1728. Stajora; cioè 6912. Stajora, le quali si segnano, e si sommano i prodotti, sono Stajora 8983. Panora 6. Pugnora 9. e braccia 4. per tale moltiplicazione.

Questo è modo industrioso, e bello, per crocetta, ma è difficile per averli à tenere à mente. Il seguente modo però è leggiadro, & assai facile.

26. D. Come si opera nel medesimo Esempio di Fr. Luca?

R. Si pongano Stajora 2. Panora 3. Pugnora 4. e Braccia 4. e dirimpetto pure Stajora 2. Panora 3. Pugnora 4. e Braccia 4. Le prime misure si moltiplicano per 12. cominciando dalle Braccia 4. ponendo gl'avanzi sopra 12. e per ogni 12. s'aggiunge 1. al prodotto della seguente misura superiore, à quella guisa, che si dà il 10. all'insù, qui si dà il 12. come nella 74. del secondo si insegnò; Si moltiplichino dunque Braccia 4. per 12. fanno Braccia 48. cioè Pugnora 4. e Braccia zero; di nuovo si moltiplicano Pugnora 4. per 12. fanno Pugnora 48. con pugnora 4. di prima sono Pugnora 52. cioè Panora 4. e Pugnora 4. le quali Pugnora 4. si segnano sopra; Di nuovo si moltiplicano Panora 3. per 12. fanno Panora 36. con Panora 4. di prima, Panora 40. cioè Stajora 3. e Panora 4. si segnano Panora 4. di sopra, e finalmente si moltiplicano Stajora 2. per 12. fanno Stajora 24. con 3. di prima sono 27. le quali si segnano; Nell'istesso modo S 2

3940. 0. 0. 0

328. 4. 0. 0

27. 4. 4. 0

Stajora 2. e 3. 4. 4. - St. 2. 3. 4. 4

780. 0. 0. 0

885. 0. 0. 0

109. 5. 4. 0

9. 5. 5. 4

8983. 6. 9. 4

fi dà

si dà il 12. all'insù due altre volte, cioè si moltiplica per 12. e la terza fila sono Stajora 328. e la quarta Stajora 3940. , le quali si moltiplicano per Stajora 2. e fanno Stajora 788. le quali si segnano sotto; La terza fila, cioè Stajora 3280. si moltiplicano per Panora 3. fanno Stajora 985. le quali si segnano sotto 7880. La seconda fila si moltiplica per Pugnora 4. e la prima per Braccia 4. segnando sotto i prodotti, li quali si sommano, e fanno Stajora 8983. 6. 9. 4. come nell' Esempio appare.

27. D. Volendo operare nel detto modo, quando il Terreno è misurato à Canne, come si deve fare?

R. Si riducano le Canne in quest' altre misure, che si fa facilmente; perche pigliando la metà delle Canne sono Pugnora, la ragione è, perche la Canna con la quale si misura è di braccia 6. onde tornando all'esempio di sopra; Canne 154. Braccia 3.  $\frac{2}{3}$ . ridotte, sono Panora 6. Pugnora 5. le braccia restano l'istesse, cioè 3.  $\frac{2}{3}$ . perche la metà di 154. è 77. che sono Pugnora, che partite per 12. vengono Panora 6. Pugnora 5. Medesimamente Canne 18. Braccia 4.  $\frac{1}{2}$ . la metà di 18. è 9. che sono Pugnora, le quali Pugnora 9. Braccia 4.  $\frac{1}{2}$ . poste dirimpetto à Panora 6. Pugnora 5. Braccia 3.  $\frac{2}{3}$ . e queste misure moltiplicate per 12. con porre gl' avanzi sopra 12. e per ogni 12. portare 1. al prodotto seguente, come di sopra hò detto, vengono Stajora 6. Panora 5. Pugnora 3. e Braccia 6. le quali misure si moltiplicano per Pugnora 9. come per numero semplice, il che si doveva avvertire anche di sopra, e verranno Stajora 57. 11. 7. 6. e per Braccia 4. si moltiplicano Panora 6. Pugnora 5. Braccia 4.  $\frac{2}{3}$ . e verranno Stajora 2. 1. 9. 2. si partono Panora 6. Pugnora 5. Braccia 3.  $\frac{2}{3}$ . per 4. e verranno Panora 1. 7. 3.  $\frac{1}{4}$ . li quali si moltiplicano per 3. Numeratore de' quarti, e verranno Panora 4. 9. 11.  $\frac{1}{4}$ . li quali prodotti si sommano per la 41. del secondo, faranno Stajora 60. 6. 2. 7.  $\frac{1}{4}$  e tante verranno nel secondo Esempio, nel quale si dà due volte 12. all' insù.

*Primo Esempio.*

Stajora	6.	5.	3.	6	Pug.
4	6.	5.	3	$\frac{2}{3}$	— 9. 4 $\frac{1}{2}$
	1.	7.	3	$\frac{1}{4}$	
	57.	11.	7.	6	
	2.	1.	9.	2	
	4.	9.	11	$\frac{1}{4}$	
Stajora	60.	6.	2.	7	$\frac{1}{4}$

Stajora	9.	4.	9. 0
2	9.	4.	9
	0.	0.	9. 4 $\frac{1}{4}$ — 6. 5. 3 $\frac{2}{3}$
		4.	8 $\frac{1}{4}$
	56.	4.	6. 0
	3.	10.	11. 9
	2.	4.	2 $\frac{2}{3}$
		4.	8 $\frac{1}{4}$
Stajor.	60.	6.	2. 7 $\frac{1}{4}$

**DISTIN**

# DISTINZIONE SECONDA 141

## *Del Partire à Danda con Rotti nel Partitore .*

**D**Opo aver trattato delle Regole de' Partitori, con le quali sapendosi il prezzo d'una Mercanzia, si trova il prezzo di più Mercanzie accompagnate con rotti, per via di moltiplicazione; Adesso bisogna trattare dell'operazione opposta, cioè del partire à Danda con rotti, che serve di prova certa al moltiplicare con Rotti; perche sapendosi il prezzo di più Mercanzie con Rotti, per mezzo del Partire si trova il prezzo d'una Mercanzia.

**28. D.** Si spesero Lire 383. 8. 4. in Canne 26. Braccia 3. di Panno, si vuol sapere quante Lire si spesero in una Canna?

**R.** Questa è l'opposta della Domanda seconda della passata Distinzione. Ivi si cercò il prezzo di Canne 26. Braccia 3. sapendosi il prezzo d'una Canna di Lire 14. 6. 8. e fu trovato il prezzo Lire 383. 8. 4. Qui sapendosi di più Canne, si cerca d'una, e però si devono partire Lire 383. 8. 4. per Canne 26. Braccia 3. e per fare questo è di bisogno moltiplicare il numero della Mercanzia, per il Denominatore delle parti della minor misura, ò peso nominato nel quesito, e per il Denominatore delle parti si moltiplicano le Lire, Soldi, e Denari, e poi si fa il partire; Duque Canne 26.  $\frac{3}{4}$  si moltiplicano per 4. per la 65. del secondo, e fanno Canne 107. Ora per 4. si moltiplicano Lire 383. 8. 4. per 4. ancora, e vengono Lire 1533. 13. 4. si partono per 107. per la 77. del primo, vengono Lire 14. ed avanzano Lire 35. che moltiplicate per 20. con l'aggiunta di Soldi 12. sono Soldi 713. li quali si partono per 167. vengono Soldi 6. ed avanzano Soldi 71. li quali si moltiplicano per 12. con aggiungere Denari 4. fanno Denari 856. li quali si partono per 107. e vengono Denari 8. sicchè il quoziente è di Lire 14. Soldi 6. 8. prezzo d'una Canna, che si cercava, e così si opererà nell'altre simili Domande.

	Canne	26. 3	—	Lire	383. 8. 4. — 4
		4			
		—————			1533. 13. 4.
Partitore		107			463.
		—————			35. — 20
Quoziente Lire		14. 6. 8			—————
					713
					71 — 12
					—————
					856

Gio: Bat-

Gio: Battista Padi nel Menarile Arimmetico, da carte 60. fino a 94. insegna, e vuole che si riducano le Lire in Soldi, e i Soldi in Denari, e che il Partitore si riduca in parti 10. esime, e 2. esime, ma ciò non è d'uopo, ed allunga l'operazione, come si può osservare nella passata, e nelle seguenti lezioni, perchè il quoziente viene della Moneta, che è partita; e però si può lasciare così.

29. D. Per qual causa valendo Canne 26. Braccia 3. Lire 383. 8. 4. e non partendosi queste per Canne 26. 3. ma le ridotte Lire 1533. 13. 4. per Canne 107. viene il prezzo d'una Canna alla medesima rata?

R. La ragione è perchè Canne 26.  $\frac{1}{4}$  stanno nella medesima proporzione a Lire 383. 8. 4. che Canne 107. a Lire 1533. 13. 4. come può essere manifesto per la proposizione 19. del settimo d'Euclide; onde ne segue che a partire il secondo numero proporzionale, per il primo, ne viene il medesimo quoziente, che a partire il quarto per il terzo come è chiaro in questi quattro numeri proporzionali 2. 8. 3. 12. sicchè partendo .8. per 2. viene 4. come a partire 12. per 4. Questa ragione vale nelle seguenti lezioni ancora, perchè i numeri con rotti stanno nella medesima proporzione, che i numeri ridotti senza frazione.

30. D. Sono state comprate Libbre 56. once 7. di Seta colorata per Lire 1348. 11. 8. si domanda quanto sia stata pagata una Libbra?

R. Libbre 56. once 7. si moltiplicano Libbre 56. per 12. 12 12  
ed al prodotto si aggiungono once 7. fanno 679. 679 — 16183. 0. 0  
Partitore; Si moltiplica L. 23. 16. 8 2603.  
no Lire 1348. 11. 8. per 12. 566. — 20  
e vengono Lire 16183. le  
quali si partono per 679. e  
vengono Lire 23. 16. 8.  
prezzo d'una Libbra, per  
la ragione passata.

Bar. 46. 7. — Lire 1385. 7. 9 / 16

16	22166. 4 —
743	7306
	619 — 20
Lire 29. 16. 8	21384
	4954
	496 — 18
	5552
	8

31. D. Un Battore di Villa ha venduto Barili 46. Fiaschi 7. d' Olio, per Lire 1385. Soldi 7. Denari 9. si domanda quanto l'ha venduto il Barile?

R. Per essere un Barile d'Olio 16. Fia-

16. Fiaschi, si moltiplicano Barili 46. per 16. aggiungendo 7. fanno 743. Partitore : Si moltiplicano Lire 1385. 7. 9. pure per 16. fanno Lire 22166. Soldi 4. da partirsi : Onde partite per la 28. di questo , vengono Lire 29. 16. 8. prezzo di Barile venduto.

32. D. E' stato fatto un pagamento in Fiorenza di Lire 3580. 3. 8. per una Tratta di Livorno , di Pezze da otto Reali 624. Soldi 9. Si cerca à che ragione è stata pagata la Pezza ?

R. Si moltiplicano Pezze, Pez. 604.9 — Lire 3580.3. 8  
624. per 20. aggiungendo 20 ————— 20  
9. fanno 12489. Partitore. —————  
Si moltiplicano anche per 12489 Lit. 71603. 13. 4  
20. Lire 3580.3.8. e fanno 9158 — 20  
Lire 71603. 13. 4. da par- Lire 5. 14. 8. —————  
tirsì, e fatto il partire ven- 183173  
gono Lire 5. 14. 8. e tanto 58283  
fu pagata la Pezza da otto 8327 — 12  
Reale .  
99928  
16

33. D. Moggia di Grano 36. Staja 13. si pagarono Lire 2186. Soldi 16. Denari 8. Si domanda quanto si pagò il Moggio ?

R. Essendo il Moggio 24. Sta- Mog. 36. 13 — Lire 2186. 16. 8  
ja , per 24. si moltiplicano 24 ————— 24  
Moggia 36. aggiungendo —————  
13. fanno 877. Partitore. Part. 877. Lire 52484. 0. 0  
Pure per 24. si moltiplica- 8634  
no Lire 2186. 16. 8. fanno Lire 59. 16. 10 741 — 20  
Lir. 52484. prezzo di Mog-  
gia 877. onde partite per 14820  
queste , vengono Lire 59. 6050  
16. 10. Prezzo d'un Mog- 788 — 12  
gio .  
9456  
686

34. D. Un Servo hà ricevuto di Salario Scudi 168. Lire 1. 2. 10. in Mesi 91. Giorni 4. si cerca quanto aveva di Salario il Mese ?

R. Essendo all'uso Mercantile il Mese di 30. Giorni, si moltiplicano Mesi 91. per 30. aggiungendo 4. fanno 2734. Partitore. Ancora per 30. si moltiplicano Scudi 168. 1. 2. 10. fanno Scudi 5044. 6. 5. — Il quali si partono per 2734. avvertendo di moltiplicare per 7. Pavanzo de' Scudi, e vengono Scudi 1. Lire 5. 18. 4. Salario di un Mese ; La Prova per la prima de' Partitori, per l'avanzo s' aggiunge  $\frac{1}{2}$  di Denaro . Mesi





- il prodotto per 16. vengono Scudi 3410. Lire 3. Soldi 4. da partirsi, e partito vengono Scudi 5. Lire 6. Soldi 13. Denari 4. Prezzo d'una soma d'Olio.
37. D. Per una Lettera di Livorno di Pezze 486. Soldi 9. Denari 6. si è fatto un pagamento in Fiorenza di Lire 2789. Soldi 2. Denari 6. Si cerca a che ragione è stata pagata la Pezza?
- R. Pezze 486. si moltiplicano per 20. aggiungendo al prodotto 9. fanno 9729. li. quali si moltiplicano per 2. aggiungendo 1. fanno 19459. Partitore, per pigliarsi Denari 6. per  $\frac{2}{3}$  Soldo. Si moltiplicano le Lire 2789. 2. 6. ancora per 20. e il prodotto per 2. fanno Lire 111565. le quali si partono per 19459. e vengono Lire 5. Soldi 14. Denari 8. e a tal ragione fu pagata la Pezza da otto.
38. D. Uno Staffiere ha avuto di Salario in Anni 17. Mesi 8. Giorni 20. Lire 8673. 16. 8. si domanda quanto aveva di Salario l'Anno?
- R. Anni 17. si moltiplicano per 12. aggiungendo 8. fanno 212. li. quali si moltiplicano per 3. aggiungendo 2. perchè 20. giorni sono recati a  $\frac{2}{3}$  di mese, e fanno 638. partitore. Lire 8673. 16. 8. si moltiplicano ancora per 12. & il prodotto numero per 3. e fanno Lire 312258. le quali si partono per 638. e vengono Lire 489. 8. 8. meno poco rotto di Denaro.
39. D. Moggia di Grano 25. Sacca 6. Staja 2.  $\frac{1}{4}$ . si venderono Scudi 250. Lire 4. 9. 8. Si domanda quanto si vendè il Moggio?
- R. Moggia 25. si moltiplicano per 8. aggiungendo 6. fanno 206. perchè un Moggio è di Sacca 8. si moltiplicano per 3. aggiungendo 2. essendo il Sacco di Staja 3. fanno 620. le quali si moltiplicano per 4. aggiungendo 3. fanno 2483. Partitore; Si moltiplicano Scudi 250. Lire 4. Soldi 9. Denari 8. per 8. il numero prodotto per 3. & il numero prodotto per 4. e fanno Scudi 24061. Lire 3. Soldi 8. li quali partiti per 2483. vengono Scudi 9. Lire 4. Soldi 16. 8. prezzo d'un Moggio, per la ragione detta nella 29. di questo; perchè il Partitore 2483. si possono pigliare per Moggia, e li Scudi 42061. Lire 3. Soldi 8. per loro prezzo, essendoci la medesima proporzione; e benchè 2483. mostrino d'essere quarti di Stajo, ad ogni modo s'intendano Moggia 25. Sacchi 6. Staja 2.  $\frac{1}{4}$ . moltiplicate per 4. il numero prodotto per 3. & il prodotto per 8. siccome per essi si moltiplicano Scudi 250. Lire 4. 9. 8. daranno il medesimo numero di 2483. E perchè a moltiplicare, il Partitore, & il numero da partirsi, per i medesimi numeri non varia proporzione, l'operazione del partire degli uni, e degli altri, darà il medesimo quoziente; tuttavia si fa tale moltiplicazione, per levare i rotoli al Partitore.

T

Mog.

Moggia 25. 6 2  $\frac{1}{2}$  — Scudi 250. 4. 9. 8

206 — 3

620 — 4

Partitore 2483

Scudi 9. 4. 16. 8.

2005. — 17. 4

6015. 2. 12. 4

24061. 3. 8. —

1714. — 7

12001.  
2069 — 20

41388

15558

1660 — 12

19920

56

Si pongono altri esempi di questo partire, operandosi al modo detto. Si tralascia però di porre la lezione stessa con i numeri, e di porre la prova potendo ciascuno fare per suo esercizio ciò sopra la carta, e renderli pratico.

40. D. Once 9. Denari 18.  $\frac{1}{2}$  di Zafferano vagliono Lire 34. 14. 4. quanto vale la libbra?

R. Once 9. si moltiplicano per 24. aggiungendo 18. fanno 234. le quali si moltiplicano per 4. aggiungendo 3. fanno 939. Partitore. si moltiplicano Lire 34. 14. 4. prima per 12. a causa dell'Once volendosi sapere il prezzo d'una Libbra; fanno Lire 416. 12. le quali si moltiplicano per 24. fanno Lire 9998. 8. e queste per 4. fanno 39993. 12. le quali si partono al solito per 939. vengono Lire 42. 11. 10. prezzo d'una Libbra.

41. D. Uno ha venduto una Possessione, che era Stajora 27. Pano. ra 6. Pugnora 3. Braccia quadre 8. di Terreno per Scudi 1061. Soldi 17. moneta; Si domanda per quanti Scudi ha venduto lo Stajoro?

R. Avvertasi, che lo scudo moneta si divide in Soldi 20. & il Soldo in Denari 12. come la Lira in Fiorenza. Stajora 27. si moltiplicano per 12. aggiungendo 6. fanno 330. le quali per 12. aggiungendo 3. fanno 3963. e queste per 12. aggiungendo 8. fanno

47564

47564. Partitore. Si moltiplicano tre volte per 12. Scudi 1001. Soldi 17. finalmente fanno Scudi 1286216. Soldi 16. li quali partiti danno di quoziente Scudi 39. 13. 4. moneta, Prezzo dello Stajoro di Terrano.

42. D. Uno ha avuto di provisione Scudi 976. 1. 12. 4. in Anni 16. Mesi 7. Giorni 20. Si domanda quanto aveva di provisione l' Anno?

R. Anni 16. si moltiplicano per 12. aggiungendo 7. fanno 199. li quali si moltiplicano per 30. aggiungendo 20. fanno 5990. e questi per 2. aggiungendo 1. fanno 11981. Partitore. Ora per 12. per 30. e per 2. si moltiplicano li Scudi 976. Lire 1. 12. 4. a modo delle passate, fanno Scudi 702886. Lire 2. le quali si partono, e vengono Scudi 58. Lire 4. 13. 4. Provisione d' un' Anno.

43. D. Un' Argentiere ha un pezzo d' Argento, che è a bontà; cioè per ogni Libbra tiene Once 9. Denari 17. Grani 18. d' Argento fino, il resto fino alla Libbra è Rame; essendo che l' Argento fino di detto Pezzo pesa Libbre 21. Once 5. Denari 20. Grani 14. Si domanda quanto pesava detto Pezzo con la lega del Rame?

R. Si moltiplicano Once. Once 9. 15. 18. — Lib. 21. 5. 20. 14  
9. per 24. aggiungendo once 9 18  
15. fanno Denari 231. li 24  
quali si moltiplicano per 24. aggiungendo 18. fanno 231 — 24  
no Grani 5562. Partito-Par. 5562 6188 — 24  
re. Qui per essere il numero da partirsi della Lib. 26. 8. 10. 16 148526  
natura del numero partitore, si moltiplicano 39288  
Libbre 21. per 12. aggiungendo 5. fanno Once 257. le quali si moltiplicano per 24. aggiungendo 20. fanno Denari 6188. li quali si moltiplicano per 24. aggiungendo 14. fanno Grani 148526. li quali si partono per 5562. e verranno Libbre 26. Once 8. 10. 16. e tanto pesava detto pezzo col Rame. La Prova per la terza de Partitori.

148  
**DISTINZIONE TERZA.**

*Del Partire per Apporre Monete superiori, & inferiori  
 secondo la pratica di Fiorenza, e può servire  
 per qualsivoglia altro luogo.*

44. D. **C**he cosa è Partire per Apporre?

R. Il Partire per Apporre è un partire artificioso, e composto di Monete superiori, & inferiori, tanto nel numero Partitore, quanto nel numero da partirsi, che si fa, & opera senza ridurre le Monete superiori all'infime, come si farebbe per Danda.

45. D. A che serve questo partire?

R. Serve per trovare per lo più il numero della Mercanzia, che si averà ad un tal prezzo, impiegando in essa una determinata quantità di Moneta; Serve a i Banchisti in Fiorenza per i Cambj a trovare la moneta corrispondente, quando la Piazza, con la quale si cambia dà l'intero cioè 1. ovvero 100. come si dirà a suo luogo, e serve di prova al valutare di Mercanzie, per il 10. all'insù, & alle regole de' Partitori, secondo che si può osservare dagli esempi, che si apportano.

46. D. Come si opera questo partire.

R. Si opera in due modi: il primo de' quali esplicasi con questo Esempio: La Libbra della Cera vale Lire 1. Soldi 12. Denari 8. Volendosi impiegare Lire 267. 17. 4. in detta Cera; Si domanda quante Libbre se n' averanno? Qui è di bisogno per Lire 1. 12. 8. partire Lire 267. 17. 4. che però senza ridurre in Denari, come si farebbe partendo a Danda; si dà il 10. all'insù; cioè si moltiplica per 10. Lire 1. 12. 8. il prodotto Lire 16. 6. 8. si pone sopra, il quale di nuovo si moltiplica per 10.; & il prodotto 163. 6. 8. si pone di sopra, a modo della 74. del secondo, & avvertasi che questo prodotto non deve passare il numero delle Lire da partirsi; Ma deve avvicinarsi quanto più può. Onde qui non si moltiplica più per 10. perchè il prodotto passerebbe le Lire 267. 17. 4. da partirsi. Ci sono tre file di Lire, &c. che sono tre Partitori distinti: si parte per il maggiore, cioè per Lire 163. 6. 8. e si vede quante volte entra in Lire 267. 17. 4. osservando i medesimi avvertimenti, che nel partire per Danda; cioè, che quante volte entrano le Lire nelle Lire, tante entrino i Soldi ne i Soldi, con l'avanzo delle Lire ridotte in Soldi, e tante i Denari ne i Denari con l'avanzo de' Soldi fatti Denari; cioè non entrino di meno.

Dunque

Dunque Lire 163. 6. 8. in Lire 267. 17. 4. entrano una volta: Si ponga 1. sopra Lire 267. 17. e 4. per il quale si moltiplicano Lire 163. 6. 8. vengono l'istesse, le quali si pongono sotto Lire 267. 17. 4. e si sottrano, e restano Lire 104. 10. 8. come nel primo Esempio. Ovvero si fa il sottrarre à mente, come nel partire à Danda alla breve, nella 77. del primo. Si dice dunque 1. via Denari 8, del Partitore fa 8. ad andare à trovare Denari 4. da i quali si devè sottrarre, non tornando indietro, cioè fino à Denari 16. ci sono Denari 8. li quali si segnano sotto Denari 4. e perche ad andare al 16. si è passato il 12. che è un Soldo, si tiene à mente 1. ora per 1. si moltiplicano Soldi 6. fa 6. Soldo 1. tenuto à mente aggiunto fa 7. ad andare à Soldi 17. ci vogliono Soldi 10. li quali si segnano sotto 17. Per 1. si moltiplicano Lire 3. ad andare à Lire 7. ci sono 4. il quale si segna sotto il 7. dipoi 1. via 6. fa 6. ad andare al 6. ci è 0. il quale si segna sotto il 6. Finalmente 1. via 1. fa 1. ad andare al 2. ci è 1. il quale si segna sotto il 2. e restano come prima Lire 104. 10. 8. le quali si partono per il secondo Partitore cioè per 16. 6. 8. nel modo detto; (avvertendo che non potendosi partire per essere il partitore maggiore; allora s'aggiunge un zero al quoziente, e si piglia l'altro partitore) e vi entrà 6. volte, si segna 6. à canto all' 1. per il quale 6. si moltiplicano Lire 16. 6. 8. fanno Lire 98. le quali si sottrano al solito come nel primo esempio, ovvero à mente, come nel secondo; ma acciò questo meglio s'intenda s'esplichi dicendo 6. via Denari 8. fa 48. ad andare à trovare Denari 8. sopra i Soldi interi, cioè Denari 56. ci vogliono Denari 8. li quali si segnano sotto, e si tengono à mente Soldi 4. per i Denari 48. che si sono passati; di nuovo 6. via Soldi 6. fa Soldi 36. con 4. tenuti à mente fanno 40. ad andare à trovare Soldi 10. sopra le Lire intiere, cioè fino à Soldi 50. ci vogliono Soldi 10. li quali si segnano sotto; di nuovo 6. via Lire 6. fanno 36. con Lire 3. per i Soldi 40. passati fanno 38. fino à 44. ci vogliono 6. il quale si segna sotto al 4. e finalmente 6. via 1. fa 6. e 4. per le 4. decime passate fanno 10. ad andare à trovare il 10. ci è niente; si che restano Lire 6. 10. 8. le quali si partono per il terzo Partitore; cioè per Lire 1. 12. 8. e viene 4. che si pone à canto al 6. per il quale si moltiplicano Lire 1. 12. 8. fanno Lire 6. 10. 8. che sottratte da Lire 6. 10. 8. resta zero, & il quoziente è 164. che sono Libbre di Cera; che s'averanno per Lire 267. 17. 4. Ecco gl' Esempj: Il primo operato alla lunga, il secondo alla breve, e se al principio pajono difficili, la pratica però gli fa assai facili.

*Prima*

*Primo Esempio . | Quoz. 164 Secondo alla Breve .*

163. 6. 8		163. 6. 8	
Partitore 16. 6. 8	Lire 267. 17. 4	16. 6. 8	164
Lire 1. 12. 8	A 163. 6. 8	Lir. 1. 12. 8	Lir. 267. 17. 4
<i>Prova col Sommare .</i>			
A 163. 6. 8	104. 10. 8		104. 10. 8
Prodott. B 98. 0. 0	B 98. 0. 0		6. 10. 8
C 6. 10. 8	6. 10. 8		
Tot. Lir. 267. 17. 4	C 6. 10. 8		
		5   1	0   0
		2   1	3   0

17. D. Quali prove si fanno a questo partire?

R. Molte prove si possono fare; Prima facendo la medesima lezione in altro modo; come si dirà più sotto; La seconda facendo la per Danda, riducendo il Partitore, ed il numero da partirsi nell'infima Moneta; La terza partendo a Danda per il Quoziente la Moneta partita, e doverà venire il Partitore ultimo; La quarta, che è più facile si fa col sommare; e la quinta è la Prova del 7. e del 9. ovvero d'altro numero; Questa si fa levando, per esempio tutti gli 9. da Lire 1. 12. 8. l'avanzo è 5. così levando gli 9. dal Quoziente 164. l'avanzo è 2. il quale moltiplicato via 5. fa 10. al quale si dovrebbe aggiungere il numero, che avanzasse dal levarli 9. dalla Moneta avanzata; ma perchè non è avanzata, nulla s'aggiunge; levando 9. dunque da 10. resta 1. di prova. Onde levando pure gli 9. da Lire 267. 17. 4. Moneta partita resta 1. come deve restare, per mostrare la lezione ben fatta, così si fa quella del 7. &c.

18. D. Come si fa la Prova col sommare?

R. Si sommano i prodotti fatti da' numeri del Quoziente via i Partitori; e con quelli si somma la Moneta avanzata, essendoci; e la somma deve essere uguale alla Moneta partita, se si è bene operato. Onde nella passata lezione sommando i prodotti A. B. C. la Somma sarà di Lire 267. 17. 4. uguali alle Lire partite, sicchè starà bene. La ragione è; perchè in tal modo viene rivolta la Domanda, e si cerca il prezzo delle Mercanzie trovate, e necessariamente deve tornare il prezzo assegnato nella lezione, operando bene; ma perchè già abbiamo i prodotti, basta sommarli, e si avrà l'intento. La Domanda rivolta è questa: La Libbra della Cera vale Lire 1. 12. 8. che valeranno Libbre 164. di Cera venute dalla lezione; e perchè già la moltiplicazione è fatta, nell'

nell'operazione del partire per apporre alla lunga, basta sommare i prodotti.

49. D. Come si fa la terza Prova?

R. Viene rivolta la Domanda

Lib. 164. Lir. 267. 17. 4

cost. Libbre 164. di Cera venute dalla lezione costano Lire

103. -- 20

Partit. torn. Lir. 1. 12. 8

~~2077~~

267. 17. 4. che costa la Libbra?

109 -- 12

Onde per Libbre 164. partendo a Danda le Lir. 267. 17. 4.

~~1312.~~

verrà il prezzo d'una Libbra,

cioè Lire 1. 12. 8. che è stato

partitore, &c.

50. D. Come si fa la seconda prova?

R. Si fa per Danda a modo della 43. riducendo Lire 1. 12. 8. in Denari 392. Partitore, e Lire 266. 17. 4. in Denari 64288. da partirsì; onde partiti vengono Libbre 164. come per l'Apporre

Lire 1. 12. 8. ——— Lire 267. 17. 4

20

20

32 — 12

5357 — 12

64288 Da partirsì —

2508

1568

Partitore 392

Libbre 164

51. D. Un Mercate vuole spendere Lire 1348. 11. 8. in Seta a Lire

23. 16. 8. la Lib. Si domanda quante Lib. ed once di Seta comprerà?

R. In questa domanda, oltre le Lib. si cercano l'oncia che può questa serve di prova alla prima de' Partitori; onde si dà il 10. all'in-

sù a Lir. 23. 16. 8. li quali ancora si partono per 12. per trovare

il prezzo d'un'oncia, per il quale prezzo, si partono Lire 13. 18. 4

avanzate doppo il ritrovamento di Lib. 56. del resto s' opera come nella passata, e verranno Libbre 56. once 7

Libbre 56. Once 7

Libbre 56. Once 7

Prova del 9. Lire 13. 16. 8

Lire 1348. 11. 8

A 1191. 13. 4

4 12 1. 19. 8 1/2

5 X 6 Prova col sommare.

Lire A 1191. 13. 4

156. 18. 4

4 16 B 143. 0. 0

143. 0. 0

C 13. 18. 0

13. 18. 4

4

C 13. 18. 0

Tornano Lire 1348. 11. 8

avanzo Den. 4. 52. D.

52. D. Nella 37. di questo si propose; Per una Lettera di Livorno di Pezze 486. Soldi 9. Denari 6. si è fatto un pagamento in Fiorenza di Lire 2789. Soldi 2. Denari 6. Si cerca a che ragione è stata pagata la Pezza? Si operò per Danda, e vennero Lire 5. Soldi 14. Denari 8. come si risolve per il partire per apporre?  
R. Pezze 486. 9. 6. si fanno partitore di Lire 2789. 2. 6. per avere la Pezza, e la Lira, la medesima divisione in Soldi, e Denari; Le Pezze si partono per 20., e per 12. per trovare i Soldi, e Denari, e verranno Lire 5. 14. 8. come per Danda.

Pezze.	486.	9.	6
20	24.	6.	$5\frac{1}{10}$
12	2.	—	$6\frac{2}{3}$
<i>Prova col Sommare.</i>			
A Lire	2432.	7.	6
B	340.	10.	8
C	16.	4.	4

Torn. Lire 2789 2. 6

	Lire	5.	14.	8
	Lire	2749.	2.	6
A	2432.	7.	6	
	356.	15.	—	
B	340.	10.	8	
	16.	4.	4	
C	16.	4.	4	

53. D. In Fiorenza si pagarono Lire 2789. 2. 6. per Lettera di Livorno a Soldi 114  $\frac{2}{3}$ . per Pezza da otto: Si domanda di quante Pezze, Soldi, e Denari fu la detta Lettera?

R. Nella passata si trovò a che ragione fu valutata la Pezza, ed in questa si troveranno quante Pezze furono. Soldi 114  $\frac{2}{3}$  sono l'istesso che Lire 5. 14. 8. le quali si partiranno per 20. e per 12. e si moltiplica due per 10. al solito, e s'averanno cinque Partitori; Onde fatto il partire, ne verranno Pezze 486. Soldi 9. Denari 6.

583.	6;	8	
57.	6.	8	
Lire	5.	14.	8
20	5.	8	
12	5.	8	

*Prova col Sommare.*

Lire	2293.	6.	8
458.	13.	4	
24.	8.	0	
2.	11.	7	
2.	10		
31.		1	
24.			

Lire 2789. 2. 6

	Pezze	486.	9.	6
	Lire	2789.	2.	6
	2293.	6.	8	
	495.	15.	10	
	458.	13.	4	
	37.	8.	6	
	24.	8.	0	
	2.	14.	6	
	2.	11.	7	
	2.	11		
	2.	10		
	31.			
	24.			

54. D.



54. D. Il migliajo di alcuna Mercanzia vale Lire 46. 13. 4. addi-  
mando per Lire 2769. 16. 8. quante Libbre si compreranno?

R. Per sciogliere questa, si moltiplicano Lire 46. 13. 4. per 10. ponen-  
do di sopra il prodotto, ed ancora si partono tre volte per 10., e  
si averanno cinque Partitori. Si faccia il partire alla breve, e ver-  
ranno Libbre 59353. Volendo però la prova, col sommare, è d'uo-  
po trovare, come si disse nella 77. del primo, nel partire à Danda  
alla breve; Onde sottrando da Lire 2769. 16. 8. le Lire 436. 10.  
verrà il primo prodotto di Lire 2293. 6. 8. e così si trovano gli  
altri.

*Prova col Sommare.*

Lire 2333. 6. 8	466. 13. 4	Libbre 59353
420. 0. 0	46. 13. 4	Lire 2769. 16. 8
14. 0. 0	4. 13. 4	436. 10. —
2. 6. 8	9. 4	16. 10. —
2. 10. 19	11. 4	2. 10. —
6		3. 4
		6

Lire 2769. 16. 8

55. D. L'oncia dell' Oro filato vale Lire 7. 6. 8. Volendosi spende-  
re Lire 511. Soldi 3. quante Libbre; Once; Denari, e Grani d'  
Oro si averanno?

R. Si moltiplicano Lire 7. 6. 8. prezzo d'un'Oncia per 12. ponen-  
do di sopra il prodotto di Lire 88. farà prezzo d'una Libbra; Si  
partino Lire 7. 6. 8. per 24. verranno Soldi 6. 1.  $\frac{1}{2}$ , e questi per  
24. verranno Denari 3.  $\frac{1}{4}$  e saranno quattro Partitori; Si par-  
ta, e verranno Libbre 5. once 9. Denari 16. Grani 20.

*Prova col Sommare.*

Lire 440	88	Libbre 5. 9. 16. 20
66	Lire 7. 6. 8	Lire 511. 3. —
4. 17. 9	24. 6. 1. $\frac{1}{2}$	71. 3. —
5. 1	25. 3. $\frac{1}{4}$	5. 3. —
2		5. 3.
Lire 511. 3. 0		

56. D. Uno ha preso in Affitto una Possessione per Scudi Moneta.  
168. 13. 4. l'Anno: Si domanda quanti Anni, Mesi, e Giorni la  
terrà in Affitto con Scudi 1762. 16. 10?

R. Scudi 578. 13. 4. si partono per 12. e vengono Scudi 14.  
17. 9.  $\frac{3}{4}$ . dovuti per l'Affitto d'un Mese, li quali si partono  
per 30. vengono Sold. 9. 11.  $\frac{3}{4}$  dovuti per l'Affitto d'un gior-  
no. Ora si partono Scudi 1762. 16. 10. per questi tre Partitori;  
Vengono Anni 9. Mesi 10. Giorni 12. V Scu-

Scudi 178. 23. 4 —  
 . 12. 14. 17. 9  $\frac{1}{2}$   
 30. 9. 11  $\frac{1}{2}$

*Prova col Sommare.*

Scudi 1608  
 148. 17. 9  
 5. 19. 1

Scudi 1762. 16. 10

Scudi 1762. 16. 30  
 1608

154. 16. 10  
 148. 17. 9

5. 19. 1  
 5. 19. 1

### Del secondo modo di Partire , per Apporre .

Essendosi con varj quesiti accennato il primo modo di partire per Apporre : Adesso si accennerà il secondo , con alcun quesito , e Domanda .

57. D. Il Barile del Vino si vende per Lire 6 Soldi 8. 4. Domando per Lire 1572. 1. 8. quanti Barili si compreranno ?

R. I numeri del Partitore , e da partirsi posti al solito ; quelli da mano sinistra , e questi da destra di chi scrive . S' offervi Lire 6. quante volte entrano in Lire 15. da partirsi , entrano 2. volte , & avanza no Lire 3. che fattene Soldi , moltiplicandola per 20. Sono 60. nel quale 60. non meno di due volte entrano Soldi 8. Denari 4. del Partitore . Si pone da parte il Quoziente 2. per esso si moltiplicano Lire 6. 8. 4. e fanno Lire 12. 16. 8. che si sottrano da Lire 15. restano Lire 2. 3. 4. le quali si moltiplicano per 10. à farne decine , & al prodotto s'aggiungono 7. decine di Lire , che seguono nel numero da partirsi , e faranno Lire 28. 13. 4. le quali si partono per Lire 6. 8. 4. medesimo Partitore , verrà 4. che s' accompagna con il quoziente 2. con il 4. si moltiplicano Lire 6. 8. 4. vengono Lire 25. 13. 4. che sottratte da Lire 28. 13. 4. restano Lire 3. che moltiplicate per 10. à farne numero con aggiugnere Lire 2. 1. 8. fanno Lire 32. 1. 8. che partite per Lire 6. 8. 4. viene 5. da porsi dopo 24. Quoziente , e dirà 245. per 5. si moltiplicano Lire 6. 8. 4. vengono Lire 32. 1. 8. che si sottrano pure da Lire 32. 1. 8. resta niente , & è finita l' operazione ; e sono venuti Barili 245. che si cercavano . Il sottrarre si puol fare à mente da chi è pratico come si è detto nella Domanda 46. di questo , e qui si vede fatto nel secondo Esempio .

per Li-

per Lire 1572. 1. 8	Col Sottrarre a mente.
per Lire 6. 8. 4 — 12. 16. 8	per Lire 6. 8. 4. Lire 1572. 1. 8
Barili 245.	2. 3. 4 — 10
28. 13. 4	Barili 245.
25. 13. 4	28. 13. 4
3. —. 0 — 10	
32. 1. 8	
32. 1. 8	
38. 1. 8	

Due cose devono sapersi in fare il Partire per apporre in questo modo, che alcune volte il partitore entra 10, 11, 12. e più volte, il che non avviene nell'altro modo di partire per apporre, non entrando il Partitore più di 9. volte. Quando dunque il Partitore entrerà 10, 11, 12. ovvero più, e sia nel principio, si pone tutto nel quoziente, e si seguita a partire; ma se già ci è qualche numero di quoziente: allora la figura, che rappresenta la decina si somma con l'antecedente figura. L'Esempio seguente sarà del primo caso.

58. D. Il braccio del Panno vale Lire 3. 2. 8. Si domanda con Lire 396. 16. 8. quante braccia s'averanno?

R. Lire 3. entrano una volta in Lire 3. ma perchè non avanza, Soldi 2. e 8. non entrano: onde bisogna dire Lire 3. in Lire 39. entrano 13. volte, e non avanza, e però Soldi 2. 8. non entrano; perchè solo entrano 12. volte, il 12. si pone per quoziente, e per esso si moltiplicano Lire 3. 2. 8. e vengono Lire 37. Soldi 12. le quali si sottrano da Lire 39. restano Lire 1. Soldi 8. che si moltiplicano per 10. aggiungendo Lire 6. 16. 8. fanno Lire 20. 16. 8. le quali partite per Lire 3. 2. 8. viene 6. il quale si pone dopo il 12. e dice 126. per 6. si moltiplicano Lire 3. 2. 8. fanno Lire 18. 16. le quali si sottrano da Lire 20. 16. 8. e restano Lire 2. —. 8. d'avanzo, e sono venute braccia 126. di Quoziente.

Lire 3. 2. 8. — Lire 396. 16. 8. Col Sottrarre a Mente.

37. 12	Lire 3. 2. 8. — 396. 16. 8.
1. 8 — 10	Brac. 126. 1. 8. — 10
Brac. 126.	20. 16. 8
18. 16	Lire 2. —. 8
Lire 2. —. 8	

Nel passato Esempio venne 12. nel principio : nel seguente doppo  
2. e 9. verrà 10. il quale si pone talmente che 1. venga sotto il 9.  
e si somma, e farà 300. e non 2910.

59. D. Lo Stajo del Grano vale Lire 4. 15. 8. spendendo una Com-  
munita Lire 14369. 2. 8. quante Staja di Grano averà a detto  
prezzo?

R. Soperi come nella passata, e verranno Staja 3004.

Lir. 4. 15. 8. -- Lir. 14369. 2. 8 *Del Sottrarre d mente.*

Staja 29	9. 11. 4	Lir. 4. 15. 8	Lir. 14369. 2. 8
104	4. 8. 8 — 10	29	4. 8. 8 — 10
Staja 3004	47. 6. 8	104	47. 6. 8
43. 1. —	Staja 3004	4. 5. 8	10
4. 5. 8 — 10	48. 16. 8	1. —. 0. — 10	
48. 16. 8	19. 2. 8		
47. 16. 8			
1. 0. 0 — 10			
19. 2. 8			

Nel seguente Esempio oltre il numero degli Anni si cercano i Mesi,  
e Giorni, per lo che la provisione di un'Anno si parte per 12. e  
per 30. ovvero prima per 3. e poi per 10. acciò sia più faci-  
le, e con questi Partitori si parte l'avanzo, e verranno Mesi, e  
Giorni, come si faceva nell'altro modo di partire per apporre.  
non voglio lasciare di dire ancora, che si potrebbe avere il me-  
desimo effetto con moltiplicare l'avanzo per 12. e poi per 30. e  
partire col medesimo Partitore, come si vedrà fatto nel secondo  
Esempio, l'avanzo però resta alterato.

60. D. Un Ministro avendo di Provisone l'Anno Scudi 48. Lire 6.

13. 4. Si vuol sapere in quanti Anni, Mesi, e Giorni averà avuto  
Scudi 867. Lire 3. 16. 8?

R. Operato come si è detto, verranno Anni 17. Mesi 8. Giorni 20.

*Primo Esempio.*

Scudi 48.	6.	13.	4.	Scudi 867.	3.	16.	8
12	4.	11.	1.	37.	—.	6.	8 — 10
per 3	1.	10.	4.	378.	—.	3.	4
10		16.	—	35.	2.	10.	—
				2.	5.	1.	1
Anni 17.	8.	20					4

*Scap-*

Secondo Esempio.

Scudi 48. 6. 13. 4 — Scudi 867. 3. 16. 8  
37. —. 6. 8 — 10

Anni 17. 8. 29.

378. —. 3. 4  
35. 2. 10. — 12

424. 2. —. —  
32. 4. 13. 4 — 30

980. —. —. —  
6. 13. 4

Avendo detto nella 45. di questo, che il partire per apporre serve per i Cambj, ne pongo un' esempio risoluto prima per il modo primo, e poi per il secondo.

61. D. In Fiorenza vien fatta rimessa da Roma di Scudi d'oro Stampe 3820. Soldi 15. 8. col Cambio di Sc. d' oro Stampe 73. 11. 4. per Scudi d' oro 100. di Fiorenza di Lire 7.  $\frac{2}{3}$  l'uno. Si domanda di quanti Scudi, di Lire 7.  $\frac{2}{3}$  l'uno, farà il credito di Roma?

R. Si dia una volta il 10. all'insù, e si parta due volte per 10. e poi per 20. e per 12. e si parta, e verranno Sc. d' oro 5192. 9. 2.

735. 16. 8. Quoziente Sc. d'oro 5192. 9. 2.

Scudi Stampe 73. 11. 8 — Sc. d'oro 100. — Sc. Stam. 3820. 15. 8

10	7. 7. 2	141. 12. 4
10	14. 8	68. —. 8
20	8	1. 16. 2
12		6. 9

In questo secondo modo si parte per il medesimo Partitore.

Sc. St. 73. 11. 8 — Sc. d' oro 100. — Sc. Sta. 3820. 15. 8

Scudi d' oro 5192. 9. 2

14. 1. 8 — 10

Alla prima moltiplicazione per 10. si moltiplica 10. via Denar. 8. fa 80. & aggiunti Den. 8. di sopra sono Denari 88. si segnano Denari 4. sotto, e Soldi 7. si sommano col prodotto seguente; dipoi si moltiplica 10. via 1. fa 10. con 7. e con 15. di sopra sono Soldi 32. si segnano Soldi 12. di nuovo 10. via 14. fa 140. & 1. che si porta fa 141. Scudi, che si segnano, &c.

141.	12. 4
68.	—. 8 — 10
680.	6. 8
18.	1. 8 — 10
180.	16. 8
33.	13. 4 — 20
673.	6. 8
11.	1. 12
133.	—. —
59.	8. 4

62. D.

62. D. Quando si sa il prezzo d' alcune Mercanzie con rotti per trovare il prezzo d' una Mercanzia , si può usare il Partire per Apporre ?

R. Si può usare , quando i rotti della Mercanzia si confanno con i rotti della Moneta , che è prezzo , per esempio : Barili 18. Fiaschi 12.  $\frac{3}{4}$  di Vino, si sono venduti Lire 239. 2. 8. Si cerca quanto fù venduto il Barile ? Perchè in Fiorenza 20. Fiaschi di Vino fanno un Barile , per questo i Fiaschi si confanno con i Soldi , e perchè  $\frac{3}{4}$  di Fiasco si riduceano a  $\frac{3}{12}$  . che si confanno con i Denari, dico che si può fare il partire per Apporre; e fatto, verranno Lire 12. 16. 8. prezzo d' un Barile .

Quoziente Lir. 12. 16. 8

Partitore	186.	6. 8			
	18.	19. 8	—	Lire	239. 2. 8
20		18. 8	$\frac{3}{4}$		52. 16. 0
12		1. 6	$\frac{3}{4}$		15. 10. 8
					12. 6
					— 1

63. D. Quando i rotti della Mercanzia non si confanno con quelli della Moneta , cioè sono di diverso Denominatore , si può fare il partire per Apporre ?

R. Non si può fare , ma si usa il partire à Danda con i rotti , come si è fatto dalla domanda 28. fino alla 43. di questo . Tuttavia contraslatare i rotti della Mercanzia , nella denominazione de' rotti della Moneta, allora si può fare ; benchè non mette conto , allungandosi alle volte l' operazione; Per cognizione pongo questo Esempio .

Libbre 347. once 5.  $\frac{1}{2}$  d' una Mercanzia si pagarono Lire 229. 4. 6. Domando quanto si pagò una Libbra al medesimo prezzo .

Primieramente si rechino once 5.  $\frac{1}{2}$  in un rotto solo di Libbra, con l'infizzare per la 22. del secondo, verrà  $\frac{11}{24}$ . il quale si riduca col traslatare in 20. esimi , e 12 esimi denominatori de' rotti della moneta , per la 19. e 20. del secondo, verranno 9. ventesimi, e 2. dodicesimi, che però il partitore sarà 347.9.2. e numero da partirsi , per l' apporre Lire 229. 4. 6. Onde operato per la 51. di questo, verranno Lire 6. Soldi 12. prezzo d' una Libbra .

Lire 6. 12

5	V	1	11	20	347.9.2	—	Lir. 2293.4.6
12	—	2	24	220	20	/	17.7.5 $\frac{1}{2}$
				4 -- 12.			208.9.6
Sold	9.02			48			

Soldi 9. 02

**DISTIN-**

# DISTINZIONE QUARTA<sup>159</sup>

## Delle Tare, Dami, e Provisionsi.

**A** Vanti di dar fine all'operazioni, nelle quali intervengono numeri retti, voglio trattare delle Tare, come si levino dalla Mercanzia ad un tanto per cento, ò per migliajo, ò ad altra ragione.

1. D. Che cosa è Tara?

R. E' una quantità di Libbre, che per ogni cento, ò migliajo si danno al Compratore d'alcuna Mercanzia difettosa, per allettarlo alla compra: pagando le Libbre nette di Tara al prezzo convenuto, in Genova, & in Milano, come ricavo da Gio: Battista Zucchetta à carte 26. La Tara s'intende sopra 100. per esempio: Libbre 105. con la Tara, restano Libbre 100. nette di Tara à Libbre 5. per 100: nell'altre Città d'Europa (contro quello che dice il Zucchetta) communemente la Tara si leva dal cento, e dal migliajo: Onde Libbre 100. con Tara, restano Libbre 95. senza Tara. Siccome fa l'istesso Autore nel Tarare la Seta à  $\frac{1}{2}$  d'oncia per Libbra, facendo tornare once 12. con la Tara, once 11.  $\frac{1}{2}$  nette di Tara, à quella ragione, come si vede à Carte 30.

2. D. Luca compra Libbre 1340. d'una Mercanzia con Tara di Libbre 6. per 100. vuol sapere quante Libbre saranno di Tara da levarsi, e quante resteranno à pagamento nette di Tara?

R. Si moltiplicano Libbre 1340. per 6. il prodotto 8040. si pone sotto Libbre 1340. avvantaggiato in due figure, le quali sono centesimi di Libbra, li quali se non arrivano à 50. i Mercanti gli lasciano, mà se passano 50. gli pigliano per una Libbra più di Tara, e così praticano; Onde nell'esempio addotto 40. centesimi traslasciano; e la Tara sarà di Libbre 80. le quali sottratte da Libbre 1340. restano Libbre 1260. nette di Tara, e à pagamento. Ma se la Mercanzia fusse preziosa, si potrebbe partire il prodotto per 10. e per 10. con cavarne l'oncia; Onde la Tara sarà in circa à Libbre 80. once 5. e la Libbre nette Libbre 1259. once 7.

Ovvero Libb. 1340 ——— 6

Libbre 1340 ——— 6

per 10 8040

Tara Libb. 80.40 si lascia.

per 10 804

Libbre 1260. nette di Tara. Tara Libbre 80. once 5

Libbre 1259. once 7. nette

3. D.

3. D. Come si fa la prova?

R. Col Sommare: Si sommino le Libbre di Tara, e le Libbre nette restate; Devono venire le Libbre superiori con la Tara: Onde sommando Libbre 80. con Libbre 1260. vengono Libbre 1340. senza però fare altri numeri.

4. D. Uno vende Libbre 1256. di Lana con tara di Libbre 6.  $\frac{1}{4}$  per 100. Vuol sapere quante Libbre dà di Tara, e quante gli dovranno essere pagate?

R. Si partono Libbre 1256. per 4. Denominatore del rotto, vengono 314. Ora si moltiplicano Libbre 1256. per 6. e 314. per 3. Numeratore del rotto, si sommino i prodotti, 78 centesimi perche passano 50. si pigliano per una Libbra; onde saranno Libbre 85. di Tara, secondo l'uso Mercantile, le quali sottratte da Libbre 1256. restano Libbre 1171. a pagamento; O pure si parta per 10. e per 10. trovando l'oncia, verranno Libbre 84. once 9. avvertendo, che quando il rotto dell'oncia è più della metà, si piglia per un'oncia, essendo meno si lascia.

Libbre 1256 — 9  $\frac{1}{4}$

3      314

75. 36

9. 42

Libbre 1256 — 6  $\frac{1}{4}$

4 / 3768

942

7536

Libbre 84. 78 si piglia per Li. 1. 10

8478

10      847. 10

Libbre 1171 nette di Tara.

Libbre 84. 9. Tara.

Libbre 1171. 3. nette.

5. D. Come si leva la Tara a ragione d'un tanto per migliajo.

R. Si moltiplicano le Libbre da tararsi, per il numero delle Libbre, a ragione delle quali, per migliajo si devono tarare, dal prodotto si levano tre figure, che è partire a scapezzo per 1000. le figure restate sono le Libbre della Tara; le levate sono millesimi di Libbra, che se passano 500. Si pigliano per Libbra una di più di Tara; ma se mancano da 500. si lasciano: E così usano i Mercanti; Ma chi vuole la Tara più esatta, parta il prodotto tre volte per. 10. che sono il ripiego di 1000. con ridurre l'avanzo in once.

6. D. Uno compra Libbre 6580. di Lana, con Tara di Libbre 85. per migliajo: Si domandano le Libbre della Tara, e le Libbre nette a pagamento?

R. Si



R. Si moltiplicano Libbre 6580. via 85. dal prodotto 559300. si levano con un punto le tre ultime figure, e restano Libbre 559. di Tara: le figure tagliate si lasciano. Libbre 559. sottratte da Libbre 6580. restano nette Libbre 6021. La prova si faccia con sommare Libbre 6021. con Libbre 559. di Tara, torneranno le medesime Libbre 6580.

Libbre 6580 — 85

32900  
52640

Per l'appunto.

per 10. 5593100  
Tara Libbre 559.  $3\frac{1}{2}$

Tara Libbre 559.300

Libbre 6020.  $8\frac{2}{3}$  nette

Libbre 6021. nette di Tara.

7. D. Si può usare altro modo per levare la Tara?

R. Certo, e può servire di Prova: Nella seconda di questo si torono Libbre 1340. a ragione di Libbre 6. per 100. Ora si faccia così: Lib. 6. si sottrino da Lib. 100. restano Libbre 94. per queste si moltiplicano Lib. 1340. il prodotto 125960. per 100. si parte a scapezzo, con tagliare le due ultime figure, e restano Lib. 1259. nette di tara; 60. centesimi sono  $\frac{1}{2}$  di Libbra, che sono poco più di once 7. le quali Libbre sottratte da Libbre 1340. restano le Libbre di Tara. Medesimamente nella 6. di questo si sono tarate Libbre 6580: a ragione di Libbre 85. per migliajo; si sottrino Libbre 85. da Libbre 1000. restano Libbre 915. per le quali si moltiplicano Libbre 6580. dal prodotto si tagliano tre figure per la partizione a scapezzo per 1000. e verranno Libbre 6020. nette di tara e  $\frac{2}{3}$  di Libbra, &c. come per l'altro modo.

Da 100 Lib. 1340

6      94  
94      5360  
12060

Libbre nette 1259. 60

Da 1000 Lib. 6580

85      915  
915      98700  
59220

Libbre nette 6020.  $700\frac{2}{3}$

8. D. Uno vende Libbre 3490. di Corame con Tara di Libbre  $63\frac{2}{3}$  per migliajo: Si vogliono sapere le Libbre di Tara, e le nette?

R. Si moltiplicano Libbre 3490. per Libbre  $63\frac{2}{3}$  con dare il 10. all'insù. e partire per 2. e dal prodotto si levano tre figure, che per passare 500. millesimi. Si pigliano per una Libbra di più di

X

Tara,

Tara, e faranno Libbre 228. e le nette Libbre 3268. Ovvero per la passata si levino da 1000. Libbre  $63 \frac{2}{3}$ . restano Libbre  $936 \frac{2}{3}$ . per le quali si moltiplichino 3490. e si taglino dal prodotto trè figure, e verranno le Libbre nette 3268. S'offervi, che operandosi bene, le trè figure tagliate nella tara, e qui nelle Libbre nette, sommate devono essere 1000.

$$\begin{array}{r}
 \text{Libbre} \quad 3490 \\
 2. \quad 1745 \\
 \hline
 209400 \\
 10470 \\
 1745 \\
 \hline
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 1000 \quad \text{Lib. } 3490 \\
 63 \frac{2}{3} \quad 936 \frac{2}{3} \\
 \hline
 936 \frac{2}{3} \quad 1745 \\
 20940 \\
 10470 \\
 31410 \\
 \hline
 \end{array}$$

Tara Libbre 221. 615. per una

Libbre nette 3268. 385  
615

Libbre 3268. nette.

9. D. Un Mercante compra Libbre 1840. di Seta con Tara di  $\frac{3}{8}$  d' oncia per Libbra. Si domanda quante Libbre n'averà di Tara, e quante ne dovrà pagare?

R. Libbre 1840. si partono per 12. vengono Libbre 153. once 4. queste si partono per 4. e vengono Libbre 38. once 4. le quali si moltiplicano per 3. Numeratore del rotto, e vengono Libb. 115. di Tara, le quali si sottrano da Libbre 1840. e restano Lib. 1725. nette a pagamento. O pure si levano  $\frac{1}{4}$  da once 12. restano  $11 \frac{3}{4}$  per le quali si moltiplicano Libbre 1840. il prodotto si parte per 12. e vengono Libbre 1725. nette di Tara, le quali sottratte da Libbre 1840. lasciano Libbre 115. di Tara.

$$\begin{array}{r}
 \text{Libbre} \quad 1840 \quad - \quad \frac{3}{8} \\
 12. \quad 153.4 \\
 4. \quad 38.4 \\
 \hline
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 \text{Libbre } 1840 \quad \frac{3}{8} \\
 11 \frac{3}{4} \quad \frac{3}{8} \\
 \hline
 460 \\
 20240 \\
 \hline
 \end{array}$$

Tara Libbre 115.

Libbre 1725 nette.

per 12. 20700

Libbre 1725 nette.

Tara Lib. 115

10. D.

163

10. D. Uno ha comprato Libbre 1480. di Lino con Tara di Libbre  $5\frac{1}{4}$  per 100. Domandasi, avendo pagato le Libbre nette di Tara Lire 76. 13. 4. per 100. quanto abbia speso?

R. Per la 4. di questo si trovano Libbre 85. di Tara lasciati 10. centesimi di Libbra, che sottratte da Libbre 1480. restano Libbre 1395. a pagamento, che valutate per la seconda de' Partitori vagliono Lire 1069. 10.

Libbre 1480 — Lib.  $5\frac{1}{4}$

4. 370

7400

1110

Tara Libbre 85. 10

Libbre 1395. nette.

766. 13. 4

Lire 76. 13. 4 — 1395

10. 7. 13. 4

10. 15. 4

766. 13. 4

230. —. 0

69. —. 0

3. 16. 8

Lire 1069. 10. —

11. D. Si può trovare il prezzo delle Libbre nette in altro modo?

R. Per esercizio a gli Scolari, gli facevo usare quest' altro modo, cioè: Si valutano Libbre 1480. a Lire 76. 13. 4. per 100. e vengono Lire 1134. 13. 4. le quali si tarano a  $5\frac{1}{4}$  per 100. partendo le dette Lire per 10. e per 10. e per 4. il quoziente del secondo 10. si moltiplica per 5. & il quoziente del 4. per 3. si sommano i prodotti, e la somma di Lire 65. 4. 10. si sottra da Lire 1134. 13. 4. prezzo di Libbre 1480. non tarate, e restano Lire 1069. 8. 6. prezzo cercato; il quale è giusto, e per l' appunto; che se manca di Soldo 1. Denari 6. è perche l'altro non è esatto, essendosi lasciati nella tara 10. centesimi.

766. 13. 4

Lire 76. 13. 4 — Lib. 1480.

10 7. 13. 4

10 15. 4

766. 13. 4

306. 13. 4

61. 6. 8

Lire 1134. 13. 4

Lir. 1134. 13. 4 —  $5\frac{1}{4}$

10 113. 9. 4

10 11. 6. 11  $\frac{3}{4}$

4 2. 16. 8  $\frac{1}{4}$

56. 14. 8

8. 10. 2

Tara Lire 65. 4. 10

Lire 1069. 8. 6

12. D. Un Mercante compra Libbre 3480. d'una Mercanzia con Tara di Libbre  $6\frac{2}{3}$  per 10. con pagare le Libbre nette a ragione di Scudi 7. Lire 5. 16. 8. per 100. Domando quanto spenda?

R. Per la 4. di questo si trovino le Libbre di tara, che sono 232. le quali sottratte da Libbre 3480. restano a pagamento 3248, che apprezzate a Scudi 7. Lire 5. 16. 8. per 100. per la seconda dei Partitori valeranno Scudi 254. 2. 19. 9. e tanto spende.

Libbre 3480 — Lib.  $6\frac{2}{3}$  78. 2. 6. 8  
3. — 1160 Scudi 7. 5. 16. 8 — Lib. 3248

20880 10. 5. 9. 8  
10. 10. 11  $\frac{1}{2}$

2320

Tara Lib. 232.00

Libbre 3248 nette.

Scudi 254. 2. 19. 9

Per l'undecima di questo, in altro modo s'apprezzano le Lib. 3480. a Scudi 7. 5. 16. 8. per 100. e vengono Scudi 272. 4. 4. — che Tarati a  $6\frac{2}{3}$  per 100. veranno come sopra Scudi 254. 2. 19. 9

78. 2. 6. 8  
Scudi 7. 5. 16. 8 — Lib. 3480. Sc. 272. 4. 4. 0  
10. 5. 9. 8 10. 27. 1. 16. 4  $\frac{2}{3}$   
10. 10. 11  $\frac{1}{2}$  10. 2. 5. 1. 7  $\frac{1}{2}$  6  $\frac{2}{3}$   
3. 6. 7. 2  $\frac{1}{2}$

235.

31. 2. 6. 8  
6. 1. 17. 4

16. 2. 9. 10

1. 5. 14. 5

272. 4. 4. 0

Tara Scudi 18. 1. 4. 3

Scudi 254. 2. 19. 9

Devo avvertire che Sc. 272.

4. 4. — si possono tarare per la settima di questo levando da 100.  $6\frac{2}{3}$  restano 93  $\frac{1}{3}$ . e partendo Scudi 272. 4. 4. per 10. per 10. e per 3. e moltiplicando il quoziente del primo 10. per 9. del secondo 10. per

Scudi 272. 4. 4. — 93  $\frac{1}{3}$

100 10. 27. 1. 16. 4  $\frac{2}{3}$   
 $6\frac{2}{3}$  10. 2. 5. 1. 7  $\frac{1}{2}$   
93  $\frac{1}{3}$  3. 6. 7. 2  $\frac{1}{2}$

245. 2. 7. 7

8. r. 4. 11

6. 7. 2

Scudi 254. 2. 19. 8

3. del

3. del 3. per 1. e sommando i prodotti s'averanno Scadi 254. 2.  
19. 8. come per gl' altri due modi .

Il prezzo scala 1. Denaro a causa de' rotti, che si pongono secondo l'uso Mercantile, e non Matematico doppo i Denari: perche i Mercanti non curano 1. o vero 2. Denari nel loro conteggiare.

13. D. Il migliajo d'una Mercanzia vale Lire 486. Soldi 184. che valeranno Libbre 3496. levando di Tara Libbre 46.  $\frac{2}{3}$  per migliajo?

R. Prima si levi la Tara dando il 10. all' insù a Libbre 3496. e partendole per 3. le file si moltiplicano per le figure corrispondenti di libbre 46.  $\frac{2}{3}$ . i prodotti si sommino; dalla somma si levino tre figure con un punto, e restano libbre 163. di tara, le quali sottratte da Libbre 3496. restano Libbre nette di Tara 3333. le quali s'apprezzino per la terza de' Partitori verranno Lire 1622. 17. 10. e tanto valeranno:

Libbre 3496	Lire 486. 18. 4	3333
Libbre 3496 ---- 46 $\frac{2}{3}$	10. 48. 13. 10	1000
3. 1165	10. 4. 17. 4 $\frac{2}{3}$	10. 9. 8 $\frac{2}{3}$
<hr/>		
139840	1460. 15. 0	
20976	146. 1. 6	
2330	14. 12. 2	
<hr/>		
Tara Libbre 163 146 si lascia	1. 9. 2	

I lib. nette 3333 <sup>1000</sup> Lire 1622. 17. 10

Mà volendo il prezzo senza tarare la Mercanzia: s'apprezzino Libbre 3496. a Lire 486. 18. 4. il migliajo per la terza de' Partitori, valeranno Lire 1702. 5. 2. le quali si tarino; con partirle tre volte per 10. e poi per 3. le tre file ultimè si moltiplicano per le figure corrisponden- Lire 486. 18. 4 -- 3496  
ti, di 46.  $\frac{2}{3}$ . e somman- 10. 48. 13. 10  
do i prodotti, faranno 10. 4. 17. 4  $\frac{2}{3}$   
Lire 79. 8. 9. di Tara, 10. 9. 8  $\frac{2}{3}$   
che sottratte da Lire  
1702. 5. 2. restano Li- 1460. 15. 0  
re 1622. 16. 5. Pre- 194. 15. 4  
zzo che si voleva; sva- 43. 16. 5  
ria in Soldo, 1. Denari 2. 18. 5  
6. perche nella passa-  
ta la Tara non si le- Lire 1702. 5. 2  
vò a punto.

Lir. 79. 8. 9 Tara.  
Li. 1622. 16. 5  
Le Li.

Le Lire 1702. 5. 2. si possono tarare, come si è fatto: in ultimo della passata, con sottrarre da 1000. la tara di 46.  $\frac{1}{2}$ . e restano 953.  $\frac{1}{2}$ . e per queste moltiplicare in cambio di 46.  $\frac{1}{2}$ . e sommare i prodotti; che verranno le Lire tarate.

1000	Lire 1702. 5. 2. — 953 $\frac{1}{2}$
46 $\frac{1}{2}$	10. 170. 4. 6 $\frac{1}{2}$
953 $\frac{1}{2}$	10. 17. 0. 5 $\frac{1}{2}$
	10. 5. 14. 0 $\frac{1}{2}$
	3. 111. 4
	1532. 0. 8
	85. 2. 3
	5. 2. 2
	11. 4
	Lire 1622. 16. 5

14. D. Uno compra Libbre 486. di Seta con tara di  $\frac{3}{4}$  d' oncia, per Libbra, pagando le Libbre nette di Tara à ragione di Lire 13. 16. 8. la Libbra si domanda quanto spenda?

R. Si levi la tara per la 9. di questo; partendo le libbre 486. per 12. e per 3. Il quoziente per 3. Si moltiplica per 2. e vengono Libbre 27. di tara, che sottratte da 486. restano libb. 459. nette, le quali si apprezzino a lire 13. 16. 8. la libbra, e verranno Lire 6349. 10. che spende il compratore.

Libbre	486. 0 — $\frac{3}{4}$
12.	40. 6
3.	13. 6

Tara Libbre 27. 0  
Libbre 459. nette.

	1383. 6. 8
	138. 6. 8
Lire	13. 16. 8 — 459
	5533. 6. 8
	691. 13. 4
	124. 10. 0
Lire	6349. 10 —

15. Come si trova il prezzo senza Tarare la Seta?

R. Si apprezzano Libbre 486. à Lire 13. 16. 8. e verranno Lire 6723. le quali si tarano, con partirle per 12. e l'avvenuto per 3. & il quoziente si moltiplica per 2. e verranno Lire 373. 10. di Tara, che si sottrano da Lire 6723. e restano Lire 6349. 10.

1383. 6. 8  
 138. 6. 8  
 Lire 13. 16. 8 — 486

5533. 6. 8  
 1106. 13. 4  
 83. 0. 0

Lire 6723. 0. 0

Libre 6723. 0 —  $\frac{1}{4}$  167  
 12. 560. 5  
 3. 186. 15

Tara Lire 373. 10

Lire 6349. 10

16. D. Uno ha venduto libbre 450. di Seta con Tara di  $\frac{1}{4}$  d' oncia per Libbra, apprezzando le libbre nette Scudi 2. Lire 4. 16. 8. Si domanda quanto riceverà in pagamento?

R. Si risolve così: Si apprezzino libbre 450. verranno Scudi 1210. 5. Li quali si partano per 12. e l'avvenuto per 4. e verranno Scudi 25. 1. 11. 3. di Tara; onde sottratti da Scudi 1210. Lire 5. restano Scudi 1185. Lire 3. 8. 9. di pagamento.

269. 0. 6. 8  
 26. 6. 8

Scudi 1210. 5. 0. —  $\frac{1}{4}$

Scudi 1210. 5. 0. —  $\frac{1}{4}$

12. 100. 6. 5. —

4. 25. 1. 11. 3. Tara.

1076. 1. 6. 8

134. 3. 13. 4

Scudi 1185. 3. 8. 9. addi

Scudi 1210. 5. —

### Del Dono Mercantile.

17. D. Che cosa è dono Mercantile?

R. E' una quantità d'alcune Libbre, che dona il Venditore a chi compra la sua Mercanzia, sopra ogni cento, il qual dono vien chiamato Tara sopra 100. da Gio: Battista Zucchetto: come si vede a carte 26. nella sua Arimmetica: onde imparando a levare il Dono della Mercanzia, si farà imparato a levare la Tara sopra cento. Al Compratore è meglio pigliare la Tara, che il Dono delle medesime libbre; perchè pigliando per esempio libbre 5. di Dono, per libbre 100. ne paga libbre 100. e lib. 5. non paga; ma pigliando lib. 5. di Tara per 100. come hò dichiarato di sopra, ne paga solo libbre 95. e libbre 5. non paga, e quando ne pagherà lib. 100. averà più di lib. 5.

18. D. Un Mercante vende a Giulio lib. 2280. di Lana a ragione di Lire 46. 16. 8. il 100. con donargliene libbre 5. per 100. Si domanda quanto doverà pagare Giulio per detta Lana? e quante libbre di Dono averà?

R. Lib.

R. Libbre 105. restano a pagamento libbre 106. onde si moltiplicano Libbre 2380. per 106. il prodotto si parte per 105. e restano libbre a pagamento 2266.  $\frac{2}{3}$  le quali valutate a Lire 46. 16. 8. per 100. valeranno Lire 1061. 11. 1. e tanto pagherà Giulio.

Le libbre 2266  $\frac{2}{3}$  s'avranno ancora con moltiplicare libbre 2380. per 5. e partire il prodotto per 105. ovvero partendo libbre 2380. per 21. e sottraendo il quoziente di libbre 113  $\frac{1}{3}$  di Dono da libbre 2380.

Libbre 105. — 100 — Lib. 2380	468. 6. 8
Libbre 2380.00	Lire 46. 16. 8 — Lib. 2266. $\frac{2}{3}$
5. $\frac{2}{3}$ 47600	46. 13. 8
129. 81. $\frac{2}{3}$ 6800	9. 4. $\frac{2}{3}$
3. Lib. 2266 $\frac{2}{3}$	3. 1. $\frac{2}{3}$
Ovvero Lib. 2380	
per 21. $\frac{2}{3}$ 113 $\frac{1}{3}$	936. 13. 4
	93. 13. 4
A Pagam. Lib. 2266 $\frac{2}{3}$	28. 2. 0
	2. 16. 2
	8 5. 3. 0

Lire 1061. 11. 1

19. D. Si può trovare in altro modo il prezzo delle Libbre, levate le Libbre di Dono.

R. Si può trovare con moltiplicare Lire 46. 16. 8. per lib. 2380. e partire il prodotto per 105. ovvero per i numeri di ripiego Lib. 105 — Li. 46. 16. 8 — Lib. 2380

5. 7. 8. 3. è l'ultimo quoziente di Lire 1061. 11. 1. sarà il prezzo cercato. Questo meglio s'intende per la regola del Trè, come a suo luogo.

per 5	111463. 6. 8
per 7	22292. 13. 4
per 3	3184. 13. 4
	Lire 1061. 11. 1



Delle



# Delle Provvisioni per 100.

20. D. Che cosa è provvisione ?

R. E' un certo assegnamento di moneta, ò di qualche parte di essa, per ogni cento ad Officiali, Riscuotitori, Sensali, Cambisti, ed altri.

21. D. Un Sensale hà fatto vendere ad un Mercante varie Merci, per Lire 2391. 13. 4. e gli si devono Lire 2. per 100. Si domanda quante Lire deve avere di sua senseria, e Provvisione ?

R. Si moltiplicano Lire 2391. 13. 4. per Lire 2. di provvisione, e vengono Lire 4783. 6. 8. le quali si partono per 10. e vengono Lire 478. 6. 8. le quali si partono per 10. e vengono Lire 47. 16. 8. di provvisione da riceverli dal Sensale. Agli Scolari per Prova, si fa fare un'altra Lezzione con la metà del Denaro impiegato, e con doppia Provvisione, come qui si vede, e deve venire il medesimo Denaro di Provvisione.

Prova.	
Lire	2391. 13. 4 — L. 2
10.	4783. 6. 8
10.	478. 9. 8
Provvisione Lire	47. 16. 8
Lire	1195. 16. 8 — 4
10.	4783. 6. 8
10.	478. 6. 8
	47. 16. 8

22. D. Uno di Venezia ordina ad un suo corrispondente in Fiorenza, che gli pigli Pannina, e gli assegna di sua provvisione Sc. 2  $\frac{2}{3}$  per 100. Domando, avendo speso Scudi 386. 5. 13. 4. in Pannina quanto gli si deva di Provvisione ?

R. Si moltiplicano Scudi 386. 5. 13. 4. per Scudi 2.  $\frac{2}{3}$  il prodotto si parta per 10. e 10. ripiego di 100. verranno Scudi 9. Lire 4. 13. 10. di provvisione; Ovvero si partano Scudi 386. 5. 13. 4. per 10. per 10. e per 2. Il quoziente del secondo 10. si moltiplica per Sc. 2. il prodotto si somma col quoziente venuto da 2., e verrà la somma di Scudi 9. Lire 4. 13. 10. di provvisione.

Scudi 386. 5. 13. 4 —  $\frac{2}{3}$  Scudi 386. 5. 13. 4 — 2  $\frac{2}{3}$

2.	193. 2. 16. 8	10.	38. 4. 15. 4
	773. 4. 6. 8	10.	3. 6. 1. 6 $\frac{2}{3}$
		2.	1. 6. 10. 9 $\frac{2}{3}$
10.	967. 0. 3. 4		7. 5. 3. 0 $\frac{2}{3}$
10.	96. 4. 18. 4		

Provvisione Scudi 9. 4. 13. 10 Scudi 9. 4. 13. 10 di Provvisione

23. D. Un Riscuotitore avendo riscosso per altri Lire 1365. 13. 4. e dovendosegli un Soldo per Lira, si domanda quante Lire averà di sua Provvisione ?

Y

R. Fa-

R. Facilmente si sodisfa à questa Domanda ; perchè dovendosi al Riscuotitore un Soldo per Lira , gli si deve la ventesima parte : Onde partendo le Lire riscosse per 20. il quoziente sarà la Provisi-  
one . Si partano dunque Lire 1365. 13. 4. per 20. vengono Lire  
68. 5. 8. di Provisi-  
one .

Lire 1365. 13. 4

Per 20. Lire 68. 5. 8 di Provisi-  
one .

24. D. Per una spedizione in Fiere si deve dare la provisione à ra-  
gione di  $\frac{2}{3}$  per 100. sopra Scudi d' oro 2756. 13. 4. si domanda  
quanto sarà detta Provisi-  
one ?

R. E' da sapersi , che nell' andata del Denaro in Fiera, siccome nel  
ritorno ci si aggiunge  $\frac{2}{3}$  per 100. medesimamente i Banchisti  
si pigliano  $\frac{2}{3}$  per 100. per ogni Tratta , o Rimesa di Denaro, che  
fanno : ma facendo Tratta , e Rimesa si pigliano  $\frac{2}{3}$  per 100. e co-  
si fa bisogno à i Banchisti saper trovare tal Provisi-  
one . Ora nel  
dato esempio si partono Scudi d'oro 2756. 13. 4. per 10. il quo-  
ziente di nuovo per 10. ed il quoziente per 3. il quoziente sarà la  
Provisi-  
one . Lo Scudo d'oro di Fiorenza , lo Scudo delle Stampe  
di Roma , lo Scudo Marche della Fiera, lo Scudo del Sole di Lio-  
ne, ed altri d'altre Piazze si dividono in 20. ed in 12. come la Lira  
in Soldi 20. e Denari 12.

Altro Esempio .

Scudi d'oro 2756. 13. 4 —  $\frac{2}{3}$

Scudi d'oro 820. — —

10. 275. 13. 4

10. 82.

10. 27. 11. 4

10. 8. 4

3.

3. Prod. Sc. 2. 14. 8

Provis. Sc. d' oro 9. 3. 9  $\frac{2}{3}$

25. D. Si può trovare tal provisione in un sola Partizione ?

R. Stimano assai i Banchisti in Fiorenza il trovare la Provisi-  
one in  
una sola riga , e tengono l'operazione segreta , ignorando la  
ragione di tale operare , la quale mi fu domandata una volta da  
un'accreditato Computista , e dirò qui sotto .

Si deva trovare la Pro. di Sc. Marche 588. 15. 4. à ragione di  $\frac{2}{3}$  per 100.

Si partono le figure , o figura delle centinaia di Scudi per 3. ven-  
gono Scudi , l'avanzo s'accompagna con l'altre due figure , le  
quali si partono per 15. e vengono Soldi , l' avanzo si moltiplica  
per 12. per farne Denari ; al prodotto s' aggiungono Denari 3.  
per ogni 5. Soldi , che siano nella domanda ; la somma si parte  
pure per 15. e vengono Denari , ed è trovata la Provisi-  
one in una  
sola riga . Nel dato Esempio si parte il 5. per 3. viene Scudo 1.  
ed avanza 2. che con l'88. dice 288. che si parte per 15. vengono  
Soldi 17. avanza 3. che si moltiplica via 12. fa. 36. ed aggiunti 9.  
Denari

Denari (stante che per ogni Soldi 5. s' aggiungono Denari 3.) e vengono 45. che partiti per 15. vengono Denari 3. sicche la Provisiione è Scudi 1. Soldi 17. Denari 3.

La ragione è di partire per 3. il numero delle centinaia, perche è come partire tutte le figure per 300. essendo che Scudi 309. à ragione di  $\frac{1}{3}$  per 100. danno Scudo 1. di Provisiione. Onde partendo 588. per 300. pure verrebbe Scudo 1. & avanzerebbero Scudi 288. li quali si dovrebbero moltiplicare per 20. e di nuovo partire il prodotto per 300. à trovare i Soldi: mà schifando 20. e 300. per 20. viene 1. e 15. onde perche uno non moltiplica, si partono 288. per 15. e vengono Soldi 17. & avanzano 3. che moltiplicati via 12. fa 36. & aggiunti Denari 9. à causa di Soldi 15. (stante che per lo schifo fatto li Soldi 15. che erano  $\frac{1}{3}$  di Scudo sono diventati  $\frac{1}{3}$  di Soldo cioè denari 9.) fanno 45. che si partono per 15. e vengono Denari 3.

Scudi Monete 588. 15. 4  $\frac{1}{3}$

*Altro Esempio.*

per 3. Scudi 1. 17. 3 Provis. Scudi d' oro 350. 6. 8 —  $\frac{2}{3}$

per 15.

per 3. Soldi 16. 8 Provis.  
per 15.

26. D. Si deve trovare la Provisiione di  $\frac{2}{3}$  per 100. per Tratta, e Rimessa sopra Scudi d' oro 1384. 16. 8. Si domanda quanto sarà?

R. Si moltiplicano Scudi 1384. 16. 8. per 2. il prodotto si parte per 10. il quoziente di nuovo per 10. & il quoziente per 5. e quest' ultimo quoziente è la provisiione: Ovvero si partono Scudi 1384. 16. 8. per 10. per 10. e per 5. nel modo detto, il quoziente per 5. si moltiplica per 2. e darà la medesima Provisiione, e così negli altri Esempi.

Scudi d' oro	1384. 16. 8 $\frac{2}{3}$	Scudi d' oro	1384. 16. 8 — $\frac{2}{3}$
10.	<u>1384. 16. 8</u>	138. 9. 8	
10.	2769. 13. 4	13. 16. 11 $\frac{1}{3}$	
5.	276. 19. 4	2. 15. 4 $\frac{2}{3}$	
	27. 13. 11		

Provisiione Scudi 5. 10. 9  $\frac{2}{3}$

Provisiione Scudi 5. 10. 9

27. D. Si può trovare più brevemente questa provisiione?

R. Da me è stato trovato questo modo. Si moltiplicano gli Scudi da Provisionarsi per 2. le figure, & figura delle centinaia di Scudi si partono per 5. e vengono gli Scudi, le figure avanzate si partono per 25. e vengono Soldi, l'avanzo si moltiplica via 12. e s' aggiunge la metà de Soldi, e si parte la somma, e vengono Denari. Nell' Esempio di sopra si moltiplicano Scudi 1384. 16. 8. per 2.

Y 2

vengo-

Vengono 2769. 13. 4. si partino 27. centinaja per 5. vengono Sc. 5. si partino 269. per 25. vengono Soldi 10. & avanzano 19. che si moltiplicano via 12. fanno 228. & aggiunte 8. metà di Soldi 16. sono 236. che partiti per 25. vengono Denari  $9\frac{1}{5}$ . e tanto per l' appunto è tale Provisiione.

La ragione di tale operare è ; Perchè Scudi 500. importano Sc. 2. di Provisiione à  $\frac{2}{5}$  di Scudo per 100. Per questo si moltiplicano li Scudi da provisionarsi per 2. e si partono le centinaja per 5. che è come si partissero tutti gli Scudi per 500. si parte poi per 25. il numero avanzato per trovare i Soldi, perche tal numero si doveria moltiplicare per 20. e partire il prodotto per 500. ma schiati 20. e 500. per 20. si averanno 1. e 25. &c.

*Altro Esempio.*

Scudi d'oro 1384. 16. 8 —  $\frac{2}{5}$   
per 5.                       
2769. 13. 4

Scudi d'oro 2794. 10. —  $\frac{2}{5}$   
per 5.                       
5589.

per 25. Scudi 5. 10. 9  $\frac{4}{5}$

per 25. Sc. 11. 3. 7

28. D. Si deve aggiungere la provisiione di  $\frac{2}{5}$  per 100. sopra Scudi d' oro Stampe 475. Soldi 17. Denari 4. si domanda quanto farà la detta Provisiione.

R. Per la 24. e 25. di questo si è insegnato il trovarla. In Roma da Banchisti si pratica così : riducono i Soldi in centesimi con moltiplicarli per 5. al prodotto aggiungono la metà de' Denari, e poi partono per 3. gli Scudi soli; dal quoziente distinguono con un punto due figure verso mano destra ( se la provisiione è più di due figure) e si averanno gli Scudi, e centesimi di Provisiione. Si moltiplicano dunque Soldi 17. per 5. fanno 85. aggiunti 2. metà di Denari 4. vengono 87. centesimi, che con gli Scudi 475. faranno così: 475. 87. Ora partono Scudi 475. per 3. e vengono 158. cioè, come hò detto, Scudo 1. 58. centesimi, e questa è la Provisiione, la quale aggiungono à gli Scudi, e centesimi, & operano, come dirò à suo luogo nel trattato de' Cambj.

Sc. d' oro St. 475. 17. 4. —  $\frac{2}{5}$       Scudi Stam. 280. 18. —  $\frac{2}{5}$

5  
per 3 475. 87

5  
per 3 280. 90.

Sc. 1. 58 Provisiione.

93. provisiione.

29. D. Usano in Roma il medesimo modo nel trovare la Provisiione di  $\frac{2}{5}$  per 100.

R. Riducono pure i Soldi in centesimi come hò detto con moltiplicarli per 5. aggiungendo la metà de' Denari ; ovvero con moltiplicare

plicare i Soldi , e Denari per 5. & allora verrebbero i centesimi per l'appunto ; Ma perchè suole venire qualche rotto di centesimo , i Banchisti non vogliono operare con rotti ; non curando poco s'vario , che nella conclusione viene ; & allora partono gli Scudi per 5. e replicano il quoziente , e verrà la Provvisione . Abbiati da trovare la Provvisione di  $\frac{2}{5}$  per 100, dalla passata quantità di Scudi d'oro Stampe 475. 17. 4. secondo loro sarà di Scudi 1. 90. come qui si vede , operando come hò detto .

*Altro Esempio .*

<p>Sc. d' oro Stam. 475. 17. 4. — <math>\frac{2}{5}</math></p> <p style="text-align: center;">5.</p> <hr style="width: 100%;"/> <p>per 5      475. 86 <math>\frac{2}{5}</math></p> <p style="text-align: center;">95</p> <p style="text-align: center;">95</p>	<p>Sc. d' oro St. 3730. — <math>\frac{2}{5}</math></p> <p style="text-align: center;">5.</p> <hr style="width: 100%;"/> <p>per 5      7460</p> <hr style="width: 100%;"/> <p>Scudi 14. 92 Provvisione.</p>
--	--

Nell'altro Esempio si sono gli Scudi moltiplicati per 2. tenendo innanzi il prodotto 7460. due figure à causa de' centesimi , e partito per 5. sono venuti Scudi 14. 92. centesimi di Provvisione , li quali si avrebbero ancora con partire 3730. per 5. e il quoziente con moltiplicarlo per 2., ovvero con replicarlo , come nel primo Esempio .

**Altra sorte di Provvisioni .**

30. D. Si dà altra sorte di Provvisioni ?

R. Le passate Provvisioni si sono trovate sopra quantità di Moneta , le quali comunemente avvengono . Alle volte però si devono levare dalla medesima quantità di Moneta , come appare chiaro dalla seguente Domanda , che si pone facile à posta .

31. D. Pietro dà ad un Sensale Scudi 100. di Lire 7. l'uno , e gli dice pigliati la Provvisione à ragione di Scudi 5. per 100. e gl'altri impiegali in tali Mercanzie . Si domanda la Provvisione del Sensale , e gli Scudi da impiegarsi ?

R. Certa cosa è , che impiegando meno di Scudi 100. non ci si devono Scudi 5. come ci si dovrebbero , impiegandone Scudi 100. che però s'aggiungano Scudi 5. al 100. fanno Scudi 105. dipoi si moltiplicano Scudi 100. de i quali si deve trovare la Provvisione per Scudi 5. provvisione assegnata , fanno 500. li quali partiti per 105. ovvero per i numeri 5. 7. e 3. di ripiego , vengono Scudi 4. Lire 5. 6. 8. di Provvisione , le quali si sottrano da Scudi 100. e restano Scudi 95. 1. 13. 4. da impiegarsi . La ragione s'intende per la Regola del trè , della quale à suo luogo , perchè è come dire ;

dire : se in Scudi 105. ci sono Scudi 5. di Provisions , quanti ne farà in Scudi 100. e si trovano gli Scudi di Provisions .

100      Se 105 ——— 5 ——— 100.

5  
—————

105

5  
—————

per 5    500

per 7    100

per 3    14. Lire 2

Scudi    4. 5. 6. 8 Provisions .

Da impiegarsi    Scudi    95. 1. 13. 4

32. D. Un Signore di Fiorenza consegna Scudi d'oro 1000. ad un Banco ; Il quale debba pigliarsi Scudo  $1 \frac{1}{2}$  per 100. di Provisions da medesimi Sc. mille, e rimettere gl'altri à Roma. Si domanda quanti Sc. faranno di Provisions, e quanti ne saranno rimessi.

R. Il Banco ad utile suo pigliando la Provisions sopra Scudi 1000. à Scudo  $1 \frac{1}{2}$  per 100. piglierebbe Scudi 15. e rimetterebbe Scudi 985. Il che non è tutto giusto; allora farebbe , se quel Signore facesse rimettere Scudi 1000. e desse altri Scudi 15. di provisione .

Volendo trovare gli Scudi da rimetterfi , e la Provisions , si faccia in quest'altro modo : Si aggiunga Scudo  $1 \frac{1}{2}$  à 100. fa Sc. 101  $\frac{1}{2}$  ora si moltiplichì 100. via 1000. Scudi da rimetterfi ; il prodotto si parta per 101.  $\frac{1}{2}$  . e veranno Scudi d'oro 985.4.6. in circa. da rimetterfi , si sottrino da Scudi 1000. restano Scudi 14. 15. 6. di provisione . Perchè è come se si dicesse per regola del trè , se 101.  $\frac{1}{2}$  tornano 100. senza provisione, che torneranno Scudi 1000. e secondo tal regola si opera , come hò detto .

## DISTINZIONE QUINTA

*Delle Monete, Pesi, e Misure della Città  
di Fiorenza .*

**D** Oblone vale Lire ——— 40  
Doppia, ò Dobra Lire 20  
Zecchino vale Lire 13. Soldi 6. 4.  
Unghero vale Lire ——— 12  
Scudo, Piastra, ò Ducato vale  
Lire ——— 7

Tollero, ò Livornina vale Lire 6  
Lira Soldi ——— 20  
Soldo Denari ——— 12  
Scudo Moneta Lire ——— 7  
Soldo di Scudo moneta Soldi 7  
Denaro di Scudo Moneta Den. 7

PER IL

# PER IL CAMBIO..

## Moneta Immaginaria.

Scudo d'oro vale Lire	7 $\frac{1}{2}$
Soldo di Scudo d'oro Soldo	7 $\frac{1}{2}$
Denaro di Scudo d'oro Den.	7 $\frac{1}{2}$
Livornino, ò Tellerq Lire	6
Pezza di Pisa Lir. 5. Soldi	15
Pezza in Fiorenza Lire 5. 13. 4	
Stellino Lir. 2. Soldi 3.	
Testone Lire	2
Giulio, ò Paolo Soldi	13. 4
Carlino ò mezza Lira Soldi	10
Grosso Soldi 6. Denari 8	
Crazia Soldi 1. Denari 8	
Quattrino Denari	4

## P E S I.

Libbra Once	12
Oncia Denari	24
Denaro Grani	24
Marco d'oro Once	8
Oncia come sopra	

# MISURE.

175

Moggia Staja	24
Moggio Sacca	8
Sacco Staja	3
Stajo Quarti	4
Quarto Metadelle	4
Metà della Mezzette	2
Mezzetta Quartucci	2
Cogno del Vno Barili	10
Barile Fiaschi	20
Fiasco Mezzette	4
Mezzetta quartucci	2
Barile dell'Olio Fiaschi	16
Fiasco come sopra.	
Canna Braccia	4
Braccio Once	12

## MISURE DI TERRENO.

Stajoro Pamora	12
Panaro Pugnora	12
Pagnoro Braccia quadre	12

Del commutare una sorte di Moneta in un' altra .

1. D. Come di Soldi si fanno Quattrini, e di Quattrini Soldi?  
 R. Si moltiplicano i Soldi per 3. e vengono Quattrini; ed i Quattrini si partono per 3. e vengono Soldi; ed una operazione è prova dell'altra, come si può osservare. Per esempio, Soldi 3478. si moltiplicano per 3. e vengono Quattrini 10434. questi si partono per 3. e vengono Soldi 3478. come prima.

$$\begin{array}{r} \text{Soldi } 3478 \text{ — per } 3 \\ \hline \text{Quattrini } 10434 \end{array}$$

10434 Quattrini.

3478. Soldi.

2. D. Come di Quattrini si fanno Denari, e di Denari Quattrini?

- R. Si moltiplicano i quattrini per 4. e vengono Denari; i Denari si partono per 4. e vengono Quattrini; Come moltiplicando Quattrini 827. per 4. vengono Denari 3308. e partendo questi per 4. tornano Quattrini 827.

$$\begin{array}{r} \text{Quattrini } 827 \text{ — per } 4 \\ \hline \end{array}$$

3308 Denari

$$\begin{array}{r} \text{Denari } 3308 \\ \hline \end{array}$$

per 4

827 Quattrini.

3. D. Co-

3. D. Come di Crazie si fanno Quattrini, e di Quattrini Crazie?

R. Si moltiplicano le Crazie per 5. e vengono Quattrini, & i Quattrini si partono per 5. e tornano Crazie; come Crazie 3254. moltiplicate per 5. vengono quattrini 16270. e partiti questi per 5. tornano Crazie 3254.

Crazie	3254 — per 5	Quattrini	16270
	<hr/>	per 5	<hr/>
	16270 Quattrini		3254 Crazie.

4. D. Come di Giulj si fanno Crazie, e di Crazie Giulj?

R. Si moltiplicano i Giulj per 8. e vengono Crazie e le Crazie si partono per 8. e vengono Giulj, perchè Crazie 8. fanno un Giulio; come Giulj 826. moltiplicati per 8. vengono Crazie 6608. e queste partite per 8. tornano Giulj 826.

Giulj	826 — per 8	Crazie	6608
	<hr/>	per 8	<hr/>
	6608. Crazie.		826 Giulj.

5. D. Come di Lire si fanno Crazie, e di Crazie Lire?

R. Si moltiplicano le Lire per 12. e vengono Crazie, e le Crazie si partono per 12. e vengono Lire; Perchè Crazie 12. fanno una Lira; come Lire 1486. moltiplicate per 12. fanno Crazie 17832. queste partite per 12. tornano Lire 1486.

Lire	1486 — per 12	Crazie	17832
	<hr/>	per 12	<hr/>
	17832 Crazie.		1486 Lire.

6. D. Come di Scudi si fanno Lire, e di Lire Scudi?

R. Si moltiplicano li Scudi per 7. e vengono Lire, e le Lire si partono per 7. e vengono Scudi; Perchè Lire 7. fanno uno Scudo; come Scudi 250. moltiplicati per 7. vengono Lire 1750. queste partite per 7. tornano Scudi 250.

Scudi	250 — per 7	Lire	1750
	<hr/>	per 7	<hr/>
	1750 Lire		250 Scudi.

7. D. Come di Tollerj si fanno Lire, e di Lire Tollerj?

R. Si moltiplicano i Tollerj per 6. e vengono Lire, e queste si partono per 6. e tornano Tollerj; Perchè Lire 6. fanno un Tollerio come Tollerj 528. moltiplicati per 6. vengono Lire 3168. queste partite per 6. tornano Tollerj 528.

Tollerj



Tolleri 528 — per 6.

Lire 3168.

3168 Lire.

per 6 528 Tolleri

8. D. Come di Soldi si fanno Denari, e di Denari Soldi?

R. Si moltiplicano i Soldi per 12. e vengono Denari; questi si partono per 12. e tornano Soldi; Perchè Denari 12. fanno una Lira; come Soldi 2453. moltiplicati per 12. vengono Denari 29436. e questi partiti per 12. Tornano Soldi 2453.

Soldi 2453 — per 12

Denari 29436

per 12

29436 Denari.

2453 Soldi

9. D. Come di Lire si fanno Soldi, e di Soldi Lire?

R. Si moltiplicano le Lire per 20. e vengono Soldi, questi si partono per 20. e tornano Lire; Perchè Soldi 20. fanno una Lira; come Lire 528. moltiplicate per 20. vengono Soldi 10560. e questi partiti per 20. tornano Lire 528.

Lire 528 — per 20

Soldi 10560

per 20

10560 Soldi.

528 Lire.

E così di tutte l'altre Monete, che con una sola operazione, o di moltiplicare, o di partire si commutano.

10. D. Come di Giulj 386. si fanno Lire, e di Lire Giulj?

R. Si partono i Giulj per 3. l'avanzo si converte in Soldi, e Denari Monete inferiori della Moneta, che n'ha da venire, nelle quali si divide la Lira, e questo sia avvertito anche per le seguenti Domande, e verranno 128. 13. 4. che si sottrano da 386, restano Lire 257. 6. 8. e tante sono Giulj 386. e le Lire si partono per 2. il quoziente si somma con le Lire, e torneranno i Giulj detti. La ragione è; perchè Giulj 3. sono Lire 2.

Giulj 386

Lire 257. 6. 8

per 3. 128. 13. 4

per 2. 257. 13. 4

Lire 257. 6. 8

Giulj 386. — 0

11. D. Come in altro modo i Giulj si fanno Lire, e di Lire Giulj?

R. Si moltiplicano i Giulj per 2. il prodotto si parte per 3. riducendo l'avanzo in Soldi, e Denari, e verranno Lire &c. queste si moltiplicano per 3. il prodotto si parte per 2. e verranno Giulj; perchè il Giulio è di Grossi 2. la Lira è di Grossi 3.

178.

Giulj 386 — per 2

Lire 257. 6. 8 — 3

per 3. 772

per 2. 772. 0. 0

Lire 257. 6. 8

Giulj 386.

12. D. Come di Giulj si fanno Scudi, Lire, Soldi, e Denari, e questi fanno Giulj?

R. Si moltiplicano i Giulj per 2. e vengono Grossi, li quali si partono per 21. ovvero per 3. e per 7. numeri di ripiego, e verranno Scudi &c. perche Grossi 21. fanno uno Scudo. Gli Scudi &c. si moltiplicano per 21. il prodotto si parte per 2. e verranno Giulj, per la ragione detta: Come Giulj 340. moltiplicati per 2. fanno Grossi 680. che partiti per 21. vengono Scudi 32. Lire 2. 13. 4. che moltiplicati per 3. e per 7. e partito l'ultimo prodotto per 2. tornano Giulj.

Giulj 340 — 2

Scudi 32. 2. 13. 4 — 3

per 3 680

97. 1. — 0 — 7

per 7 226. 4. 13. 4

per 2. 680

Scudi 32. 2. 13. 4

340 Giulj

13. D. Come di Giulj si fanno Scudi moneta, e di Scudi moneta si fanno Giulj?

R. Si opera come nella passata, avvertendo di ridurre l'avanzo in Soldi, e Denari. Per Esempio: Giulj 2618. si moltiplicano per 2. il prodotto 5236. si parte per 21. e vengono Scudi moneta 249. Soldi 6. Denari 8. li quali di nuovo moltiplicati per 21. il prodotto si parte per 2. tornano Giulj 2618. per la ragione detta.

Giulj 2618 — 2

Sc. moneta 249. 6. 8 — 21

per 21. 5236

per 2 5236

Sc. moneta 249 6. 8

2618 Giulj.

14. D. Come di Giulj si fanno Scudi d'oro di Lire 7  $\frac{1}{2}$  l'uno, e di questi si fanno Giulj?

R. Si moltiplicano i Giulj per 4. e vengono mezzi Grossi, li quali si partono per 45. ovvero per i numeri di ripiego 5. 9. e vengono Scudi d'oro; perchè 45. mezzi Grossi fanno uno Scudo d'oro, e li Scudi

li Scudi d'oro si moltiplicano per 9. ed il prodotto per 5; numeri di ripiego del 45. il prodotto si parte per 4. e vengono Giulj. per la ragione detta; E perchè Scudi d'oro 4. sono 45. Giulj. Come Giulj 3480. moltiplicati per 4. vengono mezzi Grossi 13920. li quali si partono per 5. e il quoziente per 9. e vengono Sc. d'oro 309. Soldi 6. Denari 8. e questi moltiplicati per 9. e il prodotto per 5. e il prodotto partito per 4. tornano Giulj 3480. e così. s' opera in altri.

<p>Giulj 3480 — 4 .. Scudi d'oro 309. 6. 8 — 9</p> <p>per 5. <u>          </u></p> <p>13920</p> <p>per 9. <u>2784</u></p> <p>Scudi d'oro 309: 6: 8</p>	<p><u>          </u></p> <p>2784. 0. 9 — 5</p> <p><u>          </u></p> <p>per 4. 13920.</p> <p><u>          </u></p> <p>3480 Giulj.</p>
--	--

15. D. Come di Lire si fanno Scudi d'oro, e di questi si fanno Lire?  
 R. Si moltiplicano le Lire per 2. e vengono mezze Lire, queste si partono per 15. e vengono Scudi d'oro; Perchè uno Scudo d'oro è 15. mezze Lire. Gli Scudi d'oro poi si moltiplicano per 15. e vengono mezze Lire, che si partono per 2. e vengono Lire; come Lire 384. 3. 9. si moltiplicano per 2. fanno 768. 7. 6. che si partono per 15. e vengono Scudi d'oro 51. 4. 6. Questi si moltiplicano per 15. e 768. 7. 6. si partono per 2. e vengono Lire 384. 3. 9.

<p>Lire 384. 3. 9 — 2</p> <p><u>          </u></p> <p>per 15 768. 7. 6</p> <p><u>          </u></p> <p>Scudi d'oro 51. 4. 6</p>	<p>Scudi d'oro 51. 4. 6 — 15</p> <p><u>          </u></p> <p>per 2. 768. 7. 6</p> <p><u>          </u></p> <p>Lire 384. 3. 9</p>
---	--

16. D. Come di Testoni si fanno Scudi moneta, e di questi si fanno Testoni?  
 R. Si moltiplicano i Testoni per 2. e vengono Lire, queste si partono per 7. riducendo l'avanzo in Soldi, e Denari, e verranno Scudi moneta di Lire 7. l'uno. Questi poi si moltiplicano per 7. il prodotto si parte per 2. e tornano Testoni. Come Testoni 1724. moltiplicati per 2. vengono Lire 3448. le quali partite per 7. vengono Scudi Moneta 492. Soldi 11. 5. 7. Questi moltiplicati per 7. tornano Lire 3448. le quali partite per 2. tornano Testoni 1724.

Testoni  $1724. --- 8$

Scudi moneta  $492. 11. 5 \frac{2}{7} --- 7$

per 7.  $3448$

per 2.  $3448$

Scudi moneta  $492. 11. 5 \frac{2}{7}$

$1724.$  Lire

17. D. Come di Testoni si fanno Scudi d'oro, e di Scudi d'oro Testoni?

R. Si moltiplicano i Testoni per 4. e vengono mezz' Lire, le quali si partono per 15. e vengono Scudi d'oro; e questi si moltiplicano per 15. e tornano mezz' Lire, che si partono per 4. e tornano Testoni: Perchè 15. Testoni sono 4. Scudi d'oro; Come Testoni 534. moltiplicati per 4. vengono 2136. mezz' Lire, le quali partite per 15. vengono Scudi d'oro 142. Soldi 8. li quali moltiplicati per 15. tornano 2136. che si partono per 4. e tornano Testoni 534.

Testoni  $534 --- 4$

Scudi d'oro  $142. 8 --- 15$

per 15.  $2136$

per 4.  $2136$

Scudi d'oro  $142. 8$

$534$  Testoni

18. D. Come di Scudi moneta di Lire 7. si fanno Scudi d'oro di Lire  $7 \frac{2}{7}$ . e di questi si fanno Scudi moneta?

R. Si partono gli Scudi moneta per 15. il quoziente si sottra dalli Scudi moneta, e vengono Scudi d'oro, li quali Scudi d'oro si partono per 14. il quoziente si somma con gli Scudi d'oro, e vengono Scudi moneta; Perchè Scudi moneta 15. sono Scudi d'oro 14. onde a quelli levando la quintadecima parte restano Scudi d'oro, ed a questi aggiungendo la quartadecima parte vengono Scudi moneta; Come Scudi moneta 976. 12. 6. partiti per 15. vengono 65. 2. 2. che sottratti da 976. 12. 6. restano Scudi d'oro 911. 10. 4. li quali partiti per 14. vengono 65. 2. 2. che sommati con 911. 10. 4. tornano Scudi moneta 976. 12. 6.

Scudi moneta  $976. 12. 6$

Scudi d'oro  $911. 10. 4$

per 15.  $65. 2. 2$

per 14.  $65. 2. 2$

Scudi d'oro  $911. 10. 4$

Scudi moneta  $976. 12. 6$

19. D. Come in altro modo si fanno di Scudi moneta, Scudi d'oro, e di questi si fanno Scudi Moneta?

R. Gli Scudi moneta si moltiplicano per 14. e vengono mezz' Lire. queste

queste si partono per 15. e vengono Scudi d'oro, e questi si moltiplicano per 15. e vengono mezze Lire, le quali si partono per 14. e vengono Scudi moneta; Come Scudi moneta 488. 6. 3. moltiplicati per 14 fanno 6836. 7. 6. che si partono per 15. e vengono Scudi d'oro 455. 15. 2. e questi moltiplicati per 15. tornano 6836. 7. 6. che si partono per 14. e tornano Scudi moneta 488. 6. 3. per la ragione detta.

Scudi moneta 488. 6. 3 — 14      Scudi d'oro 455. 15. 2 — 15

per 15      6836. 7. 6

per 14.      6836. 7. 6

Scudi d'oro      455. 15. 2

Scudi moneta      488. 6. 3

20. D. Come di Tollerì di Lire 6. si fanno Scudi moneta, e di questi si fanno Tollerì?

R. I Tollerì si partono per 7. il quoziente si sottra da' Tollerì, e restano Scudi; questi si partono per 6. il quoziente si somma con li Scudi, e tornano Tollerì; Perchè Tollerì 7. sono Scudi 6. come Tollerì 588. partiti per 7. il quoziente 84. sottratto da 588. restano Scudi 504. i quali partiti per 6. il quoziente 84. si somma con Scudi 504. e tornano Tollerì 588.

Tollerì 588

Scudi 504

per 7      84

per 6.      84

Scudi 504

Tollerì 588

21. D. Come in altro modo, di Tollerì si fanno Scudi, e di questi si fanno Tollerì?

R. Si Moltiplicano i Tollerì per 6. e vengono Lire, le quali si partono per 7. e vengono Scudi, e questi si moltiplicano per 7. e vengono Lire, le quali si partono per 6. e tornano Tollerì; Come Tollerì 340. moltiplicati per 6. vengono Lire 2040. le quali si partono per 7. e vengono Scudi 291. Lire 3. questi si moltiplicano per 7. e tornano Lire 2040. le quali si partono per 6. e vengono Tollerì 340.

Tollerì 340 — 6

Scudi 291. 3 — 7

per 7.      2040

per 6.      2040

Scudi 291. Lire 3

Tollerì 340.

22. D.

22. D. Come di Tolleri si fanno Scudi d'oro, e di questi si fanno Tolleri?

R. Si partono i Tolleri per 5. il quoziente si sottra da' Tolleri, e restano Scudi d'oro. Questi si partono per 4. il quoziente si somma con gli Scudi d'oro, e tornano Tolleri; Perchè Tolleri 5. sono Scudi d'oro 4. come Tolleri 1570. partiti per 5. il quoziente 314. si sottra da 1570. restano Scudi d'oro 1256. Questi partiti per 4. il quoziente 314. sommati con 1256. e tornano Tolleri 1570.

Tolleri 1570	Scudi d'oro 1256
per 5. 314	per 4. 314

Scudi d'oro 1256

Tolleri 1570

23. D. Come di Pezze Reali di Lire 5. 13. 4. si fanno Scudi moneta, e di questi si fanno Pezze Reali?

R. Si moltiplicano le Pezze per 17. e vengono Grossi, questi si partono per 21. ovvero per 3. e 7. numeri di ripiego, e vengono Scudi moneta; perchè Grossi 21. fanno un Scudo moneta; gli Scudi moneta poi si moltiplicano per 21. ovvero per 7. e per 3. e si partono per 17. e tornano Pezze; Come Pezze 730. moltiplicate per 17. fanno 12410. che partite per 3. e vengono Scudi moneta 590. Soldi 19. 0  $\frac{2}{3}$ . questi moltiplicati per 7. e per 3. e partito il prodotto 12410. per 17. tornano Pezze 730.

Pezze 730 — 17

Sc. moneta 590. 19. 0.  $\frac{2}{3}$  — 7

per 3. 12410

4136. 13. 4 — 3

per 7. 4136. 13. 4

per 17. 12410

Sc. moneta 590. 19. 0  $\frac{2}{3}$

730 Pezze.

24. D. Come di Pezze Reali di Lire 5  $\frac{2}{3}$  si fanno Scudi d'oro, e di questi si fanno Pezze?

R. Si moltiplicano le Pezze per 17. e vengono Grossi, li quali si moltiplicano per 2. e vengono mezzi Grossi, che si partono per 5. e per 9. numeri di ripiego di 45. e vengono Scudi d'oro; Per questi si moltiplicano per 9. il prodotto per 5. e vengono mezzi Grossi, li quali si partono per 2. vengono Grossi, che si partono per 17. e vengono Pezze; Perchè Grossi 17. fanno una Pezza, e 45. mezzi Grossi uno Scudo d'oro; come Pezze 780. moltiplicate per 17. vengono Grossi 13260. e questi per 2. vengono mezzi Grossi 26520. che partiti per 5. il quoziente per 9. vengono Sc. 589. 6. 8. e questi si moltiplicano per 9. il prodotto per 5. e vengono mezzi Grossi

183

Grossi 26520., che si partono per 2. e vengono Grossi 13260. li quali si partono per 17. e tornano Pezze 782. per la ragione detta.

Pezze Reali . 782 — 17

Scudi d'oro — 589. 6. 8. — 9

Grossi 13260 — 2

5304. — 5

per 5. 26520

per 2. 26520

per 9. 5304

per 17. 13260

Scudi d'oro 589. 6. 8.

782 Pezze Reali.

25. D. Come di Pezze di Lire 5. e Soldi 15. si fanno Scudi moneta, e di questi si fanno Pezze.

R. Si moltiplicano le Pezze per 23. il prodotto si parte per 4. e vengono Lire, le quali si partono per 7. e vengono Scudi, li quali si moltiplicano per 7. e tornano Lire, che si moltiplicano per 4. e tornano quarti di Lira, li quali si partono per 23. che tanti quarti di Lira vale la Pezza, e verranno Pezze, per la ragione detta: ovvero, perchè Scudi 23. sono Pezze 28. Come Pezze 300. moltiplicate per 23. vengono 6900. quarti di Lira, che si partono per 4. e vengono Lire 1725. le quali si partono per 7. e vengono Scudi moneta 246. 8. 6.  $\frac{5}{7}$  li quali si moltiplicano per 7. & il prodotto per 4. e tornano 6900. quarti di Lira, che si partono per 23. e tornano Pezze 300.

Pezze 300 — 23

Scudi moneta 246. 8. 6  $\frac{5}{7}$  — 7

per 4. 6900

1725. — 4

per 7. 1725 Lire.

per 23. 6900

Scudi moneta 246. 8. 6  $\frac{5}{7}$

Pezze 300.

26. D. Come di Pezze di Lire 5  $\frac{1}{2}$  si fanno Scudi d'oro, e di questi si fanno Pezze.

R. Si moltiplicano, per esempio Pezze 300. per 23. vengono 6900. quarti di Lira, si partono per 2. e vengono 3450. mezze Lire, le quali si partono per 15. ( che tante mezze Lire fanno uno Scudo d'oro ) e vengono Scudi d'oro 230. li quali moltiplicati per 15. e il prodotto per 2. è 6900. si partono per 23. tornano Pezze 300.

Pezze

Pezze 330 — 23

Scudi d'oro 230 — 15

per 2. 6900

3450 — 2

per 15. 3450

per 23. 6900

Scudi d'oro 230

Pezze 300

27. D. Come di Stellini si fanno Scudi, Lire, Soldi, e Denari, e di questi si fanno Stellini?

R. Si moltiplicano, per esempio Stellini 1290. per 43. vengono Soldi 55470. li quali si partono per 10. & il quoziente per 14. e vengono Scudi 396. Lir. 1. 10. e per farne Stellino; si moltiplicano per 14. il prodotto per 10. e tornano Soldi 55470. li quali partiti per 43.; perchè uno Stellino tanti Soldi vale, e tornano Stellini 1290. ma fatti di Stellini Soldi, e partiti questi per 10. e il quoziente per 15. vengono Scudi d'oro, &c.

Stellini 1290 — 23

Scudi 396. 1. 10. — 14

3870

5160

per 10

per 14. 55470

Scudi 396. 1. 10

per 43. 55470 — 10

124

387

Stell. 1290. — 0

28. D. Come di Zecchini si fanno Scudi d'oro; e di questi si fanno Zecchini?

R. Si partono, per esempio Zecchini 520. il quoziente 173. 6. 8. si somma con 520. e vengono Scudi d'oro 693. 6. 8. li quali si partono per 4. il quoziente si sottra da 693. 6. 8. e tornano Zecchini 520. Perchè Zecchini 3. sono Scudi d'oro 4.

Zecchini 520

per 3. 173. 6. 8

Scudi d'oro 693. 6. 8

per 4. 173. 6. 8

Scudi d'oro 693. 6. 8

Zecchini 520. 0. 0

29. D. Come in altro modo si fanno di Zecchini Scudi d'oro, e di questi Zecchini?

R. Si moltiplicano gli Zecchini per 4. il prodotto si parte per 3. e vengono Scudi d'oro; e questi si moltiplicano per 3. il prodotto si parte per 4. e tornano Zecchini per la ragione detta; Onde Zecchini 520. moltiplicati per 4. fanno 2080. che partiti per 3. vengono Scudi d'oro 693. 6. 8. questi moltiplicati per 3. il prodotto partito per 4. tornano Zecchini 520.



Zecchini 520 — 4. 693. 6. 8. — 3 <sup>185</sup>

per 3. 2080 per 4. 2080. 0. 0.

Scudi d'oro 693. 6. 8 Zecchini 520

30. D. Come di doppie si fanno Scudi d'oro, e di questi si fanno Doppie?

R. Si moltiplicano per esempio Doppie 340. per 8. il prodotto 2720. si parte per 3. e vengono Scudi d'oro 906. 12. 4. li quali si moltiplicano per 3. il prodotto si parte per 8. e tornano Doppie 340. perche Doppie. 3. sono Scudi d'oro 8.

Doppie 340. — 8 Scudi d'oro 906. 13. 4. — 3

per 3. 2720 per 8. 2720

Scudi d'oro 906. 13. 4 340 Doppie.

Per fare di Doblioni Scudi d'oro, quelli si moltiplicano per 16. il prodotto si parte per 3. e vengono Scudi d'oro, per essere il Doblone di doppio valore della Doppia, &c.

31. D. Come di Scudi Romani di Giulj 10. l'uno si fanno Scudi di Fiorenza di Lire 7. e di questi si fanno Scudi Romani?

R. Agli Scudi Romani, senza Bajocchi, s'aggiungono due zeri, per la moltiplicazione di 100. in fine degl'istessi Scudi, e poi si partono per 5. 7. 2. numeri di ripiego di 105. La ragione è, perchè Scudi 105. Romani sono Scudi Fiorentini di Lire 7. cento, e vengono Scudi Fiorentini, li quali si moltiplicano per 105. ovvero per i numeri di ripiego, e dall'ultimo prodotto si levano due zeri, e restano Scudi Romani per la ragione detta. Come Scudi Romani 1724. operato come hò detto, vengono Scudi di Fiorenza 1641. Lire 6. Soldi 6. Denari 8.

Scudi Romani 172400 Scudi Fior. 1641. 6. 6. 8 — 3

per 5. 34480 3925. 5. 0. 0 — 7

per 7. 4925. 5 34480. 0. 0. 0 — 5

per 3. Sc. Fio. 1641. 6. 6. 8

Scudi Rom. 1724.00

32. D. Quando, oltre gli Scudi Romani, ci sono i Bajocchi, per farne Scudi Fiorentini di Lire 7. come si opera?

R. Agli Scudi Romani allora non s'aggiungono zeri; mà gli stessi Bajoc-

A a

Bajocchi servono per questi; del resto si opera come si è detto : per esempio Scudi Romani 376. Bajocchi 42. si partono per 105. ovvero per i numeri di ripiego 5.3.7. e vengono Scudi Fiorentini 358. Lire 3. 9. 4. li quali moltiplicati per 5. 3. e 7. torneranno Scudi Romani 376. Bajocchi 42. per la ragione detta, e perchè Bajocchi 105. sono uno Scudo di Lire 7,

Scudi Rom. 376.42

Sc. Fiorentini: 358. 3. 9. 4 — 5

Per 5. 7528. 2. 16.

per 3. 2509. 3. 5. 4

per 7. —————

Sc. Fiorentini 358. 3. 9. 4

1792. 3. 6. 8 — 3

5377. 3. 0. 0 — 7

Scudi Rom. 376.42

33. D. Come di Soldi di Lira Fiorentina si fanno Bajocchi Romani, e di questi si fanno Soldi?

R. I Soldi si partono per 4. il quoziente si sottra da' Soldi, e restano Bajocchi: Questi si partono per 3. il quoziente si somma con i Bajocchi, e tornano Soldi; Come Soldi 5740. partiti per 4. il quoziente 1435. si sottra da 5740. e restano Bajocchi 4305. Questi si partono per 3. e 1435. si sottrano con 4305. e tornano Soldi 5740. Perchè Soldi 4. sono Bajocchi 3.

Soldi.

Bajocchi.

per 4. 5740  
1435 sottra

per 3. 4305  
1435 Somma

Bajocchi 4305

Soldi 5740.

34. D. Come in altro modo di Soldi si fanno Bajocchi, e di Bajocchi Soldi?

R. Si moltiplicano i Soldi per 3. e vengono quattrini, li quali si partono per 4. e vengono Bajocchi, e questi si moltiplicano per 4. e vengono Quattrini, li quali si partono per 3. e tornano Soldi; per chè il Soldo è 3. Quattrini il Bajocco 4. quattrini Fiorentini; Onde Soldi 6740. moltiplicati per 3. vengono Quattrini 17220. li quali si partono per 4. e vengono Bajocchi 4305. li quali moltiplicati per 4. tornano Quattrini 17220. che partiti per 3. tornano Soldi 5740.

Soldi 5740 — 3

Bajocchi 4305 — 4

per 4. 17220

per 3. 17220

Bajocchi 4305

Soldi 5740 35. D.

35. D. Come di Fiorini delle Decime si fanno Lire, Soldi, e Denari, e di queste si fanno Fiorini; Valendo il Fiorino Lire 7. Soldi 7.  
 R. Si moltiplicano i Fiorini per 7. il prodotto si parte per 20. ed il quoziente, con il prodotto si somma, e vengono Lire, Soldi, e Denari, li quali si partono per 21. il quoziente si sottra dalle Lire; il restato numero si parte per 7. e vengono Fiorini 5. Soldi 13. Denari 4. moltiplicati per 7. fanno 39. 13. 4. che partito per 20. il quoziente 1. 19. 8. si somma con 39. 13. 4. e vengono Lire 41. Soldi 13. Queste partite per 21. viene 1. 19. 8. che sottratto da 41. 13. tornano 39. 13. 4. che partito per 7. tornano Fiorini 5. 13. 4. perchè il Fiorino vale Lire 7. Soldi 7.

Fiorini 5. 13. 4. — Li. 7. 7

Lire 41. 13. 0  
 per 21. 1. 19. 8

per 20. 39. 13. 4  
 1. 19. 8

Lire 41. 13. 0

per 7. 39. 13. 4

Fiorini 5. 13. 4

### Del contarli le Monete à Mani.

Quattro Monete fanno una Mano, e 105. Mani di quattrini Fiorentini fanno uno Scudo di Lire 7. Per il che ancora 105. Mani d'altre Monete faranno tanti Scudi, quanti quattrini valerà una di quelle Monete: Per esempio; 105. Mani di Grazie faranno Scudi 5. Perchè una Crazia vale 5. Quattrini; di Grossi faranno 20. Scudi, &c.

36. D. Come di Mani d'una sorte di Moneta, si fa altra Moneta?

R. Per regola generale si moltiplicano le Mani di Monete per 4. e verranno Monete semplici, le quali si riducono in altre Monete, come si è insegnato: Per esempio; Di Mani 368. di Giulj si facciano Lire. Si moltiplichino 378, per 4. verranno Giulj 1512. Questi si riducono in Li. per la 10. e per la 11. e verranno Li. 1008

37. D. Come di Mani 378. di Giulj si fanno Lire, e di queste si fanno Mani di Giulj?

R. Si moltiplicano 378. per 8. e vengono Grossi, li quali si partono per 3. e vengono Lire. 1008. le quali si moltiplicano per 3. e vengono Grossi 3024. che si partono per 8. e tornano Mani 378. di Giulj.  
 Mani di Giulj 378. — 8

Lire .. 1008 — 3

per 3. 3024

Lire 1008

per 8. 3024

Mani di Giulj 378

A a 2

38. D.

38. D. Come di Mani di Grazie si fanno Scudi, Lire, Soldi, e Denari, e di questi si fanno Mani di Grazie?

R. Le Mani di Grazie si partono per 21. ovvero per 3. e per 7. numeri di ripiego, e vengono Scudi, Lire, Soldi, e Denari; Perchè una Mano di Grazie è un Grosso, e Grossi 21. un Scudo; Come Mani di Grazie 520. si partono per 21. e vengono Scudi 24. Lire 5. Soldi 6. Denari 8. le quali si moltiplicano per 21. e tornano Mani di Grazie 520.

<i>Mani di Grazie.</i>		Scudi 24. 5. 6. 8 — 21
per 21.	520	<hr/>
Scudi	24. 5. 6. 8	520 Mani di Grazie.

39. D. Come di Mani 2715. di Grazie si fanno Scudi d'oro, e di questi si fanno Mani di Grazie?

R. Mani 2715. si moltiplicano per 2. e vengono 5430. mezzi Grossi li quali si partono per 5. e per 9. numeri di ripiego di 45. e vengono Scudi d'oro 120. 13. 4. Perchè un Scudo d'oro è 45. mezzi Grossi. Li Scudi d'oro si moltiplicano per 9. e 5. e tornano mezzi Grossi 5430. li quali si partono per 2. e tornano Mani 2715. di Grazie.

<i>Mani di Grazie.</i>		Scudi d'oro 120. 13. 4. — 9
	2715 — 2	<hr/>
per 5.	5430	1086. 0. 0. — 5
per 9.	1086	<hr/>
Scudi d'oro	120. 13. 4	per 2. 5430
		<hr/>
		2715 Mani di Grazie.

40. D. Come di mani 480. di Grossi si fanno Scudi Lire, Soldi, e Denari, e di questi si fanno Mani di Grossi?

R. Si moltiplicano Mani 480. per 4. e vengono Grossi 1920. li quali si partono per 3. e vengono Lire 640. le quali si partono per 7. e vengono Scudi 91. Lire 3. per farne Mani di Grossi, si opera al contrario.

<i>Mani di Grazie.</i>		Scudi 91. 3 — 7
	480 — 4	<hr/>
per 3.	1920	640. 0 — 3
per 7.	640	<hr/>
Scudi	91. 3	per 4. 1920
		<hr/>
		Mani 480 di Grossi.
		<hr/>
		41. D.

41. D. Come di mani di Grossi si fanno Scudi d'oro, e di questi si fanno Mani di Grossi?

R. Si moltiplicano 1800. Mani di Grossi per 8. e vengono 14400. mezzi Grossi, li quali si partono per 5. ed il quoziente 2880. si parte per 9. e vengono Scudi d'oro 320. di questi per farne Mani di Grossi s'opera al contrario?

<i>Mani di Grossi.</i>	<i>Scudi d'oro</i>
1800 — 8	320 — 9
per 5. 14400	2880 — 5
per 9. 2880	per 8. 14400
<i>Scudi d'oro</i> 320	<i>Mani di Gr.</i> 1800.

42. D. Come di Mani 694. di Giulj si fanno Scudi, Lire, Soldi, e Denari, e di questi si fanno mani di Giulj?

R. Si moltiplicano Mani 694. per 8. e vengono Grossi 5552. Si partono per 3. e vengono Lire, le quali si partono per 7. e vengono Scudi, &c. di questi, per farne Mani di Giulj si opera al contrario.

<i>Mani di Giulj.</i>	<i>Scudi</i>
694 — 8	264. 2. 13. 4 — 3
per 3. 5552	793. 1 — 7
per 7. 1850. 4. 13. 4	per 8. 5552
<i>Scudi</i> 264. 2. 13. 4	694 Mani di Giu.

43. D. Come di Mani di Giulj si fanno Scudi d'oro, e di questi si fanno Mani di Giulj?

R. Si moltiplicano, per esempio Mani 150. per 16. e vengono mezzi Grossi 2400. li quali si partono per 5. e per 9. numeri di ripiego del 45. e vengono Scudi d'oro 53. 6. 8. perchè 45. mezzi Grossi fanno uno Scudo d'oro, e di questi, per farne Mani di Giulj, si opera al contrario.

<i>Mani di Giulj.</i>	<i>Scudi d'oro</i>
150 — 16	53. 6. 8. — 9
per 5. 2400	480. — 5
per 9. 480	per 16. 2400
<i>Scudi d'oro</i> 53. 6. 8	<i>Mani di Giu.</i> 150.

44. D. Come di Mani di Testoni si fanno Scudi, Lire, Soldi, e Denari, e di questi si fanno Mani di Testoni?

R. Mani di Testoni 856. si partono per 7. il quoziente 122. Lire 2. Si somma con 856. e vengono Scudi 978. Lire 2. e per tornare questi in Mani di Testoni si partono per 8. & il quoziente 122. Lire 2. Si sottra da 978. Lire 2. e restano Mani 856. di Testoni; La ragione è, perchè 7. Mani di Testoni sono Scudi 8.

<i>Mani di Testoni.</i>	Scudi	978. 2
per 7. 856	per 8.	<u>122. 2</u>
<u>122. 2</u>		<u>Mani di Test. 856. —</u>
Scudi 978. 2		

45. D. Come di manì di Testoni si fanno Scudi d'oro, e di questi si fanno Mani di Testoni?

R. Mani di Testoni 125. si partono per 15. e il quoziente 8. 6. 8. si somma con 125. e vengono Scudi d'oro 133. 6. 8. e questi si partono per 16. e il quoziente 8. 6. 8. si sottra dagli Scudi d'oro, e restano Mani di Testoni 125. La ragione è, perchè 15. Mani di Testoni sono Scudi d'oro 16.

<i>Mani di Testoni.</i>	<i>Scudi d' Oro.</i>
per 15. 125	per 16. 133. 6. 8.
8. 6. 8.	8. 6. 8.
<u>Scudi d'oro 133. 6. 8.</u>	<u>Mani 125 di Testoni.</u>

46. D. Come di Mani di Lire si fanno Scudi, Lire, Soldi, e Denari, e di questi si fanno Mani di Lire?

R. Le Mani delle Lire si partono per 2. e vengono Mani di Testoni, queste si partono per 7. il quoziente si somma con le Mani di Testoni, come per la 44. Come le Mani di Lire 3768. si partono per 2. e vengono Mani di Testoni 1884. queste si partono per 7. il quoziente 269. 1. si somma con 1884. e vengono Scudi 2153. Lire 1.

<i>Mani di Lire.</i>	Scudi	2153. 1
per 2. 3768	per 8.	269. 1
<u>1884</u>		<u>1884 — 2</u>
per 7. 269. 1		<u>Mani di Lire 3768.</u>
<u>Scudi 2153. 1</u>		

Le Mani

Le Mani delle mezze-Lire, à Carlini si partono per 4. e le Mani de  
Grossi per 6. e vengono Mani di Testoni, per farne Scudi d'oro,  
si opera per la 45.

47. D. Come di Mani di Stellini si fanno Scudi. Lire, Soldi, e  
Denari, e di questi si fanno Mani di Stellini?

R. Le Mani 435. di Stellini si moltiplicano per 129. che sono Quat-  
trini, che fanno uno Stellino, e vengono Mani di Quattrini 56115.  
li quali si partono per 15. e per 7. ripiego di 105. e vengono Scu-  
di 534. 3. perche 105. Mani di Quattrini fanno uno Scudo; Gli  
Scudi poi si moltiplicano per 7. e per 15. ripiego di 105. il pro-  
dotto si parte per 129. e tornano Mani di Stellini 435. come  
prima.

435 — 129	Scudi 534. 3. — 7
<hr/> 3915	<hr/> 3741 — 15
5220	<hr/>
<hr/>	per 129 56115
per 15. 56115	<hr/> 451
per 7. 3741	Mani di Stell. 435 645
Scudi 534. 3.	---

48. D. Come di mani di Stellini si fanno Scudi d'oro, e di questi  
Mani di Stellini?

R. Mani di Stellini 160. si moltiplicano per 86. il prodotto 13760.  
si parte per 5. e vengono mezze Lire 2752. le quali si partono per  
15. e vengono Scudi d'oro 183. 9. 4. per farne Mani di Stellini,  
si opera al contrario.

Mani di Stellini.	Scudi d'oro 183. 9. 4 — 15
160 — 86	<hr/> 2752. 0. 0 — 3
<hr/> 960	<hr/>
1280	per 86. 13760
<hr/>	<hr/> 546
per 5. 13760	---
<hr/>	160 Mani di Stellini.
per 15. 2752	
<hr/>	
Scudi d'oro 183. 9. 4	

## Valore di alcune Monete di Roma .

Lo Scudo Moneta vale Giulj	10
Ovvero lo Scudo Moneta Bajocchi	100
Il Giulio Bajocchi	10
Il Bajoccho Quattrini	5
Il mezzo Bajoccho Quattrini	2 $\frac{1}{2}$
Il mezzo Grosso Bajocchi	2 $\frac{1}{2}$
Il Grosso Bajocchi	5
Il Carlino Bajocchi	7 $\frac{1}{2}$
La Lira di Fiorenza Bajocchi	15
Il Cavallotto di Bologna Bajocchi	20
Il Testone Bajocchi	30
La Livornina Giulj 9. Bajocchi	90
La mezza Piastra Giulj 5. $\frac{5}{8}$ Bajocchi	52 $\frac{1}{2}$
La Piastra Giulj 10. $\frac{5}{4}$ Bajocchi	105
Il Fiorone Giulj 8. $\frac{5}{2}$ Bajocchi	85
La Genovina Giulj 13. Bajocchi	130

*Le Monete d' Oro variano .*

Il Luigi d'oro Giulj 33. Bajocchi	330
La Doppia d' Italia Giulj 32. $\frac{5}{8}$ Bajocchi	325
La Doppia di Stampe Giulj 33. Bajocchi	330
La Doppia di Spagna Giulj 33. $\frac{5}{8}$ Bajocchi	335
Il Zecchino Giulj 19. Bajocchi	190
L' Unghero Giulj 18. Bajocchi	180

*Moneta Imaginaria per il Cambio .*

Lo Scudo d' oro Stampe varia prezzo , secondo l' Aggio di 1520.  
1521. 1522. 1523. 1524. 1525. mezzi Quattrini Romani . Si di-  
vide in Soldi 2. 20. Il Soldo in Denari 12. Imaginarij .

*Pesi, e Misure .*

La Libbra Once	12
L' Oncia Denari	24
La Canna de' Mercanti Palmi .	8
Il Palmo Once di misura	12
Il Rubbio del Grano Scorzi	22
Lo Scorzo Quartucci	4
Il Rubbio di Campagna Scorzi	16
Il Barile del Vino Boccali	32
Il Boccale Fogliette	4
Il Barile dell' Olio Boccali	28
Il Boccale Fogliette	4
La Foglietta Misure	2

Tramu.



## Tramutazioni di Monete.

*A fare di Scudi moneta Giulj, e Bajocchi.*

Al numero de' Scudi aggiunto un zero si fanno Giulj; aggiunti due zeri si fanno Bajocchi, come; Scudi 15. sono Giulj 150. ovvero Bajocchi 1500.

*A fare di Bajocchi Giulj, e Scudi moneta.*

Dal numero de' Bajocchi puntata l'ultima figura, le restate sono Giulj; ma puntate le due ultime, le restate sono Scudi, e le puntate Bajocchi, come; Bajocchi 1754. sono Giulj 175. , Bajocchi 4; ovvero Scudi 17. Bajocchi 54.

*Di Quattrini far Bajocchi.*

Il numero di Quattrini si parte	Quattrini	Bajocchi
per 5. e vengono Bajocchi; e questi si moltiplicano per 5. e tornano Quattrini, come:	per 5. 7620.	1524. per 5.
	Bajocc. 1524.	7620. Quat.

*Di Mezzi Grossi far Giulj.*

Il numero de' mezzi Grossi si parte per 4. e vengono Giulj, e questi si moltiplicano per 4. e tornano mezzi Grossi, come:	mezzi Grossi per 4. 728.	Giulj 182. per 4.
	Giulj 182.	728. mez.Gr.

*Di Grossi far Giulj.*

Il numero de' Grossi si parte per 2. e vengono Giulj, e questi si moltiplicano per 2., e tornano Grossi, come:	Grossi Per 2. 526.	Giulj 263. per 2.
	Giulj 263.	526. Grossi

*Di Carlini far Giulj.*

Il numero de' Carlini si parte per 4. il quoziente si sottra dal numero de' Carlini, e restano Giulj, e questi si partono per 3. il quoziente con essi si somma, e tornano Carlini, come:	Carlini per 4. 728. 182.	Giulj per 3: 546. 182.
	Giulj 546.	Carlini 728.

*Di Cavallotti, e Testoni fare Scudi moneta.*

I Cavallotti si moltiplicano per 3. I Testoni per 3. e vengono Giulj. Si punta l'ultima figura, e restano Scudi moneta, come:	Cavallotti 324. — 2.	Testoni 526. per 3.
	Sc. 64. 8. Giu.	Sc. 157. 8. Giulj.

*Di Livornine, e Genovine fare Scudi moneta.*

Le Livornine si moltiplicano per 9. le Genovine per 13. e vengono Giulj. Si punta l'ultima figura, e restano Scudi, come:	Livornine 725. per 9.	Genovine 324. per 13
	Sc. 652. 5	Scudi 421. 2.

B b

Di

*Di Piastre, e di Fioroni fare Scudi moneta.*

Al numero delle Piastre si aggiun-  
ge un zero, ed al numero risul-  
tato si aggiunge la metà delle  
Piastre, e vengono Giulj. Il nu-  
mero de' Fioroni si moltiplica  
per 8. al prodotto si aggiunge  
la metà de' Fioroni, e vengono  
Giulj. Si punta l'ultima figura,  
e restano Scudi moneta di Giu-  
lj 10.

Piastre	Fioroni
84. 0	145 per 8.
4. 2	—
—	1160.
Scudi 88. 2	Giulj 72 $\frac{1}{2}$
	—
	Scudi 123. 2 $\frac{1}{2}$

*Di Scudi d'oro Stampe fare Scudi moneta.*

Siano Scudi d'oro Stampe 75. si moltiplicano per l' Aggio, il qua-  
le sia 1523. del prodotto 114225. si punta il 5. che sono mezzi  
Quattrini; si punta il 22. che sono Bajocchi, e restano Scudi mo-  
neta 114. così: Scudi 114. 22. 5.

*Di Scudi moneta fare Scudi d'oro Stampe.*

Al numero di Scudi moneta si aggiungono per ordine tre zeri, e  
vengono mezzi quattrini, li quali si partono per l'Aggio, e ven-  
gono Scudi d'oro Stampe; ma se sono Scudi, e Bajocchi si ag-  
giunge un zero, ed essendoci Quattrini, in cambio di zero si rad-  
doppiano, e saranno tutti mez- Ag. 1523. per 1523. — 114225.  
zi Quattrini, che partiti per 75. 75. 7615.  
l'Aggio daranno li Scudi d'oro —  
Stampe: Siano li passati Scudi 7615.  
114. Bajocchi 22. 5. mezzi 10661.  
Quattrini, si partono per 1523. —  
e vengono Scudi d'oro Stampe 114. 22. 5  
75.

*Trovare l'Aggio.*

Scudi d'oro Stampe 75. importano Scudi moneta 140. Bajocchi  
22.  $\frac{1}{2}$  Domando l'Aggio dello Scudo d'oro Stampe per 75. ovvero  
per il ripiego 5. 5. e per 75. — 114225. per 5. — 114225.  
3. si partono 114225. Ag. 1523. 392. per 5. — 22845.  
e vengono 1523. mez- 172. per 3. — 4569.  
zi Quattrini Aggio 225. Aggio 1523.  
cercato.



DI.

# DISTINZIONE SESTA. 295

## Delli Rotti Astronomici.

**A** Vendo conosciuto gl' Astronomi non poterli avere giuste, nè esatte le misure de' moti delli Pianeti, e degl' altri Corpi Celesti per li soli Segni, e Gradi, hanno diviso ciascun Cerchio in parti immaginarie 360. E primieramente hanno diviso lo Zodiaco in 12. parti fra se uguali, corrispondenti alli 12. Mesi dell' Anno, chiamate Segni comuni; ciascuna Segno hanno diviso in 30. Gradi corrispondenti alli 30. giorni quasi di ciascun Mese. Altri, come nelle Tavole Alfonsine, hanno diviso il Cerchio in 6. Segni Fisici, ò Maggiori, e ciascuna di questi Segni in 60. Gradi per più comodità del computo; e queste parti sono dette intiere del Cerchio. Un Grado hanno diviso in 60. parti, dette qui minuti primi minori; Un minuto in 60. secondi, un secondo in 60. terzi, e conseguentemente sino in minuti decimi, e più bisognando.

E da avvertire, che siccome l'intero si divide in 60. parti diminuendo, così si accresce per 60. moltiplicandosi, risultando minuti primi maggiori, secondi, terzi, &c. li quali con i minori costituiscono una progressione Geometrica di Numeri, e Rotti Astronomici: come qui si può osservare, denotando li Minuti primi, secondi, terzi, &c. per 1. 2. 3. &c.

*Minuti Maggiori.*

*Minuti Minori.*

3.	2.	1.	Grado	1.	2.	3.	4.
216000	3600	60	60	1	1	1	1
1	1	1	60	60	3600	216000	1296000

### Del Sommare.

Dovendo sommare si collocano li Minuti maggiori sotto quelli della medesima specie, così li Gradi sotto i Gradi, & ancora i minuti minori, li primi sotto i primi, li secondi sotto i secondi; e mancando qualche specie, per essa si sostituiscono due 00. e si comincia a raccogliere li numeri da mano destra al solito, ponendo sotto gl' avanzi dal 60. alli Gradi però dal 30. se seguono segni comuni.

Per facilitare l'operazione si avverta, che ciascuna specie di Minuti costa per lo più di due figure decime, e numero: e però si sommano li numeri, segnando sotto l'avanzo dalle decine, e le decine si contano con l'altre della seconda fila, segnando sotto

B b 2

l' avanzo

L'avanzo dal 6. perche ogni 6. decinc fanno un'intiero seguente, e gl' intieri si contano con i seguenti numeri, operando sempre uniformemente. Nel primo Esempio A. sono segni comuni, e così Gradi 30. fanno un segno, e 12. segni un Cerchio, e però alli Gradi l' avanzo sopra 30. si segna sotto; alli segni sopra 12. mà nel secondo esempio B. Gradi 60. fanno un segno, e segni 6. un Cerchio, come nelle Tavole Alfonsine.

Si lascia di segnare l'intiero Circolo, come richiede il conto Astronomico.

<i>Esempio A.</i>						<i>Esempio B.</i>					
Seg.	Gra.	Min.	Sec.	Terz.	Quar.	Segni	Gra.	Min.	Secon.	Terz.	
11.	25.	40.	65.	15.	20.	4.	45.	17.	28.	54	
3.	18.	25.	46.	28.	34	9.	17.	25.	54.	12	
	16.	09.	00.	17.	25		34.	40.	00.	56	
	12.	18.	24.	06.	00		13.	17.	18.	18	

Sec. 4.	12.	33.	16.	07.	19	Segn. 2.	40.	40.	40.	20
<hr/> Somme <hr/>										

L'Ore ancora si dividono in Minuti primi, secondi, terzi, &c. Alcuni però, come il Pelettario, convertono l'Ore in Minuti, o in sessantesimi con moltiplicare l'Ore per  $2\frac{1}{2}$  perchè 24. Ore d' un Giorno naturale moltiplicate per  $2\frac{1}{2}$  fanno 60. In pratica l' Ore si moltiplicano per 5, il numero prodotto si parte per 2. e vengono sessantesimi di Giorno; Come Ore 18. moltiplicate per 5. fanno 90. che partito per 2. vengono 45. minuti di Giorno; e questa conversione si fa per faeilità del moltiplicare, come ivi daremo un'esempio, dove si convertiranno ancora li minuti, secondi, &c. dell' Ora come fa di bisogno.

Li sessantesimi di Giorno si moltiplicano per 2., il numero prodotto si parte per 5. e tornano Ore; Come 45. Minuti di Giorno moltiplicati per 2. fanno 90. che partito per 5. tornano Ore 18. Si somma ne' seguenti Esempj, come ne' passati, fuorchè all' Ore.

Gior.	Ore	Min.	Sec.		Gior.	Minu.	Sec.	Terzi
17.	16.	50.	25		20.	50.	45.	18
13.	14.	18.	46		17.	16.	56.	28.
10.	18.	54.	37		18.	54.	38.	16

Gio. 42.	02.	03.	48	Somme	Gio. 56.	42.	20.	02
<hr/>								

Del

## Del Sottrarre.

Da segni comuni 6. Gradi 25. Minuti 20. Secondi 54. siano da sottrarsi segni comuni 4. Gradi 28. Minuti 36. Secondi 14. Si collocano questi sotto quelli per ordine, e si dice da 54. levando 14. resta 40. che si segna sotto; di nuovo da 20. levando 36. non si può, perlochè 36. si leva da 60. resta 24. che si aggiunge a 20. fa 44. e tanti minuti restano, che si segnano. Più facilmente però; si levi numero da numero, e decine da decine, da 0. leva 6. non si può; da 10. leva 6. resta 4. che si segna sotto il 6. per la decina impressa si agginnge 1. al 3. seguente, fa 4. Di nuovo da 2. leva 4. non si può, al 2. s'aggiunge 6. fa 8. ora da 8. leva 4. resta 4. che si segna sotto il 3. si aggiunge 1. all'8. seguente fa 9. Da 5. leva 9. non si può, da 15. leva 9. resta 6. che si segna sotto l'8. e si aggiunge 1. al 2. seguente di sotto, fa 3. Adesso da 2. leva 3. non si può, al 2. si aggiunge 3. perchè 30. Gradi fanno un Segno comune, fa 5. e da 5. leva 3. resta 2. che si segna sotto il 2. e si aggiunge 1. al 4. seguente, fa 5. da 6. leva 5. resta 1. & è finito il sottrarre, e sono restati Segni 1. Gradi 26. Minuti 44. Secondi 40.

Il secondo Esempio è di Giorni. Minuti, Secondi, &c.

Segni comuni Gr. Min. Sec.				Min. Sec. Ter.			
6.	25.	20.	54	Giorni	28.	44.	30. 24
4.	28.	36.	14		25.	50.	25. 35
<hr/>				<hr/>			
Differenza	1.	26.	44. 40	Differenza	2.	54.	04. 49
<hr/>				<hr/>			

## Del Moltiplicare.

Primo avvertimento. Moltiplicando Minuti minori, per minuti minori il prodotto è denominato dalla somma de' denominatori de' Minuti, che fra se si moltiplicano: Come moltiplicando primi via secondi, fanno terzi, perchè 1. de' primi con 2. de' secondi fa 3: ovvero moltiplicando secondi via secondi fanno quarti, e secondi via terzi fanno quinti, perchè i loro Denominatori tanto sommano; e così de' Minuti maggiori fra se moltiplicati.

Secondo. Occorrendo moltiplicare Minuti maggiori via minuti minori, il prodotto è denominato dal residuo, che viene dal sottrarre il minore dal maggiore Denominatore: Come moltiplicando primi maggiori con terzi minori, fanno secondi minori; perchè levando 1. da 3. resta 2. e sono minori, perchè li terzi, che hanno maggior Denominatore, sono minori, & al contrario moltiplicando terzi maggiori via secondi minori, vengono primi maggiori.

Terzo,

Terzo. Moltiplicando poi minuti maggiori, con minuti minori di medesima denominazione, come secondi con secondi, terzi con terzi vengono interi, cioè Gradi.

Siano da moltiplicarsi Minuti 20., Secondi 45., Minori via Secondi 12. e Terzi 30. pur minori. In due modi si opera; prima per riduzione, moltiplicando minuti 20. per 60. & aggiungendo Secondi 45. sono ridotti i Secondi 1245. Ancora Secondi 12. moltiplicando con 60. & aggiungendo Terzi 30., sono ridotti in Terzi 750. via Secondi 1245. fanno Quinti 933750. per il primo avvertimento; essendo che i Denominatori sommati 2. e 3. fanno 5. Li quinti 933750. si partono per 60. vengono quarti 15562.; e quinti 30. numero avanzato dal partire, si partono per 60. Quarti 15562. vengono Terzi 259. e quarti 22. li Terzi 259. si partono per 60. e vengono Secondi 4. Terzi 19. Sicchè il prodotto importa Secondi 4. Terzi 19. Quarti 22. Quinti 30. si veda A.

Ma per il secondo modo senza riduzione; si moltiplicano 30. Terzi via 45. Secondi fanno 1350. Quinti, li quali partiti per 60. sono 22. Quarti, e 30. Quinti, che si segnano sotto nel suo ordine; ancora 30. Terzi si moltiplicano via 20. Minuti, fanno 600. Quarti, li quali partiti per 60. sono 10. Terzi, li quali si segnano sotto per ordine; dipoi si moltiplicano 12. Secondi via 45. Secondi fanno 540. Quarti, li quali partiti per 60. sono 9. Terzi, che si segnano sotto 10. Terzi. Finalmente si moltiplicano 12. Secondi via 20. Minuti fanno 240. Terzi, che partiti per 60. sono 4. Secondi, che segnati nel suo ordine si sommano, e la somma sarà di Secondi 4. Terzi 19. Quarti 22. e Quinti 30. come per l'altro modo. Si veda B.

A				B				
Min.	Sec.	Sec.	Terzi.	Min.	Sec.	Ter.	Quar.	Quin.
20.	45.	12.	30	20.	45.			
60		60			12.	30		
<hr/>				<hr/>				
Sec. 1245				4.	10.	22.	30.	
Per 60. — 33750.					9.			
		15562.	30. Quinti.					
		259.	22. Quarti.	Secon.	4.	19.	22.	30.
		Secondi	4. 19. Terzi.	<hr/>				
Sec. 4. Ter. 19. Quar. 22. Quin. 30.								

Si moltiplicano per il secondo modo Gradi 27. Min. 18. Secon. 25. via Gradi 10. Minuti 25. Secondi 13. sarà il Prodotto di segni maggiori 4. Gradi 44. Minuti 32. Secondi 45. Terzi 24. Quar. 25. cioè Segni comuni 9. Gradi 14. &c. si vede l'operazione C.

Si mol.

Si moltiplicano ancora Gradi 13. Min. 10. Sec. 33. Terzo 1. moto diurno della Luna, come si ha nelle Tavole Altonline seguitate dal Purbachio, per Giorni 29. Ore 12. Min. 44. Secondi 3. ma prima l'Ore, e li seguenti numeri si devono ridurre in Minuti secondi, &c. di giorno come accennai nel sommare, e si fa così; Si moltiplicano Secondi 3. per 5. fa 15. che si parte per 2. vengono Terzi 7. e mezzo, cioè Quarti 30. Si moltiplicano Min. 44. per 5. fa 220. che si parte per 2. vengono Secondi 110. partiti per 60. sono Minuti 1. e Secondi 50. Finalmente si moltiplicano Ore 12. per 5. fa 60. che si parte per 2. vengono Minuti 30. che con Minuti 1. antecedente sono Minuti 31. In tutto Gior. 29. Min. 31. Sec. 50. Terzi 7. Quarti 30. che moltiplicati per Gr. 13. Min. 10. Sec. 35. Terz. 1. fanno Gr. 389. che partiti per 30. sono Segnicomuni 12. Gradi 29. Min. 6. Secondi 24. Terzi 2. Quarti 31. Quinti 12. Setti 37. Settimi 30.

Che vengano dalla moltiplicazione Gradi, Min. &c. è manifesto, perchè, se giorno 1. da Gr. 13. Min. 10. &c. di moto. Cior. 29. Ore 12. &c. danno Gradi 389. Min. 6. &c. Si veda l'operazione D.

C				D									
Gra.	Min.	2.	3.	4	Gradi	Min.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
27.	18.	25			Giorni	29.	31.	50.	07.	30			
10.	25.	33			Gradi	13.	10.	30.	01				
<hr/>					<hr/>								
	05.	54.	59.	25				29.	31.	50.	07.	30	
	11.	22.	40.	25				17.	13.	34.	14.	22.	30
4.	33.	04.	10.					4.	55.	18.	21.	15.	00
<hr/>								383.	53.	51.	37.	30	
3.	4.	44.	32.	45.	24.	25							
<hr/>					Gradi	389.	06.	24.	02.	31.	12.	57.	30
<hr/>					<hr/>								

### Del Partire.

**Primo avvertimento.** E' da sapersi, che partendo Minuti minori per minori, o maggiori per maggiori d' un medesimo Denominatore; cioè il numero partitore, e il numero da partirsi siano primi, secondi, &c. allora dal partire vengono interi, come Gradi.

**Secondo.** Essendo poi di Diverfo Denominatore; come se si partono Quinti per Terzi, risultano Secondi dimostrati da 2. che resta dal sottrarre il Denominatore 3. de' Terzi dal Denominatore 5. de' Quinti.

**Terzo.** Ma se si partono minuti maggiori per minori, risultano Minu.

Minuti di quel Denominatore, che importa la somma de' Denominatori loro; Come partendo Secondi maggiori, per Primi Minori risultano terzi maggiori, perchè 2. de' Secondi, con 1. de' primi fa 3. e vengono maggiori, perchè quelli sono partiti.

**Quarto.** Al contrario, partendo Primi minori, per Secondi maggiori vengono Terzi minori, per la detta causa.

In due modi si è operato il moltiplicare: così in due modi si farà il partire, e prima per riduzione: Per Gradi 10. Minuti 11. Secondi 3. si debbano partire i Segni maggiori 2. (de' quali 6. fanno il Cerchio) Gradi 57. Minuti 13. Secondi 58. Terzi 12. Quarti 30. Li Gradi 10. si moltiplicano per 60. aggiungendo Minuti 11. fanno Minuti 611. che si moltiplicano per 60. aggiungendo Secondi 3. fanno Secondi 36663. numero partitore.

Ancora Segni 2. si moltiplicano per 60. e si aggiungono Gradi 57. fanno Gradi 177. che si moltiplicano per 60. e si aggiungono Minuti 13. fanno Minuti 10633. che si moltiplicano per 60. e si aggiungono Secondi 58. fanno Secondi 638038. li quali si partono per Secondi 36663. e vengono Gradi 17. per il primo avvertimento, & avanzano Secondi 14767, che si moltiplicano per 60. e si aggiungono Terzi 2. fanno Terzi 886022. che si partono per Secondi 36663. vengono Minuti primi 24. per il secondo avvertimento, & avanzano Terzi 6110. che si moltiplicano per 60. e si aggiungono Quarti 30. fanno Quarti 366630. che si partono per Secondi 36663. e vengono secondi 10. per il medesimo avvertimento, e niente avanza; Sicchè il quoziente è di Gradi 17. Min. 24. Secondi 10. e volendone far prova, & insieme esercizio, per questi Gradi 17. Min. 24. Secondi 10. si partono Segni 2. Gradi 57. &c. e verrà il quoziente di Gr. 10. Minuti 11. Secondi 3. stato prima numero partitore. L'operazione si tralascia, per essere facile.

Per fare il partire senza riduzione, si colloca il numero partitore di Gradi 10. Minuti 11. Secondi 3. da mano sinistra, e dopo una linea il numero da partirsi di Segni 2. Gradi 57. Minuti 13. Secondi 58. Terzi 2. Quarti 30. e poi si comincia l'operazione dicendo; Gr. 10. non entrano in Segni 2. questi si moltiplicano per 60. e si aggiungono Gradi 57. fanno Gradi 177. Adesso Gradi 10. entrano 17. volte, & avanzano Gradi 7. li quali ridotti in Minuti con la moltiplicazione di 60. fanno Minuti 420. ne i quali Minuti 11. entrano non meno di 17. volte, & avanzano tanti, che fatti Secondi per la moltiplicazione di 60. pur troppo entrano Secondi 3. Questa avvertenza sempre si deve avere, che entrino tutte le specie del numero partitore, come si disse nella 46. della

Terza



Terza Distinzione Trattato Terzo, per il Partire per Apporre, che è un partire composto di varie specie, come questo: Si segnano Gradi 17. sotto Gradi 10. e si moltiplicano per li numeri del partitore, fanno Segni 2. Gradi 53. Minuti 7. Secondi 51. che posti sotto per ordine, si sottrano da' numeri partiti, e restano Gr. 4. Min. 6. Sec. 7. Terzi 2. Quarti 30. Di nuovo Gr. 10. in Gr. 4. non entrano, per lo che Gr. 4. si moltiplicano per 60. & aggiunti Min. 6. fanno Min. 246. Ora Gradi 10. entrano 24. volte, che si segnano sotto Min. 11. e per 24. si moltiplicano li numeri del Partitore, e fanno Gr. 4. Min. 40. Sec. 25. Terzi 12. che sottratti da' loro corrispondenti, restano Min. 1. Sec. 41. Terzi 50. Quarti 30. Finalmente Gr. 10. non entrano in Min. 1. onde per 60. aggiungendo Sec. 41. fanno Sec. 101. li Gr. 10. in 101. entrano 10. volte, & avanza 1. che via 60. aggiunti terzi 50. fanno Terzi 110. Min. 11. entrano appunto 10. volte, siccome Secondi 3. in Quarti 30. Onde segnati Sec. 10. sotto secondi 3. e moltiplicati li numeri del partitore per 10. fanno minuti 1. Secondi 41. Terzi 50. Quarti 30. che sottratti da altrettanti resta 0. e il Quoziente è di gradi 17. Minuti 24. Secondi 10. come per l' altro modo.

	Gra.	Min.	Sec.		Seg.	Gra.	Min.	Sec.	Ter.	Qua.
	10.	11.	3.	—	2.	57.	13.	58.	2.	30
Quoziente	17.	24.	19.		2.	53.	7.	51.		

4. 6. 7. 2. 30

4. 4. 25. 12.

1. 41. 50. 30

1. 41. 50. 30

**Resta niente.**

## Dell' Estrazione della Radice Quadra da' Rotti Astronomici.

**Mi par bene accennare l' estrazione della Radice quadra , e cuba da' Rotti Astronomici , benchè il Trattato dell' estrazione di Radici si metterà à suo luogo .**

**Avvertimento unico** è, che si possa pigliare la metà dei Denominatore de rotti Astronomici, da i quali si deva estrarre la Radice quadrata, del resto fatta la riduzione de rotti nell'infima specie, si

trova la Radice quadra, come ne i numeri assoluti: Per esempio; di Secondi 36. la Radice quadra è di primi 6. di Quarti 49. la radice quadra è Sec. 7. così ancora volendo cavare la Radice quadra da Gradi 2. Min. 18. Sec. 7. Terzi 15. Quarti 29. ridotti tutti a Quarti 28970129. come si disse nel moltiplicare, la Radice quadra sarà Secondi 5373. ( pigliando la denominazione dalla metà del Quarti ) che partiti per 60. la Radice quadra sarà Gradi 1. Minuti 29. Secondi 33.

### Del' Estrazione della Radice Cuba.

Bisogna che si possi pigliare il terzo del Denominatore de' Rotti. **Axioma.** Come la Radice di Sesti 27. sono Secondi 3. per. che il terzo di 6. è 2. Denominatore de' Minuti della Radice Cuba. Medesimamente la Radice Cuba di Secondi 2. Terzi 5. moltiplicando 2. via 60. aggiungendo 5. fanno Terzi 225. la Radice Cuba Minuti 5. perche il terzo di 3. è 1. Denominatore de' Minuti. Ancora estrando la Radice Cuba de' Minuti 10. Secondi 55. Terzi 4. ridotti in Terzi 39304. la Radice Cuba importa Primi 34.



# TRATTA TO QUARTO

## Della regola dritta, e roverscia delle Proporzioni, o regola aurea del Trè, del Cinque, ò Moltiplice.

*Con le sue Prove, e Difficoltà ad essa appartenenti.*

### DISTINZIONE PRIMA.

1. D.

R.



He cosa è Regola delle Proporzioni, ò de Trè?

La Proporzione, secondo Euclide, è un' abitudine, che hà una quantità ad un' altra Come dal 6. al 2. si domanda Proporzione tripla, e dal 2. al 6. subtripla. E perchè in questa regola si vuol sapere un terzo numero à qual' altro numero abbia la medesima abitudine, ò proporzione, che hà il primo numero al secondo: Come per esempio il terzo numero 48. à qual numero abbia la medesima proporzione, che hà il primo numero 6. al secondo 2. Per questo si chiama tal regola delle proporzioni. La proporzione quando è continua costituisce la proporzionalità, che è similitudine di proporzioni, che consiste in trè termini, e non in meno, per la nona definizione del quinto Libro d'Euclide, per essere il secondo termine conseguente del primo, ed antecedente del terzo: Come 3. 6. 12. Onde, come stà 3. à 6. così stà il medesimo 6. à 12. Ma quando è discontinua, si ricercano quattro termini, stante che il secondo termine non è antecedente del terzo nella medesima ragione, che è il primo al secondo: Come 3. 6. 4. 8. e questi quattro termini si dicono proporzionali. Ora in molte Domande, che si fanno si trovano solo trè termini, ed il quarto viene cercato, e si trova per via di moltiplicare, e partire, e per questi trè termini conosciuti si chiama comunemente regola del Trè. Nell'Esèmpio di sopra si cercava il terzo numero 48. al qual numero avesse la medesima proporzione, che il primo numero 6. al secondo numero 2. Ora per trovare il quarto numero si moltip-

C c. 2

plichì

moltiplicar il secondo 2. via il terzo 48. il prodotto 96. si parta per il primo numero 6. il quoziente 16. sarà il quarto numero cercato, al quale il 48. dice proporzione tripla, come dice 6. al 2. La ragione perche si moltiplichi il secondo via il terzo numero, & il prodotto si parta per il primo a trovare il quarto; & come prova Euclide nella proposizione 19. del Libro 7. perche si deve trovare un numero che moltiplicato per il primo faccia tanto, quanto fa il secondo numero moltiplicato per il terzo, e per evidenza, il 16. moltiplicato per 6. fa 96. che è quanto fece 2. via 48. e questo serve di prova, se nella regola del 3. si è operato bene; tuttavia per errore dell'operante è fallace, come dirò più sotto.

Questi quattro numeri 6. 2. 48. 16. sono proporzionali per le proporzioni, che fra di loro hanno. La medesima proporzione è dal 6. al 2. che dal 48. al 16. e per proporzione conversa dal 16. al 48. che dal 2. al 6. e per proporzione permutata dal 6. al 48. che dal 2. al 16., e per la conversa di questa dal 16. al 2., che dal 48. al 6. Altre proporzioni si tralasciano come non necessarie, e queste sole servono per provare l'operazioni di detta Regola del Trè, la quale consiste in trovare un quarto numero incognito per via di moltiplicare, e partire come si è detto, e meglio si dichiarerà parte, per parte, che è quello, che si richiedeva nella sopradetta domanda, la quale è della regola del Trè dritta, che ordinariamente suole avvenire, perche della regola del Trè roverscia se ne parlerà dopo.

2. D. Proposta qualche Domanda come questa: Libbre 48. d'alcuna Mercanzia quanto si pagheranno: stante che Libbre 8. si sono pagate Lire 12? Che ordine terranno i numeri per operare?

R. Si osservi in questa, e nell'altre Domande seguenti, che sempre due numeri trattano della medesima materia, e però si dicono simili, come 48. e 8. trattano di Libbre di mercanzia, ed il terzo tratta di materia differente, come 12. tratta di Lire prezzo di Libbre 8. che però nel primo luogo si pone 8. uno de' simili, che non porta seco Domanda; nel secondo luogo si pone 12. differente, e nel terzo luogo 48. simile al primo; e questo porta seco la Domanda, perche di Libbre 48. si vuol sapere il prezzo, e così anderanno disposti sempre; avvertendo però, che alle volte avviene, che tutti i trè numeri sono della medesima materia, tuttavia uno di quelli è differente, e diverso per la diversa ragione, e differente modo, con che viene considerato; come: Uno con Scudi 100. guadagna Scudi 5., che guadagnerà con Scudi 320. nel medesimo tempo. Tutti i trè numeri sono di Scudi; con tutto ciò Scudi 100., e Scudi 320. sono simili per essere di Capitale, e Scu-

e Scudi 5. e differente per essere di guadagno; Per il che si pone in primo luogo 100. in secondo Scudi 5. differente, ed in terzo Scudi 320. che porta seco la Domanda.

Capitale. Guadagno Capitale

Lib. 8. — Lir. 12. — Lib. 48? Sc. 100. — Sc. 5. — Sc. 320?

3. D. Disposti per ordine i tre numeri della regola aurea, che operazione si fa per trovare il quarto proporzionale, che sciolga il quesito?

R. Comanemente s'insegna di moltiplicare il numero secondo via il terzo, ò il terzo via il secondo, e di partire il prodotto per il primo numero, ed il quoziente sarà il quarto numero proporzionale, che scioglie il Quesito, simile in natura al secondo numero. Il moltiplicare, e il partire si faccia per quel modo che uno vuole, e che riesca più facile, e breve. Negl'Esempj della passata nel primo si moltiplica 12. via 48. fa 576. il quale si parte per 8. e viene 72. quarto proporzionale, che sono Lire, prezzo di Libbre 48. come il numero secondo 12. Nell'Esempio secondo si moltiplica 320. via 5. fa 1600. il quale si parte a scapezzo, ò per tronco per 100. e viene 16. che sono Scudi di guadagno; Siccome erano Scudi di guadagno Scudi 5. numero secondo. Finita l'operazione, si avvezza lo Scolare a fare la sua risposta, così nel primo Esempio si risponde, che Libbre 48. si pagheranno Lire 72. Nel secondo, che con Scudi 320. Uno guadagnerà Scudi 16. Questo di moltiplicare, e poi partire sia il primo modo più comune, per trovare il quarto proporzionale, la ragione del quale si cava dalla proposizione 19. del settimo Libro d'Euclide, come ho accennato nella prima risposta. Gli seguenti modi alle volte sono facili, e brevi; Ma non sempre: tuttavia, acciò sia uno più pratico nell'operare, non tralascio di darne cognizione, perchè è certo, che quello, che sa andare ad un luogo per diverse vie è più pratico del cammino, che l'altro, che non ci sa arrivare, che per una strada.

8 — 12 — 48?

576

100 — 5 — 320

Quarto &c. 1600

72 Quarto Proporz.

4. D. Qual'è il secondo modo di trovare il numero quarto proporzionale?

R. Disposti come ho detto nella seconda i tre numeri, per il primo si parte il secondo, e per il quoziente si moltiplica il terzo, ed il prodotto numero è il quarto proporzionale. Per esempio:  
Canne

Canne 3. di Panno costano Sc. 12. che costeranno Canne 15? I numeri sono per ordine : per 3. si parte 12. e per il quoziente 4. si moltiplica 15., e fa 60. quarto proporzionale, che scioglie il quesito, e sodisfa alla Domanda, perchè Scudi 60. costeranno

$$3 - 12 - 15$$

Canne 15. La ragione dell'operare è, perchè partendosi il secondo per il primo, si trova

$$4$$

Quarto proporzionale 60 il numero Denominatore della proporzione, per il quale moltiplicandosi il terzo, necessariamente verrà il quarto; stante che dissi nella prima, che sta il primo numero al secondo, come il terzo al quarto. Questo modo, e i seguenti in alcuna Regola di Compagnie può abbreviare operazione secondo l'esigenza de' numeri.

5. D. Qual' è il terzo modo di trovare il quarto proporzionale?

R. Per il primo si parte il terzo, e per il quoziente si moltiplica il secondo, e ne viene il quarto. Nell'esempio della passata per 3. si parte 15. per il quoziente 5. si moltiplica 12. e viene 60. quarto proporzionale, come per il modo passato.

$$3 - 12 - 15$$

$$5$$

La ragione di questo operare è Pistessa, che la passata. Perchè dovendo stare il primo numero al terzo, come il secondo al

quarto per proporzione permutata, come nella prima dissi: Per questo si trova il numero Denominatore della proporzione, partendo il terzo per il primo; per il qual Denominatore moltiplicando il secondo, ne deve venire onninamente il quarto.

6. D. Quale è il quarto modo di trovare il quarto numero proporzionale?

R. Per questo, e per il seguente modo si trova il quarto numero senza moltiplicare, ma solo con partire due volte; Perchè per il secondo numero si parte il primo, e per il quoziente si parte il terzo, e viene il quarto proporzionale. L'Esempio sia il passato rivoltato. Se Canne 15. di Panno costano Scudi 60., quante Canne di Panno s'averanno con Scudi 12. Il primo numero 60. il secondo differente 15. il terzo 12. che porta seco la Domanda. Dunque per 15. si parte 60. viene 4. per questo si parte 12. viene 3. quarto proporzionale, e tante Canne di Panno si averanno con Scudi 12.

$$\text{per } 15. \quad 60 - 15 - 12$$

$$\text{per } 4 - 1 - 12.$$

Viene 3. quarto proporzionale. La ragione di questo operare è, perchè col partire due numeri per un medesimo numero, dicono i quozienti la medesima proporzione,

zione, che dicevano quei due numeri, per ragione inversa della Proposizione 17. del settimo d' Euclide; Onde nell' Esempio detto partendo 60. primo numero .e 15. secondo numero per 15. Il quoziente primo è 4. il secondo 1. manifesto è che 4. ad 1. dice proporzione quadrupla, come diceva 60. à 15., e se operando con questi tre numeri 60 — 15 — 12. viene il quarto 3. medesimamente operando con questi 4 — 1. — 12. viene il quarto 3. col solo partire il terzo numero 12. per 4. stante che 1. nel secondo luogo non moltiplica.

L'istessa ragione vale per il seguente modo, perche 1. viene in terzo luogo; per il che si opera con partire due volte.

7. D. Qual' è il quinto modo di trovare il quarto numero?

R. Per il terzo si parte il primo, e per il quoziente si parte il secondo, e viene il quarto proporzionale. Dunque nell' Esempio passato per 12. si parte 60. viene 5. e per 5. si parte 15. viene 3. per le Canne, che si averanno con — per 12. 60 — 15 — 12

Scudi 12. la ragione di tale ope — per 5 — 15 — 1

rare si è detta nella passata. — — — 3. Qu. prop.

Questi modi si sono insegnati con esempio facile, acciò meglio si amano intesi: Adesso soggiungo due altre industrie, che servono per impieciore i numeri della regola del Tre senza mutare proporzione, che facilitano l'operazione di moltiplicare, e partire, quando si può.

8. D. Qual' è la prima industria?

R. La prima è di partire il primo, secondo numero per un numero, che gli misuri appunto ambedue, e di poi si opera con i quozienti, come si farebbe operato con quei primi numeri; per esempio; Con Scudi 18. si sono comprate Libbre 30. d' alcuna Mercanzia; Si domanda quante Libbre si farebbero comprare con Scudi 45? I numeri stanno per ordine, che però il primo 18. & il secondo 30. si partono per 6. vengono 3. e 5. quozienti? Si moltiplichi adesso il terzo 45. per 5. il prodotto 225. si parta per tre, e verrà il quarto 75. che sono Libbre che si faranno comprare; tanto farebbe venuto a moltiplicare 45. per 30. il prodotto 1350. con partito per 18. cioè 75. La ragione si è detta nella passata.

Risposta

18 — 30 — 45?

per 6.

18 — 30 — 45?

3 — 5 —

30

225

Quarto 75

1350

Quarto

75

50

9. D.

9. D. Qual' è la seconda industria?

R. La seconda è di partire il primo, e terzo numero, per un numero, che gli misuri appunto ambedue, e dipoi s' opera con i quozienti, come con quei primi numeri. Nell' Esempio della passata si partono 18. e 45. per 9. vengono 2. e 5. Ora si moltiplica 30. per 5. il prodotto 150. si parte per 2. e verrà il quarto 75. come per l' altra.

$$\begin{array}{r} 18 \text{ — } 30 \text{ — } 45 \\ 9 \text{ — } 2 \text{ — } 5 \end{array}$$

$$\underline{150}$$

75 Quar. num.

10. D. Alle volte si può usare l' una, e l' altra industria?

R. Sicuro: Nel dato Esempio si parte 18. e 30. per 6. Vengono 3. e 5. di nuovo per 3. si parte 3. primo, e 45. terzo, vengono 1. e 15. questo moltiplicato per 5. secondo, fa 75. numero quarto. La ragione si è detta nella 6. Risposta.

$$\begin{array}{r} \text{per } 6. \quad 18 \text{ — } 30 \text{ — } 45 \\ \text{per } 3. \quad 3 \text{ — } 5 \text{ — } 45 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{per } 3. \quad 1 \text{ — } 5 \text{ — } 15 \text{ — } 75 \text{ Quarto.} \end{array}$$

11. D. L' unità può tenere il luogo d' uno de' tre numeri della regola del Trè?

R. Molte volte lo tiene. Quando tiene il primo luogo, allora basta moltiplicare il secondo via il terzo numero, & il prodotto farà il quarto numero, che si cerca, stante che a partire per 1. non varia il numero da partirsi; per esempio. La Libbra della Seta vale Lire 26. che vagliono Libbre 8. al medesimo prezzo?

Si moltiplicano Lire 26. per 8. e Lib. 1 — Lire 26 — Lib. 8?

vengono Lire 208. quarto nu-

mero.

Lire 208. quarto num.

12. D. Ma se l' unità tiene il secondo, ovvero il terzo luogo, che operazione si fa?

R. Si fa solo il partire; per esempio: con Lire 26. si compra Libbra 1. di Seta si domanda con Lire 208. quante Libbre se ne comprerebbero? Adesso 1. tiene il secondo luogo, e perchè 1. non moltiplica, per 26. si partono Lire 208., e vengono Libbre 8. quarto numero. Medesimamente se 1. tiene il terzo luogo, per il primo si parte il secondo, & il quoziente farà il quarto numero; per esempio: Se Libbre 8. di Seta vagliono Lire 208. che vale Libbra 1. Si partono Lire 208. per 8. vengono Lire 26. prezzo d' una Libbra.

$$26 \text{ — } 1 \text{ — } 208 \text{ — } 8$$

$$8 \text{ — } 208 \text{ — } 1 \text{ — } 26$$

Dal che si deduce, che in ogni moltiplicazione fatta ci sono quattro numeri proporzionali; Come moltiplicando 2. via 4. fa 8. l' unità,

C. 2

benechè





la prova del 7. è 2. il quale si segna di sopra per primo numero di prova. Dipoi si levino gli 7. da 12. secondo numero, avanza 5. che si segna. Si levano gli 7. da 48. resta 6. il quale si segna sotto il 5. e via esso si moltiplica fa 30. dal quale si levano gli 7. avanza 2. secondo numero di prova corrispondente in uguaglianza al primo, che si segna sotto, e mostra essere giusto il quarto numero 72. Così può farsi la prova del 9. e d'altro numero, come s'è insegnò nel primo trattato in varj luoghi. Se si farà la prova del 7. all' antecedente Esempio à posta errato, il primo numero della prova è 0. & il secondo della prova è 5. sicche scuopre l'errore.

Prova del 7.

$\begin{array}{r} 2 \\ 1 \text{ X } 5 \\ 2 \text{ X } 6 \\ 2 \end{array}$	<p>3. 12. 48. 72</p>	<p>Errato 4. 6. 9. 14</p>	$\begin{array}{r} 0 \\ 4 \text{ X } 6 \\ 0 \text{ X } 2 \\ 5 \end{array}$
---	----------------------	-------------------------------	---

La ragione di tal prova è fondata sopra l' assioma; se da' numeri uguali si levano altri numeri uguali gl'avanzi sono uguali; E perchè il primo numero moltiplicato per il quarto, & il secondo per il terzo i prodotti sono numeri uguali. Onde è che con levare gli 7. d'gti 9. da quei numeri, come si è detto, restano gl'avanzi uguali; perchè è come se si levassero da i loro prodotti uguali, e dimostrano i numeri essere proporzionali.

15. D. Si dà altra prova per la regola del Trè?

R. In quattro modi si può esaminare col partire, se il numero trovato sia il quarto proporzionale. Il primo modo è partire il secondo numero per il primo, & il quarto per il terzo; se i quozienti vengono uguali, segno è che il quarto è proporzionale; per esempio 8. 24. 15. 45. perchè à partire 24. per 8. ne viene 3. siccome à partire 45. per 15. pure ne viene 3. Dunque 45. è quarto proporzionale.

16. D. Qual' è il secondo modo?

R. Il secondo è al contrario di partire il primo per il secondo, & il terzo per il quarto; se i quozienti sono numeri uguali, il quarto trovato è proporzionale; per esempio: Siano 20. 5. 28. 7. Perchè à partire 20. per 5. viene 4. siccome à partire 28. per 7. ne viene pure 4. il numero 7. è quarto proporzionale.

17. D. Qual' è il terzo modo?

R. Il terzo è di partire il terzo numero per il primo, & il quarto per il secondo; se i quozienti sono uguali, i numeri fra se sono proporzionali; per esempio: 8. 12. 48. 72. perchè à partire 48. per 8. ne viene 6. siccome ne viene 6. à partire 72. per 12. Però i numeri sono proporzionali.

18. D.

18. D. Qual'è il quarto modo ?

R. Il quarto finalmente è di partire il primo per il terzo, ed il secondo per il quarto ; se i quozienti sono uguali, i numeri sono fra se proporzionali ; per esempio: 36. 20. 18. 10. perchè à partire 36. per 18. viene 2. siccome à partire 20. per 10. viene pure 2. Dunque i numeri sono proporzionali . Si sono posti Esempj facili, acciò meglio siano intesi . In pratica s'usa quello , che si conosce più facile de' modi sopradetti . La ragione di questi modi di Prove si hà nella prima risposta di questo Trattato , dove dissi , che così stà il primo numero al secondo , come il terzo al quarto: &c.

19. D. Restano altre prove da assegnarsi alla Regola del Trè ?

R. Trè altre prove , che reali chiamare si possono , si fanno per esercizio degli Scolari , e consistono in rivoltare la Domanda , e fare altre regole del Trè; che se in quelle verrà il quarto numero corrispondente à quello lasciato dell'altra Domanda , si potrà concludere essersi bene operato , e trovato il numero , che si cercava .

Nella seconda Domanda di questo si propose : Libbre 48. d'alcuna Mercanzia , quanto si pagheranno , stante che Libbre 8. si pagaronno Lire 12? e nella terza si rispose che si farebbero pagate Lire 72. Ora per prima prova si rivolti la Domanda con porre 72. che è venuto in quarto luogo , nel primo, dicendo : Lire 72. si sono pagate per Libbre 48. per quante altre Libbre si pagheranno Lire 12. e partendo 72. per 12. , e per il quoziente 6. partendo 48. viene 8 : e perchè questo corrisponde alle Libbre 8. è segno essere stata fatta bene la regola , e la prova , la quale si è fatta per il quinto modo della settima di questo .

*Regola .*

8 — 12 — 48.

6

————

72

*Prova .*

72 — 48 — 12.

per 6. ———

8-corrispondente .

20. D. Come si rivolta la Domanda per la seconda prova ?

R. Si mette in primo luogo il secondo numero , dicendo : Si sono pagate Lire 12. per Libbre 8. si domanda per quante Libbre si pagheranno Lire 72. ? per il terzo modo della quinta si parta 72. per 12. il quoziente 6. si moltiplichi via 8. il prodotto 48. è numero corrispondente alle Libbre , che si hanno per Lire 72. dunque è giusta .

21. D. Come finalmente si rivolta la Domanda per la terza Prova ?

R. Si pone in primo luogo il terzo numero 48. dicendo Libbre 48. D d 2 furono

furono pagate Lir. 72. Si cerca quante Lire si pagheranno per lib. 8? s'offerì, che il primo numero, e il terzo siano simili, cioè Libbre, e Libbre. Per il quinto modo della 7. per 8. si parte 48. per il quoziente 6. si parte 72. e viene 12. corrispondente, che doveva venire.

*Seconda prova.*

$$12 - 8 - 72?$$

6

48 corrispondente.

*Terza prova.*

$$48 - 72 - 8?$$

per 6

12 corrispondente.

22. D. Avendo detto nella seconda, che i numeri della regola del Trè vanno sempre disposti, che il differente tenga il secondo luogo, e che tenga il primo luogo il numero simile in qualità a quello, che porta la Domanda, che tiene il terzo luogo, si può fare altrimenti tal disposizione?

R. Si può collocare il differente in terzo luogo, e porre il numero della Domanda in secondo, ed operare come si è insegnato, ed allora il quarto numero farà della natura del terzo, cioè del differente; per esempio: Braccia 6. di Panno costarono Lire 16. domando, che costeranno braccia 9. del medesimo Panno? Si pongano braccia 6. in primo luogo, braccia 9. in secondo, delle quali si fa la domanda, in terzo luogo Lire 16. numero differente. Adesso si moltiplichì 9. via 16. fa 144. il quale si parta per 6. viene 24. quarto numero simile al terzo, cioè Lire 24. prezzo di braccia 9. e come stanno braccia 6. a braccia 9. così stanno Lire 16. a Lire 24. Onde quando si è detto, che sempre si ponga in mezzo il differente, ciò è stato detto per regola ferma, e per seguitare il comune uso.

$$6 - 9 - 16$$

9

144

24

*Prova.*

$$9 - 6 - 24$$

6

144

16 torna.

Avendo a bastanza detto della disposizione de' numeri, delle operazioni, per trovare il quarto proporzionale, e di varie prove della regola del Trè: Adesso si propongono varie Domande sopra la medesima, con un modo di recare i numeri con i Rotti a' numeri senza Rotti, mantenendo frà essi la medesima proporzione, e così sarà facile l'operare; benchè si sodisfarà talvolta alla Domanda con operare con gl'istessi Rotti, ò per più brevità, ò per renderli più pratico,

23. D.

23. D. Che valeranno libbre 84. di Cera, se libbre 7. si pagarono Soldi 273?

R. In primo luogo libbre 7. in secondo Soldi 273. in terzo lib. 84. li quali si moltiplicano via 273. fanno 22932. che si partono per 7. e vengono Soldi 3276. prezzo di lib. 84. ovvero per la quinta di questo, si parte 84. per 7. viene 12. il quale si moltiplica via 273. e vengono Soldi 3276. e serve di prova quest'altro modo.

7 — 273 — 84

In altro modo per Prova.

7 — 273 — 84

1092

2184

22932

3276 Soldi valeranno.

24. D. L'Oriuolo di Palazzo Vecchio di Fiorenza dà tocchi di Campana 3744. in giorni 24. perchè vada di 12. in 12. ore senza ripetere; Si vuol sapere in un' Anno, cioè in giorni 365. quanti tocchi di Campana darà?

R. Si moltiplica 3744. via 365. il prodotto 1366560. si parte per 4. il quoziente per 6. numeri di ripiego di 24. e verrà 56940. per li tocchi che darà tale Oriuolo in giorni 365.

Regola del Trè, quando il Rotto è nel numero del primo luogo.

25. D. Essendosi pagate Lire 24. per braccia 7  $\frac{2}{3}$  di Saja Scotta si domanda quanto si pagheranno braccia 45. della medesima robba?

R. Si ordinino i numeri, ponendo in primo luogo 7  $\frac{2}{3}$  Lire 24. in secondo, e 45. in terzo; Per regola generale, devesi recare l'intero del primo luogo al suo rotto per la 18. del secondo, moltiplicando 2. Denominatore via 7. fa 14. aggiunto 1. Numeratore fa 15. ora per il Denominatore 2. si moltiplica il terzo 45. fa 90. benchè se torna commodò si moltiplica il 2. 24. potendosi ò l'uno, ò l'altro ridurre à quella specie di rotto, che si riduce il primo, e s'averanno i numeri della regola del Trè senza rotti, cioè 15. 24. e 90. ovvero 15. 48. e 45. operando per la 3. verrà il quarto numero 144. ovvero per il modo della 5. si parte 90. per 15. per il quoziente 6. si moltiplica 24. e viene 144. così si può operare con i secondi numeri partendo 45. per 15. per il quoziente 3. si moltiplica 48. e viene 144.

7  $\frac{2}{3}$  — 24 — 45?

15 — 24 — 45?

15 — 24 — 45?

Quarto 144. 90

Si risponde, che si pagheranno

Lire 144.

7  $\frac{2}{3}$  — 24 — 45.

15 — 24 — 45.

15 — 24 — 45.

15 — 24 — 45.

15 — 24 — 45.

15 — 24 — 45.

Quarto 144

26. D,

26. D. Furono comprate libbre 138. d'una Mercanzia per Lire 76  $\frac{2}{3}$  si cerca con Lire 25. quante libbre si compreranno?

R. Per l' antecedente Lire 76  $\frac{2}{3}$ . si riducono in 230. terzi per 3. si moltiplica 3. via 25. fa 75. e si hanno i numeri senza rotti 230. 138. e 75. si moltiplichino 138. via 75. il prodotto 10350. si parte per 230. viene 45. e tante libbre si compreranno.

$$76 \frac{2}{3} = 138 = 25.$$

*Prova.*

$$\begin{array}{r} 75 \\ 230 \overline{) 10350} \\ \underline{690} \\ 345 \\ \underline{345} \\ 0 \end{array}$$

$$45 = 25 = 138.$$

$$\begin{array}{r} 9 \quad 5 \quad 5 \\ 25 \overline{) 1385} \\ \underline{225} \\ 130 \\ \underline{130} \\ 0 \end{array}$$

Quarto 45.

$$\begin{array}{r} 10350 \\ 115 \\ \hline 89570 \end{array}$$

Tornano Lire 76  $\frac{2}{3}$  Schif.  $\frac{2}{3}$

27. D. Avendo uno venduto per Lire 118. Staja di Grano 26  $\frac{1}{2}$ . Si cerca volendone vendere altra Staja 214. quanto sarà il loro prezzo?

R. Staja 26  $\frac{1}{2}$  ridotte in quarti 107. si moltiplica per 4. 214. il prodotto 856. si moltiplica per 118. fa 101008. che si parte per 107. e verrà 944. che sono Lire. prezzo di Staja 214. ovvero ridotte Staja 26  $\frac{1}{2}$  in quarti 107. per 4. si moltiplichino 118. fa 472. il quale si moltiplica per 2. che si ha da partire il terzo numero 214. per 107. e ne viene 944. come per l'altro modo.

$$26 \frac{1}{2} = 118 = 214.$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ 107 \overline{) 856} \\ \underline{428} \\ 428 \\ \underline{428} \\ 0 \end{array}$$

*Ovvero*

$$26 \frac{1}{2} = 118 = 214.$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ 107 \overline{) 472} \\ \underline{428} \\ 44 \\ \underline{44} \\ 0 \end{array}$$

Lire 944.

$$\begin{array}{r} 6848 \\ 9416 \\ \hline 101008 \\ 470 \\ \hline 428 \end{array}$$

Lire 944 tornano.

28. D. Quanto si pagarono libbre 100. d'una Mercanzia, essendosi pagate libbre 34  $\frac{1}{2}$  dell' istessa Lire 26.

R. Libbre 34  $\frac{1}{2}$  si riducono in 104. terzi, e Lire 26. in 78. terzi s'aggiungono due zeri per la moltiplicazione di 100. e si parte 7800. per 104. e viene 75. che sono Lire pagamento di lib. 100. si rivolti per prova dicendo Lire 75. sono prezzo di libbre 100.

Lire

Lire 26. di quante libbre faranno prezzo? & operato per <sup>2 15</sup> 3. ver-  
ranno libbre 34  $\frac{1}{2}$ .

$$\begin{array}{r} 34 \frac{1}{2} \rightarrow 26 \rightarrow 100. \\ \hline 104 \quad 3 \\ \hline \text{Lire } 75 \quad 520 \end{array}$$

Prova.

$$\begin{array}{r} 75 \rightarrow 100 \rightarrow 26. \\ 3 \rightarrow 4 \quad 4 \\ \hline 104 \end{array}$$

Tornano libbre 34  $\frac{1}{2}$

29. D. Si sono spese Lire 15. in  $\frac{1}{2}$  d' una libbra di Seta torta da cu-  
cure. Si domanda quante Lire si spenderanno in libbre 18. della  
medesima Seta?

R. Il primo numero sono 3. ottavi. Lib. 18. Si riducono in ottavi  
con moltiplicarle per 8. faranno 144. le quali si moltiplicano per 3.  
secondo il modo della 4. e verranno Lire 432. che si spenderanno  
in libbre 18. di Seta. La prova si faccia con dire Lire 432. sono  
prezzo di libbre 18. di Seta. Di quanta Seta faranno prezzo Lire  
15? e moltiplicato 18. via 15. fa 270. Numeratore; Denomina-  
tore 432. che se divide per 54. tornano  $\frac{1}{2}$ . di libbra.

$$\begin{array}{r} 5 \rightarrow 15 \rightarrow 18. \\ 8 \quad 3 \quad 8 \\ \hline 144 \end{array}$$

Prova.

$$\begin{array}{r} 432 \rightarrow 18 \rightarrow 15. \\ 15 \\ \hline 270 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 144 \\ 3 \\ \hline 432 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 270 \\ \hline \text{feh. per } 54. \text{ fa } 5. \frac{1}{2} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{Lire } 432 \end{array}$$

$$432$$

Come si trovò lo scalfatore 54. si disse nella 14. e nella 15. del secondo.

**Regola del Trè, quando il numero rotto si trova  
nel secondo Numero.**

30. D. Uno comprò Libbre 35. once 5. d' alcuna cosa per Lire 15.  
si domanda, se avesse speso Lire 48. quanto Libbre averebbe  
comprato?

R. Per regola generale si riduce il secondo numero al suo rotto, per  
il Denominatore del quale si moltiplica il primo numero; & al-  
lora faranno i numeri senza rotti: e così libbre 35. si riducono  
in once con moltiplicarle per 12. & aggiungere once 5. fanno  
425. Si moltiplica 15. primo numero per 12. fa 180. adesso 425  
si moltiplica via 48. il prodotto 20400. si parte per 180. e viene  
113  $\frac{1}{3}$  per le libbre che averebbe comprato. Ovvero si opera così:  
Si moltiplica 48. via once 5. il prodotto 240. si parte per 12. il  
quozien-

quoziente 20. s'aggiunge al prodotto fatto da 48. via 35. la somma 1700. si parte per 15. e viene  $113 \frac{2}{3}$ . come per l'altro modo.

$$15 - 35.5 - 48.$$

*In altro modo.*

$$15 - 35.5 - 48.$$

$$\begin{array}{r} 1810 \ 425 \\ \underline{48} \end{array}$$

$$3400$$

$$1700$$

$$204010$$

Libb.  $113 \frac{2}{3}$

$$12 \ / \ 240$$

$$20$$

$$280$$

$$140$$

$$1700$$

Lib.  $113 \frac{2}{3}$

31. D. Fiorenza cambia con Roma Scudi d'oro 100. di Lire 7.  $\frac{2}{3}$  l'uno, per Scudi d'oro Stampe 74  $\frac{2}{3}$  Si domanda per Scudi d'oro 420. quanto s'averà di credito in Roma?

R. Benchè à suo luogo si fa il Trattato de' Cambj; tuttavia qui ne propongo alcuni da risolversi per regola del Trè. Per l' antecedente si riducano 74.  $\frac{2}{3}$ . in 372. quinti per 5. si moltiplichino 100. fa 500. si tagli ora un zero al primo, e terzo numero, si moltiplichino 372. per 42. il prodotto 15624. si parte per 10. e per 5. numeri di ripiego di 50. verranno Scudi d'oro Stampe 312. 9. 7  $\frac{2}{3}$ . ovvero si operi per la prima de' Partitori ridotti  $\frac{2}{3}$ . à Soldi 8. si tagli un zero al primo, e terzo numero per il restato 10. si parta 74. Soldi 8. vengono Scudi 7. 8. 9.  $\frac{2}{3}$ . questo si moltiplichino per 2. avendo moltiplicato prima per 4. Scudi 74. Soldi 8. i prodotti si sommano, e vengono Scudi 312. 9. 7.  $\frac{2}{3}$ . come per l' altro modo.

$$100 - 74 \frac{2}{3} - 420$$

$$5$$

$$372$$

$$\text{solo}$$

$$42$$

$$744$$

$$1488$$

$$\text{per } 10. \ 15624$$

$$\text{per } 5. \ 1562. 8$$

*Altro modo.*

$$1010 - 74. \ 8. - 4210$$

$$7. \ 8. \ 9 \frac{2}{3}$$

$$297. \ 12$$

$$14. \ 17. \ 7 \frac{2}{3}$$

$$\text{Scudi } 312. \ 9. \ 7 \frac{2}{3}$$

Sc. d'oro Stam. 312. 9. 7  $\frac{2}{3}$

23. D. Che è la 29. rivoltata. Effendosi spese Lire 15. in  $\frac{1}{3}$  di libbra di Seta da cucire. Si domanda quante libbre se ne avranno per Lire 432?

R. Si



R. i moltiplica 432. per 5. fa 2160. pure si moltiplica 8. per 15. fa 120. per questo si parte 2160. e viene 18. che sono lib. di Seta; ovvero per 5. si parte 15. il quoziente 3. moltiplica 8. fa 24. per il quale si parte 432. e viene 18. come per l'altro modo.

$$\begin{array}{r} 15 \text{ — } 5 \text{ — } 432 \\ \underline{8} \quad \underline{8} \quad \underline{5} \\ 120 \quad \quad 2160 \end{array}$$

Libbre 18.

*Altro modo.*

$$\begin{array}{r} 15 \text{ — } 5 \text{ — } 432 \\ \underline{8} \quad \underline{3} \\ 24 \quad 18 \text{ libbre.} \end{array}$$

**Regola del Tre quando il Numero rotto si trova nel terzo luogo .**

33. D. Uno spende Lire 25. in libbre 45. di Canapa. Si domanda quante libbre n' averà per Lire 76.  $\frac{7}{8}$ .

R. Per regola generale il numero terzo si riduce al suo rotto, per il Denominatore del rotto si moltiplica il primo numero, e si averanno i numeri senza rotti. Dunque 76  $\frac{7}{8}$  si riducono a 230. terzi; per 3. si moltiplica 25. fa 75. Adesso per il modo della 8. di questo, per 15. si parte 75. e 45. quozienti 5. e 3. per questo si moltiplica 230. fa 690. il quale si parte per 5. e viene 138. che sono libbre di Canapa; Ovvero si parte 25. e 45. per 5. quozienti 5. e 9. per questo si moltiplica 76  $\frac{7}{8}$ . il prodotto 690. si parte per 5. e viene 138. &c.

$$\begin{array}{r} 25 \text{ — } 45 \text{ — } 76 \frac{7}{8} \\ \underline{3} \quad \underline{3} \quad \underline{230} \\ \text{per } 15. \quad 75 \quad \quad 690 \\ \underline{5} \quad \quad \quad \underline{\quad} \\ \text{libbre } 138 \end{array}$$

*Altro modo.*

$$\begin{array}{r} 25 \text{ — } 45 \text{ — } 76 \frac{7}{8} \\ \underline{5} \quad \underline{9} \quad \underline{230} \\ \text{per } 5. \quad 75 \quad \quad 690 \\ \underline{\quad} \quad \quad \underline{\quad} \\ \text{libbre } 138 \end{array}$$

34. D. Che è la 27. rivoltata : Un Fattore di Villa ha venduto Staja di Grano 214. per Lir. 944. Si domanda per quante Lir. averà venduto Staja 26  $\frac{1}{4}$  al medesimo prezzo?

R. Si riducono 26  $\frac{1}{4}$  in 107. quarti, per 4. si moltiplica 214. fa 856. Adesso i numeri sono senza rotti per 107. Si parte 856. per il quoziente 8. si parte 944. e viene 118. che sono Lire, prezzo di Staja 26  $\frac{1}{4}$ . Ovvero, si moltiplica 944. per 3. il prodotto 2832. si parte per 4. il quoziente 708. si somma col prodotto di 26. via 944. la somma 25252. si parte per 214. viene 118. &c.

$$\begin{array}{r}
 218 \\
 214 \text{ --- } 944 \text{ --- } 26 \frac{1}{2} \\
 150 \text{ --- } 407 \\
 856 \\
 \text{per } 8. \quad 944 \\
 \text{Lire } 118
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{r}
 214 \text{ --- } 944 \text{ --- } 26 \frac{1}{2} \\
 \text{per } 4. \quad 2832 \\
 708 \\
 5664 \\
 1888 \\
 \text{Lire } 118. \quad 25252 \\
 385 \\
 1712
 \end{array}$$

35. D. Un Vinajo deve rendere conto di Barili 74. Rofoli 13. di Vino; valendo 3. Barili Lire 25. Si domanda di quante Lire renderà conto?

R. Si riducano Barili 74. in Fiaschi, con moltiplicarli per 20. e con aggiungere 13. faranno 1493. Pure 4. si moltiplichino per 20. fa 60. i numeri faranno senza rotti: Si partono 60. e 25. per 5. Quozienti 12. e 5. per questo si moltiplichino 1493. il prodotto 7465. si parta per 12. vengono Lire 622. 1. 8.

$$\begin{array}{r}
 3 \text{ --- } 25 \text{ --- } 74.13 \\
 29 \text{ --- } 120 \text{ --- } 25 \text{ --- } 3 \text{ --- } 622.1.8 \\
 \text{per } 5. \quad 60 \text{ --- } 7493. \\
 130 \text{ --- } 1150 \text{ --- } 7465 \\
 \text{Lire } 622.1.8
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{r}
 \text{Prova} \\
 622.1.8 \\
 3 \\
 \text{per } 5. \quad 1866.5 \\
 \text{per } 5. \quad 373.5 \\
 \text{Barili } 74.13
 \end{array}$$

La prova è con rivoltare Domanda, dicendo: Lire 25. sono prezzo di Barili 3. di quanti faranno Lire 622. 1. 8? Queste si moltiplicano per 3. il prodotto 1866. 5. si parte per 5. il quoziente 373. 5. si parte per 5. e vengono Barili 74. 13.

36. D. Riforma cambia Scudi d'oro 72. per Ducati 100. di Banco di Venezia. Si domanda per Scudi d'oro 324.  $\frac{1}{2}$  di rimessa, di quanti Ducati farà il credito in Venezia?

R. Si riducano 324.  $\frac{1}{2}$  in 1949. fusti, per 6. si moltiplichino 72. fa 432. Ora i numeri sono senza rotti: Si moltiplichino 1949. per 100. il prodotto 194900. si parta per 8. 9. e 6. numeri di ripiego di 432. riducendo l'avanzo in Grossi, de' quali 24. fanno un Ducato di Venezia; dall'ultimo partire verranno Ducati 451. Grossi 3.  $\frac{1}{2}$ .

La prova si faccia con rivoltare Domanda, dicendo: Ducati 100. sono Scudi d'oro 72. quanti, di questi faranno 451. Grossi 3  $\frac{1}{2}$ ? questi si riducano in Grossi, e poi in noni 97450. e perchè si dovevano moltiplicare per 72. si lascia, per essere stati per 24. e per

213  
e per 9. già moltiplicati, e basta partirgli per 100. e per 3. e tor-  
neranno Scudi d'oro 324  $\frac{1}{2}$ .

*Prova.*

$$\begin{array}{r} 72 \text{ --- } 100 \text{ --- } 324 \frac{1}{2} \\ 6 \text{ --- } 8 \text{ --- } 1940.00 \\ 432 \text{ per } 9 \text{ --- } 24362.12 \\ 6 \text{ --- } 2706.22 \frac{1}{2} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 100 \text{ --- } 72 \text{ --- } 451.3 \frac{1}{2} \\ 24 \text{ --- } 10827 \\ 100 \text{ --- } 974510 \\ \text{per } 3 \text{ --- } 974 \frac{1}{2} \end{array}$$

Bacati 451. 3  $\frac{1}{2}$

Scudi d'oro 324  $\frac{1}{2}$

37. D. La libbra della Seta costa Lire 24. che costeranno  $\frac{1}{2}$  d'oncia?  
R. Libbra 1. cioè once 12. si moltiplicano per 4. vengono 48. e  
Lire 24. per 3. Numeratore del rotto fanno 72. le quali partite  
per 48. viene Lire 1. Soldi 10. per il costo di  $\frac{1}{2}$  d'oncia.

*Prova.*

$$\begin{array}{r} 12 \text{ --- } 24 \text{ --- } \frac{1}{2} \\ 4 \text{ --- } 3 \text{ --- } 12 \text{ --- } 48 \\ 48 \text{ --- } 72 \text{ --- } 1 \text{ --- } 10 \text{ --- } \frac{1}{2} \end{array}$$

Lire 24 --- Lire 1  $\frac{1}{2}$

48 --- 72 --- 1 --- 10 ---  $\frac{1}{2}$

Lire 1  $\frac{1}{2}$  --- 48 --- 72 --- 1 --- 10 ---  $\frac{1}{2}$

Regola del Trè quando il Rotto è nel primo,  
e secondo luogo.

38. D. Uno vuol sapere quanto abbia da pagare libbre 1383. d'un a  
Mercanzia, avendo pagato per libbre 38. once 5. Lire 15  $\frac{1}{2}$

R. Per regola generale, si riduce il primo numero al suo rotto, ed  
il secondo, per il Denominatore del rotto del primo si moltiplica  
il terzo numero, ovvero il secondo; Per il Denominatore del  
rotto del secondo si moltiplica il primo numero, ed allora Rave-  
ranno i numeri della regola del Trè senza rotto, e si opera come  
si è insegnato. Dunque si moltiplichino 38. per 12. aggiungendo 5.  
fa 461. il quale si moltiplichino per 6. Denominatore del rotto del  
secondo numero, fa 2766. Si moltiplichino 15. per 6. aggiungendo  
5. fa 95. per 12. Denominatore del rotto del primo si moltiplichino  
1383. fa 16596. sicchè i numeri senza rotto sono 2766.95. e 16596.  
questo moltiplicato per 95. il prodotto 1576620. partito per  
2766. ne viene 570. Lire da pagarsi per libbre 1383. In altro me-  
do si riduca solo il primo al suo rotto, per il Denominatore si

E e 2

mol-

229

moltiplichi il terzo ; il prodotto si moltiplichi per il secondo con il rotto per la 65. del secondo ; il prodotto si parta per il primo , e verrà il medesimo 570. Ma modo più spedito è ridurre il rotto del secondo , cioè  $\frac{1}{2}$  in  $\frac{2}{2}$  . ed allora fatta la riduzione , i numeri sono senza rotte , e si opera al solito .

$38 \frac{1}{2}$	$15 \frac{1}{2}$	1383.	<i>Modo più spedito.</i>		
<u>      </u>	<u>      </u>	12	$38 \frac{1}{2}$	$15 \frac{1}{2}$	1383
461	95	<u>      </u>	<u>      </u>	<u>      </u>	190
6		16596	461	190	<u>      </u>
		95			124470
2766		<u>      </u>			1383
		82980			<u>      </u>
		149364	Lire 570.		262770
Lire 570.		<u>      </u>			3827
		1576620			- 0
		19362			

39. D. Un Mercante comprò libbre 866  $\frac{1}{2}$  di Zucchero per Lire 569  $\frac{1}{2}$ . Si domanda per quante Lire lo comprò il 100. ?

R. Quando nel primo , e secondo numero è la medesima specie di rotto , ed anche nel primo , e terzo ; allora fatta la riduzione , i numeri della regola del 3. senza rotte , stanno in proporzione come prima , in ordine ad avere il quarto proporzionale ; E quando non sono , si riducono ad una medesima specie di rotto , se si abbrevia l'operazione , altrimenti si opera per regola generale , come ho detto . Ora qui  $\frac{1}{2}$  del primo si riducono a  $\frac{2}{2}$  . che è rotto della medesima specie del secondo . Dunque 866  $\frac{1}{2}$  ridotti sono 5200. fusti , e 596  $\frac{1}{2}$  ridotti sono 3419. questi si moltiplicano per 100. fanno 341900. e si partono per 5200. vengono Lire 65  $\frac{1}{2}$  prezzo di libbre 100.

$866 \frac{1}{2}$	$569 \frac{1}{2}$	100.	<i>Prova.</i>		
<u>      </u>	<u>      </u>		$65 \frac{1}{2}$	100	$569 \frac{1}{2}$
2.00 per 13.	3419.00		<u>      </u>	<u>      </u>	
per 4.	263		789		6838.00
Lire	$65 \frac{1}{2}$				5260
			Libbre 866. $\frac{1}{2}$		5260
					526-3
					<u>      </u>
					1578

40. D. Che è la 37. rivoltata. Valendo  $\frac{1}{2}$  d'oncia di Seta Lire 1  $\frac{1}{2}$  che costa la Libbra ? che è onze 12.

R. II

R. Il 3. Numeratore de' quarti si moltiplica per 2. Denominat. del rotto del secondo fa 6. partitore. Si moltiplica 12. per 4. fa 48. e questo per 3. fa 144. il quale si parte per 6. e viene 24. che sono Lire, prezzo d'una libbra; Ovvero  $\frac{2}{3}$  si riduca a  $\frac{4}{6}$ . e s'operi per la passata, verranno Lire 24.

$\begin{array}{r} 0 \frac{1}{3} \text{ --- } 1 \frac{2}{3} \text{ --- } 12. \\ \hline 3 \quad 3 \quad 4 \\ \hline 2 \quad 48 \\ \hline \text{per 6} \quad 3 \\ \hline \text{Lire } 24 \end{array}$	$\begin{array}{r} \frac{1}{3} \text{ --- } 1 \frac{2}{3} \text{ --- } 12. \\ \hline \text{per 3.} \quad 6 \quad 6 \\ \hline \text{Lire } 24 \end{array}$	$\begin{array}{r} 12. \\ \hline 6 \\ \hline 72 \\ \hline \text{Lire } 24 \end{array}$
--	--	---

**Regola del Trè, quando il Rotto è nel primo, e terzo luogo.**

41. D. Libbre 24. once 7. di Cera gialla sono costate Lire 38. Demandasi alla medesima ragione il prezzo di Libbre 196  $\frac{2}{3}$ ?

R. Per regola generale si riduce il primo, ed il terzo numero al suo rotto, che se uno ha diverso Denominatore dell'altro, il Denominatore del rotto del primo moltiplica il terzo, ovvero il secondo numero, ed il Denominatore del rotto del terzo moltiplica il primo, ed allora i numeri sono aggiustati senza rotti, e però operasi secondo gl'ammestramenti dati.

$\begin{array}{r} 24 \frac{1}{3} \text{ --- } 28 \text{ --- } 196 \frac{2}{3} \\ \hline 295 \\ 3 \\ \hline 885 \\ \hline \text{Lire } 224. \end{array}$	$\begin{array}{r} 590 \\ 12 \\ \hline 7080 \\ 28 \\ \hline 56640 \\ 14160 \\ \hline 198240 \\ 2124 \\ \hline 3540 \end{array}$	$\begin{array}{r} 24 \frac{1}{3} \text{ --- } 28 \text{ --- } 196 \frac{2}{3} \\ \hline 295 \\ \hline 2360 \\ 28 \\ \hline 18880 \\ 4720 \\ \hline 66080 \\ 708 \\ \hline 1180 \end{array}$	$\begin{array}{r} \text{Lire } 224. \\ \hline 66080 \\ 708 \\ \hline 1180 \end{array}$
---	--	---	--

Dunque si moltiplichì 24. per 12. aggiungendo 7. fa 295. Si moltiplichì il terzo 196. per 3. aggiungendo 2. fa 590. questo si moltiplichì per 12. Denominatore del rotto del primo, fa 7080, e 295.

e 295. si moltiplichino per 3. Denomin. del rotto del terzo, fa 885. si moltiplichino 7080. per 28. il prodotto 198240. si parte 885. e viene 224. che sono Lire, prezzo di Libbre 196  $\frac{1}{2}$  ovvero  $\frac{1}{2}$  si riducono a  $\frac{1}{4}$  ed allora fatta la riduzione, i numeri saranno 295. 28. e 2360. onde con moltiplicare, e partire si averanno le medesime Lire 224.

42. D. Roma cambia Scudi d'oro Stampe 74  $\frac{1}{2}$  per Scudi d'oro 100. di Fiorenza. Si domanda per una rimessa di Scudi d'oro Stampe 235. Soldi 14. quanti Scudi d'oro faranno in Fiorenza di Lire 7.  $\frac{1}{2}$  l'uno?

R. Soldi 14. sono  $\frac{1}{5}$ . onde si riduca 74  $\frac{1}{2}$  in quinti 373 ed aggiunto un zero, per la moltiplicazione per 10. Denominatore del rotto del terzo numero; Si riduca ancora 335  $\frac{1}{2}$  in decimi 3357. li quali si moltiplicano per 5. Denominatore del rotto del primo numero, fanno 16785. ed aggiunti due zeri per la moltiplicazione di 100. si partono per 3730. tagliato prima un zero, e viene 450. Scudi d'oro di Fiorenza; Ovvero  $\frac{1}{4}$  del primo si riducono a  $\frac{1}{5}$  ed allora non occorre moltiplicare per i Denominatori, che sono i medesimi, ed i numeri saranno 746. 100. e 3357. Onde operato verranno Scudi d'oro 450. di Fiorenza, come per l'altro modo.

$$\begin{array}{r}
 74 \frac{1}{2} \text{ --- } 100 \text{ --- } 335 \frac{1}{2} \\
 \hline
 37310 \text{ --- } 3357 \\
 \hline
 \text{--- } 5 \\
 \hline
 16785010 \\
 \hline
 \text{Scudi d'oro 450.} \quad 1865
 \end{array}$$

*Secondo modo.*

$$\begin{array}{r}
 74 \frac{1}{2} \text{ --- } 100 \text{ --- } 335 \frac{1}{2} \\
 \hline
 746 \text{ --- } 335700 \\
 \hline
 3730 \\
 \hline
 450
 \end{array}$$

Scudi d'oro 450.

43. D. Braccia 96. di Robba si pagano Lire 247  $\frac{1}{2}$ . Si domanda, se si fossero spese solo Lire 68  $\frac{1}{2}$  quante braccia si farebbero avute?

R. In cambio di 247.  $\frac{1}{2}$  si pongono 247  $\frac{1}{2}$ . e si riducono in 990. quarti; pure 68  $\frac{1}{2}$  si riducono in 275. quarti, li quali si moltiplicano per 96. il prodotto 26400. si parte per 990. e levato un zero dalle parti 2640. si divide per 11. e 9. numeri di ripiego di 99. il secondo quoziente 26  $\frac{1}{2}$  sono le braccia &c.

Per prova si rivolti Domanda, dicendo: Braccia 26  $\frac{1}{2}$  vagliono Lire 68  $\frac{1}{2}$ . che varranno Braccia 96. ed operato per la 38. di questo torneranno Lire 247  $\frac{1}{2}$ .

$\begin{array}{r} 247 \frac{1}{2} \text{ --- } 96 \text{ --- } 68 \frac{1}{2} \\ \hline 99.0 \\ \hline 275 \\ 96 \\ \hline 1650 \\ 2475 \\ \hline 2640.0 \\ 240 \\ \hline \text{per 11.} \dots 2640.0 \\ \text{per 9.} \dots 240 \\ \text{Bracc.} \dots 26 \frac{6}{7} \text{ sc. } \frac{2}{7} \end{array}$	$\begin{array}{r} 26 \frac{1}{2} \text{ --- } 68 \frac{1}{2} \text{ --- } 96 \frac{1}{2} \\ \hline 80 \\ 4 \\ \hline 32.0 \\ \hline 275 \\ \hline 288 \\ 275 \\ \hline 1440 \\ 2016 \\ 576 \\ \hline \text{per 8.} \dots 7920.0 \\ \text{per 4.} \dots 990 \\ \text{Lire} \dots 247 \frac{3}{4} \text{ sc. } \frac{5}{8} \end{array}$
--	---

44. D. Valendo  $\frac{5}{8}$  di braccia di Panno Lire 4. che valeranno  $\frac{1}{4}$  di braccio?

R. Si moltiplica 5. Numeratore del primo per 4. Denominatore del terzo, fa 20. Partitore. Si moltiplica 6. Denominatore del primo via 3. Numeratore del terzo, fa 18. il quale si moltiplica per 4. numero secondo, fa 72. il quale si parte per 20, e ne vengono Lire 3. Saldi 12. prezzo di  $\frac{1}{4}$  di braccio.

La prova si fa dicendo Lire 3  $\frac{1}{4}$  l'ono prezzo di  $\frac{1}{4}$  di braccio, di che faranno prezzo Lire 4. & operato per la 40. torneranno  $\frac{1}{4}$ .

Prova.

$$\begin{array}{r} 3 \frac{1}{4} \times 4 = 12 \\ \hline \text{per 20.} \dots 72 \\ \hline \text{Lire 3. 12.} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \frac{1}{4} \text{ --- } 3 \text{ --- } 4 \\ \hline 18 \quad 20 \\ \hline 4 \quad 3 \\ \hline 72 \quad 60 \\ \hline 72 \quad \text{schisato } \frac{5}{8} \end{array}$$

**Regola del Tre, quando il Rotto è nel secondo, e terzo luogo.**

45. D. Se braccia 10 di Fiorenza tornano in Venezia braccia 8  $\frac{2}{3}$  alla loro misura, quante Braccia faranno in Venezia braccia 464  $\frac{1}{2}$  Fiorentine?

R. Si riduce il secondo, e terzo numero al suo rotto, & i Denominatori de' rotti moltiplicano il primo numero, allora saranno aggiustati senza rotti; Come 8.  $\frac{2}{3}$  si riducono in 60, & ttrimi 464

224

464  $\frac{1}{4}$  in 1859. quarti; Si moltiplica 10. per 7. fa 70. e questo per 4. fa 280. partitore; Si moltiplica 1859. per 60. fa 111540. che partito per 280. viene 398.  $\frac{1}{4}$ . che sono braccia Veneziane. Per prova si rivolti dicendo; le braccia Veneziane 8.  $\frac{3}{4}$  sono braccia Fiorentine 10. che saranno braccia Veneziane 398  $\frac{1}{4}$ ? Per accordare il primo rotto col terzo; si pigli 8  $\frac{3}{4}$  in cambio di 8  $\frac{1}{2}$ . e si operi per la 43. di questo, torneranno braccia Fior. 464  $\frac{1}{4}$ .

$$10 - 8 \frac{3}{4} - 464 \frac{1}{4}.$$

$$8 \frac{3}{4} - 10 - 398 \frac{1}{4}.$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ \hline 60 \quad 1859 \\ 70 \quad 60 \\ 4 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 12.0 \quad 5577.0 \\ \hline \text{Fiorentine brac.} \quad 464 \frac{1}{4} \text{ sc. } \frac{1}{2} \end{array}$$

per 4. 11154.0

28.0 per 7. 2788  $\frac{3}{4}$

Venezian. brac. 398  $\frac{1}{4}$

46. D. In Fiorenza sono tratti di Roma Scudi d'oro 1326.  $\frac{2}{3}$  di Lire 7  $\frac{1}{2}$  l' uno col Cambio di Scudi d' oro Stampe 74  $\frac{1}{2}$  per Scudi d' oro 100. Si domanda di quanti Scudi delle Stampe farà il credito in Roma?

R. Si riducono 74  $\frac{1}{2}$  in 297. quarti, e 1326  $\frac{2}{3}$  in 3980. terzi, il 100. si moltiplica per 4. e per 3. Denominatori, è in una volta per 12. viene 1200. Si moltiplicano 3980. per 297. il prodotto 1182060 levato un zero dalle parti si divide per 10. e per 12. numeri di ripiego di 120. e verranno Scudi d' oro Stampe 985. Soldi 1. di credito in Roma. Ovvero si operi per la regola de' Partitori, e verranno i medesimi Scudi, e serve di prova.

$$100 - 74 \frac{1}{2} - 1326 \frac{2}{3}$$

Soldi.

$$\begin{array}{r} 12 \\ \hline 297 \quad 3980 \\ 120.0 \quad 297 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 74. 5 - 1326 \frac{2}{3} \\ 7. 8. 6 \\ 10. 14. 10 \frac{2}{3} \\ 3. 4. 11 \frac{1}{3} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 27860 \\ 35820 \\ 7960 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 965. 5 \\ 14. 17 \\ 4. 9. 1 \frac{2}{3} \\ 9. 10 \frac{1}{3} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{per 10.} \quad 118206.0 \\ \text{per 12.} \quad 11820. 12 \end{array}$$

$$985. 1$$

Scudi d' oro Stampe 985. 1

47. D. Che è la 44. rivoltata. Con Lire 4. si ebbero  $\frac{1}{2}$  di braccio con Lire 2  $\frac{1}{2}$  che si averà?

R. Si Ri.



225

R. Si riducono  $3 \frac{1}{4}$  in 18. quinti. Si moltiplica 4. per 6. Denominatore fa 24. per questo si parte 18. e viene  $\frac{3}{4}$ . Si lascia di moltiplicare per 5. il primo, e il terzo numero per brevità.

$$\frac{4}{6} \quad \frac{5}{6} \quad 5 \frac{3}{4}$$

24       $\frac{18}{24}$  schif.  $\frac{2}{4}$  di braccio s'averanno.

### Della Regola del Tre quando i Rotti sono in tutti tre i luoghi.

48. D. Si sono spese Lire 32  $\frac{2}{3}$  in braccia 18.  $\frac{1}{4}$  di Tela. Si domanda quanto Lire si spenderanno in una Pezza di braccia 45.  $\frac{1}{2}$ .

R. Si riduce ciascun numero al suo posto: Il Denominatore del rotto del primo numero moltiplica il secondo, ovvero il terzo numero: I Denominatori de' rotti del secondo, e terzo numero moltiplicano il primo numero, quando i Denominatori de' rotti sono diversi, e vengono i numeri aggiustati della Regola del Tre senza rotti: Onde si opera allora come si è insegnato: Ma se il Denominat. del rotto del primo sarà il medesimo, che il Denominatore del rotto del secondo, ovvero terzo numero, allora il Denominatore diverso moltiplica solo il primo numero, e vengono i numeri aggiustati senza rotti. Si torni alla Domanda 18.  $\frac{1}{4}$  si riducano in 75. quarti, Lire 32.  $\frac{2}{3}$  in 65. mezzi, e 45  $\frac{1}{2}$  in 275. festi. Il Denominatore 4. del primo moltiplichi 65. ovvero 275. ò l'uno, ò l'altro. Moltiplichi 275. fa 1100. il Denominatore 2. del secondo moltiplichi 75. primo fa 150. & il Denominatore 6. moltiplichi 150. fa 900. Ecco i numeri aggiustati senza rotti, il primo 900. il secondo 65. il terzo 1100. tagliati due zeri nel primo, e terzo. Si moltiplichi 65. per 11. il prodotto 715. si parta per 9. e verranno Lire 79  $\frac{2}{3}$  prezzo di braccia 45.  $\frac{1}{2}$ . Ma accordando, che il primo, e secondo rotto abbiano il medesimo Denominatore, solo il Denominatore del terzo moltiplica il primo numero, e servirà di prova.

$18 \frac{1}{4}$	$32 \frac{2}{3}$	$45 \frac{1}{2}$	$18 \frac{1}{4}$	$32 \frac{2}{3}$	$45 \frac{1}{2}$
75	65	275	75	130	275
2	11	4	2	6	13
150	715	1100	150	715	13575
6	9	9	6	9	9
900	65	1100	900	65	1100
			per 5. 3575		
			9. 715		
			Lire 79 $\frac{2}{3}$		
			49. D.		

R F

49. D. Si sono vendute libbre  $42 \frac{2}{3}$  d'una Mercanzia per Lire 25  $\frac{1}{2}$ . Si domanda per Lire 436.  $\frac{1}{2}$ . quante libbre si farebbero vendute alla medesima ragione?

R. Il Denominatore del rotto del numero è uguale al prodotto del Denominatore del rotto del secondo via il Denominatore del rotto del terzo, e però fatta la riduzione, i numeri sono aggiustati senza rotti. Si riducano dunque 25  $\frac{1}{2}$  in 155. festi,  $42 \frac{2}{3}$  in 85. mezzi, e 436  $\frac{1}{2}$  in 1310. terzi, questi li moltiplicano per 85. il prodotto è 11350. si parte per 155. il quoziente è 718  $\frac{2}{3}$  sono libbre, che si farebbero vendute. La prova si fa con rivoltarla: Dove è da osservare, che in cambio di moltiplicare il secondo, o il terzo per 2. Denominatore del primo, questo primo numero si è moltiplicato per 3. metà di 6. Denominatore del rotto del secondo, e si opera al solito tornano Lire 436  $\frac{1}{2}$ .

25 $\frac{1}{2}$	42 $\frac{2}{3}$	436 $\frac{1}{2}$	42 $\frac{2}{3}$	25 $\frac{1}{2}$	718 $\frac{2}{3}$
155	85	1310	85	155	718
	85		34		2154
	6550		85		18
	10480		255		2270
					155
Libbre 718 $\frac{2}{3}$	11350		2635		
	385		3		11350
	1300				334450
	60 festi $\frac{2}{3}$		995		
					3451850
	155	Lire 436 $\frac{1}{2}$			28985
					52700
					5470
					15810

50. D. Quanto valeranno Canne di Panno 32  $\frac{1}{2}$ . essendo che  $\frac{1}{2}$  di Canna costano  $\frac{1}{2}$  di Scudo?

R. Si moltiplica 5. Numeratore del primo via 5. Denominatore del secondo, fa 25. e questo via 2. Denominatore del terzo fa 50. Partitore; 32  $\frac{1}{2}$  li riducono in 65. mezzi, li quali si moltiplicano per 6. Denominatore del primo, fa 390. il quale si moltiplica via 4. Numeratore del secondo, fa 1560. tagliato il zero dalle parti. Si divide 1560. per 5. il quoziente è 312  $\frac{1}{2}$  sono gli Scudi. Si rivoltò per prova.

$\frac{3}{6}$	$\frac{4}{5}$	$\frac{32}{4}$	$\frac{4}{5}$	$\frac{5}{6}$	$31\frac{1}{4}$
<hr/>			<hr/>	<hr/>	
5		65	4	5	156
<hr/>		<hr/>	<hr/>	<hr/>	
5		6	6	5	5
<hr/>		<hr/>	<hr/>	<hr/>	
25		390			780
<hr/>		<hr/>			<hr/>
2		4	per 24		Canne 32 $\frac{1}{4}$
<hr/>		<hr/>			
5.0	Scudi 31 $\frac{1}{4}$	156.0			

51. D. Se  $1\frac{1}{2}$  di Libbra d'alcuna Mercanzia vale  $\frac{1}{4}$  di Scudo : Si cerca , che valeranno  $\frac{1}{4}$  di libbra ?

R. Si moltiplica il numeratore del rotto del primo luogo , cioè 7. per il Denominatore del rotto del secondo luogo , cioè per 5. fa 75. e questo prodotto per il Denominatore del rotto del terzo luogo cioè per 8. fa 286. il quale si pone sotto una linea ; Dipoi si moltiplica il Denominatore del rotto del primo luogo per il Numeratore del rotto del secondo luogo in croce, cioè 12. per 4. fa 48. è questo prodotto per il Numeratore del rotto del terzo luogo , cioè per 5, fa 240. il quale si pone sopra la medesima linea così  $\frac{240}{286}$ . Che schifato per 40. viene  $\frac{6}{7}$  di Scudo prezzo di  $\frac{1}{4}$  di libbra . E' da osservare , che se nel moltiplicare il Numeratore del rotto del primo via gl' altri due Denominatori, s'incontra in un medesimo numero ; che è nella moltiplicazione del Denominatore del rotto nel primo luogo via gl' altri due Numeratori, si può lasciare quel medesimo numero , e nell' Esempio dato il 5. ed allora ne viene  $\frac{48}{286}$  che schifato per 8. viene  $\frac{6}{7}$  come prima .

$\frac{7}{12} \times \frac{4}{5} = \frac{28}{60}$  vien.  $\frac{240}{286}$  cioè  $\frac{6}{7}$       $\frac{7}{12} \times \frac{4}{5} = \frac{28}{60}$  vien.  $\frac{48}{286}$  cioè  $\frac{6}{7}$

52. D. Il primo modo può servire per regola generale, anche quando ci sono numeri intieri ?

R. Certamente: Basta formare i numeri intieri à modo di rotto , con l'unità sotto la linea ; sopra essa il numero intiero ; e se il numero intiero ha congiunto il rotto , si riduce al rotto con sotto il Denominat. per la 18. del secondo ; E si opera come si è detto ; ed essendo il Denominatore del risultato minore del Numeratore , si parta questo per quello , e ne verrà quello che si cerca , come s' insegnò nella 10. del secondo . Di più se l'intiero è accompagnato con più rotte , si riduce per ordine fino all' ultimo , il numero venuto si pone sopra una linea , e sotto si pone per Denominatore il prodotto fatto dalla moltiplicazione de i Denominatori di quei rotte , e si opera , &c.

R. In primo luogo  $\frac{3}{4}$  libbre 8. once 5. ridotte sono  $\frac{3 \cdot 2 \cdot 2}{4}$ , in secondo luogo, ed in terzo  $\frac{1}{2}$  a modo di rotto. Si operi ne verrà  $\frac{2 \cdot 2 \cdot 2}{4}$ , e partito 2727. per 24. ne verrà 113  $\frac{1}{4}$  per le libbre cercate.

$\frac{101}{13} = \frac{9}{1}$  viene  $\frac{2727}{24}$  cioè 113  $\frac{15}{24}$  -schifato  $\frac{5}{8}$

54. D. Si vuol sapere il prezzo di  $\frac{7}{8}$  di libbra alla medesima ragione, che  $\frac{7}{8}$  si pagarono Lire 12  $\frac{3}{4}$ .

R. 12  $\frac{1}{4}$  ridotti in quarti sono  $3\frac{3}{4}$ . del resto si opera come la passata, e verranno Lire 12  $\frac{1}{4}$  per il prezzo cercato.

$\frac{7}{8} \text{ X } \frac{51}{4} = \frac{5}{6}$  viene  $\frac{3040}{168}$  cioè 12  $\frac{24}{168}$  schifato  $\frac{2}{7}$

55. D. Si lono spesi Scudi  $6\frac{1}{2}$  in libbre 34. once  $5\frac{3}{4}$ . Si domanda spendendosi Scudi  $54\frac{1}{2}$ . quante libbre si avrebbero?

R. Siriducono  $6\frac{3}{4}$  in  $4\frac{1}{2}$  libbre  $34\frac{1}{2}$  in  $26\frac{1}{2}$ , e  $54\frac{1}{2}$  in  $22\frac{1}{2}$ . Si moltiplica 13. via 48. fa 624. e questo via 5. fa 3120. Partitore. Si moltiplica poi 2. via 1655. fa 3310. e questo via 273. fa 903630. il quale si parte per 3120. e viene 289.  $\frac{3}{4}$  per le libbre, che si averebbero. Per prova la Domanda si rivolta, dicendo: Scudi  $54\frac{1}{2}$  danno libbre 289  $\frac{3}{4}$  che libbre daranno Scudi  $6\frac{3}{4}$ . e torneranno libbre 34. once  $5\frac{1}{2}$ .

$$6\frac{1}{2} - 34.5\frac{3}{4} - 54\frac{2}{3}$$

$$\begin{array}{r} \text{\textbf{X}} \\ \underline{13} \end{array}$$

13 3310  
624 273

5  
312.0 9930

Libbre 289  $\frac{1}{2}$

90363.0  
2796  
3003  
195  
— fch.  $\frac{5}{2}$   
312

**Prova.**

$$\begin{array}{r} 54\frac{3}{4} \\ \underline{273} \\ 5 \end{array} \quad \mathbf{X} \quad \begin{array}{r} 289\frac{5}{8} \\ \underline{2317} \\ 8 \end{array} \quad \begin{array}{r} 6\frac{5}{8} \\ \underline{13} \\ 2 \end{array}$$

2184 30121  
B S

per 4368 / 150605  
19565  
Lib. 34.5  $\frac{1}{2}$  2093 — 12

$$\begin{array}{r} 25116 \\ 3276 - 4 \\ \hline 13104 \end{array}$$

# Kegs!

## Regola del Trè quando ci sono Lire, Soldi, e Denari.

56. D. Un Mercante spende Lire 25. 17. 6. In Libbre 23. di Sápone vuol sapere, con spendere Lire 480. quante libbre avrà della medesima Mercanzia?

R. Si moltiplicano Lire 480. per 23. il prodotto 11040. si parte per Lire 25. 17. 6. per il modo della 46. e 51. del terzo, Distinzione terza, con dare due volte il 10. all'insù, e partire per 12. per trovare l'onze, e verranno libbre 426, onze 8. Ovvero per la 22. del secondo Soldi 17. 6. Si rechino a  $\frac{1}{2}$  di Lira, e si dica se Lire 25  $\frac{1}{2}$  sono prezzo di libbre 23. di quante Libbre faranno Lire 480. ed operando per la 25. di questo, verranno pure libbre 426. onze 8.

2587. 10. —	23 — 480	25 $\frac{1}{2}$ — 23 — 480
258. 15. —		8
Lire 25. 17. 6	1440	202
12. 2. 3. 1 $\frac{2}{3}$	960	3840
		23
	11040	
	10350	11520
Libbre 426. onze 8.	690	Libbre 426. onze 8. 7680
	517. 10	88320
	172. 10	552
	155. 5	1380
		138- 12
	17. 5	1656
	17. 5	

57. D. Che è l'antecedente rivolta. Libbre 23. si sono pagate Lire 25. 17. 6. che si pagheranno Libbre 426.  $\frac{1}{2}$ .

R. Si moltiplicano Lire 25. 17. 6. per 426.  $\frac{1}{2}$  per la 2. del terzo, Distinzione prima, verranno Lire 11040, che partite per 23. torneranno Lire 480. Ovvero ridotti Sol. 17. 6. in  $\frac{1}{2}$  di Lira, si opera per la 25. di questo, e verranno le medesime Lire 480.

230

23 —	2587. 10	23 —	25 $\frac{7}{8}$ —	426 $\frac{1}{2}$
3	298. 15. 1	8	108	
	25. 17. 6 — 426 $\frac{1}{2}$		307	1280
	8. 12. 6		184	207
			3	
	10350		552	8960
	517. 10			2560
Lir. 480.	155. 5	Lire 480.		264960
	17. 5			4416
				— •
	11040			
	184			
	0			

58. D. Con Lire 56. 16. 8. si sono comprate braccia 16. di Panno : Si domanda quante Lire si spenderanno in braccia 84.

R. Per la 73. del secondo, si dia il 10. all'insù a Lire 56. 16. 8. Si moltiplichino per 84. il prodotto 4774. Si parta per 16. e verranno Lire 298. 7. 6. che si spenderanno ; Ovvero si parta per 16. 84. per 4. quozienti 4. 21. per 3. e 7. numeri di ripiego di 21. si moltiplichino Lire 56. 16. 8. l'ultimo prodotto si parte per 4. e verranno le medesime Lire.

16 — Lire	568. 6. 8	16 — Lire 56. 16. 8 — 84.	4	3. 21
	56. 16. 8 — 84.			170. 10. — 7
	4546. 13. 4			1193. 10
	227. 6. 8			
	4774		Lire	298. 7. 6
Lirè	298. 7. 6			

59. D. Che è l' antecedente rivolta. Si sono comprate braccia 16. di Panno con Lire 56. 16. 8. quante ne compreranno con Lire 298. 7. 6.

R. Si moltiplichino Lire 298. 7. 6. per 16. il prodotto 4774. si parte per lire 56. 16. 8. per la 46. del terzo ; e verranno braccia 84. Ovvero ridotti Soldi 16. 8. in  $\frac{1}{2}$  di Lira, il prodotto 4774. si moltiplica per 6. il prodotto si parte per 341. che vengono dalla riduzione di 56  $\frac{1}{2}$ . e si avranno le medesime braccia 84. Altri modi si trascurano.

568

568. 6.8  
Liro 56. 16.8 — 16 — 298. 7.6.

Braccia 84.

4774. — 9  
4546. 13.4

227. 6.8  
227. 6.8

56  $\frac{1}{2}$  — 16 — 298. 7.6.

341

4774  
6

Braccia 84.

28644  
1364  
---

60. D. La libbra della Seta vale Lire 25. 17.8. che valeranno libbra 428. alla medesima ragione?

R. Lire 25. si moltiplicano per 20. aggiungendo 17. fanno Soldi 517. questi si moltiplicano per 3. aggiungendo 2. vengono terzi di Soldo 1553. pigliando Denari 8. per  $\frac{2}{3}$  li quali 1553. si moltiplicano per 428. il prodotto 664684. si parta per 20. e per 3. il secondo quoziente sono Lire 11078. 1. 4. Ovvero si moltiplicano Lire 25. 17.8. per 428. per la 73. del secondo, e verranno le medesime Lire.

1 — 25. 17  $\frac{1}{2}$  — 428  
20 — 1553

517

1284

8140

6420

per 20.

34684

per 3.

33234.4

Lire 11078. 1. 4

2588. 6.8

258. 16.8

1 — Lire 25. 17.8 — 428

10352. 6.8

517. 13.4

207. 1.4

Lire 11078. 1.4

61. D. Che è l'antecedente rivolta? Libbre 428. di Seta costano Lire 11078. 1. 4. Che cosa una Libbra?

R. Si partono Lire 11078. 1. 4. per 428. a Danda, e verranno Lire 25. 17.8. Per prova si rivolti dicendo: Se Lire 25. 17.8. sono il prezzo di libbra una, di quante faranno prezzo Lire 11078. 1. 4. e si operato per l'Apporre secondo il modo della 46. del terzo, Distinzione terza, verranno libbre 428.

232

428 — 11078. 1. 4 — 1.

2518  
 Lire 25. 17. 8    378 — 20

Prova.

7563

3281

285 — 12

2588. 6. 8

258. 16. 8

Lir. 25. 17. 8 — 1. — 11078. 1. 4

724. 14. 8

Libbre 428. 207. 1. 4

3424

62. D. Uno ha comprato braccia  $23 \frac{1}{4}$  di Panno per Lire 86. 12. 8.

Si domanda il prezzo di braccia 57.

R. Si moltiplicano Lire 86. 12. 8. via 57. per la 73. del secondo, vengono Lire 4938. Soldi 2. che si moltiplicano per 4. Denominatore del rotto, fanno 49752. Soldi 8., li quali si partono per 19. vengono 1039. 12. e quelle per 5. vengono Lire 207. 18. 4.  $\frac{2}{3}$  prezzo di braccia 57. I numeri 19. e 5. sono di ripiego di 95. che sono venuti dal ridurre  $23 \frac{1}{4}$  in quarti. Si faccia la prova con rivoltarla, dicendo: Braccia 57. costano Lire 207. 18. 4.  $\frac{2}{3}$  che costeranno braccia  $23 \frac{1}{4}$ . Le Lire 207. 18. 4.  $\frac{2}{3}$  si riducano in quinti, vengono 1039. 12. e  $23 \frac{1}{4}$  in quarti 95. Adesso si parta per 19. il numero primo 57. & il numero terzo 95. vengono 3. e 5. il 3. si moltiplichi per 4. Denominatore del rotto del terzo numero fa 12. per questo si parte 1039. 12. verranno Lire 86. 12. 8. prezzo di braccia  $23 \frac{1}{4}$ . che si cercava. Si è lasciato di moltiplicare il primo, e secondo numero per 5. perchè non varia proporzione.

866. 6. 8

23  $\frac{1}{4}$  — 86. 12. 8 — 57.

Prova.

95    4331. 13. 4  
       606. 8. 8

57 — 207. 18. 4  $\frac{2}{3}$  — 23  $\frac{1}{4}$ .

3    1039. 12.    95

4    49752.    5

per 12. Li. 86. 12. 8.

19. 19752. 8.

per 5. 1039. 12.

Lire 207. 18. 4  $\frac{2}{3}$ 

62. D. Libbre  $3 \frac{1}{4}$  d'alcuna Mercanzia si sono pagate Lire 13. 19. 8 che si pagheranno libbre  $22 \frac{1}{2}$  al medesimo prezzo.

R. In cambio di  $\frac{7}{8}$  si faccia  $\frac{7}{8}$ . per accordare i rotoli. Si riduca  $3 \frac{1}{4}$  in 15. quarti, e  $22 \frac{1}{2}$  in 90. quarti. Si parte 90. per 15. viene 6. per il quale si moltiplicano Lire 13. 19. 8. e verranno Lire 83. 18. che si pagheranno per libbre  $22 \frac{1}{2}$ .

3  $\frac{1}{4}$



$$\begin{array}{r} 3 \frac{1}{4} = 13. 19. 8 = 22 \frac{3}{4}. \\ \hline 15 \text{ Lire } 83. 18. = 90 \\ 6 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{Prova.} \\ 22 \frac{3}{4} = 83. 18. 0 = 3 \frac{1}{4}. \\ \hline 90 \text{ Lir. } 13. 19. 8 \quad 15 \\ \text{per } 6. \end{array}$$

64. D. Uno ha comprato  $\frac{1}{4}$  di Canna di Panno per Lire 3. 17. 4. Si domanda che varranno Canne 28. al medesimo prezzo?

R. Si moltiplicano Lire 3. 17. 4. per 4. il prodotto di Lire 15. 9. 4. si moltiplica per 8. e vengono Lire 123. 14. 8. prezzo di Canne 28. La ragione di tale operare è, perchè i numeri di ripiego del 28. sono 4. e 7. e si lascia di moltiplicare, e poi partire per 7. Numerat. de'  $\frac{1}{4}$ . La prova si faccia con rivoltare Domanda, dicendo: Se Canne 28. costano Lire 123. 14. 8. che costeranno  $\frac{1}{4}$  di Canna, Si partano Lire 123. 14. 8. per 4. le Lire 30. 18. 8. si partano per 8. verranno Lire 3. 17. 4. prezzo di  $\frac{1}{4}$  per la ragione detta.

$$\frac{1}{4} = \text{Lire } 3. 17. 4 = 28.$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ \hline 15. 9. 4 \\ 8 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{Prova.} \\ 28 = 123. 14. 8 = \frac{1}{4}. \\ \text{per } 4. \quad 30. 18. 8 \\ 8. \text{ Lir. } 3. 17. 4 \end{array}$$

Lire 123. 14. 8

65. D. Che è l'antecedente rivoltata. Uno ha comprato  $\frac{1}{4}$  di Canna di Panno, per Lire 3. 17. 4. Domando per Lire 123. 14. 8. quante Canne di Panno averebbe comprate?

R. Lire 3. 17. 4. si moltiplicano per 8. fanno Lire 30. 18. Si moltiplicano Lire 123. 14. 8. per 7. fanno 866. 2. 8. li quali si partono per il secondo modo di partire per Apporre, per la 56. del secondo, per le Lire 30. 18. 8. e verranno Canne 28. Ovvero si riducano Lire 3. 17. 4. in Denari 928. li quali si moltiplicano per 8. il prodotto 7424. è il Partitore; Pure Lire 123. 14. 8. si riducono in Denari 29696. li quali si moltiplicano per 7. il prodotto 207872. si parte per 7424. e verranno Canne 28.

$3. 17. 4 = \frac{1}{4} = 123. 14. 8$	$3. 17. 4 = \frac{1}{4} = 123. 14. 8$
$\begin{array}{r} 8 \\ \hline 30. 18. 8 \end{array}$	$\begin{array}{r} 20 \\ \hline 2474 = 12 \end{array}$
$\begin{array}{r} 8662. 8 \\ 61. 17. 4 \\ \hline 928 = 8 \end{array}$	$\begin{array}{r} 29696 = 7 \\ \hline 207872 \end{array}$
Canne 18. $24. 2. 8 = 10$	$7424 = 207872$
$247. 9. 4$	$59392$
G g	Canne 28.

66. D.

55. D. Libbre 6. once  $7\frac{1}{2}$  d'al cuna cosa sono state pagate Lire 15. 17. 8. che si farebbero pagate libbre 26. once  $5\frac{1}{2}$ ?
- R. Libbre 6. once  $7\frac{1}{2}$  si riducano in ottavi d' oncia, faranno 635. Medesimamente Libbre 26. once  $5\frac{1}{2}$  in ottavi d'oncia e faranno 2540. li quali si partano per 635. viene 4. per il quale si moltiplicano Lire 15. 17. 8. e verranno Lire 63. 10. 8. prezzo cercato. Si rivolti per prova; se Lire 15. 17. 8. sono prezzo di libbre 6.  $7\frac{1}{2}$  di quante faranno prezzo Lire 63. 10. 8. e partendo queste per Lire 15. 17. 8. viene 4. per il quale si moltiplicano libbre 6. once  $7\frac{1}{2}$  torneranno Libbre 26. once  $5\frac{1}{2}$ .
- L. 6.  $7\frac{1}{2}$  -- 15. 17. 8 - Lib. 26.  $5\frac{1}{2}$  Lire. 15. 17. 8 - L. 6.  $7\frac{1}{2}$  - Lire. 63. 10. 8.
- |     |                |      |                         |
|-----|----------------|------|-------------------------|
| 12  | 4              | 12   | 4                       |
| 79  | Lire 63. 10. 8 | 317  | Lib. 26. $5\frac{1}{2}$ |
| 635 |                | 2540 |                         |
67. D. La libbra della Seta vale Scudi 2. Lire 6. 13. 4. che valeranno Libbre 34. once 7. Denari 15. ovvero  $\frac{1}{2}$  d'oncia?
- R. Scudi 2. Lire 6. 13. 4. si partono per 12. a causa dell'oncia, ed il quoziente per 8. e si dà una volta il 10. all'iusù, e queste file si moltiplicano per i numeri corrispondenti, i prodotti si sommano, e vengono Scudi 102. Lire 1. 15. 11.  $\frac{1}{2}$  prezzo delle dette libbre, operando per la seconda de' Partitori, per la 4. della Distinzione 6. del secondo. Si faccia la prova con rivoltar Domanda: dicendo; Scudi 2. 6. 13. 4. sono prezzo d'una libbra, di quante Libbre faranno prezzo Scudi 102. Lire 1. Soldi 16. ed operando per il partire per Apporre per la 52. del terzo, verranno libbre 34. once  $7\frac{1}{2}$ .
68. D. Si può sodisfare alla Domanda passata in altro modo?
- R. Certo, Scudi 2. Lire 6  $\frac{1}{2}$ . Si riducano in 62. terzi; Pure libbre 34. once  $7\frac{1}{2}$ . si riducano in 3325. ottavi, li quali si moltiplicano per 62. il prodotto 206150. si parte per 12. per 8. per 7. e per 3. dall'ultimo partire verranno Sc. 102. 1. 15. 11  $\frac{1}{2}$ . Ovvero Sc. 2. 6. 13. 4. si moltiplicano per 17. il prodotto per 2. ripiego di 34. e verranno Scudi 100. 2. 13. 4. si pigli la metà partendo per 2. Scudi 2. 6. 13. 4. sono Scudi 1. 3. 6. 8. per once 6. di questo si pigli il sesto per once 1. partendo per 6. sono Lire 1. 14. 5.  $\frac{1}{2}$  di questo si pigli la metà per  $\frac{1}{2}$  partendo per 2. sono Soldi 17. 2  $\frac{1}{2}$  di questo si pigli il quarto per  $\frac{1}{2}$  partendo per 4. sono Soldi 4. 3  $\frac{1}{2}$  si sommano, e torneranno Scudi 102. 1. 15. 11  $\frac{1}{2}$ .
69. D. Libbre 93  $\frac{1}{2}$  di Zucchero candido sono valute Ducati 17.  $\frac{1}{2}$ . che sono grossi 3. Veneziani. Domanda, che valeranno a tal prezzo libbre 765. once 9.  $\frac{1}{2}$ .
- R. Questa Domanda è di Nicolò Tartaglia al numero 68. cap. 2. del

del lib. 8. , la quale hò poſto quì per riſolverla in altro modo, ac-  
ciò ſi veda, che le regole date ſervono per qualſivoglia Moneta:  
ancorchè ſia di difficile diviſione , come è il Ducato diviſo in  
Groſſi 24. , & il Groſſo in Piccioli 32. Si moltiplicano Ducati  
17. Groſſi 3. per 10. e ſi pone il prodotto 171. Groſſi 6. ſopra ,  
queſti ſi moltiplicano ancora per 10. e pure ſopra ſi pone il pro-  
dotto 1712. Groſſi 12. Si partono Ducati 17. 3. per 12. per cauſa  
dell' once riducendo gl' avanzi in Groſſi, e piccioli, e viene Du-  
cati 1. 10. 8. e queſto ſi parte per 4. , e vengono Groſſi 8. 18.  
Queſte file di Ducati, Groſſi, e Piccioli ſi moltiplicano per i nu-  
meri corriſpondenti di libbre 765. once  $9\frac{1}{4}$  cominciando dal 7.  
à moltiplicare Groſſi 12. e Ducati 1712. prima fila di ſopra , e ſi  
ſommano i prodotti, la ſomma farà di Ducati 13114. 12. 30. li  
quali devonſi partire per  $93\frac{2}{3}$ . che però ridotti in 467. quinti per  
5. Si moltiplicano Ducati 13114. 12. 30. il prodotto di Ducati  
65572. 16. 22. ſi partono à Danda breve, e verranno Ducati 140.  
Groſſi 9. Piccioli 28  $\frac{2}{3}\frac{1}{4}$ . prezzo cercato delle Libbre dette. Si  
faccia la Prova rivoltando Domanda coſì : Ducati 17. Groſſi 3.  
ſono prezzo di libbre  $93\frac{2}{3}$  di quante faranno prezzo Ducati  
140. 9. 29. Ducati 17. Groſſi 3. ſi riducano in Piccioli 13152.  
li quali ſi moltiplicano per 5. Denominatore del rotto del ſecon-  
do numero ; fanno 65760. Partitore ; Pure  $93\frac{2}{3}$  ſi riducano in  
467. quinti, e finalmente Ducati 140. 9. 29. in Piccioli 107837.  
li quali ſi moltiplicano per 467. il prodotto 50359879. ſi parte  
à Danda alla breve per 65760. e torneranno Libbre 765.  
once  $9\frac{1}{4}$ .

70. D. Oltre à i modi aſſegnati ſul principio , ci è altro modo di  
trovare il quarto proporzionale ?

R. Mi è ſovvenuto queſto , il quale per ordinario è di più lunga  
operazione , alle volte però è di più commoda, e breve , e confi-  
ſte in ſervirſi della differenza dal numero primo al numero ſecon-  
do della regola del Trè , per il numero ſecondo , & operato per i  
preceſſi dati, il numero , che ne viene ſi ſomma col terzo, quan-  
do ſi ſottra il ſecondo dal primo , per trovare la differenza ; Ma  
ſottraſſi il primo dal ſecondo , allora il numero , che ne vie-  
ne dalla regola del Trè , ſi ſottra dal terzo numero , e nel primo  
caſo , la ſomma è il quarto proporzionale , nel ſecondo caſo , il  
reſto è il quarto proporzionale ; per eſempio del primo caſo . Se  
con Lire 4. ſi comprano braccia di Tela 12. con Lire 18. quan-  
te ſe ne compreranno? Si ſottri 4. da 12. reſta 8. differenza . Di-  
co adeſſo , che in cambio del 12. ſi adopra 8. differenza per ſe-  
condo numero: dicendo, ſe 4. vuole di giunta 8. che ne vorrà 18.

G g 2

& ope-

& operato troverassi 36. il quale aggiunto à 18. terzo numero, fa 54. per il quarto proporzionale, e tante braccia si averanno di Tela. Nel secondo caso si rivolti Domanda dicendo: Braccia 12. di Tela costano Lire 4. che costeranno braccia 54. Per trovare la differenza si sottra 4. secondo numero da 12. primo, & operato con dire 12. vuol meno 8. che vorrà di meno 54. Verrà 36. il quale si sottra da 54. terzo numero, resta 18. quarto numero proporzionale, e Lire, che costeranno braccia 54.

4 — 12 — 18.	12 — 4 — 54.
. 4	4
4 — 8 — 18.	Differenza 8
36 somma	12 — 8 — 54. 36.
Viene 36	36 sottra
54 Braccia	

Lire 18.

71. D. Libbre 27  $\frac{2}{3}$  di Mercanzia si apprezzano Lire 37  $\frac{2}{3}$  Domanda, che si apprezzaranno libbre 192  $\frac{2}{3}$ .

R. Per l'antecedente: da 37  $\frac{2}{3}$  si sottrai 27  $\frac{2}{3}$  resta 10. Or si dica se 27  $\frac{2}{3}$  cresce 10. che crescerà 192  $\frac{2}{3}$ .? si riduca 27  $\frac{2}{3}$  in 55. mezzi, e 192  $\frac{2}{3}$  in 385. mezzi, si moltiplicano per 10. e 3850. si parta per 11. viene 350. questo per 5. numeri di ripiego del 55. viene 70. il quale si aggiunge à 192  $\frac{2}{3}$  viene 262  $\frac{2}{3}$ . per le Lire, che si apprezzeranno le dette Libbre. Si rivolti la Domanda per prova dicendo: se con Lire 37  $\frac{2}{3}$ . si comprano libbre 27.  $\frac{2}{3}$  quante se ne compreranno con Lire 262.  $\frac{2}{3}$ .? Si sottrino 27  $\frac{2}{3}$  da 37  $\frac{2}{3}$  resta 10. e si operi; verrà 70. il quale si sottra da 262.  $\frac{2}{3}$  resta 192  $\frac{2}{3}$  per le Libbre, e torna la Lezione.

	Con		Da
37 $\frac{2}{3}$	se 27 $\frac{2}{3}$ — 10 — 192 $\frac{2}{3}$	se 37 $\frac{2}{3}$ — 10 — 262 $\frac{2}{3}$	
27 $\frac{2}{3}$	55      11      3850	75      15      5250	
10	5      350	5      350	
	70 Sommasi	Sottra 70	
	Lire 262 $\frac{2}{3}$	Libbre 192 $\frac{2}{3}$	

72. D. Che è il quesito 38. à carte 87. di Gio. Battista Pisani. Vorrei cambiare Genovine 1550  $\frac{2}{3}$  in Zecchini, atteso che la Genovina vale Lire 7  $\frac{2}{3}$ . ed il Zecchino Lire 10  $\frac{2}{3}$ . Domando quanti Zecchini faranno.

R. Da 10  $\frac{2}{3}$  si sottra 7  $\frac{2}{3}$  resta 3. ora si dica: se 10  $\frac{2}{3}$  scema 3. che sceme-

237

scemerà  $1550. \frac{2}{3}$ . & operato viene  $453.16.1 \frac{7}{8}$ . il quale si sottra  
da  $1550. \frac{2}{3}$  e restano Zecchini 1096. 13. 10. &c.

$$\begin{array}{r}
 10 \frac{2}{3} \\
 7 \frac{1}{4} \\
 \hline
 3 \\
 \hline
 41 \\
 \hline
 453, 16. 1 \frac{7}{8} \\
 \hline
 6202 \\
 3 \\
 \hline
 18606 \\
 220 \\
 156 \\
 33 - 20 \\
 \hline
 660 \\
 250 \\
 4 - 12 \\
 \hline
 48 \\
 7
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 \text{Da } 1550. 10 \\
 \text{sottra } 453. 16. 1 \frac{7}{8} \\
 \hline
 \text{Zecchini } 1096. 13. 10 \frac{1}{4}
 \end{array}$$

## DISTINZIONE SECONDA DEL TRATTATO QUARTO.

### *Della Regola del Trè semplice roverscia.*

1. **Q**uesta Regola in che cosa differisce dalla dritta, e perchè si chiama roverscia?

R. Nella Regola del Trè dritta in quella ragione, ò proporzione stà il primo numero al secondo, che stà il terzo al quarto, come si ricava dalla proposizione 14. del Lib. 5. d' Euclide: Onde se il primo è maggiore del secondo; il terzo è maggiore del quarto: Come 4. 3. 8. 6. ovvero, se il primo è minore del secondo, il terzo è minore del quarto; come 3. 6. 4. 8. Ma nella regola del Trè roverscia; come stà il primo numero al quarto, così stà il terzo al secondo, e però è necessario fare l'operazioni à roverscio, cioè: moltiplicare il primo numero via il secondo, il prodotto è d' uopo partire per il terzo, e il quoziente sarà il quarto numero cercato: e si osservi, che il numero, che porta seco la Domanda è il Partitore, e gl' altri due si moltiplicano: per la qual cosa per ordinare i numeri del quesito, ò Domanda si ponga in primo luogo il numero, che porta la Domanda, in secondo il numero

differen-

differente, in terzo luogo il simile al primo. Et allora si operi come nella regola del Trè dritta si è detto, secondo i preeetti dati, moltiplicando il secondo via il terzo, il prodotto si parta per il primo, e verrà il quarto numero cercato; e per questa disposizione il primo starà al secondo, come il terzo al quarto; e si potranno fare, & usare tutti quei modi detti nella regola dritta, e tutte le prove sopra notate, senza variare insegnamenti, che però riesce assai facile a gli Scolari la pratica con insegnargli solo la diversa disposizione, cioè di porre in primo luogo il numero, che porta seco la Domanda; dove nella dritta si poneva il terzo.

2. D. Come si conosce che la Domanda si deve sciogliere per regola roverscia del Trè?

R. Ogni volta, che il quarto numero cercato deve essere menò del secondo, come il terzo è maggiore del primo; Ovvero deve essere più del secondo, come il terzo è minore del primo, si soddisfa alla Domanda per regola del Trè roverscia, e il lume naturale lo detta come si può osservare nelle Domande seguenti.

3. D. Cavalli 6, hanno mangiato una quantità di Biada, in giorni 20. Si domanda Cavalli 15. In quanti giorni l'averebbero mangiata, dandogliene la medesima misura ogni giorno?

R. Volendo disporre i numeri à modo della regola del Trè dritta, in primo si pone 15. del quale si fa la Domanda, in secondo luogo 20. differente, e in terzo 6. simile al numero posto in primo. Onde moltiplicando 6. via 20. fa 120. il quale si parte per 15. viene 8. e in tanti giorni mangierebbero quella quantità di Biada 15. Cavalli, che hanno mangiata 6. Cavalli in 20. giorni; perchè quanti più Cavalli sono, in meno giorni la mangiano. Per prova si rivolti la Domanda, dicendo: Cavalli 15. hanno mangiato una quantità di Biada in giorni 8. in quanti giorni la mangierebbero Cavalli 6. dandogliene la medesima misura ogni giorno? si moltiplica 8. via 15. fa 120. il quale si parte per 6. e tornano giorni 20.

$$\begin{array}{r} 15 \text{ — } 20 \text{ — } 6 \\ \hline 6 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 120 \\ \hline \end{array}$$

Giorni 8

$$\begin{array}{r} \text{Prova.} \\ 6 \text{ — } 8. \text{ — } 15 \\ \hline 8 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 120 \\ \hline \end{array}$$

Giorni 20

4. D. In una Fortezza assediata sono Soldati 2136. & hanno Vettovaglia per Mesi 7. volendo, che gli duri Mesi 24. quanti Soldati si devono scemare?

R. qua-

R. Quanto maggior tempo deve durare la Vettovaglia, tanto minor numero deve essere di Soldati; Che però 24. è partitore per farli di esso la domanda, e si moltiplicano 2136. per 7. il prodotto 14952. si parte per 24. il quoziente 623. sono i Soldati, che resteranno in Fortezza, e sottratti da 2136. restano 1513. da scemarsi. Per prova si rivolti la Domanda, dicendo; In una Fortezza ci è Vettovaglia per Mesi 24. sufficiente a' Soldati 623. dovendoci stare Soldati 2136. quanti Mesi durerà la Vettovaglia? Si moltiplichino 24. via 623. il prodotto 14952. si parta per 2136. e tornano Mesi 7.

$$24 \text{ — } 2136 \text{ — } 7$$

$$\text{—————}$$

$$14952$$

$$\text{—————}$$

Soldati 623

Prova.

$$2136 \text{ — } 24 \text{ — } 623$$

$$\text{—————}$$

$$14952$$

$$\text{—————}$$

Mesi 7

5. D. Molini 2. hanno macinato in 21. giorno una quantità di Grano. Molini 6. della medesima portata, in quanti giorni l'averebbero macinata?

R. Più molini in minor tempo macinano la medesima quantità di Grano; Che però si moltiplica 21. per 2. il prodotto 42. si parte per 6. e viene 7. e in tanti giorni sarà macinata; per prova si dica in 7. giorni si macina una quantità di Grano da Molini 6. da quanti si macinerà in giorni. 21. si moltiplichino 6. via 7. fa 42. il quale si parte per 21. e viene 2. per li Molini, che macineranno.

$$6 \text{ — } 21 \text{ — } 2$$

$$\text{—————}$$

$$42$$

$$\text{—————}$$

Giorni 7

Prova.

$$21 \text{ — } 6 \text{ — } 7$$

$$\text{—————}$$

$$42$$

$$\text{—————}$$

Molini 2

6. D. Lavoranti 30. fanno un'opera in Mesi 8. Si vuol sapere Lavoranti 20. in quanti Mesi l'averebbero fatta?

R. Minor numero di Lavoranti più Mesi ricercano; Onde si moltiplichino 8. via 30. il prodotto 240. si parta per 20. e verrà 12. per li Mesi ne' quali sarebbe stata fatta l'opera. Per prova si dica: Se Lavoranti 20. in mesi 12. fanno un'opera; in quanti mesi Lavoranti 30. la faranno, e moltiplicato 12. via 30. il prodotto 240. partito per 30. tornerà 8. per li Mesi ne' quali la faranno.

$$20 \text{ — } 8 \text{ — } 30$$

$$\text{—————}$$

$$240$$

$$\text{—————}$$

Mesi 12

$$30 \text{ — } 12 \text{ — } 20$$

$$\text{—————}$$

$$240$$

$$\text{—————}$$

Mesi 8

7. D. Se

7. D. Se Gradi 36. d'altezza di Sole fanno braccia 27. d'ombra d'una Campanile, ò Torre; Si domanda Gradi 38. d'altezza di Sole. quante braccia d'ombra causeranno?

R. Quanto è meno alto il Sole maggior'ombra causa, e però Virgilio per dire il Sole tramonta, cantò nella Bucolica. *Majoresque cadunt de montibus umbra*, ed al contrario, più Gradi d'altezza danno minor numero di braccia; che però si moltiplica 27. via 36. il prodotto 972. si parte per 48. e vengono braccia  $20\frac{3}{4}$  d'ombra. Per prova si dica: Quando un Campanile, ò Torre fa braccia 20  $\frac{3}{4}$  d'ombra, il Sole è alto Gradi 48. Si domanda quando farà braccia 27. d'ombra, quanti Gradi farà alto il Sole, Si moltiplichino 48. via  $20\frac{3}{4}$  il prodotto 972. si parta per 27. e verranno Gradi 36.

$$48 \text{ — } 27 \text{ — } 36$$

$$27 \text{ — } 48 \text{ — } 20\frac{3}{4}$$

$$\text{Braccia } 20\frac{3}{4} \quad 972 \quad \frac{3}{4}\frac{3}{4} \text{ sch. } \frac{3}{4}$$

$$12$$

$$960$$

$$\begin{array}{r} \text{per } 3. \quad 972 \\ 9. \quad 324 \end{array}$$

$$\text{Gradi } 36$$

8. D. Una Fusta di Remi 12. fa un viaggio d'alquante miglia in ore 8. Si vuol sapere un'altra di Remi 20. in quant' ore lo farà?

R. Numero maggiore di Remi fa fare il viaggio in men' ore; Per il che si moltiplica 8. via 12. il prodotto 96. si parte per 20. e viene  $4\frac{3}{5}$  che sono ore, nelle quali la Fusta di 20. Remi farà il viaggio. Per prova si dica; una Fusta di Remi 12. fa un viaggio d'alquante miglia in ore 8. Domando di quanti Remi farà un'altra che fa il medesimo viaggio in ore  $4\frac{3}{5}$  si moltiplichino 12. via 8. e si parte 96. per  $4\frac{3}{5}$ . e torneranno Remi 20.

$$20 \text{ — } 8 \text{ — } 12$$

$$96$$

$$\text{Ore } 4\frac{3}{5}$$

Prova.

$$4\frac{3}{5} \text{ — } 12 \text{ — } 8$$

$$24 \quad 96$$

$$5$$

$$480$$

$$\text{Remi } 20$$

9. D. Una verga d'oro di peso once 15. à bontà di Carati 18. messa nel fuoco è tornata di peso once 12. Si domanda à che bontà di Carati farà?

R. L'oro



R. L'oro fino è di Carati 24. quando è di meno, è segno essere mescolato con Rame, il quale si consuma con metterlo al fuoco, e l'oro quanto scema di peso, tanto cresce di bontà di Carati: si moltiplica dunque 18. via 15. il prodotto 270. si parte per 12. e verrà 22  $\frac{2}{3}$ . che sono Carati di bontà dell'oro. Si faccia la prova dicendo: Una Verga d'oro di once 12. à bontà di Carati 22  $\frac{2}{3}$ . è stata posta al fuoco con aggiungere Rame, & è venuta di peso once 15. Si domanda di quanti Carati sarà dett'oro? Si moltiplica 22.  $\frac{2}{3}$  via 12. il prodotto 270. si parte per 15. viene 18. per i Carati dell'oro.

$$12 - 18 - 15$$

$$\begin{array}{r} 270 \\ \hline \end{array}$$

$$\text{Carati } 22 \frac{2}{3}$$

$$15 - 22 \frac{2}{3} - 12$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ \hline \end{array}$$

$$264$$

$$270$$

18 Carati.

10. D. Carlo ha tenuto à pigione una Casa apprezzata scudi 480. Anni 8. Mesi 10. Adesso per sodisfare al Padrone della Casa gli affitta un Podere, che vale scudi 640. si domanda quanto tempo terrà il podere in sodisfazione della pigione della Casa?

R. Quanto più vale il Podere della Casa, tanto meno di tempo lo deve tenere, e per saperlo: Si riducano Anni 8. Mesi 10. in Mesi 106. li quali si moltiplicano per 480. il prodotto 50880. si parte per 640. e viene 79  $\frac{2}{3}$  che sono Mesi, cioè Anni 6. Mesi 7  $\frac{2}{3}$  e tanto tempo terrà il podere per esser sodisfatto. Per prova si dica: Carlo ha tenuto à pigione una Casa apprezzata scudi 480. anni 8. Mesi 10. & il Padrone della Casa ha tenuto in affitto un Podere di Carlo Anni 6. Mesi 7  $\frac{2}{3}$  e sono pari nel contratto. Si domanda quanto valeva il Podere di Carlo. Ridotti Anni 8. mesi 10. in Mesi 106. li quali si moltiplicano via 480. il prodotto 50880. si parta per 79  $\frac{2}{3}$  che sono Mesi, e verrà 640. che sono scudi prezzo del Podere.

$$640 - 106 - 480$$

$$\text{Prova } 79 \frac{2}{3} - 480 - 106$$

$$8480$$

$$424$$

$$\begin{array}{r} \text{per } 8 \\ 8 \end{array} \begin{array}{r} 50880 \\ 636 \\ \hline \end{array}$$

$$\text{Mesi } 79 \frac{2}{3}$$

$$159$$

$$\text{Scudi } 640$$

H h

$$8480$$

$$424$$

$$50880 - 2$$

$$101760$$

$$636$$

$$11. D.$$

11. D.

11. D. Flavio dà a guadagno scudi 1200. per Mesi 15. e Lelio dà a guadagno scudi 2000. alla medesima ragione. Si domanda doppio quanti Mesi averà guadagnato quanto Flavio in Mesi 15.

R. E' certo, che scudi 2000. in meno tempo guadagneranno la medesima quantità di scudi; che però si moltiplica 15. via 1200. il prodotto 18000. Si parte per 2000. e ne viene 9. che sono mesi, ne quali Lelio guadagnerà il medesimo che Flavio. Per prova si rivolti domanda dicendo: Lelio con scudi 200. in mesi 9. fa il medesimo guadagno, che Flavio in mesi 15. alla medesima ragione: Si domanda quanti furono gli scudi di Flavio dati a guadagno. Si moltiplicano 2000. via 9. fa 18000. i quali si partono per 15. e tornano scudi 1200. &c.

$$\begin{array}{r}
 2.000 \text{ ——— } 15 \text{ ——— } 1200 \\
 \quad \quad \quad 15 \\
 \quad \quad \quad \text{—————} \\
 \quad \quad \quad 18.000 \\
 \quad \quad \quad \text{—————} \\
 \quad \quad \quad \text{Scudi } 1200
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{r}
 15 \text{ ——— } 2000 \text{ ——— } 9 \\
 \quad \quad \quad \text{—————} \\
 \quad \quad \quad 18000
 \end{array}$$

12. D. Uno deve riscuotere Pezze 174. da Lire 5. e un Giulio l'una da un Banco in tante Piastre di Lir. 7. Si domanda quante faranno?

R. Questa tramutazione di Moneta, & altre simili, appartengono alla regola del Trè Rovercia, che però si moltiplicheranno Lire 5.  $\frac{1}{3}$  via Pezze 174. e verranno Lire 986. le quali si partiranno per Lire 7. e verranno Piastre 140. Lire 6. Fiorentine, per prova si dice: sono state pagate Piastre 140. Lire 6. per Pezze di Lire 5  $\frac{1}{3}$ . Si domanda quante siano state dette Pezze? Si moltiplicano Piastre 140. Lire 6, per 7. fanno Lire 986, queste si partano per Lire 5  $\frac{1}{3}$ , e torneranno Pezze 174.

$$\begin{array}{r}
 \text{Lire } 7 \text{ ——— } 174 \text{ ——— } 5 \frac{1}{3} \\
 \quad \quad \quad 3. 38 \\
 \quad \quad \quad \text{—————} \\
 \quad \quad \quad 890 \\
 \quad \quad \quad 116 \\
 \quad \quad \quad \text{—————} \\
 \quad \quad \quad 986
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{r}
 5 \frac{1}{3} \text{ ——— } 140. 6 \text{ ——— } 7 \\
 \quad \quad \quad 17 \\
 \quad \quad \quad \text{—————} \\
 \quad \quad \quad 986 \\
 \quad \quad \quad 3 \\
 \quad \quad \quad \text{—————} \\
 \quad \quad \quad 8 \\
 \quad \quad \quad \text{—————} \\
 \quad \quad \quad 995 \\
 \quad \quad \quad 125 \\
 \quad \quad \quad \text{—————} \\
 \quad \quad \quad - 68
 \end{array}$$

Piastre 140. Lire 6.

13. D. Un Mercante hà comprato libbre 2750. di Lana a Lire 37. 13. 4. il 100. il quale la fece lavare, e tornarono libbre 2500. nette. Si domanda quanto gli vengono a costare Libbre 100. nette?

R. Avvertasi che non occorre trovare il prezzo di tutte le libbre; Ma secondo che vuole questa regola, si ponga in primo luogo per parti-

243

partitore 2500. in secondo luogo Lire 37. 13. 4. ; in terzo 2750. per l'industria insegnata nella 9. de Ma prima Distinzione di questo si parte 2500. per 250. e viene 10. pure 2750. per 250. e viene 11. per il quale si moltiplicano Lire 37. 13. 4. e vengono Lire 414. 6. 8. le quali si partono per 10. e vengono Lire 41. 8. 8. per quanto gli vengono a costare le libbre nette : Per prova si rivolti Domanda. Un Mercante avendo fatto lavare una quantità di libbre, che aveva pagato il 100. Lire 37. 13. 4. tornarono asciutte, e nette libbre 2500. e gli vengono a costare il 100. Lire 41. 8. 8. Si domanda quante libbre erano sporche ? In primo luogo  $37 \frac{1}{2}$  in secondo libbre 2500. in terzo  $41 \frac{1}{2}$ . ed opera. to, torneranno libbre 2750.

	$37 \frac{1}{2}$	2500.		$41 \frac{1}{2}$
2500.	37. 13. 4.	2750.	113	1243
10			11	250
	414. 6. 8.			
Lire	41. 8. 8.	Libbre 2750.	310750	847
				565

14. D. Se il Mercante nel fare lavare la Lana ci avesse avuto di spesa Lire 40. si domanda quanto gli verrebbe a costare il cento delle libbre nette ?

R. Sapprezzino libbre 2750. a Lire  $37 \frac{1}{2}$  13. 4. il cento ; sarà il loro prezzo Lire 1035. 16. 8. alle quali si aggiungano Lire 40. di spesa, fanno Lire 1075. 16. 8. le quali si sono spese in centinaja 25. di libbre nette, che però partendole per 25. verranno Lire 43. 8. quanto gli verranno a costare il cento

15. D. Un Mercante avendo fatto lavare 2750. libbre di Lana sporca con spesa di Lire 40. trova che gli sono tornate libbre nette 2500. che vengono a costargli Lire 43. —. 8. il 100. Si domanda quanto spese nel cento della Lana sporca ?

R. Questa serve di prova alla passata. Si moltiplicano Lire 43. —. 8. per 25. centinaja di Libbre nette, vengono Lire 1075. 16. 8. dalle quali si sottrino Lire 40. di spesa, restano Lire 1035. 16. 8. prezzo di centinaja  $27 \frac{1}{2}$  libbre di Lana sporche per  $27 \frac{1}{2}$  partite Lire 1035. 16. 8. vengono Lire  $37 \frac{1}{2}$  13. 4. che spese nel cento della Lana sporca.

16. D. Uno ha comprato Staja di Grano 1720. a Lire  $3 \frac{1}{4}$  lo stajo. le fa crivellare, e mondare, e tornano nette Staja 1560. Si domanda quanto gli viene a costare lo Stajo del Grano netto ?

H h 2

16. D.

R. Si moltiplicano 1720. per  $3 \frac{2}{3}$  il prodotto 6020. si parte per 1560. il quoziente di Lire 3. 17. 2  $\frac{2}{3}$ . è il prezzo dello Stajo netto.  
 17. D. Uno avendo comprato una quantità di Staja di Grano, a Lire  $3 \frac{2}{3}$  lo Stajo; le fece crivellare, e mondare, e tornano Staja 1560. e trovò costargli lo Stajo del Grano netto Lire 3. 17. 2  $\frac{2}{3}$ . Si domanda quante Staja erano sporche?

R. Serve di prova alla passata. Si moltiplicano Lire 3. 17. 2  $\frac{2}{3}$ . per 12. 12. o 10. numeri di ripiego di 1560. l'ultimo prodotto 6020. si parte per  $3 \frac{2}{3}$  e torneranno Staja 1720. sporche.

18. D. Un Mercante aveva una pezza di Panno di braccia 50. la fece lavare, e cimare, e tornò di braccia  $46 \frac{2}{3}$ . e le vorrebbe vendere con tornare nel prezzo di braccia 50. a Scudi 3. 14. 8. il braccio. Si domanda braccia  $46 \frac{2}{3}$  quanto le venderà il braccio?

R. In primo luogo braccia  $46 \frac{2}{3}$ . perchè di queste si fa la Domanda: Lire 3. 14. 8. in secondo; in terzo braccia 50. per le quali si moltiplicano Lire 3. 14. 8. a ripiego il prodotto 186. 13. 4. si partono per  $46 \frac{2}{3}$ . e vengono Lire 4. e tanto le venderà il braccio.

19. D. Un Mercante avendo fatto lavare, e cimare, una Pezza di Panno d'alquante braccia, che valeva il braccio Lire 3. 14. 8. e sono tornate braccia  $46 \frac{2}{3}$  lavate, e cimate, che per non scapitare nel prezzo fa il suo conto, che costeranno il braccio Lire 4. Si Domanda di quante braccia era la detta Pezza non bagnata?

R. Questa serve di prova alla passata. Si moltiplicano  $46 \frac{2}{3}$ . 13. 4. a modo di Soldi, e Denari per 4. il prodotto 186. 13. 4. si parte per l'Apporre per Lire 3. 14. 8. moltiplicando col 10. all'insù, vengono braccia 50. per la detta pezza di Panno non bagnata.

37. 6. 8	<i>Prova.</i>
46 $\frac{2}{3}$ — Lire 3. 14. 8. — 50	37. 6. 8
—————	3. 14. 8 — 46. 13. 4 — 4
per 14.0	186. 13. 4 — 3
—————	186. 13. 4
560. — —	Braccia 50. 186. 13. 4
Lire 4.	—————

20. D. Uno si è fatto un Ferrajolo con braccia  $10 \frac{1}{2}$  di Panno largo braccio  $1 \frac{1}{2}$ . Si domanda volendosene fare un' altro con Panno largo  $\frac{1}{2}$  di braccio, quante braccia ce ne vorranno?

R. In primo luogo  $\frac{1}{2}$ . in secondo  $10 \frac{1}{2}$ . in terzo  $1 \frac{1}{2}$ . e si operi per la 48. del Trattato terzo Distinzione prima, ne verranno braccia  $17 \frac{1}{2}$ . perchè quanto è più stretto il Panno, tante più braccia di lunghezza si ricercano.

21. D. Uno si fa un Ferrajolo con Panno largo  $\frac{1}{2}$  di braccio, e ce ne van-

ne vanno braccia 17  $\frac{2}{3}$  Si domanda: essendosi fatto un simile Ferrajolo con braccia 10  $\frac{1}{2}$  di Panno migliore, quanto era largo?  
 R. Questa serve di prova alla passata: Disposti i numeri come si è insegnato: cioè in primo luogo 10  $\frac{1}{2}$ . in secondo  $\frac{1}{2}$ . ed in terzo 17  $\frac{2}{3}$ . si opera per la medesima 48. e verrà 1  $\frac{2}{3}$ . per la larghezza del Panno.

$\begin{array}{r} \frac{1}{6} \text{ ————— } 10 \frac{1}{2} \text{ ————— } 1 \frac{2}{3} \\ 5 \text{ ————— } \\ 3 \text{ ————— } 43 \text{ ————— } 4 \\ \text{————— } 24 \text{ ————— } 6 \\ 15 \text{ ————— } \\ 4 \text{ ————— } 172 \text{ ————— } 24 \\ \text{————— } 86 \text{ ————— } \\ 60 \text{ ————— } \\ 1032 \\ 432 \end{array}$	<p><i>Prova.</i></p> $\begin{array}{r} 10 \frac{1}{2} \text{ ————— } \frac{1}{2} \text{ ————— } 17 \frac{2}{3} \\ 43 \text{ ————— } 86 \\ 6 \text{ ————— } \\ \text{————— } 4 \\ \text{per } 258 \\ \text{Bra. } 1 \frac{2}{3} \text{ si parte } 344 \\ 86 \text{ sch. } \frac{1}{3} \\ 258 \end{array}$
--	--

Br. 17  $\frac{2}{3}$   $\frac{1}{6} \frac{2}{3}$  schifato  $\frac{1}{3}$   
 Nella prova si tralascia di moltiplicare il terzo per 5. numeratore del secondo, per essersi moltiplicato nella riduzione in quinti, e si tralascia di moltiplicare anche il primo per 5. Perché ogni volta, che il numero partitore, ed il numero da partirsi si abbia da moltiplicare per un medesimo numero, si tralascia dando ad ogni modo il medesimo quoziente con più brevità.

22. D. In un Padiglione da Letto ci sono andate braccia 48. di Damasco largo braccio 1  $\frac{2}{3}$ . Si domanda: facendone un simile con robba larga braccio 1  $\frac{1}{2}$ . quante braccia di lunghezza ci vorranno?

R. Si moltiplicano le braccia 48. per braccia 1  $\frac{2}{3}$  di sua larghezza, il prodotto 60. si parte per 1  $\frac{1}{2}$  e vengono braccia 40. che ci vogliono a fare simile Padiglione.

23. D. Con braccia 40. di robba larga braccio 1  $\frac{2}{3}$ . Si è fatto un Padiglione da Letto, ed in un simile ci sono andate braccia 48. di Damasco; Si domanda quanto era largo?

R. Si moltiplica 1  $\frac{2}{3}$  via 40. fa 60. il quale si parte per 48. e viene braccia 1  $\frac{1}{4}$  di larghezza, e torna la prova. *Prova.*

$\begin{array}{r} 1 \frac{2}{3} \text{ ————— } 48 \text{ ————— } 1 \frac{1}{4} \\ \text{————— } 5 \text{ ————— } \\ 6 \text{ ————— } 240 \text{ ————— } 5 \\ \text{————— } \\ \text{Braccia } 40 \end{array}$	$\begin{array}{r} 48 \text{ ————— } 1 \frac{2}{3} \text{ ————— } 40 \\ \text{————— } \\ 20 \text{ ————— } \\ 40 \text{ ————— } \\ \text{————— } 60 \\ 12 \text{ sch. } \frac{1}{4} \\ 48 \end{array}$
---	---

25. D. Quando lo Stajo del Grano vale Lire 6. 13. 4. comprefecelle spese di macina, di manfattura, e cottura il filo del Pane pesa onçe 26. Si domanda se lo Stajo del Grano verrà a costare Lire 5. 6. 8. con tutte le spese quanto peserà il filo del Pane, che è tre Pani?

R. Lire 5  $\frac{2}{3}$  in primo luogo, che portano seco la Domanda, in secondo onçe 26. in terzo Lire 6  $\frac{2}{3}$ . e ridotte le Lire in terzi, si moltiplichino 20. via 26. il prodotto 520. si parta per 16. verranno onçe 32  $\frac{1}{2}$ . che peserà il filo del Pane. Si rivolti la Domanda per prova.

$\begin{array}{r} 520 \\ 16 \overline{) 520} \\ \underline{160} \phantom{00} \\ 360 \phantom{00} \\ \underline{320} \phantom{00} \\ 40 \end{array}$	$\begin{array}{r} 26 \text{ onçe} \\ 20 \overline{) 520} \\ \underline{400} \phantom{00} \\ 120 \phantom{00} \\ \underline{120} \phantom{00} \\ 0 \end{array}$	$\begin{array}{r} 26 \text{ onçe} \\ 3 \overline{) 78} \\ \underline{6} \phantom{00} \\ 16 \phantom{00} \\ \underline{15} \phantom{00} \\ 1 \end{array}$	$\begin{array}{r} 5 \frac{2}{3} \text{ Lire} \\ 32 \frac{1}{2} \text{ onçe} \\ \underline{1040} \\ 104 \phantom{00} \\ \underline{1040} \\ 0 \end{array}$
Onçe 32 $\frac{1}{2}$	40	156	312
schif. $\frac{2}{3}$		cor. Lir. 6 $\frac{2}{3}$	

## D I S T I N Z I O N E T E R Z A

*Della Regola del Trè composta diritta, detta del Cinque, del Sette, &c.*

1. D. **I**N che consiste la Regola del Trè composta, detta del Cinque?

R. Consiste in questo; che si danno alcuni Questi, ne i quali ci sono cinque numeri distinti, due de' quali simili sono principali, e ne hanno annessi due altri meno principali: il quinto numero è differente, al quale si trova il suo simile, per via di moltiplicare, e partire, e sarà il sesto numero, che soddisfa alla Domanda.

2. D. Come si ordineranno i numeri in Carta, per operare?

R. Si terrà quest' ordine: Nel primo luogo da mano sinistra si pone il numero principale, che non porta seco la Domanda: Nel secondo luogo il numero meno principale a lui annesso; Nel mezzo, o nel terzo luogo il numero differente: Nel quarto luogo l'altro numero principale, che porta seco la Domanda, simile al primo; e finalmente nel quinto luogo il numero a lui annesso. Si osservi il tutto nel quesito seguente, nel quale i numeri sono proposti per ordine.

4. D. Un

3. D. Un Signore ha tenuto à frutto Scudi 640. Mesi 15. e ne ha avuto di guadagno Scudi  $32\frac{1}{2}$ . Si vuol sapere con Scudi 1600. in Mesi 20. alla medesima ragione, quanti Scudi averebbe guadagnato?

R. Si conosce chiaro, che il Capitale di Scudi 640. è numero principale, & il 15. di Mesi à lui annesso è meno principale, e che non porta seco la Domanda; che però va posto il Capitale di Scudi 640. in primo luogo, & i Mesi 15. nel secondo. Il guadagno di Scudi  $32\frac{1}{2}$  nel mezzo, cioè nel terzo luogo; l'altro Capitale di Scudi 1600. che porta seco la Domanda, nel quarto luogo, & i Mesi 20. à lui annessi nel quinto luogo.

4. D. Ordinati i numeri nel detto modo, che operazione si fa per sciogliere il Quesito?

R. Si moltiplicano Scudi 640. per Mesi 15. cioè il primo con il secondo, il prodotto 9600. è il numero partitore. Si moltiplicano gl'altri tre numeri, come torna meglio; Il prodotto 1040000. si parte per 9600. e vengono Scudi  $108\frac{1}{2}$  numero cercato, simile à quello di mezzo, & del terzo luogo, che per essere guadagno, anche Scudi  $108\frac{1}{2}$  sono guadagno fatto da Scudi 1600. in Mesi 20.

Le operazioni non si mettono afile; e già si suppone dopo tanti ammaestramenti, che si sappia operare in più modi.

Capitale	Mesi	Guadagno	Capitale	Mesi	Guadagno
640	15	$32\frac{1}{2}$	1600	20	Scudi $108\frac{1}{2}$

5. D. Questa Regola del Cinque si opera anche per regola del Tre?

R. Si opera per Regola del Tre due volte replicata. Nel detto Quesito per la prima, si pone in primo luogo il numero principale, cioè Scudi 640. Capitale, nel secondo il differente, cioè Sc.  $32\frac{1}{2}$  guadagno; nel terzo Sc. 1600. Capitale, che porta seco la Domanda; e moltiplicando  $32\frac{1}{2}$  via 1600. il prodotto 52000. si parte per 640. e ne vengono Scudi  $81\frac{1}{2}$ . Per la seconda Mesi 15. in primo luogo, & in secondo Sc. 81.  $\frac{1}{2}$  in terzo Mesi 20. li quali moltiplicati via  $81\frac{1}{2}$  fa 1625. il quale partito per 15. ne verranno Sc.  $108\frac{1}{2}$ . come per regola del Cinque.

640	—	$32\frac{1}{2}$	—	1600.	15	—	$81\frac{1}{2}$	—	20.
		Scudi					Scudi		

6. D. Si può fare la prima Regola del Tre con i numeri meno principali, e la seconda con i principali?

R. Si può dicendo: in Mesi 15. si guadagnano Scudi  $32\frac{1}{2}$ . quanti si ne guadagneranno in Mesi 20. & operato verranno Scudi  $43\frac{1}{2}$ . Di nuovo per la seconda regola del Tre & dica: con Scudi 640. si guadagnano Sc.  $43\frac{1}{2}$  nel detto tempo, con Scudi 1600. quanti se ne

se ne guadagneranno? e verranno Scudi 108.  $\frac{2}{3}$  come per gl'altri modi.

$$15 \text{ — } 32 \frac{2}{3} \text{ — } 20. \\ \text{Scudi } 43. \frac{2}{3}$$

$$640 \text{ — } 43 \frac{2}{3} \text{ — } 1600. \\ \text{Scudi } 108 \frac{2}{3}$$

7. D. Che prove si fanno à questa regola del cinque?

R. Molte se ne potrebbero fare, & una è risolvere il quesito per due regole del Trè, eome si è fatto nella 5. e 6. di questa; Mà la sua vera è rivoltare domanda con ricercare il guadagno delli Scudi 640. in Mesi 15. & operare come si è insegnato: Avvertendo che ricercandosi li Scudi di Capitale ovvero il tempo, allora il Quesito apparterebbe alla Regola del-cinque roverscia, come si vederà à suo luogo. Si rivolti dunque per prova, come hò detto, e doveranno tornare Scudi 32.  $\frac{2}{3}$ .

8. D. In Mesi 20. sono stati guadagnati Scudi 108.  $\frac{2}{3}$  con Scudi 1600. Si domanda con Sc. 640. in Mesi 15. quanti Scudi faranno guadagnati?

R. Si mettano per ordine i numeri dicendo: Scudi 1600. in Mesi 20. danno di guadagno Scudi 108.  $\frac{2}{3}$  che daranno Scudi 640. in Mesi 15. ? & operate come si è insegnato, verranno Scudi 32.  $\frac{2}{3}$ . Per regola generale per i rotti: Si faccia la riduzione degl' intieri ad essi rotti, che se sono ne' numeri del primo, e secondo luogo, il Denominatore moltiplica il numero corrispondente nel quarto, e quinto luogo, e reciprocamente, se i rotti sono nelli numeri del quarto, e quinto luogo, il Denominatore di quelli moltiplica il numero del primo, e secondo luogo corrispondente: Mà se il rotto è nel terzo luogo, il Denominatore moltiplica il numero del primo, ovvero del secondo luogo; & allora i numeri saranno accordati senza rotti, che però si moltiplicano i trè ultimi numeri, e verrà il numero composto, il quale si parte per il prodotto de' primi due numeri, e il quoziente sarà il numero cercato, che scioglie il Quesito.

$$1600 \text{ — } 20 \text{ — } \text{Sc. } 108 \frac{2}{3} \text{ — } 640 \text{ — } 15. \text{ Sc. } 32. \frac{2}{3}$$

3

325

4800

9. D. Come si scioglie il Quesito con due regole del 3.

R. Si dica: Se in Mesi 20. si guadagnano Sc. 108.  $\frac{2}{3}$ . quanti in Mesi 15, e verranno Scudi 81.  $\frac{2}{3}$ . Di nuovo, se 160. danno Sc. 81.  $\frac{2}{3}$ . che 640. ? e torneranno Scudi 32.  $\frac{2}{3}$ . Ovvero si faccia la prima regola del 3. con i numeri principali, e la seconda con gl'altri, si avranno i medesimi Scudi 32.  $\frac{2}{3}$ .

Se 20.



Sc 20 — 108  $\frac{2}{3}$  — 15.

Se 1600 — 81  $\frac{2}{3}$  — 640.

Schaci 81  $\frac{2}{3}$

Scudi 32  $\frac{2}{3}$

10. D. Uno ha tenuto a frutto Scudi 1320. Anni 4. Mesi 8. Si domanda quanto gl'averanno fruttato a ragione di Scudi 4  $\frac{2}{3}$  per 100. l'Anno?

R. Ridotti Anni 4. Mesi 8. in Mesi 56. Si dica Scudi 100. in Mesi 12. fruttano Scudi 4  $\frac{2}{3}$  che Scudi 1320. in Mesi 56. ed operando come hò detto, verranno Scudi 277  $\frac{2}{3}$ . per frutto cercato.

100 — 12 — 4  $\frac{2}{3}$  — 1320 — 56. — Scudi 277  $\frac{2}{3}$

11. D. Che serve di prova alla passata. Uno ha guadagnato Scudi 277  $\frac{2}{3}$  in Anni 4. Mesi 8. con Scudi 1320. Si domanda quanto gli fruttavano per 100. l'Anno?

R. Si dica: se 1320. in Mesi 56. fruttano Scudi 277  $\frac{2}{3}$ . che 100. in Mesi 12. Si operi riducendo in quinta il primo, e terzo numero, verranno Scudi 4  $\frac{2}{3}$ .

1320 — 56 — 277  $\frac{2}{3}$  — 100 — 12. Scudi 4  $\frac{2}{3}$ .

12. D. Nella regola del Trè semplice, s'integna la Prova con moltiplicare il primo numero via il quarto trovato, e veniva il prodotto uguale a quello fatto dal moltiplicare il secondo via il terzo, per la Proposizione 19. del settimo d'Euclide. Si domanda se si può fare simil prova nella regola del Cinque?

R. Senza dubbio: Si moltiplichì il sesto numero trovato via il prodotto del primo numero via il secondo, verrà un prodotto uguale, fatto dal moltiplicare il terzo, quarto, e quinto numero: e così nell'Esempio passato, moltiplicando 4  $\frac{2}{3}$  sesto numero trovato per 73920. prodotto del primo 1320. via il secondo 56. fa 332640. uguale al prodotto del terzo 277  $\frac{2}{3}$  via il quarto 100. che fa 27720. e questo via il quinto 12. che fa pure 332640. dalla qual Prova ne può venire quella del 7. del 9. o d'altro numero.

13. D. Come si può fare la prova del 7. del 9. &c. alla regola del Cinque?

R. Con levare, per esempio li 7. dal terzo, quarto, e quinto numero, e moltiplicare gl'avanzi, e dal prodotto levare li 7. e il numero avanzato sarà il numero della prova. Medesimamente levando li 7. dal primo, dal secondo, e dal sesto numero venuto, e gl'avanzi moltiplicando, e dal prodotto levando li 7. doverà avanzare un numero uguale all'altro della prova; avvertendo, che essendoci rotti da una parte, i Denominatori moltiplicano gl'avanzi dell'altra reciprocamente. Si faccia la prova del 7. all'Esempio di sopra, che è questo.

1600	20	108 $\frac{7}{8}$	640	15. 32 $\frac{4}{8}$
Di 108 $\frac{7}{8}$ l' avanzo è 3			Di 32 $\frac{7}{8}$ l' avanzo è 2	
Di 640 l' avanzo è 3			Di 1600 l' avanzo è 4	
Di 15 l' avanzo è 1			Di 20 l' avanzo è 6	
Il Denom. del rotto è 2			Il Denom. del rotto è 3	

Di 18 l' avanzo è 4.

Di 144 pure è 4

14. D. Uno abbia guadagnato Piaſtre 46. Lire 3. 17. 8. in Anni 3. Meſi 7. giorni 16. con Piaſtre 420. date à frutto. Domandaſi con le medefime Piaſtre in quanto tempo averebbe guadagnato Piaſtre 232. Lire 5. 8. 4. alla medefima ragione?

R. In queſta Domanda benchè ci ſiano cinque numeri, tuttavia ſi ſcioglie il queſito per una ſola regola del Trè, per eſſere il medefimo Capitale di Piaſtre 420. dicendo: Piaſtre 46. 3. 17. 8. ricercano Anni 3. 7. 16. che ricercheranno Piaſtre 232. 5. 8. 4. e verranno Anni 18. Meſi 1. 20. Pure ſi ſcioglierebbe il queſito per una regola del Trè, ſe fuſſe il medefimo tempo, benchè fuſſe diverſo Capitale.

Piaſtre 46.	3. 17. 8	An.	3. 7. 16	Piaſtre 232.	5. 8. 4
	7		12		
	1629		20		
Lire 325	— 20	Meſi 43	— 30		
				32588	— 12
Soldi 6517	— 12	Gi. 1306		391060	
				1306	
Den. 78212					
	Giorni 6530			2346360	
	per 30. 217. 20			1173180	
	per 12. An. 18. 1. 20			391060	

510724360

414523

234636

15. D. Libbre 4. d'Argento à bontà d'once 8.  $\frac{1}{2}$  vagliono Lire 275. 6. 8. quanto valeranno Libbre 2. once 9. à bontà d' once 10.  
R. Quando ſi dice Argento à bontà d' once 10. ſ' intende, che in una libbra ci ſono once 10. d' Argento finò, & once 2. di Rame. Diſpoſti i numeri come ſtanno nella Domanda, & operato, verranno Lire 216. 6. 8. prezzo cercato.

4 — 8  $\frac{1}{2}$  — Lire 275. 6. 8 — 2  $\frac{1}{2}$  — 10 <sup>251</sup>

35	3028. 13. 4	11
4		10
<hr/>		
	Lire 216. 6. 8	

14.0 — 11.0

16. D. Libbre 2  $\frac{1}{2}$  d' Argento a bontà d' onse 10. costano Lire 216. 6. 8. Si domanda, che costeranno libbre 4. a bontà d' onse 8  $\frac{1}{2}$ .  
 R. Questa serve di prova alla passata. I numeri si dispongono come sono ordinati nella Domanda, & operato come sopra torneranno Lire 275. 6. 8. per il prezzo cercato.

21 $\frac{1}{2}$	10	Lire 216. 6. 8	4	8 $\frac{1}{2}$
<hr/>				
11.0		3028. 13. 4		35
				4
<hr/>				
		Lire 275. 6. 8		

17. D. Once 8. d' oro di Carati 20. vagliono Lire 584. 13. 4. che costeranno once 5. di Carati 22.

R. L' orofino è di Carati 24; onde come nelle passato si dispongano i numeri come sono ordinati nella Domanda, e si operi al solito, che verranno Lire 401. 19. 2.

8	20	Lire 584. 13. 4	5	22
8				5
<hr/>				
		6431. 6. 8		
16.0				11.0
<hr/>				
		Lire 401. 19. 2		

18. D. Once 5. di Carati 22. costano Lire 401. 19. 2. che costeranno once 8. di Carati 20.

R. Questa è la passata rivolta; & i numeri sono ordinati per il che moltiplicando once 5. via Carati 22. il prodotto 110. è partitore, & once 8. via 20. fa 160. e lasciato il zero per 16. si moltiplicano Lire 401. 19. 2. il prodotto 6431. 6. 8. si parte per 11. e torneranno Lire 584. 13. 4. &c.

5	22	401. 19. 2	8	20
5				8
<hr/>				
		6431. 6. 8		
11.0				16.0
<hr/>				
		Lire 584. 13. 4		

19. D. Effondosi pagate Lire 129. 13. 4. per braccia di Panno 46  $\frac{2}{3}$  largo braccio 1.  $\frac{1}{4}$ . Si vuol sapere quante Lire si pagheranno per braccia 17.  $\frac{2}{3}$  del medesimo Panno largo braccio 1.  $\frac{1}{4}$ . dell'istessa finezza?

R. In primo luogo braccia 46.  $\frac{2}{3}$  in secondo 1.  $\frac{1}{4}$  in terzo Lire 129. 13. 4. in quarto braccia 17.  $\frac{2}{3}$  & in quinto 1.  $\frac{1}{4}$ . Si operi che verranno Lire 55. Soldi 2. Denari 2. e tante si pagheranno per le braccia 17.  $\frac{2}{3}$ . &c.

20. D. Per braccia 17.  $\frac{2}{3}$  di Panno largo braccio 1.  $\frac{1}{4}$ . si sono pagate Lire 55. 2. Si domanda, che si pagheranno braccia 46  $\frac{2}{3}$  del medesimo Panno largo braccio 1.  $\frac{1}{4}$ .

R. I numeri si dispongano come sono ordinati nella Domanda. Si moltiplichino, e parta come si è insegnato, e torneranno Lire 129. 13. 4. da pagarsi in braccia 46.  $\frac{2}{3}$ .

21. D. Molini 3. in ore 10. abbiano macinato Staja di Grano 24. Si domanda Molini 5. in ore 4. quante Staja di Grano macineranno?

R. Si moltiplichino 3. via 10. fa 30. partitore. Si moltiplichino 5. via 4. fa 20. e questo via 24. fa 480. il quale si parte per 30. e viene 16. per le Staja, che saranno macinate.

22. D. Molini 5. in ore 4. macinano Staja 16. di Grano. Quante saranno macinate da Molini 3. in ore 10.

R. Si moltiplichino 5. via 4. fa 20. e 3. via 10. fa 30. si lasci il zero da ciascuna parte, e si moltiplichino 16. via 3. fa 48. il quale si parte per 20. e torneranno Staja 24. che saranno macinate.

23. D. Con quattrini 12. Si sono avute in Fiorenza once 25. di Pane valendo il Moggio del Grano Lire 96. Domandasi, valendo il Moggio Lire 108. quanti Quattrini valeranno once 33  $\frac{1}{2}$  di Pane?

R. In primo luogo once 25. in secondo Lire 96. in terzo Quattrini 12. in quarto once 33.  $\frac{1}{2}$  & in quinto Lire 108. e riducendo il primo, e quarto numero in terzi si moltiplichino, e parta, e s'averranno Quattrini 18. prezzo cercato.

24. D. Come si risolva il quesito con due regole del Tre?

R. Si dica: Once 25. costano Quattrini 12. che costeranno once 33.  $\frac{1}{2}$ . e verranno Quattrini 18. di nuovo; se quando il Moggio vale Lire 96. il prezzo è di Quattrini 12. Quando il Moggio vale Lire 108. di quanti Quattrini sarà il prezzo? & operato torneranno quattrini 18. come per regola del Cinque.

25. D. Once 33.  $\frac{1}{2}$  di Pane costando il Moggio del Grano Lire 108. vagliono Quattrini 18. Si domanda, che valeranno once 25. di Pane, costando il Moggio del Grano solamente Lire 96.

R. Serve di prova alla passata. I numeri vanno ordinati come stanno nella Domanda. Si moltiplicano once 33.  $\frac{1}{2}$  via 108. il prodotto

dotto 3600. è il Partitore : Si moltiplica 18. via 24. fa 450. e questo via 96. fa 43200. il quale partito per 3600. tornano Quattrini 12. prezzo &c.

26. D. Come si risolve per due regole del Trè ?

R. Si dica : Quando il Moggio del Grano costa Lire 108. il prezzo è di Quattrini 18. quando costerà Lire 96. ed operato , verranno Quattrini 16. Di nuovo si dica : Once 33.  $\frac{2}{3}$  vagliono Quattrini 16. che valeranno onçe 25. e torneranno Quattrini 12.

27. D. Due barattano Seta à Cera : Il primo valuta in baratto la libbra della Seta Lire 29. 6. 8. tempo à pagamento Mesi 10. che in contanti vale Lire 26. 13. 4. Si domanda : valendo il cento della Cera Lire 168. in contanti; quante lo deve valutare il secondo in baratto uguale , tempo à pagamento Mesi 15. ?

R. I baratti a tempo si riducono à regola del Cinque così: Si sottrino da Lire 29. 6. 8. le Lire 26. 13. 4. restano Lire 2.  $\frac{2}{3}$ . Ora si dica se Lire 26  $\frac{2}{3}$  in Mesi 10. hanno d'accrescimento Lire 2  $\frac{2}{3}$ . che averanno d'accrescimento Lire 168. in Mesi 15. e verranno Lire 25. Soldi 4. che aggiunte à Lire 168. faranno Lire 193 Soldi 4. ed à questo prezzo deve valutare il secondo il 100. della Cera in baratto ; tempo Mesi 15. à pagamento .

Da Lire 29  $\frac{2}{3}$       26  $\frac{2}{3}$  — 10 — 2  $\frac{2}{3}$  — 168 — 15. Lire 25. 4.  
26  $\frac{2}{3}$       168

—  
Lire 2  $\frac{2}{3}$

—  
Lire 193. 4.

28. D. Due barattano Cera à Seta : Il cento della cera vale in contanti Lire 168. ed in baratto si pone 193  $\frac{2}{3}$  tempo à pagamento Mesi 15. La libbra della Seta vale Lire 26  $\frac{2}{3}$  in contanti si domanda quanto si metterà in baratto , tempo à pagamento Mesi 10. ?

R. Si sottrino Lire 168. da Lire 193  $\frac{2}{3}$ . restano Lire 25  $\frac{2}{3}$ . Ora si dica: Se Lire 168. in Mesi 15. guadagnano Lire 25  $\frac{2}{3}$ . che guadagneranno Lire 26  $\frac{2}{3}$  in Mesi 10. e verranno Lire 2  $\frac{2}{3}$  che aggiunte à Lire 29  $\frac{2}{3}$ . per il prezzo della libbra della Seta in baratto .

Da Lire 193  $\frac{2}{3}$       168 — 15 — 25  $\frac{2}{3}$  — 26  $\frac{2}{3}$  — 10. Lire 2  $\frac{2}{3}$   
168      26  $\frac{2}{3}$

—  
25  $\frac{2}{3}$

—  
Lire 29  $\frac{2}{3}$

29. D. Avendo mangiato Cavalli 18. in giorni 15. Staja 67  $\frac{2}{3}$  di Biada : quante Staja ne mangeranno Cavalli 6. in giorni 25. dandosi ogni giorno à ciascuno la medesima misura ?

R. Si moltiplichino 18. via 15. fa 270. partitore . Si moltiplichino 67  $\frac{2}{3}$  via 6. fa 405. e questo via 25. fa 10125. il quale si parte per 270. e verrà 37  $\frac{2}{3}$ . che sono Staja di Biada , che mangeranno Cavalli 6. in 25. giorni .

30. D.

30. D. Se Cavalli 6. in giorni 25. mangerebbero Staja  $37 \frac{1}{2}$ . che ne mangeranno Cavalli 18. in giorni 15.?

R. Si moltiplichino 6. via 25. fa 150. partitore. Si moltiplichino ancora  $37 \frac{1}{2}$  via 18. fa 675. e questo via 15. fa 10125. il quale partito per 150. torneranno Staja  $67 \frac{1}{2}$  di Biada.

31. D. Se Cavalli 20. in giorni 25. hanno mangiato in un Magazzino di Biade tanto, che n'avanzarono Mine 40. domandasi, se fussero stati Cavalli 13. che vi avessero mangiato giorni 46. quante Mine ne farebbero avanzate?

R. Questa viene proposta da Gio. Battista Zucchetto à carte 69. nel fine della Regola del Trè composta dritta, e dice: che è caso irresolubile, ed io dico, che è troppo solubile; Perchè si può soddisfare alla Domanda con diversa risposta, secondo il vario supposto, che si faccia; Perchè se si supporrà, che ogni giorno ciascuno Cavallo mangi un quarto di Mina, allora in quel Magazzino farebbero Mine 165. ed allora Cavalli 13. in giorni 46. ne fariano avanzate  $15 \frac{1}{2}$ . Ma supponendo, che ciascun Cavallo ne mangi un terzo di Mina, allora farebbero nel Magazzino Mine 206  $\frac{2}{3}$  e à gl'altri Cavalli ne fariano avanzate Mine  $7 \frac{1}{3}$ . Perchè moltiplicando Cavalli 20. via giorni 25. nel primo supposto, fanno 500. che à  $\frac{1}{4}$  di Mina sono Mine 125. ed aggiunte Mine 40. che si dice avanzate, vengono Mine 165. Ora si moltiplichino Cavalli 13. via giorni 46. fa 598. che à  $\frac{1}{4}$  di Mina, importerebbero Mine 149  $\frac{1}{2}$ . che sottratte da 165. restano Mine  $15 \frac{1}{2}$ . che fariano avanzate. Nel secondo supposto si moltiplicano Cavalli 20. via 25. giorni, fanno 500. che à  $\frac{1}{3}$  di Mina sono Mine 166  $\frac{2}{3}$ . e con Mine 40. avanzate sono mine 206  $\frac{2}{3}$ . Pure si moltiplicano 13. Cavalli via 46. giorni fanno 598. che à  $\frac{1}{3}$  di Mina sono Mine 199  $\frac{1}{3}$ . che sottratte da 206  $\frac{2}{3}$  ne fariano avanzate Mine  $7 \frac{1}{3}$ .

Cav. 20 — 25		13 — 46		20 — 25		13 — 46	
per 4.	500	per 4.	598	per 3.	500	per 3.	598
	125	Mine	149 $\frac{1}{2}$		166 $\frac{2}{3}$	Mine	199 $\frac{1}{3}$
	40				40		
Mine	165			Mine	206 $\frac{2}{3}$		
	149 $\frac{1}{2}$				199 $\frac{1}{3}$		

Mine  $15 \frac{1}{2}$  avanzate fariano. Mine  $7 \frac{1}{3}$

Ma supponendo, che ciascun Cavallo ne mangiasse una mezza Mina, allora à Cavalli 13. in giorni 46. non solo avanzerebbe delle Mine

Mine di Biadara, anzi gli mancherebbero Mine 9. per pareggiare le mangiate, e l' avanzate à gl' altri.

Cavalli 20 — 25

Cavalli 13 — 46

per 2. 500

250

40

per 2. 598

299 Mine

290

Mine 290

Mancano 9 Mine.

Ecco, che secondo il vario supposto si dà varia soluzione; benché secondo quest' ultimo sarebbe contro la proposta.

32. D. Uno ha comprato Mercanzia per Lire 4577.8. 4. tempo à pagamento Meſi 22  $\frac{1}{2}$ . ma pagando di prefente, il Mercante gl' offerisce lo sconto à ragione di Lire 4  $\frac{1}{2}$  per 100. l' Anno. Si domanda, con detto sconto, quanto doverà pagare?

104  $\frac{1}{2}$  — 12 — 4  $\frac{1}{2}$  — 4577  $\frac{1}{2}$  — 22  $\frac{1}{2}$ .

314

12

3768

24

15072

7536

Per 90432

Lire 382. 13. 4

Da Lire 4577. 8. 4

382. 13. 4

Lire 4194. 15

14

54929

45

274645

219716

2471805

14

34605270

747567

241110

60336 — 20

1206720

302400

33314 — 12

373368

11640

R. Questo è il quesito secondo del Ciacchi à carte 85. male risolto, perchè operato come merito; dovendosi lo sconto operare con aggiungerlo sopra 100. e dire: Se 104  $\frac{1}{2}$  dando di sconto 4  $\frac{1}{2}$ . per essere operazione opposta al merito, come si vedrà à suo luogo.

80,

go, e non che 100. diano di sconto  $4\frac{2}{3}$ . Si dica dunque se 104  $\frac{2}{3}$  in Mesi 12. danno di sconto  $4\frac{2}{3}$ . che daranno Lire 4577  $\frac{1}{4}$ . in Mesi 22  $\frac{5}{6}$ . e verranno Lire 382. 13. 4. che sottratte da Lire 4577. 8. 4. restano Lire 4194. Soldi 15. da pagarsi di presente al Mercante.

33. D. Lavoranti 80. in giorni 25. d'ore 10. hanno fatta una rottura di Fiume lunga braccia 48. larga 20. alta 5. Si domanda Lavoranti 60. in giorni 52  $\frac{2}{3}$  d'ore 12. che lunghezza di rottura faranno larga braccia 15. alta braccia 6.

R. Quando nel quesito sono 5. termini, si fa la regola del cinque, ma essendoci 7. 9. ovvero 11 termini, si farà per regola del 7. 9. ovvero 11. la quale non è differente da quella del Cinque. E per essere pari tali questi, e di poca utilità, non mi sono curato di porre più domande: Tuttavia da questa si conoscerà, come si deve operare nell'altre. Si dispongano i numeri come sono ordinati nella Domanda, tralasciando i due ultimi. Si moltiplicano giorni 25. via ore 10. fanno 250. il quale si moltiplichi via 80. fa 20000. Partitore; Medesimamente si moltiplicano 52  $\frac{2}{3}$  via 12. fanno 625. e questo via 60. fa 37500. Si moltiplicano le misure della Rottura fatta, cioè 5. via 20. fa 100. e questo via 48. fa 4800. che sono braccia corporee. Se questo numero composto 20000. danno braccia 4800. che darà quest'altro 37500. Sicchè moltiplicandosi 4800. via 37500. il prodotto partito per 20000. vengono braccia corporee 9000. e perchè si fanno le braccia di larghezza 15. e d'altezza 6. moltiplicate assieme fanno 90. per il quale si parte 9000. e vengono braccia 100. di lunghezza, che si cercavano. E' ben vero, senza tanta distinzione si può moltiplicare 80. 25. 10. 15. e 6. il prodotto 1800000. sarà partitore, & ancora 48. 20. 5. 60. 52  $\frac{2}{3}$  e 12. & il prodotto 180000000. si parte, ne verranno braccia 100. di lunghezza come si è detto.

## DISTINZIONE QUARTA

*Della Regola del Trè composta roverscia, detta del Cinque.*

1. D. **P** Erchè questa regola del Trè composta roverscia si distingue dalla passata?

R. Come si è detto, la passata regola è composta di due regole del Trè dritte; e questa è composta di due regole del Trè, una dritta, e l'altra roverscia, e per quest'ultima viene denominata roverscia per differenziarla dall'altra.

2. D. Co-



2. D. Come si conosce se il quesito è della regola del Cinque roverscia?

R. Per conoscerlo Gio: Battista Zucchetta à carte 70. della sua Arimmetica assegna trè modi: Il primo è: se la cosa ricercata sarà proposta in modo passivo; come se si dicesse: Se Lire 30. furono guadagnate dal Capitale di Lire 540. in Mesi 9. da che Capitale furono guadagnate Lire 28. in Mesi 12.? Allora per la proposta dice, che furono guadagnate, e non che guadagnarono, e la ricerca Capitale, che è efficiente: sarà il caso per regola roverscia.

3. D. Questo modo è egli buono?

R. Non è sufficiente per conoscere la regola del Cinque roverscia, perchè anche la cosa ricercata nella regola del Cinque dritta, si può proporre in modo passivo così: Scudi  $32\frac{1}{2}$  furono guadagnati dal Capitale di Scudi 640. in Mesi 15. Quanti Scudi saranno guadagnati dal Capitale di Scudi 1600. in Mesi 20. ed il suo proposto si rivoltà in attivo così: Lire 540. in Mesi 9. guadagnarono Lire 30. quali Lire guadagnarono Lire 28. in mesi 12.

4. D. Qual'è il secondo modo del Zucchetta, per conoscere la regola del Cinque roverscia?

R. E' questo: Se gli numeri quarto, e quinto non corrisponderanno in natura con il primo, e secondo: come in questa proposta: Se Scudi 540. in Mesi 9. guadagnarono Scudi 30. in quanto tempo Scudi 378. guadagnarono Scudi 28. perchè gli numeri quarto, e quinto non corrispondono al primo, e secondo, che sono Capitale, e tempo; la regola è roverscia.

5. D. Questo secondo modo è egli buono?

R. Non è del tutto buono: Perchè il quesito roverscio si può proporre, che il quarto, e quinto abbiano corrispondenza con il primo, e secondo, come il proposto, così dicendo: Scudi 540. guadagnarono Scudi 30. in Mesi 9. in quanto tempo Scudi 378. guadagnarono Scudi 28. Ecco, che il Capitale del quarto, e il guadagno del quinto corrisponde al Capitale del primo, e al guadagno del secondo.

6. D. Qual'è il terzo modo del Zucchetta?

R. E' questo: Se la cosa, che si cerca sarà una dell'efficienti, e non la fatta, come in questo Esempio: Se Molini 5. macinarono Mine 400. in giorni 8. in quanti giorni Molini 12. macinarono Mine 840. Per la quale si ricerca il tempo, che è una delle cose, che fanno: (l'altra delle quali è gli Molini; e la fatta è le Mine) dico: che non ricercando la cosa fatta, la regola è roverscia. Qui si offervi di passaggio, che la detta Proposta dell'Autore

K k

distrug.

distrugge i suoi due primi modi, per conoscere la regola del Cinque roverscia, perchè la cosa ricercata non è proposta in modo passivo, e il quarto Molini 12, e il quinto Mine 840. corrispondono al primo Molini 5. & al secondo Mine 400.

7. D. Questo terzo modo è egli buono?

R. E' migliore degl' altri, il quale si farà chiaro nell' esplicazione, che farò, per conoscere se il Questito, o Domanda appartenga alla regola del Cinque roverscia; ma prima voglio riferire il sentimento di Giuseppe Maria Figatelli circa il Zucchetto. In primo (dice egli à carte 78. ch' abbia trattato, e scritto di questa regola è stato il Zucchetto Genovese; ma con tanta oscurità, che (el dirò del Dottor Bassi Piacentino nella medesima regola) da pochi è inteso. Se poi sia stato inteso da quei, che dopo il Zucchetto hanno stampato, non tocca à me il dirlo; Sò bene, che alcuni proponghino li puri quesiti del Zucchetto, senza una sola parola di dichiarazione: (stimo che voglia notare Gio: Battista Pisani nel suo Giardino Arithmetico: ) Altri si discostano un tantino dalla riva; ma non hanno dato regola chiara, ed universale. Confesso la verità, che più mi ha dato da faticare l' intendere bene il Zucchetto in questa materia, che l' aver' appreso l' Algebra: Ma perchè col favore del Cielo, n' ho cavato il marcio; qui ordinatamente metto in chiaro quello che altri hanno lasciato oscuro, ed imbrogliato. Sin qui il Figatelli, il quale poteva astenersi di dire, che altri abbino messo i puri Questiti del Zucchetto alla Stampa; mentre egli in tutto, e per tutto si serve di quelli di Gio: Battista Pisani, o vogliamo dire del Zucchetto, nel fare la dichiarazione della regola senza aggiungerne alcuno de' suoi.

8. D. Avendo detto i modi del Zucchetto, per conoscere quando il questito appartiene alla regola del Cinque roverscia con l' eccezione data, quale sarà il modo universale, e sufficiente per conoscerlo?

R. Per intendere bene, quando un questito sia da sciogliersi per regola del Cinque roverscia; qui propongo il Questito sopra posto nella 3. Domanda della Distinzione terza di regola del Cinque dritta. Con il Capitale di Scudi 640. in Mesi 15. Si sono guadagnati Scudi  $32\frac{1}{2}$ . Si domanda, con il Capitale di Scudi 1600. in Mesi 20. quanti Scudi si guadagnerebbero? e si trovarono, fatta 1.<sup>a</sup> operazione, Scudi 108  $\frac{1}{2}$ .

Si offervi, che Scudi 640. e Mesi 15. causano l' effetto di Scudi  $32\frac{1}{2}$  di guadagno, che però chiamo Scudi 640. e Mesi 15. insieme cause, ovvero concause, gli Scudi causa principale, il tempo causa

causa meno principale. Adesso si vuol sapere quest'altre due concause, cioè Scudi 1600. e Mesi 20. che effetto di guadagno produrranno; Per il che dico, che modo universale, e sufficiente sarà di conoscere il Quesito appartenere alla regola del Cinque roverscia, se in quello si cerca una delle due concause, o la principale, o la meno principale, cioè o gli Scudi di Capitale, ovvero il tempo; Ma cercandosi l'effetto, cioè il guadagno, come nel sopradetto, apparterrà alla regola del Cinque dritta; Ed acciocchè questo modo si conosca generale, si dichiara in un altro Quesito di regola del Cinque dritta. Libbre 4. d'Argento di Lega d'once 8.  $\frac{1}{4}$  d'Argento fino per libbra, vagliono Lire 275  $\frac{1}{4}$  quante ne valeranno libbre 2  $\frac{1}{4}$  di lega d'once 10.

Libbre 4. d'Argento in peso, e once 8  $\frac{1}{4}$  di lega sono le due concause, che producono l'effetto di Lire 275  $\frac{1}{4}$ . prezzo loro. Si cerca, che effetto di prezzo produrranno libbre 2  $\frac{1}{4}$  di peso, ed once 10. di lega; Sicchè il Quesito aspetta alla regola del Cinque dritta, per cercarsi l'effetto; Ma se si domandasse una delle due cause, o le Libbre di peso, o l'oncia di lega; allora aspetterebbe alla regola del Cinque roverscia.

9. Di Conoscimento, che il Quesito appartiene alla regola del Cinque roverscia, come il seguente, donde si ordinano i numeri per scioglierlo. Da Sc. 640. sono stati guadagnati Scudi 32  $\frac{1}{2}$  in Mesi 15. Si vuol sapere da quanti Scudi faranno guadagnati Sc. 108  $\frac{1}{4}$  in Mesi 20.

R. In ogni quesito due numeri sono accompagnati; ciascuno de quali ha un'altro numero simile in natura, come qui Scudi 32  $\frac{1}{2}$  di guadagno ha l'altro numero 108  $\frac{1}{4}$  di guadagno, e Mesi 15. ha l'altro di Mesi 20. ne rimane un numero, cioè Scudi 640. Capitale, il compagno del quale simile in natura si cerca. Che però, siccome si è fatto nella regola del Cinque dritta, questo differente a tutti li collocherà in terzo luogo, cioè nel mezzo, il quale per essere causa ha il suo effetto, che qui sono Scudi 32  $\frac{1}{2}$  di guadagno, il quale si ponerà in primo luogo; Adesso nel secondo luogo non si metterà la causa compagna di quella del terzo luogo detta concausa; ma l'altra simile in natura, che porta seco la Domanda: onde non si porrà Mesi 15., che è concausa con Scudi 640. di Capitale; ma bensì il numero di Mesi 20. In quarto luogo poi si pone il numero corrispondente in natura al secondo, cioè Mesi 15. e in quinto corrispondente in natura quel numero, che essendo guadagno Capitale, tempo, prezzo, lega, peso ha l'altro pari di guadagno, Capitale, tempo, prezzo, lega, e peso; e medesimamente in quinto, luogo l'altro corrispondente.

K k

dente à quello del primo luogo, cioè Scudi  $108 \frac{2}{3}$  di guadagno, che è effetto come Scudi  $32 \frac{2}{3}$  è l'altro effetto. Così si ordineranno sempre i numeri di simili Questi, secondo il mio modo; E quel si vede.

Effetto Causa M. Cap. e Causa P. Causa M. Effetto.  
Scudi  $32 \frac{2}{3}$  — Mesi 20. — Scudi 640 — Mesi 15. — Scudi  $108 \frac{2}{3}$   
10. D. Ordinati i numeri del Questito in tal modo in Carta, che operazione si fa per trovare il numero simile, e corrispondente à quello di mezzo; cioè gli Scudi di Capitale?

R. Si moltiplicano i numeri del primo, e secondo luogo, il prodotto sarà partitore. Si moltiplicano i numeri del terzo, quarto, e quinto luogo, il prodotto sarà numero da partirsi; e fatto il partire, il quoziente sarà il numero cercato. Ecco dunque, che si ordinano i numeri in tal modo, che si opera come ne i Questiti della regola del Cinque dritta; H'che giova assai a i Giovani, perchè gl'insegnamenti dati in quella, servono per operare nella regola roverscia. E tornando a i numeri sopra ordinati: Si moltiplichino  $32 \frac{2}{3}$  via 20. fa 650. partitore. Si moltiplichino 640. via 15. fa 9600. e questo via  $108 \frac{2}{3}$ . fa 1040000. il quale partito per 650. verranno 1600. per li Scudi di Capitale, dai quali saranno guadagnati Scudi  $108 \frac{2}{3}$  in Mesi 20.

11. D. Facendosi la riduzione dell'intieri ne i suoi rotti, come nel dato Esempio, riducendo  $32 \frac{2}{3}$  in 65. mezzi, e  $108 \frac{2}{3}$  in 325. terzi, come si deve operare?

$32 \frac{2}{3} \text{ — } 20 \text{ — } 640 \text{ — } 15 \text{ — } 108 \frac{2}{3}$	$108 \frac{2}{3}$
$\begin{array}{r} 65 \\ 3 \end{array}$	$\begin{array}{r} 325 \\ 2 \end{array}$
$\begin{array}{r} 595 \text{ — } 20 \end{array}$	$\begin{array}{r} 650 \\ 15 \end{array}$
<b>Partit. 39.00</b>	$\begin{array}{r} 9750 \\ 640 \end{array}$
	$\begin{array}{r} 390000 \\ 58500 \end{array}$

per 3. 62400.00 da partirsi.  
per 15. 20800  
Scudi 1600 di Capitale.

R. I De-

R. I Denominatori de' Rotti; che sono ne i numeri del partitore moltiplicano uno de' numeri, che comporre devono il numero da partirsi, & i Denominatori de' Rotti di questi reciprocamente devono moltiplicare uno de' numeri, che compongono il numero partitore; del resto si moltiplica, e parte al solito, come si può osservare negl' antecedenti numeri.

12. D. Essendo il Quesito della regola del Cinque roverscia composto di due regole del Trè, come si risolve per esse?

R. Sia il sopradetto Quesito; si dica per regola del Trè dritta: Se Scudi  $32 \frac{1}{2}$  di guadagno vengono dal Capitale di Scudi 640. da qual Capitale di Scudi verranno Scudi  $108 \frac{1}{2}$ . & operato verranno da Scudi  $2133 \frac{1}{2}$ . Adesso per la seconda roverscia: Se Mesi 15. danno Scudi  $2133 \frac{1}{2}$ . che daranno Mesi 20. Ma perchè questa è roverscia, i Mesi 20. de' quali si fa la Domanda, in Carta si metteranno in primo luogo, e nel terzo Mesi 15. per i quali si moltiplicheranno Scudi  $2133 \frac{1}{2}$ . il prodotto si partirà per 20. e verranno Scudi 1600. di Capitale cercati.

Scudi  $32 \frac{1}{2}$  — 640 —  $108 \frac{1}{2}$

Partitore 195	650	640	Scudi 1600 di Capitale
	650		
	640		
	26000		
	39000		
	416000		
	260		
	650		
	650		
	650		
	650		
	195		

Scudi  $2133 \frac{1}{2}$

416000

260

650

650

650

650

195

13. D. Che prova si fa alla regola del Cinque roverscia?

R. Essendo che in ogni regola del Cinque ci sono due numeri, che rappresentano l'effetto, come nel passato Quesito; Scudi  $32 \frac{1}{2}$ . e Scudi  $108 \frac{1}{2}$  di guadagno, e quattro rappresentano causa, nel modo detto. Ogni qual volta si cercherà uno di questi, la regola farà roverscia; ma cercandosi di quelli sarà dritta; sicchè ogni regola del Cinque si ha in sei modi, due dritti, e quattro roversci: Oadè se fatta in un modo, si rivolerà Domanda; Si farà in un'al-

un' altro, e servirà di prova; & acciò questo in pratica si conosca, essendosi fatto il quesito passato in tre modi, due dritti, & uno roverscio, quì con voltare Domanda si farà negli altri tre modi roversci, che restano.

14. D. Scudi 108  $\frac{2}{3}$  sono stati guadagnati da Scudi 1600. in Mesi 20. Si domanda in quanto tempo saranno guadagnati Scudi 32  $\frac{2}{3}$  da Scudi 640.

R. Perchè si cerca il tempo, che è causa di guadagno, il Quesito è roverscio; e però Mesi 20. tengono il terzo luogo Scudi 108  $\frac{2}{3}$ . il primo Scudi 640. il secondo; Scudi 1600. altro Capitale il quarto, e Scudi 32  $\frac{2}{3}$  altro guadagno il quinto. Si operi per la 11. di questo verranno Mesi 15.

108  $\frac{2}{3}$  — 640 — 20 — 1600 32  $\frac{2}{3}$ . Mesi 15.

15. D. Guadagnando Scudi 1600. di Capitale in 20. Mesi Sc. 108  $\frac{2}{3}$ . Domando quali Scudi di Capitale guadagneranno Scudi 32  $\frac{2}{3}$  in Mesi 15. alla medesima ragione?

R. Perchè si cerca il Capitale causa di guadagno, il Quesito è roverscio; & i numeri s' intavoleranno così: Scudi 1600. in terzo luogo; 108  $\frac{2}{3}$  primo Scudi 108  $\frac{2}{3}$ . nel secondo Mesi 15. nel quarto Mesi 20. con causa con 1600. e nel quinto Scudi 32  $\frac{2}{3}$ . che corrisponde al primo. Dunque si moltiplichino 108  $\frac{2}{3}$  via 15. il prodotto 1625. sarà partitore. Si moltiplichino 1600. via 32  $\frac{2}{3}$ . il prodotto 52000. si moltiplichino per 20. il prodotto 1040000 si parte per 1625. e verranno Scudi 640. di Capitale.

108  $\frac{2}{3}$  — 15 — 1600 — 20 — 32  $\frac{2}{3}$ . Scudi 640.

16. D. Scudi 32  $\frac{2}{3}$  sono stati guadagnati in Mesi 15. da Scudi 640. Si vuol sapere in quanto tempo saranno guadagnati Scudi 108  $\frac{2}{3}$  da Scudi 1600.

R. Anche in questa si cerca il tempo causa di guadagno, come nella penultima; Però il Quesito è roverscio, che per questo Mesi 15. Si pongano in terzo luogo Scudi 32  $\frac{2}{3}$  effetto in primo, in secondo Scudi 1600. nel quarto Scudi 640. con causa con Mesi 15. & in ultimo Scudi 108  $\frac{2}{3}$ . che è l'altro effetto. Si moltiplichino 32  $\frac{2}{3}$ . via 1600. il prodotto 52000 è il partitore. Si moltiplichino 15. via 108  $\frac{2}{3}$  si 1625. il quale si moltiplichino via 640 il prodotto 1040000. si parte per 52000; e verranno mesi 20. &c.

32  $\frac{2}{3}$  — 1600 — 15 — 640 — 108  $\frac{2}{3}$ . Mesi 20.

17. D. Uno ha dato a Cambio limitato Scudi 960. a Scudi 4  $\frac{1}{2}$  per 100. l' Anno. Si domanda in quanto tempo Scudi 960. gli torneranno col frutto Scudi 124.

R. Da Scudi 124. si sottrano 960. restano Scudi 224. di frutto, che vuol guadagnare a ragione di Scudi 4. per 100. l' Anno; Onde per re-

per regola roverscia, Anno 1, in 3. luogo: In primo Scudi  $4\frac{2}{3}$   
In secondo 960. In quarto 100. In quinto Scudi 224. & operato  
verranno Anni 5. In tanto tempo &c.

$$\begin{array}{r|l} 184 & 4\frac{2}{3} \text{ --- } 960 \text{ --- An. 1. --- } 100 \text{ --- } 224 \\ 960 & \text{ --- } 14 \\ \hline 224 & 14 \text{ per } 13440 \end{array}$$

67200 si parte.

Anni 5.

18. D. Uno trova da dare a guadagno li suoi Denari a Scudi  $4\frac{2}{3}$   
per 100. l' Anno. Si domanda per guadagnare Scudi 224. in An-  
ni 5. a merito semplice, quanti Scudi a guadagno darà?

R. Questa serve di prova alla passata Domanda, e per cercarsi il Ca-  
pitale è di regola del Cinque roverscia; che però Scudi 100. di  
Capitale in terzo luogo, in primo Scudi  $4\frac{2}{3}$  guadagno, in se-  
condo Anni 5. in quarto Anno 1. concausa con Scudi 100. in  
quinto l'altro guadagno Scudi 224. Si moltiplichi, e parta, e  
verranno Scudi 960. e tanti ne darà a guadagno.

$$4\frac{2}{3} \text{ --- } 5 \text{ --- } 100 \text{ --- } 1 \text{ --- } 224. \text{ Scudi } 960.$$

19. D. Un altro avendo dato a frutto Scudi 580. dopo Anni 2.  
Mesi 4. Ricevè Scudi  $72\frac{1}{2}$  di merito semplice. Si cerca alla me-  
desima ragione. Da quanti Scudi faranno guadagnati Scudi  $25\frac{1}{2}$   
in Mesi 7.

R. Si cercano gli Scudi di Capitale, però Scudi 580. altro Capita-  
le in terzo luogo: Scudi  $72\frac{1}{2}$  suo guadagno in primo, in secon-  
do Mesi 7. in quarto Mesi 28. con causa con Scudi 580. e in quin-  
to Scudi  $25\frac{1}{2}$ . Ratta la riduzione in selti; si moltiplica, e par-  
te, e verranno Scudi 826.  $\frac{2}{3}$  di Capitale, da quali faranno gua-  
dagnati  $25\frac{1}{2}$  in Mesi 7.

$$72\frac{1}{2} \text{ --- } 28 \text{ --- } 580 \text{ --- } 25\frac{1}{2} \text{ Scudi } 826\frac{2}{3}.$$

20. Di Cui Scudi 826.  $\frac{2}{3}$  di Capitale. si sono guadagnati Sc.  $25\frac{1}{2}$   
in Mesi 7. Si domanda in quanto tempo si guadagneranno Scudi  
 $72\frac{1}{2}$  da Scudi 580. alla medesima ragione?

R. Serve di prova alla passata; e perchè si domanda il tempo, Mesi  
7. in terzo luogo. Scudi  $25\frac{1}{2}$  guadagno loro in primo; in secon-  
do Scudi 580. in quarto Scudi 826.  $\frac{2}{3}$  concausa con Mesi 7. in  
quinto Scudi  $72\frac{1}{2}$ . Si operi al solito, e torneranno Mesi 28. co-  
me qui si vede.

$$25\frac{1}{2} \text{ --- } 580 \text{ --- } 7 \text{ --- } 826\frac{2}{3} \text{ --- } 72\frac{1}{2} \text{ Mesi } 28.$$

21. D. Si sono spese Lire 275.  $\frac{1}{2}$  in libbre 4. d' Argento di Lega,  
d' onze 8.  $\frac{1}{2}$ . Si domanda la lega, & bontà di libbre 2.  $\frac{1}{2}$  d' altro  
Argento, nelle quali si pesero Lire 216.  $\frac{2}{3}$ .

R. Perchè si domanda la lega d' Argento, che è concausa col peso,  
Il Quali-

il Quesito è di regola del cinque roverscia. Si ponga dunque la lega d' once  $8 \frac{1}{2}$  in terzo luogo, il prezzo di Lire 275  $\frac{1}{2}$ , che è come suo effetto in primo; In secondo libbre 2.  $\frac{1}{2}$  peso. In quarto libbre 4. peso con causa con once 8.  $\frac{1}{2}$  di lega. In quinto, & ultimo l' altro prezzo di Lire 216.  $\frac{1}{2}$ . Si riducano gl'intieri a i suoi rotti; si moltiplichino, e parta, e ne verranno once 10. di lega.

275 $\frac{1}{2}$	2 $\frac{1}{2}$	8 $\frac{1}{2}$	4	216 $\frac{1}{2}$
826	11	35	649	4
11				
Pet 9086			2596	35
			12980	7788

Di lega once 10. 90860 Si parta.  
 22. D. Sono state spese Lire 216.  $\frac{1}{2}$  in libbre 2.  $\frac{1}{2}$  d'Argento di Lega d' once 10. Si Domanda quanto peserà l'Argento di Lega once 8.  $\frac{1}{2}$  Con spendere Lire 275.  $\frac{1}{2}$ .

R. In questa si cerca il peso dell'Argento, che è causa del prezzo, che però è regola del cinque roverscia. Si ordinino i numeri ponendo in terzo Lib. 2.  $\frac{1}{2}$  di peso; in primo luogo il prezzo di Lire 216.  $\frac{1}{2}$ , in secondo once 8.  $\frac{1}{2}$ , in quarto once 10. con causa con Libbre 2.  $\frac{1}{2}$ . & in quinto il prezzo di Lire 275.  $\frac{1}{2}$ . s' operi al solito verranno Libbre 4. di peso.

216  $\frac{1}{2}$  — 8  $\frac{1}{2}$  — 2  $\frac{1}{2}$  — 10 — 275  $\frac{1}{2}$  Libbre 4.

23. D. Uno ha comprato braccia di Panno 46.  $\frac{1}{2}$  largo braccio 1.  $\frac{1}{2}$  e Phà pagate Lire 129.  $\frac{1}{2}$  Domando trovandosi Panno della medesima qualità, largo braccio 1.  $\frac{1}{2}$  con spendere Lire 55. Sol. 2. Den. 2. quante n' averà?

R. Si cerca la lunghezza, che è causa del prezzo: Per il che è simile alla passata. Dunque braccia 46.  $\frac{1}{2}$  in terzo luogo in primo il loro prezzo di Lire 129.  $\frac{1}{2}$ , in secondo 1.  $\frac{1}{2}$ , in quarto 1.  $\frac{1}{2}$  con causa con 46.  $\frac{1}{2}$  in ultimo Lire 55. Soldi 2. Denari 2. & operato, vengono braccia 17.  $\frac{1}{2}$  &c.

129  $\frac{1}{2}$  — 1  $\frac{1}{2}$  — 46  $\frac{1}{2}$  — 1  $\frac{1}{2}$  — 55. 2. 2. Braccia 17.  $\frac{1}{2}$ .

24. D. Si sono spese Lire 55. 2. 2. in braccia 17.  $\frac{1}{2}$  di Panno largo braccio 1.  $\frac{1}{2}$ . Si domanda, volendosi spendere Lire 129.  $\frac{1}{2}$  in Panno della medesima bontà, largo braccio 1.  $\frac{1}{2}$  quante braccia se ne averanno?

R. Ques-



R. Questa serve di prova alla passata, & i numeri si dispongono come in quella, ponendo in terzo luogo braccia  $17 \frac{1}{2}$  in primo Lire 55. 2. 2. in secondo  $1 \frac{1}{2}$  in quarto  $1 \frac{1}{2}$  concausa con braccia  $17 \frac{1}{2}$ . in quinto Lire 129.  $\frac{1}{2}$  si opera come si è insegnato, e qui si vede, tornano braccia  $46 \frac{1}{2}$ .

55. 2. 2 —  $1 \frac{1}{2}$  —  $17 \frac{1}{2}$  —  $1 \frac{1}{2}$  — 129  $\frac{1}{2}$ . Brac.  $46 \frac{1}{2}$

25. D. Molini 5. in ore 4. hanno macinato Staja di Grano 32. Si cerca Staja 48. in quanto tempo faranno macinate da Molini 3.

R. Perchè si cerca il tempo si pongono ore 4. in terzo luogo, in primo luogo Staja 32. in secondo Molini 3. in quarto Molini 5. concausa con ore 4. & in quinto Staja 48. & operando al solito risultano ore 10. & in tal tempo faranno macinate.

32 — 3 — 4 — 5 — 48. Ore 10.

26. D. Sono macinate da Molini 3. Staja 48. in ore 10. Si domanda da quanti Molini faranno macinate Staja 32. in ore 4.

R. Anche questa è per regola del 5. roverscia cercandosi il numero de' Molini causa del Grano macinato; però Molini 3. in terzo luogo Staja 48. in primo, in secondo ore 4. in quarto ore 10. concausa con Molini 3. in quinto Staja 32. Si moltiplica 48. via 4. fa 192. partitore. Si moltiplica 32. via 10. fa 320. e questo via fa 960. il quale partito per 192. viene 5. per il numero de' Molini, e torna la prova.

48 — 4 — 3 — 10 — 32. Molini 5.

27. D. Quando il moggio del Grano valeva in Fiorenza Lire 96. per Quattrini 12. si avevano once 25. di Pane. Si domanda, valendo il moggio Lire 108. quanto peserà il Pane dovuto a Soldi 6. cioè a Quattrini 18.

R. Perchè si vuol sapere il peso del Pane, che è causa del prezzo. Once 25. si pongano in terzo luogo, nel primo il suo prezzo, che è come suo effetto, Quattrini 12. nel secondo Lire 108. in quarto Lire 96. concausa con once 25. al prezzo. In ultimo Quattrini 18. & operato verranno once  $33 \frac{1}{2}$  di Pane.

12 — 108 — 25 — 96 — 18. Once  $33 \frac{1}{2}$ .

28. D. Come si risolve per due regole del Trè?

R. Si dica, per regola dritta: Se Quattrini 12. danno once 25. quanti Quattrini 18. e verranno once  $37 \frac{1}{2}$  ora per regola roverscia: se valendo il moggio Lire 96. si hanno, once  $37 \frac{1}{2}$  di Pane, quante se n' averanno valendo il moggio Lire 108. schifato 108. e 96. per 12. Si moltiplichino  $37 \frac{1}{2}$  per 8. fa 300. il quale partito per 9. numeri venuti dallo schifo, vengono once  $33 \frac{1}{2}$ . come si disse venire di sopra.

12 — 25 — 18  
per 2. 3 3

75

108 — 37  $\frac{1}{2}$  — 96  
per 9. 8 8

300

29. D. Once 33  $\frac{1}{4}$  di Pane si pagano Quattrini 18. valendo il moggio del Grano Lire 108. Si domanda avendosi once 25. di Pane per quattrini 12. quanto valerà il Moggio del Grano?

R. Il prezzo del Moggio del Grano è causa del prezzo del Pane; onde ricercandosi questo, la Domanda appartiene alla regola del cinque roverscia. In terzo luogo dunque Lire 108. In primo Quattrini 18. in secondo once 25. in quarto once 33  $\frac{1}{4}$ . con causa Lire 108. in ultimo quattrini 12. & operato verranno Lire 96. prezzo del moggio cercato. Nell'operazione s'usano alcuni simboli per brevità.

18 — 25 — 108 — 33  $\frac{1}{4}$  — 12. Lire 96.

30. D. Come si risolve alla Domanda con due regole del Tre?

R. Si dica se Quattrini 12. danno once 25. di Pane, quanti Quattrini 18. e verranno once 37  $\frac{1}{2}$ . Per la roverscia se once 33  $\frac{1}{4}$ . ricercano il prezzo del moggio Lire 108. once 37  $\frac{1}{2}$  di quante Lire ricercherà il prezzo del moggio? Onde moltiplicandosi 33  $\frac{1}{4}$  via 108. e partendo per 37  $\frac{1}{2}$ . verranno Lire 96. che dovevano venire.

12 — 25 — 18  
per 2. 3 3

75

37  $\frac{1}{2}$  — 108 — 33  $\frac{1}{4}$

75

3

100

21600

1350

Once 37  $\frac{1}{2}$

per 225

Lire 96.

31. D. Quando lo Stajo del Grano costava Lire 4.  $\frac{1}{2}$ . si davano once 27. di Pane per 12. Quattrini. Si domanda dandone once 32. per 12. Quattrini, quanto costerà lo Stajo?

R. Questa pone il Ciacchi a carte 238. nella regola del Cinque, benchè si risolva per regola roverscia del Tre semplice; perchè il medesimo prezzo di Quattrini 12. vengono dalla parte del partitore, e del numero da partirsi; onde si tralascia per non allungare operazione; e si moltiplicano Lire 4. Soldi 12. 4. per 3. e il prodotto per 9. e 126. si parte per 8. e il quoziente di Lire 15. 15. per 4. e verranno Lire 3. 18. 9. per il prezzo dello Stajo, adoprando i numeri di ripiego di 32. e di 27.

Il medesimo Ciacchi a carte 231. pone il quesito ivi sopra gli Sconti a capo

à capo d' Anno, sotto la regola del Cinque, dicendo: Se Sc, 100. scontano in Mesi 12. Scudi 20. li Scudi 2500. in Mesi 12., cioè nel primo Anno quanto scontreranno; ma per essere il medesimo tempo di Mesi 12. Si lasciano, come hò di sopra avvertito, e resta una semplice Regola del Trè. Tal quesito però non è bene sciolto, per essere operato à modo di merito, e non di sconto, come farò vedere à suo luogo; Siccome il Quesito secondo delli sconti semplici à carte 229. il quale qui pongo bene sciolto sotto la regola del Cinque roverscia nelle due Domande seguenti.

32. D. Un Mercante era creditore d' una quantità di Lire da pagar segli dopo Mesi 22  $\frac{1}{2}$ . e per averle adesso, rilascia al Debitore Lire 382  $\frac{1}{2}$ . per sconto à ragione di Lire 4  $\frac{1}{2}$  per 100. l' Anno. Si domanda di quante Lire era creditore?

R. S'aggiungono Lire 4  $\frac{1}{2}$  à 100. fanno Lire 104  $\frac{1}{2}$ . e queste danno di sconto Lire 4  $\frac{1}{2}$ . che sono come loro effetto, che però 104  $\frac{1}{2}$ . in terzo luogo, in primo 4  $\frac{1}{2}$ . in secondo 22  $\frac{1}{2}$ . in quarto Mesi 12. concausa dello sconto con 104  $\frac{1}{2}$ . & in quinto Lire 382  $\frac{1}{2}$  di sconto corrispondenti al primo. Si operi al solito, e verranno Lire 4577. 8. 5  $\frac{1}{2}$ . ed tante era creditore.

4  $\frac{1}{2}$  — 22  $\frac{1}{2}$  — 104  $\frac{1}{2}$  — 12 — 382  $\frac{1}{2}$ . Lire 4577. 8. 5  $\frac{1}{2}$ . Il Quesito dritto della regola del Cinque, sarà nella Domanda 25. della Distinzione quarta. Qui si rivolta Domanda in Quesito roverscio, come è il seguente.

33. D. Un Mercante è creditore di Lire 4577. 8. 4. da pagarseli dopo alquanto tempo, e ne riceve Lire 4104. Soldi 15. al presente, con lo sconto di Lire 4  $\frac{1}{2}$  per 100. l' Anno; Si domanda dopo quanti Mesi doveva ricevere le dette Lire 4577. 8. 4.

R. Si sottripo Lire 4104. 15. da Lire 4577. 8. 4. restano di sconto Lire 382  $\frac{1}{2}$ . e perchè si domanda il tempo: In terzo luogo, Mesi 12. in primo lo sconto di 4  $\frac{1}{2}$ . in secondo 4577  $\frac{1}{2}$ . in quarto 104  $\frac{1}{2}$  concausa con Mesi 12. & in quinto Lire 382  $\frac{1}{2}$  di sconto per il quale si cerca il tempo; Et operando verranno Mesi 22. e giorni 15. cioè mezzo Mese; e dopo tali Mesi il Mercante doveva ricevere tutto il credito.

4  $\frac{1}{2}$  — 4577  $\frac{1}{2}$  — 12 — 104  $\frac{1}{2}$  — 382  $\frac{1}{2}$ . Mesi 22. 15.

34. D. Cavalli 6. in giorni 25. hanno mangiato Staja 37  $\frac{1}{2}$  di Biada. Si cerca à Cavalli 18. quanto tempo basteranno Staja 135. dandone certa misura ogni giorno?

R. Si cerca il tempo: dunque giorni 25. in terzo luogo, Staja 37  $\frac{1}{2}$  in primo, Cavalli 18. in secondo; e Cavalli 6. concausa con giorni 25. del mangiamento delle Staja; e nel quinto Staja 135. si moltiplichino 37  $\frac{1}{2}$  via 18. fa 675. partitore. Si moltiplichino 135.

L 1 2

via 6.

via 6. fa 810. che via 25. fa 20250. il quale partito per 675 viene 30: per li giorni cercati.

37  $\frac{3}{4}$  — 18 — 25 — 6 — 135. Giorni 30.

5. D. Da quanti Cavalli faranno mangiate Staja 135 di Biada in giorni 30. effendo che Cavalli 6. hanno mangiato Staja 37  $\frac{1}{2}$  di Biada in giorni 25. dandone certa misura ciascun giorno?

R. Nella passata si cercò la causa meno principale, cioè il tempo, in questa si cerca la principale, cioè i Cavalli, che fanno il mangiamento della Biada. Però Cavalli 6. in terzo luogo, in primo Staja  $37\frac{1}{2}$ . in secondo luogo giorni 30. in quarto giorni 35. con causa con Cavalli 6. ed in quinto Staja 135. Si moltiplichino  $37\frac{1}{2}$  via 30. fa 1125. partitore. Si moltiplicano gl' altri numeri, fanno 20250. il qual partito per 1125. vengono 18. per i Cavalli.

37  $\frac{2}{3}$  — 30 — 6 — 25 — 135, Cavalli 18.

36. Di Due barattano Seta a Cera; il primo ha Seta, la Libbra della quale vale Lire 2  $\frac{1}{4}$  più in baratto, che in contanti, tempo a pagamento Mesi 10. L'altro ha cera, il cento della quale s'apprezza in contanti Lire 168. ed in baratto Lire 193  $\frac{1}{4}$ . tempo a pagamento Mesi 15. Si domanda, essendo il Baratto uguale, quanto valse la libbra della Seta in contanti?

R. Di Baratti si dirà nel Trattato loro ; Tuttavia qui s'accenna la soluzione di due Questiti per regola del Cinque roverscia . Sà fottrino Lire 168. da Lire 193  $\frac{2}{3}$  , restano Lire 25  $\frac{2}{3}$  Ora si dica : Se Lire 25  $\frac{2}{3}$  sono guadagnate da Lire 168. in Mesi 15. da quali Lire saranno guadagnate Lire 2  $\frac{2}{3}$  in Mesi 10. ed operato al solito , è per la 15. di questo, verranno Lire 26  $\frac{2}{3}$  per il prezzo della libbra della Seta in contanti, ed aggiunte Lire 2  $\frac{2}{3}$  di più verranno Lire 29  $\frac{2}{3}$ . prezzo della medesima in baratto .

File 1934 25-10 - 168-15-24

168 2 5 3

126

55-2 840

**[REDACTED]**

Per 252

**In contanti Lire 26  $\frac{3}{4}$**

 $2\frac{1}{2}$ 

6720

1680

168

111.

252  
Fate

## Seta

10 8'21

26 7

01 40

•

•

**In baratto Lire 29  $\frac{1}{2}$**

**schifato**  $\frac{B}{2}$

11

• 11 100. de

**Prezzo Lire**

**ed in Bar**

**manda qual**

Digitized by G

37. D. Due vogliono barattare Cera à Seta . Il 100. della Cera vale in contanti Lire 168. ed in baratto s'apprezza Lire 193  $\frac{1}{2}$ . la Libbra della Seta vale in contanti Lire 26  $\frac{1}{2}$ . ed in baratto si pone 29  $\frac{1}{2}$  tempo à pagamento Mesi 10. Si domanda quanto tempo dovè-

doverà stare quello della Cera, sopra il baratto si uguale, ad essere pagato?

R. Da Lire 29.  $\frac{1}{2}$  si sottrino Lire 26  $\frac{1}{2}$  restano Lire 2.  $\frac{1}{2}$  Mede finalmente, da Lire 193. si sottrino Lire 168. e restano Lire 25  $\frac{1}{2}$ . Porfi dica, se Lire 2.  $\frac{1}{2}$  sono guadagnate da Lire 26.  $\frac{1}{2}$  in Mesi 10. in quanto tempo faranno guadagnate Lire 25  $\frac{1}{2}$  da Lire 168. & operando secondo che si è insegnato, verranno Mesi 15. dopo i quali doverà essere pagato quello della Cera.

$$\begin{array}{r} 29 \frac{1}{2} \\ 26 \frac{1}{2} \text{ Sottratti} \\ \hline 2 \frac{1}{2} \end{array} \qquad \begin{array}{r} 193 \frac{1}{2} \\ 168 \text{ Sottratti} \\ \hline 25 \frac{1}{2} \end{array}$$

$$2 \frac{1}{2} \text{ — } 168 \text{ — } 10 \text{ — } 25 \frac{1}{2} \text{ — } 26 \frac{1}{2} \text{ Mesi 15}$$

Gio: Battista Zucchetta, & altri dopo lui, pongono alcune Domande sopra il recare più presto a pagarli in diversi giorni, ad una partita da pagarli in un sol giorno, sotto la regola del Cinque roverscia, le quali io pongo in altro luogo; Perchè i numeri ricercano altra disposizione, & operazione, che non si fanno con questa regola.

Alcuni, come il Pisani, mettono regole del 7. e del 9. &c. roverscie, le quali vengono di raro in uso, Tuttavia pongo qui due Domande di undici termini, le quali possono essere di indirizzo in tutte l'altre, che si possono fare.

38. D. Lavoranti 80. in giorni 25. d'ore 10. hanno fatto una Rottura di Piume lunga braccia 48. larga 20. alta 5. Si domanda Lavoranti 60. in quanti giorni d'ore 12. faranno un'altra Rottura di Piume, lunga braccia 100. larga 15. alta 6.

$$48 \text{ — } 20 \text{ — } 5 \text{ — } 30000 \text{ — } 100 \text{ — } 15 \text{ — } 6$$

12

per 576

15

1200

25

30000 Si parte

1200

Giorni 52  $\frac{1}{2}$

48

576

schifato

R. Perchè si cercano i giorni, che sono concausa con i Lavoranti della rottura, si pone il numero de' giorni 25. in detto luogo; cioè nel mezzo, e nel settimo ore 10. nel primo, secondo, e terzo l'effetto, cioè braccia 48. 20. 5. nel quarto Lavoranti 80. nel quinto ore 12. nell'ottavo Lavoranti 60. nel nono, decimo, undecimo braccia 100. 15. 6. Si moltiplichino i primi cinque termini.

R. Anche questa appartiene alla regola roverscia, per cercarli i Lavoranti, che sono causa della Rottura: E così Lavoranti 80. in mezzo 426. Operato come si è detto nella passata verranno La-

-6-  
-12-  
-25-  
-100-  
-15-  
-6-  
-6-  
-625-  
-48-  
-150-

15  
 5000  
 2500  
 2500  
 Per 2,0000  
 Livoranti Co. 10,000

## DISTINZIONE QUINTA

### Dolls Ready for the Modeling

**1. D.** **C** He ~~essa~~ la Regola del Trè moltiplice ?  
**R.** Non è altro, dice Gio: Battista Zucchetto, che l'unione di più conti, che per una stessa proposta haveffero da farli; e più chiaramente l'unione di più regole del Trè, sotto una sola Domanda, sulla quale per un Artificioso ordine, e concatenazione, di numeri si soddisfa finalmente col partire, come si vedrà.

R. Niccolò Tartaglia nella sua Arimmetica universale, sotto regola del Cinque, nel fine del libro decimo, ha posti alcuni quesiti, e prima di lui Fra Luca; Tuttavia Gio: Battista Zucchetto l'ha dichiarata, ampliata, e posta in uso con dargli nome.

Non è omniamente necessaria, perchè essendo l'unione di più regole del Tré sotto una Domanda, si può soddisfare ad essa per distin.

distinte regole del Trè senza contenersi. , siccome hanno fatto antichi Autori , benchè può dirsi necessaria , ed utile , per facilitare il conto , e dare la risoluzione d'istata , dove che se si operasse per di tante regole del Trè avvenrebbero rotti , che è difficil-terrebbero l'operazione , o trascurandosi non verrebbe giusto il conto :

4. D. Per quali conti più particolarmente serve?

R. Oltre a i quesiti con Tare , con guadagno e perdita per 100. a i Baratti , ad uguagliare Pesi , e Misure di diverso Paese , serve per li Cambi doppj , per raggugli di Piazza , per spacci in Fiera ; Per commissioni , e per tutti Cambj con ritorni , e provisioni , con permutazione di Moneta immaginaria in Moneta Reale , ed ad altri computi importanti di negozio , e traffico Mercantile ; Onde non si verifichi quello che dice il Figatelli a carte 88. cioè , che sia più di curiosità , che di necessità questa regola .

5. D. Proposto qualche questo , come si ordinano i numeri per operare , e scioglierlo , per questa regola del Trè moltiplice ?

R. Si trovi nel proposto Quesito il numero , del quale si fa la Domanda , il quale si scriva per potere in ultimo luogo ; dipoi si avverrà quel numero , che della medesima qualità di quello della Domanda , o sia Prezzo , o Mercanzia , o Capitale , o Guadagno , &c. il quale si pone in primo luogo da mano sinistra di chi scrive , e nel secondo si pone l'equivalente , tramezzato da una linea così — come se il primo numero fosse di Mercanzia , il secondo sarà di prezzo di questa . Il primo si dice sinistro , il secondo destro , che formano il primo ordine , che si distingue con linea così : nel terzo luogo , eh'è il primo del secondo ordine , si pone il numero simile in qualità all'antecedente ; Onde se l'antecedente è di Mercanzia , o di Moneta , il numero della medesima Mercanzia , o Moneta , si pone in primo luogo del secondo ordine , e nel secondo luogo si pone il numero , che eguale all'antecedente , come si è detto , e con linea si distingue il secondo ordine al modo detto . Con la medesima avvertenza si istaurano i numeri del terzo ordine , del quarto , &c. E se avverrà non essere il numero corrispondente nel Quesito , sarà segno il Quesito essere mancante di termini necessari ; Perchè un numero chiama l'altro , siccome un Anello di una Catena tira l'altro Anello . Finalmente nell'ultimo luogo si pone il numero della Domanda , che essendo sotto è numero destro . Si ponghino in ordine i numeri del seguente quesito :

6. D. Uno vende libbre 06. di Cera per Lire 22. un altro libbre 9. di Pepe per Lire 15. Si domanda barattando ugualmente assieme il pri-

Il primo libbre 100. di Cera; quante libbre di Pepe averà?

R. Il numero di libbre 100. di Cera, del quale si fa la domanda, si serba per l'ultimo luogo; l'altro numero simile in qualità, cioè di libbre 16. di Cera, si pone in primo luogo; nel secondo si pone il numero equivalente, cioè Lire 22. prezzo di Libbre 16. e si chiude il primo ordine; Nel terzo luogo; ch'è il primo del secondo ordine, si pone il numero simile in natura, e qualità all'antecedente, cioè Lire 15. nel quarto libbre 9. di Pepe, equivalente a Lire 15; e si chiude il secondo ordine. In ultimo luogo si pongono libbre 100. di Cera.

7. D. Collocati per ordine i numeri del Quesito, che si fa?

R. Si moltiplicano i primi numeri di ciascun'ordine, che sono numeri detti sinistri, nell'esempio dato 16. via 15. fa 240. Partitore. Si moltiplicano i secondi numeri di ciascun'ordine detti destri, col numero ultimo da se solo; cioè 22. via 9. fa 198. e questo via 100. fa 19800. numero da partirsi, il quale partito per 240. il quoziente  $82\frac{1}{4}$  soddisfa alla domanda, il qual numero è della qualità del penultimo (quando non ci sono posti numeri proporzionali, come si dirà più à basso,) e perchè il penultimo è 9. che sono libbre di Pepe, anche  $82\frac{1}{4}$  sono libbre di Pepe, che si hanno per libbre 100. di Cera.

Cera	Lire	Lire	Pepe	Cera
16	22	15	9	100.
15			22	
<hr/>				
Per 240			19800	
Di Pepe libbre $82\frac{1}{4}$			60	
			$\frac{15}{24}$	schifato $\frac{1}{2}$

8. D. Che cosa si deve avvertire circa l'operazione?

R. Se ne numeri sinistri ci saranno rotti, quanti numeri sinistri si riduchino in parti mezz, o terze, o quarte, &c. Tanti numeri destri si riduchino nelle medesime parti; e reciprocamente se ne numeri destri ci sono rotti, si riduchino in quelle parti secondo l'esigenza de' rotti, e nelle parti medesime si riduchino i sinistri; se pure già non fossero ridotti nelle medesime parti, & allora avviene, quando i numeri sinistri, e destri hanno rotti della medesima specie, e denominazione.

9. D. Ci è altra cosa d'avvertire circa l'operazione?

R. Si deve avvertire, che se avverrà qualche numero sinistro di un'ordine essere il medesimo, che il numero destro d'altr'ordine, quei numeri s'annullano assieme, e così si tralasciano, per non allun-



allungare inutilmente operazione : come farebbe sinistro 100. destro 100. Uno pure s'annulla ; perche non moltiplica , ne parte .  
10. D. Si deve avvertire altro ?

R. Quando si può schifare un numero sinistro d'un ordine , & un altro destro di qualsivoglia ordine ; si faccia per abbreviare operazione , & alcune volte avverrà , che finita la schifazione resterà solo il numero cercato . Queste schifazioni non si fanno di necessità ; ma per commodità , onde chi non sarà pratico nello schifare , cioè in saper trovare à mente un numero che sia commune misura di due numeri , lo può tralasciare . Adesso nel sopradetto Esempio , si schifa, d parte il 16. e 22. per 2. e viene 8. e 11. Il 15. e 9. per 3. viene 5. e 3. Dipoi si schifa il 5. e 100. per 5. viene 1. il quale si annulla , e 20. e finalmente 8. e 20. per 4. viene 2. e 5. dunque rimane 2. numero sinistro per partitore , & 1175. 3. numeri destri , che moltiplicati fanno 165. il quale per 2. partito viene  $82\frac{1}{2}$ . che sono libbre , come per l' altro modo .

16 — 22	15 — 9	100	3 — 5
8 — 11	5 — 3	100	
18 — 11	1 — 3	20	15
2 — 11	1 — 3	5	per 2. 165

Libbre  $82\frac{1}{2}$

11. D. Qual prova si fa alla regola del Trè moltiplice ?

R. Si può sodisfare alla Domanda con tante regole del Trè semplici ; quanti sono gl' ordini della regola moltiplice , e tornerà il medesimo numero ; come nella Domanda 6. si dica ; Se libb. 16. di Cera vagliono Lire 22. che varranno libbre 100. & operato verranno Lire  $137\frac{1}{2}$ . Ora con altra regola del Trè con Lire 15. si hanno libbre 9. di Pepe ; quante se ne averanno con Lire  $137\frac{1}{2}$ . e verranno di Pepe libbre  $82\frac{1}{2}$ .

12. D. Si può fare altra prova ?

R. Tante prove si possono fare à ciascun Questo di regola moltiplice , quanti sono i termini , de' quali è composta , con rivoltare il Questo , e fare la domanda d'uno di quel termini , & operando per regola moltiplice , doverà per prova tornare il termine , d numero lasciato , per esempio : Si rivolti il Questo della Domanda 6. dicendo : Uno vende libbre 16. di Cera per Lire 22. Un' altro libbre 9. di Pepe per Lire 15. Si domanda , barattando ugualmente insieme , quante libbre di Cera doverà avere il secondo per libbre  $82\frac{1}{2}$  di Pepe ? La domanda si fa di libbre  $82\frac{1}{2}$  di

M m

Pepe ,

Pepe, che però libbre 9. di Pepe in primo luogo, in secondo Lire 15. in terzo Lire 22. in quarto libbre 16. di Cera, in ultimo  $82\frac{1}{2}$  che fanno due ordini, &c. Si operi come si è insegnato, avvertendo, che riducendo in mezzi un destro numero, si riduca anche un sinistro, per quello che si è detto, nella Domanda 8. e verranno libbre 100. di Cera, e dimostra la lezione passata essere giusta.

*Per riduzione in Rotte.*

20 — 15	22 — 16	$82\frac{1}{2}$	9 — 15	22 — 16	$82\frac{1}{2}$
2	16	2			
					165
Pen. 1080	8	18			16
	1318	22			
					2640
	1320 per 396				15
	65				
					39600
Libbre 100.	19800				
	-00				

13. D. Una ha barattato libbre 100. di Cera per libbre  $82\frac{1}{2}$  di Pepe, del quale libbre 9. valevano Lire 15. Si vuol sapere quante Lire dovranno valere libbre di Cera 16.

R. Ecco rivoltato il Quesito in un'altro modo; perchè se ne intenda la pratica. I numeri vanno ordinati in Carta come sono disposti nel quesito: Si riducono libbre  $82\frac{1}{2}$  in 165. mezzo libbre a libbre 91 in 18. mezzo libbre. Si moltiplicano 100. via 18. numeri sinistri, verrà il partitore 1800. Si moltiplicano 25. via 165. da questo via 165. numeri destri viene 39600. da partirsi; onde partito verrà 22. che sono Lire prezzo di libbre 16. di Cera; e torna la Lezione, e la prova.

100 —  $82\frac{1}{2}$  | 9 — 15 | 16. Lire 22.

14. D. Un Mercante di Fiorenza ha comprato Cera, pagando libbre 100. al peso sottile di Venezia, Ducati correnti 25. & il Ducato corrente si valuta Lire 5.  $\frac{2}{3}$ . facendo il Cambio, e condotta in Fiorenza, ha speso a ragione di 10. per 100. Si domanda quanto gli venga a costare la libbra di Fiorenza, essendo libbre 22. di questa, libbre 25. sottili di Venezia.

R. Di libbra di Fiorenza si fa la Domanda, che andrà in ultimo luogo. Dunque in primo di Fiorenza, lib. 22. uguali a lib. 25. di Venezia, che si pongono in secondo, e libbre 100. di Venezia in terzo, Ducati 25. loro prezzo in quarto, Ducato 1. in quinto, e Lire 5.  $\frac{2}{3}$  in sesto luogo, & in ultimo libbra 1. che restano

restano esclusi da questa catena, ovvero ordine di numeri 10. per 100. di spesa; perchè per ogni 100. il Mercante ha pagato 110. li quali si chiamano numeri di proporzione, che costituiscono un'ordine, e si possono mettere nel principio, ò nel mezzo, ò nel fine degl'ordini; Avvertendo, che i numeri di proporzione non levano luogo a gl'altri. Il numero della Domanda sempre va in ultimo. Ora i numeri di proporzione si pongono nel principio, e gl'altri come si è detto; e dopo aver fatto la riduzione, e schifazione si averà 3. sinistro, e 5. destro, il quale partito per 3. Verrà  $1\frac{2}{3}$ . cioè Lire 1. Soldi 13. 4. prezzo, che gli viene a costare la libbra della Cera in Firenze. Chi non vuole fare le schifazioni, operi con moltiplicare, e partire, come si è insegnato, verrà il medesimo prezzo.

Proporz. Lib. di Rio. di Venez. Ducati : : Lire Lib. di Flor.

100 — 110	22 — 25	100 — 25	$1\frac{2}{3}$ — 5 $\frac{1}{3}$	1.
10 — 11	22 — 25	4 — 1	3 — 16	0 per 3 / 5
2 — 1	2 — 5	1 — 0	3 — 4	0
0 — 0	0 — 5	0 — 0	3 — 0	0

15. D. Un Mercante di Firenze si provvede di Cera di Venezia à Ducati 25. correnti il 100. di peso sottile, delle quali Libbre 25. tornano in Firenze libbre 22. & avendo speso à ragione di 10. per 100. per Condotta, Gabelle, & altro, e trovò costargli la libbra di Firenze Lire  $1\frac{2}{3}$ . Si domanda quante Lire si valuto il Ducato corrente di Venezia?

R. Questa Domanda è stata necessaria non solo per Prova, Ma perchè si avverta una difficoltà ne' numeri di proporzione, dovendosi intavolare al contrario dicendo, che 110. torni 100. Nel che si potrebbe errare. In tanto nella passata si disse, che 100. tornava 110. Perchè dovea crescere il prezzo della libbra di Firenze per le spese fatte. Qui adesso abbiamo il prezzo accresciuto; & il Ducato viene apprezzato avanti le spese, e per questa causa si pone 110. torna 100. e forma il primo ordine; E perchè di Ducato 1. si fa la Domanda: Ducati 25. in primo luogo del secondo ordine, nel secondo luogo libbre 100. sottili di Venezia; dipoi nel primo del terzo ordine libbre sottili 25. uguali à libbre 22. di Firenze nel secondo luogo; libbre 1. di Firenze nel primo del quarto ordine, il suo prezzo Lire  $1\frac{2}{3}$  nel secondo; & in ultimo Ducato 1. e fatta la riduzione, e schifazione, s'averanno numeri destri 2. 4. e 2. li quali si moltiplicano; Il prodotto 16. si parte per 3. numero sinistro, e verrà  $5\frac{1}{3}$  per le Lire, che si valuto il Ducato corrente di Venezia.

110 — 100	25 — 100	25 — 22	1 $\frac{2}{3}$ — 1 $\frac{2}{3}$	Ducato 1.
11 — 10	0 — 4	25 — 22	3 — 5	0
0 — 2	0 — 4	0 — 2	3 — 0	0
		4 — 2		
		8 — 2		

Per 3 / 16

Lire 5  $\frac{5}{7}$ .

16. D. Un Mercante di Fiorenza ordina, che gli sia pigliata Cera in Venezia libbre 100. Al peso sottile di Venezia vengono pagate Ducati corretti 25. de' quali uno vale Lire 5  $\frac{5}{7}$ . & in condotta, e Gabella ha speso à ragione di 10. per 100. essendo che libbre 25. sottili di Venezia sono libbre 22. di Fiorenza; Si domanda quante Lire dovrà rivendere la libbra di Fiorenza con guadagno di 20. per 100. ò del quinto del Capitale, che è l'istesso.

R. Si sono aggiunti due altri numeri di proporzione, che sono 100. e 120. perchè chi vuole guadagnare 20. per 100. vuol fare di 100. 120. & essendo 20. il quinto di 100. vuol guadagnare il quinto del Capitale, e si sappia, che chi vuol guadagnare il quinto, di 9. vuol fare 6. chi il terzo di 3. vuol fare 4. &c. Nella Domanda 14. si trovò, che la libbra gli costava Lire 1  $\frac{2}{3}$ . Onde per regola del Trè; se 5. deve tornare 6. che Lire 1  $\frac{2}{3}$ ? E verranno Lire 2. e tanto la rivenderà per avere detto guadagno; Mà per impraticarsi nella regola del Trè moltiplice, si ordinino i numeri come nella 14. Domanda, mettendo nell'ultimo ordine 100. e 120. e ridotti, e spisati i numeri, resterà 2. solamente destro, che non avendo numero sinistro, che lo parta saranno Lire 2. simile in qualità à Lire 5  $\frac{5}{7}$ . numero penultimo, stante che i numeri 100. e 120. di proporzione non levano luogo, come di sopra hò detto. Dunque rivenderà la libbra della Cera al peso di Fiorenza Lire 2. per guadagnarci 20. per 100. ovvero il quinto del suo Capitale.

100 - 110	22 - 25	100 - 25	1 $\frac{2}{3}$ - 5 $\frac{5}{7}$	100 - 120	1. L. 2.
10 - 11	22 - 25	4 - 8	3 - 16	5 - 6	0
2 - 0	2 - 5	0 - 0	0 - 4	5 - 2	0
0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 2	0

17. D. Un Mercante si è provisto di Cera da Venezia, & ha speso in Condotta, & altro à ragione di 10. per 100, e l'ha rivenduta al

ta al peso di Fiorenza Lire 2. la libbra, con guadagno di 20. per 100. essendo che le libbre 25. sottili al peso di Venezia, sono libbre 22. in Fiorenza. Si domanda quanti Ducati correnti di Venezia ha pagato per libbre 100. sottili, essendo valutato il Ducato corrente Lire  $5\frac{1}{2}$ .

R. Questa ferve di prova alla passata; S' avverta che i numeri di proporzione s' intavolano al contrario per quello, che si è detto nella risposta della 15. Domanda; Onde si dirà, che 110. torna 100. ovvero 11. torna 10. e 120. torna 100., ovvero 6. torna 5. li quali faranno i due ultimi ordini. Di Libbre 100. sottili di Venezia si fa la domanda, che però si pongono in ultimo luogo; libbre sottili 25. e libbre 22. a quelle uguali, fanno il primo ordine; libbre 1. e Lire due prezzo fanno il secondo ordine; Lire  $5\frac{1}{2}$ . e Ducato 1. fanno il terzo ordine; 11. torna 10. e 6. torna 5. fanno i due ultimi ordini, & in ultimo libbre 100. ridotti i numeri, e schisati restano 5. e 5. destri solamente; per il che moltiplicati fanno 25. per i Ducati, che furono pagati per libbre 100. di peso sottile di Venezia, e torna la prova.

25	—	22		1	—	2		$5\frac{1}{2}$	—	$1\frac{2}{3}$		11	—	10		6	—	5		100.	Duc.	25.
—	0	—	2		0	—	2		16	—	3		—	5		3	—	5		—	4	5
—	0	—	0		0	—	0		0	—	0		0	—	5		0		5		0	5

Duc. 25

18. D. Un Mercante Fiorentino commette in Bologna, che gli sia presa Canapa, la quale gli viene comprata a Lire 13.  $\frac{1}{2}$  moneta di Bologna, che Lire 3. sono Lire 4. di Fiorenza, il 100. con tara di libbre 4. per 100. & egli la vuole rivendere con guadagno del sesto del suo Capitale, con donativo di libbre 2. per 100. a moneta, e peso di Fiorenza, dove libbre 100. sono 95. di Bologna. Si domanda quante Lire la rivenderà il 100. con le dette condizioni.

R. Per sapere dunque quanto rivenderà libbre 102. a peso di Fiorenza, cioè libbre 100. e libbre 2. di donativo, si porranno libbre 102. in ultimo luogo, & in primo libbre 100. di Fiorenza, e libbre 95. a quelle uguali di Bologna in secondo; per il primo ordine. Poi si veda libbre 100. di Bologna, con tara di libbre 4. quante sono, e faranno libbre 104.  $\frac{5}{6}$ . le quali si pongano, e Lire 13.  $\frac{1}{2}$  di Bologna, per il secondo ordine. Ora Lire 3. di Bologna, e Lire 4. di Fiorenza per il terzo ordine; Adesso i numeri di proporzione 6. e 7. perchè chi vuol guadagnare il sesto del capitale di 6. vuol fare 7. come di sopra ho detto; e da ultimo libbre 102. Si faccia la riduzione in sestis di libbre 104.  $\frac{5}{6}$ , e di Li-

di Lire 13  $\frac{1}{2}$ . e si schifino i numeri, e restano i destri 1. 57. 9. e 19. ed i sinistri 625. e 5. questi moltiplicati fanno 3125. partitore, e gl'altri fanno 61047. da partirsi, e fatto il partire vengono Lire di Fiorenza 19. Soldi 10. Denari 8  $\frac{3}{4}$  per rivendita della Canapa, &c.

100 — 95	104 $\frac{1}{2}$ — 13 $\frac{1}{2}$	3 — 4	6 — 7	102. L. 19. 10. 8 $\frac{3}{4}$
20 — 19	625 — 81	3 — 4	6 — 7	102
5 — 19	625 — 27	0 — 0	3 — 7	51
5 — 19	625 — 9	0 — 0	0 — 7	51

19. D. Come si prova la passata Domanda?

R. Si prova così dicendo per regola del Trè: Se Libbre 95. di Bologna tornano libbre 100. di Fiorenza, che torneranno libbre 104  $\frac{1}{2}$  di Bologna? e torneranno 109  $\frac{3}{4}$  di Fiorenza. Adesso se libbre 102. vagliono Lire 19. 10. 8  $\frac{3}{4}$  prezzo venuto, che valeranno libbre 109  $\frac{1}{4}$ . e valeranno Lire 21. appunto, e perchè si spefero Lire 18. che tante sono Lire 13  $\frac{1}{2}$  di Bologna, mentre Lire 3. di questa sono Lire 4. di Fiorenza; Chiaro si conosce guadagnarsi il festo del Capitale, cioè Lire 3. le quali ci vogliono da Lire 18. fino a Lire 21. che è quanto si cercava.

Si deve avvertire nelle Domande passate, che avendo detto, che per Lire 18. si hanno libbre 100. e la Tara a ragione di libbre 4. per 100, non hò messo 104. mà 104  $\frac{1}{2}$ . perchè la Tara si leva dal 100. Onde levando libbre 4. da 100. restano libbre 96. a pagamento, e libbre 4. di Tara. Ora volendo libbre 100. a pagamento si dice: Se libbre 96. a pagamento ricercano libbre 4. di Tara, quante ne ricerchieranno libbre 100. e fatta la regola del Trè, verranno libbre 4  $\frac{1}{2}$ . O pure si poteva dire: se libbre 96. tornano con la Tara 100. che torneranno libbre 100. e torneranno libbre 104  $\frac{1}{2}$ .

20. D. Di Fiorenza si fa rimessa in Roma di Scudi d'oro 500. col Cambio a Scudi d'oro Stampe 73  $\frac{1}{2}$  per Scudi d'oro 100. Si domanda quanti Scudi di Giulj 10. l'uno faranno in Roma Aggio 1523.?

R. Si sappia, che l'Aggio è il valore dello Scudo d'oro Stampe; del che più chiaramente nel trattato de' Cambj si dirà: Onde per adesso se si pigliano 1523. per mezzi quattrini Romani, l'Aggio è il valore d'uno Scudo d'oro Stampe. Se per Bajocchi l'Aggio è il valore di Scudi d'oro Stampe 10. Se per Giulj l'Aggio è il valore di Scudi d'oro Stampe 100. Se per Scudi moneta di Giulj 10. l'uno, l'Aggio è il valore di Scudi d'oro Stampe 1000. Per ordinare i numeri per regola del Trè moltiplice, Scudi d'oro 500. terran-

terranno l'ultimo luogo, perchè di quelli si fa la Domanda. Scudi d'oro 100. il primo simili in qualità all' ultimo: il secondo Scudi d'oro Stampe  $73\frac{2}{3}$  suo equivalente per il primo ordine. Dipoi Scudi d'oro Stampe 10. uguali all' Aggio, cioè a Bajocchi 1523. per il secondo ordine, ed in ultimo Scudi d'oro 500. come si è detto?

Ridotti i numeri, e schifati sono destri 22. 1523. e 5. quali moltiplicati fanno 167530. prodotto, qual numero partito per 3. solo numero sinistro, vengono bajocchi 55843  $\frac{2}{3}$ . cioè Scudi di Giulij 10. detti moneta 558. bajocchi 43  $\frac{2}{3}$ .

100 — $73\frac{2}{3}$	10 — 1523	500.	1523
300 — 220	10 — 1523	500	5
3 — 22	0 — 1523	5	7615
			22

per 3 / 167530

Scudi moneta 558:43  $\frac{2}{3}$

21. D. Uno di Fiorenza è creditore in Roma di Scudi 558. bajocchi 43  $\frac{2}{3}$  e gli sono rimessi a Scudi d'oro Stampe  $73\frac{2}{3}$  per Scudi d'oro 100. Si domanda quanti di questi riceverà, Aggio 1523.

R. In ultimo luogo Scudi 558:43  $\frac{2}{3}$ . de quali si fa la domanda: In primo l' Aggio 1523. pigliati per bajocchi uguali a Scudi d'oro Stampe 10. per il primo ordine: Scudi d'oro Stampe  $73\frac{2}{3}$ . e Scudi d'oro 100. per il secondo ordine. In ultimo 55843  $\frac{2}{3}$ .

Si fa la riduzione in terzi, se vengono agguagliati per essere nel sinistro, e destro numero, e dipoi la schifazione, e restano numeri destri 100. e 83765. e sinistri 1523. e 11, questi moltiplicati fanno 16753. numero partitore, e gl'altri 8376500. numero da partirsi, e fatto il partire, vengono Scudi d'oro 500. li quali dovrà ricevere, e si è provato, che la lezione passata è giusta.

1523 — 10	$73\frac{2}{3}$ — 100	55843 $\frac{2}{3}$
1523 — 10	220 — 100	167530
1523 — 0	11 — 100	83765
1523	83765	
11	100	
16753	8376500	

Scudi d'oro 500

22. D.

22. D. Sono stati rimessi in Fiorenza Scudi d'oro 500. per un credito in Roma di Scudi 558. bajocchi  $43 \frac{2}{3}$  si vorrebbe sapere a quanti Sc. d'oro Stampe per Scudi d'oro 100. abbia cambiato Roma con Fiorenza, Aggio 1523.

R. Perchè si vuol sapere l'equivalente di Scudi d'oro Stampe, per Scudi d'oro 100. Questi si metteranno in ultimo luogo. Sc. d'oro 500. in primo, in secondo Sc. 558:  $43 \frac{2}{3}$  per il primo ordine. In terzo l'Aggio 1523. in quarto Scudi d'oro Stampe 10. equivalenti a bajocchi 1523. ed in ultimo come si è detto Scudi d'oro 100. e ridotti i numeri, e schifati, restano destri 16753. e 100. e sinistri 15. e 1523. li quali si moltiplicano fanno 22845. per partitore, per il quale si parte 1675300. e ne viene  $73 \frac{1}{3}$  per li Scudi d'oro Stampe.

$\begin{array}{r} 500 - 55843 \frac{2}{3} \mid 1523 - 10 \mid 100. \\ \hline 15. - 16763.0 \mid 1523 - 0 \mid 100 \end{array}$	<div style="text-align: right;">             1523              15  <hr style="width: 50px; margin: 0 auto;"/>             Per 22845 / 1675300              76150              7615. 3  <hr style="width: 50px; margin: 0 auto;"/>             22845           </div>
--	--

Sc. oro St.  $73 \frac{1}{3}$

23. D. Sono stati tratti in Roma Scudi d'oro 500. di Fiorenza a Sc. d'oro Stampe  $73 \frac{1}{3}$ . per Scudi d'oro 100. avendo avuto di Credito in Roma Scudi 558. bajocchi  $43 \frac{2}{3}$ . Si vuol sapere quanto fu l'Aggio di Roma?

R. Pigliando il numero dell'Aggio per bajocchi, viene ad essere il valore, e prezzo di Scudi d'oro Stampe 10. li quali si pongono in ultimo luogo. In primo Scudi d'oro Stampe  $73 \frac{1}{3}$  in secondo Scudi d'oro 100. In terzo Scudi d'oro 500. in quarto bajocchi 55843  $\frac{2}{3}$ . numero penultimo, della qualità del quale deve venire l'Aggio. Fatta la riduzione, e schifazione si parte 16753. per 11. e viene l'Aggio 1523.

$\begin{array}{r} 73 \frac{1}{3} - 100 \mid 500 - 55843 \frac{2}{3} \mid 10. \\ \hline 220 - 100 \mid 500 - 167530 \mid 10 \end{array}$	<div style="text-align: right;">             Per 11 / 16753  <hr style="width: 50px; margin: 0 auto;"/>             Aggio 1523           </div>
---	---

24. D. Essendo il Cambio da Roma a Fiorenza a Scudi d'oro Stampe  $73 \frac{1}{3}$  per Scudi d'oro 100. di Lire  $7 \frac{1}{2}$  l'uno. Viene fatta rimessa di Scudi 875. di Giust. l'uno da Roma. Si Domanda quante Lire faranno in Fiorenza, Aggio 1523.

R. Per intavolare i numeri, si pongono in ultimo Scudi 875. In primo



primo luogo l' Aggio 1523. simile in qualità, per pigliarli per Scudi di Giulj 10. In secondo luogo Sc. d'oro Stampe. 1000. uguali all' Aggio in Valore. In terzo Scudi d'oro Stampe 73.  $\frac{1}{4}$  In quarto Sc. d'oro 100. In quinto Sc. d'oro 1. In sesto Lire 7.  $\frac{1}{4}$ . & in ultimo, come si è detto, Scudi 875. I numeri si riducano, e poi si schifino, e faranno destri 875. 5. 400. e 200. li quali si moltiplicano, e producono 350000000. che si parte per 59397. prodotto di 1523. via 39. numeri sinistri, e verranno Lire 5892. Soldi 11. &c. siccome Lire rappresenta il penultimo numero, come si è detto da principio; Lasciandosi ora la moltiplicazione, e divisione si pongono solo i numeri ridotti, e schifati.

1523 — 1000		73 $\frac{1}{4}$ — 100		1 — 7 $\frac{1}{4}$		875.
1523 — 1000		585 — 800		2 — 15		875
1523 — 200		117 — 400		0 — 15		875
1523 — 200		39 — 400		0 — 5		875

25. D. Uno di Fiorenza fa rimessa in Roma di Lire 5892. Soldi 12 col cambio a Scudi d'oro Stampe 73  $\frac{1}{4}$  per Scudi d'oro 100. Si domanda quanti Scudi di Giulj 10. faranno in Roma. Aggio 1523. Valendo lo Scudo d'oro Lire 7  $\frac{1}{4}$ .

R. Per abbreviare Scrittura si disporranno i numeri, e si opera come si è insegnato; e torneranno Scudi 875.

Scudi d'oro Scudi d'oro St. Sc. di Giulj 10.

Lire 7  $\frac{1}{4}$  1 | 100 — 73  $\frac{1}{4}$  | 1000 — 1523 | Lire 5892  $\frac{1}{4}$ .

26. D. Uno è creditore in Roma di Scudi 4048. bajocchi 48. e gli sono rimessi in Fiera Sestri di Levante a Scudi d'oro Stampe 102  $\frac{1}{4}$  per Scudi Marche 100. Aggio 1523. Si domanda di quanti Scudi Marche sarà creditore in Fiera?

R. In ultimo si pongono Scudi 4048. 48. de' quali si fa la domanda, e pigliando l'Aggio per bajocchi 1523. si pone in primo luogo; In secondo Scudi d'oro Stampe 10. uguali a 1523. In terzo Scudi d'oro Stampe 102.  $\frac{1}{4}$ . In quarto Scudi Marche 100. In ultimo, come si è detto, Scudi 4048. 48. Si riducano i numeri, faranno destri 4048. 48. 500. 10. e sinistri 1523. e 513. e fatta la moltiplicazione, e partizione; verranno Scudi Marche 2590. Soldi 17. Denari 3.

1523 — 10. | 102  $\frac{1}{4}$  — 100 | 404848. Sc. | Marche 2590. 17. 3.

1523 — 10. | 513 — 500 | 404848

27. D. Uno è creditore in Fiera Sestri di Scudi Marche 2590. Soldi 17. Denari 3. e gli sono rimessi in Roma col Cambio di Scudi d'oro Stampe 102.  $\frac{1}{4}$ . per Scudi Marche 100. Si domanda quanti Scudi,

Scudi, e bajocchi faranno. Aggio 1523.  
 R. In primo luogo Scudi Marche 100. In secondo Scudi d'oro Stam-  
 pe 102  $\frac{1}{4}$  equivalenti. In terzo Scudi d'oro Stampe 1000. In  
 quarto Scudi di Giulio 10. cioè l' Aggio 1523. & in ultimo Scudi  
 Marche 2500. 17. 2. Si facciano le sue reduzzioni, e si operi al 10-1  
 110, che torneranno Scudi 4041. 47. 18. 5. il up il pos 9. 0. 4

160 — 102  $\frac{1}{4}$  | 1000 — 1523 | 2500. 17. 2. 1523  
 18. D. Di Genova si rimette in Fiorenza di Doppie 500. di Spa-  
 gna à ragione di Pezza 1. di Lire 5. di Genova per Pezza 1. di Lire  
 8. di Fiorenza. Si domanda valendo la Doppia in Genova Lire  
 18  $\frac{1}{4}$ . & in Fiorenza Lire 22. quante Doppie faranno in Fio-  
 renza?

R. Si dispongano i numeri così, dicendo Lire 5. di Genova sono  
 Lire 8. di Fiorenza, se Lire 22. di questa, Lire 18  $\frac{1}{4}$  di quella.  
 Doppie 500. di Genova quante Doppie di Fiorenza faranno?  
 & operato verranno Doppie 512. in Fiorenza.

5 — 6 | 22 — 18  $\frac{1}{4}$  | 500. Doppie 512.  
 29. D. Di Fiorenza si rimettono in Genova Doppie 512  $\frac{1}{2}$  che va-  
 gliano Lire 22. l'una, in Genova Lire 18  $\frac{1}{4}$ , essendo che il Cam-  
 bio è di Pezza 1. di Lire 6. di Fiorenza per Pezza 1. di Lire 5. di  
 Genova. Quante Doppie faranno in Genova?

R. In primo luogo Lire 18  $\frac{1}{4}$ . In secondo Lire 22. In terzo Lire 6.  
 In quarto Lire 5. & in ultimo Doppie 512  $\frac{1}{2}$  Ridotti, e schifa-  
 ti i numeri, restano destri 940. e 25. li quali moltiplicati fanno  
 23500. che si parte per 47. sinistro, e torneranno Doppie 500.  
 18  $\frac{1}{4}$  — 22 | 6 — 5 | 512  $\frac{1}{2}$  Doppie 500.

30. D. Uno di Fiorenza ha credito in Milano Lire 5742. Soldi 17.  
 correnti, e gli sono rimesse in Fiorenza col Cambio di Soldi Im-  
 periali 119.  $\frac{1}{2}$  per Scudo d'oro 1. di Lire 7  $\frac{1}{2}$ . Si domanda, valen-  
 do il Filippo Soldi 140. correnti, in cambio Soldi Imperiali 106.  
 quante Lire faranno di Fiorenza?

R. Si dispongano i numeri: Le Lire 5742. 17. di Milano in ultimo  
 luogo. Soldi correnti 140. in primo luogo. In secondo Soldi Im-  
 periali 106. equivalenti. In terzo Soldi Imperiali 119.  $\frac{1}{2}$ . In quar-  
 to Lire 7.  $\frac{1}{2}$ . uguali ad uno Scudo d'oro, & in ultimo Lire 5742.  
 17. ovvero Soldi 114857. Si faccia la reduzzione, e schifazione,  
 sono numeri destri 114857. 9. e 58. li quali moltiplicati danno  
 54786789. da partirsi per 10052. prodotto di 712. via 14. nu-  
 meri sinistri, e verranno Lire 5450. Sol. 6. Denari 8. di Fiorenza.  
 140 — 106 | 119  $\frac{1}{2}$  — 7  $\frac{1}{2}$  | 5742. 17. Lire 5450. 6. 8  
 140 — 53 | 250 — 15 | 114857

14 — 53 | 718 — 9 | 114857

31. D.

31. D. Essendosi pagate Lire 5450  $\frac{1}{2}$  in Fiorenza per un debito di Lire correnti di Milano col Cambio a Soldi Imperiali 119  $\frac{1}{2}$  per Scudo d'oro, 1. di Lire 7  $\frac{1}{2}$ . Valendo il Filippo in corrente Lire 7. in Cambio Soldi Imperiali 106. Si domanda quante furono dette Lire in Milano?

R. In primo luogo Lire 7  $\frac{1}{2}$ . In secondo 119  $\frac{1}{2}$ . In terzo 106. In quarto Lire 7. in ultimo Lire 5450  $\frac{1}{2}$ . Ridotti i numeri faranno destri 16351. 7. e 359. li quali si moltiplicano. Il prodotto 41090063. si parte per 7155. prodotto di 135. via 53. numeri sinistri: restano Lire 5742. 16. &c. correnti di Milano.

7  $\frac{1}{2}$  — 119  $\frac{1}{2}$  — 106 — 7 — 5450  $\frac{1}{2}$   
 16351. 7. — 359 — 53 — 7 — 16351  
 41090063 — 7155 — 53 — 7 — 16351  
 5742. 16. &c. correnti di Milano

**Cambio e Ritorno con Provisions, per Regola del Tre Moltiplice.**

32. D. Uno di Fiorenza trafse a Roma Scudi d'oro 1760. & Sc. d'oro Stampe 73  $\frac{1}{2}$  per Sc. d'oro 100. & il ritorno fu a Scudi d'oro Stampe 73  $\frac{1}{2}$ . Si domanda quanti ritorneranno in Fiorenza con la provisione di  $\frac{1}{4}$  per 100.

R. Sogliono communemente ridurre li Scudi d'oro 1760. in Scudi d'oro Stampe, dicendo per regola del Tre: Se Scudi d'oro 100. torneranno Scudi d'oro Stampe 73  $\frac{1}{2}$ . quanti torneranno Scudi d'oro 1760. & operato torneranno Scudi d'oro Stampe 1290. 13. 4 a i quali si aggiungono Scudi d'oro Stampe 4. 6. 1. di provisione  $\frac{1}{4}$  per 100. come si è insegnato nella 24. e 25. distinzione settima fanno Scudi d'oro Stampe 1294. Soldi 19. 5. di questi fanno il ritorno dicendo Scudi d'oro Stampe 73  $\frac{1}{2}$ . tornano Scudi d'oro 100. che torneranno Scudi d'oro Stampe 1294. 19. 5. & operato, torneranno Scudi d'oro 1767. 17. 6. in Fiorenza.

Più speditamente per regola moltiplice si averà il conto. In ultimo Scudi d'oro 1760. de quali si fa la Domanda: In primo luogo Sc. d'oro 100. In secondo Scudi d'oro Stampe 73  $\frac{1}{2}$  d'Andata per il primo ordine. Nel terzo Scudi d'oro Stampe 73  $\frac{1}{2}$  di ritorno. In quarto Scudi d'oro 100. per il secondo ordine. Adesso per il terzo ordine i numeri di proporzione per la provisione cioè 100. torneranno 100  $\frac{1}{4}$ . In ultimo Scudi d'oro 1760. come ho detto: Scudi d'oro 100. per essere numero sinistro, e destro s'annullano; Si faccia la riduzione, e schifazione, restano numeri destri 352. 301. 022 11. li quali moltiplicati fanno 4661883. che si parte per

Na 2

2637.

1225q2

282

2637. prodotto di 879. via 3. numeri sinistri, e verranno, come sopra, Scudi d'oro 1767. 17. 6.

100 — 73 $\frac{1}{2}$	73 $\frac{1}{2}$ — 100	100 — 100 $\frac{1}{2}$	1760 Sc. 1767. 17. 6.
3 — 220	293 — 4	300 — 301	1760
3 — 11	293 — 4	15 — 301	1760
3 — 11	293 — 4	3 — 301	352

33. B. Ne' Cambj, e Ritorni con provisione, si può usare maggior brevità di calcolo?

R. Si può usare questa, dicendo per regola del Trè: Se Scudi d'oro Stampe 73  $\frac{1}{2}$  fossero 73  $\frac{1}{2}$ , che Scudi d'oro 1760 e verranno Scudi d'oro 1762, a quali aggiunti Scudi 5. 17. 6. di provisione à  $\frac{1}{2}$ . per 100. per la 24. e 25. detta nell' antecedente; Si averanno Scudi d'oro 1767. 17. 6. come per la passata. La provisione però si può aggiungere al secondo, ovvero terzo numero della regola del Trè, & operato; verranno sempre i medesimi Scudi.

oro 1762. 17. 6. + 5. 17. 6. = 1767. 17. 6.

oro 1760. + 5. 17. 6. = 1765. 17. 6.

oro 1765. 17. 6. + 2. = 1767. 17. 6.

32. C. aggiungano a Scudi 1760. Scudi 5. 17. 4. di provisione sarà la somma 1765. 17. 4. Ora si faccia regola del trè, dicendo: Se 73  $\frac{1}{2}$  fossero 73  $\frac{1}{2}$ , che fariano 1765. 17. 4. e verranno Scudi d'oro 1767. 17. 6. come per gl' altri modi.

34. D. Di Roma si hanno a rimettere in Napoli Scudi di Giulj dieci 1500. col Cambio a Ducati 182  $\frac{1}{2}$  per Scudi d'oro Stampe 100. Si Domanda; essendo il ritorno a Ducati 121. per Scudi 100. di Giulj 10. quanti Scudi d'oro Stampe torneranno in Roma?

R. Si ordinano i numeri così: Scudi 1500. in ultimo luogo. In primo l'Aggio 1523. pigliandosi per Scudi di Giulj 10. uguali a Scudi d'oro Stampe 1000. che si pongono in secondo; In terzo Scudi d'oro Stampe 100. uguali a Ducati 182  $\frac{1}{2}$ . che si pongono in quarto. In quinto Ducati 121. uguali a Scudi 100. di Giulj 10. li quali si pongono in sesto. Di nuovo l'Aggio 1523. in settimo, e nell' ottavo Scudi d'oro Stampe 1000. In ultimo Scudi 1500. de quali si fa la Domanda. Si moltiplichino i numeri sinistri, e destri, e si faccia la divisione, e verranno Scudi d'oro Stampe 978. Soldi 12. Denari 2. &c.

1523 — 1000. | 100 — 182  $\frac{1}{2}$  | 121 — 100 | 1523 — 1000 | 1500.

Spacci

## Spacci in Fiera

35. D. Giulio piglia da Livio à Cambio corrente Scudi d'oro 784. per partirne il Cambio di Fiera, nella qua le andarono à Sc. d'oro  $133 \frac{1}{2}$  per 100. Marche, e fatta la Fiera tornarono à Scudi d'oro  $135 \frac{1}{2}$ . Domandasi con le solite provisioni di  $\frac{1}{2}$  per 100. quanti Scudi doverà Giulio à Livio per detto Cambio?

R. Questo è un spaccio in Fiera, che è un Cambio con il ritorno, e si danno due provisioni di  $\frac{1}{2}$  per 100. una all'andare, e l'altra al tornare, e sogliono i Banchisti operare così: Aggiungono  $\frac{1}{2}$  per 100. di provisione à Scudi d'oro 784. e vengono 786. 12. 3. li quali sono Scudi Marche 389. 19. 2. à Scudi d'oro  $133 \frac{1}{2}$  per Scudi Marche 100. che si provisionano, e vengono Scudi Marche 391. 18. 6. che sono Scudi d'oro 800. 1. 8. à Scudi d'oro  $135 \frac{1}{2}$  per Scudi Marche 100. e tanti ne doverà Giulio à Livio per li 784. prefatti Cambio.

Ma volendo soddisfare alla Domanda per regola del Trè multiplice, in ultimo luogo si pongono Scudi d'oro 784. In primo l'andata di Scudi d'oro  $133 \frac{1}{2}$  per accordargli; Nel secondo Scudi d'oro  $135 \frac{1}{2}$  si tralasciano di porre due volte Scudi Marche 100. perchè vengono in destro, e sinistro luogo: onde s'annullano. Adesso nel terzo 300. nel quarto 301. e di nuovo nel quinto 300. e nel sesto 301. per le due provisioni, in fine li detti Scudi d'oro 784. e fatta la riduzione, faranno sinistri 800. 300. e 306. e destri 784. 301. 301. e 811. e fatto si moltiplicare, e partire tornerà uno come per l'altro modo, Scudi d'oro 800. 1. 8.

$$\begin{array}{r} 133 \frac{1}{2} - 135 \frac{1}{2} \mid 300 - 301 \mid 300 - 301 \mid 784 \\ \hline 800 - 811 \mid 300 - 301 \mid 300 - 301 \mid 784 \end{array}$$

36. D. Nella 38. di questo si è usato modo più breve, si può usare ancora nelli spacci?

R. Si può con usare la regola del Trè semplice, dicendo; Se Scudi d'oro  $133 \frac{1}{2}$  tornano  $135 \frac{1}{2}$  che torneranno Scudi d'oro 784. e verranno Scudi 794. 15. 7. 2. li quali si aggiungono Scudi d'oro 12. 11. prima provisione à  $\frac{1}{2}$  per 100. e vengono Scudi d'oro 797. 8. 6. a i quali s'aggiunge la seconda provisione; pure à  $\frac{1}{2}$  per 100. e vengono Scudi d'oro 800. 1. 8. La provisione di  $\frac{1}{2}$  per 100. si è insegnato à trovarla facilmente in una sola riga nella 25. Distinzione quarta. Trattato terzo.

$$\begin{array}{r} 233 \frac{5}{8} \\ \hline 800 \end{array} \quad \begin{array}{r} 135 \frac{1}{8} \\ \hline 811 \end{array} \quad \begin{array}{r} 784 \\ \hline 821 \end{array}$$

800

811

per 10. : 635824

per 10, 63882, 8

REF: 16358 4:9

794 15. 7

2. 12. 11 **Provisione Pr.**

797. 2. 5

2. 13 2 Provisions Sec.

**Ritorno Scuola d'Ora 800. 1. 8**

Quindi nuova avvertito, che si potrebbe aggiungere la provvisione di  $\frac{7}{8}$  per 100. due volte al secondo numero, cioè a 135  $\frac{7}{8}$ . ovvero al terzo 784. e poi fare la regola del Trè, e verrebbero i medesimi Scudi d'oro di ritorno. Ora s'aggiungano le provvisioni a 784, verranno Scudi 789, 4. 8. e poi si dica, se 133  $\frac{7}{8}$  tornano 135  $\frac{7}{8}$ . che torneranno Scudi d'oro 789, 4. 8. e verranno i medesimi Scudi d'oro 800, 1. 8.

78993-6.8



42.3

786. 12. 3

2. 12. 5

7895-458

1221

899

8.

PDF 102

to.

7802.6.8

789. 48

63.1386.13.4

---

640068. 4. 8

80028. Ia.

Dec. 14.

# Scud'bro

800.1.8

37. D. Uno ha dato a Cambio corrente Scudi d'oro 1500. il quale gl'ha tenuto due Fiere. Nella prima andarono a Scudi d'oro 133  $\frac{1}{2}$  per Scudi Marche 100. e fatta la Fiera tornarono a Scudi 135. Nella seconda a Scudi d'oro 136  $\frac{1}{2}$  e tornarono a Scudi 134  $\frac{1}{2}$ . Domando con le solite provvisioni di  $\frac{1}{2}$  per 100. quanti Scudi d'oro faranno ultimamente tornati?

4. Deve avvertirsi che avviene mutarfi il prezzo variabile, e che cresce, o scema il valore de' Scudi Marche Foo. tuttavia la regola è la medesima si dica dunque: Se Scudi d'oro 133. 4 tornano 135. e 136 1/2 tornano 135 1/4, che torneranno Scudi d'oro 1500. ed operando per regola multiplice, riducen-  
do, e'

do, e schifando i numeri, faranno destri 15.5435. e 405. che danno di prodotto 33107625. il quale partito per 21856. numero fatto da 5464. via 4. numeri sinistri: verranno Scudi d'oro 1510. 13. 9. a i quali aggiunti gli Scudi di quattro provisioni a  $\frac{4}{5}$  per 100. succcessivamente faranno tornati Scudi d'oro 1530. 18. 7 in Fiorenza.

133 $\frac{1}{2}$ — 136 $\frac{1}{2}$ — 136 $\frac{1}{2}$ — 135 $\frac{1}{2}$ — 1500.	5435.
409 — 405 — 683 — 1087 — 1500	15
4 — 405 — 5464 — 5435 — 15	81525
Scu. 1510. 13. 9.	405
5. — 2 Provis. Pr.	4
1515. 14. 6	407625
5. 1. — Seconda	326100
Per 21856	
Sc. 1510. 13. 9	33017625
1520. 15. 6	111616
5. 1. 4 Terza	23368
1525. 16. 10	15063 — 20
5. 1. 9 e Quarta	301300
Sc. oro 1530. 18. 7 tornati in Fiorenza.	82740
	17172 — 12
	286064
	9360

38. D. Un Mercante di Fiorenza ha dato a Cambio corrente Scudi d'oro 5510 12. 8. per tre Fiere. Nella prima Fiera andarono a Sc. d'oro 141  $\frac{5}{8}$  per Scudi Marchie 100. e tornarono, fatti a Fiera, Scudi d'oro 142  $\frac{1}{2}$ . Nella seconda a Scudi d'oro 139  $\frac{1}{2}$  col ritorno a 141. Nella terza a Scudi d'oro 140. col ritorno a 141  $\frac{1}{2}$ . Si domanda, con le due provisioni per ciascuna Fiera di  $\frac{4}{5}$  per 100. quanti Scudi d'oro siano tornati in Fiorenza?

R. Si pongono Scudi d'oro 5510. 12. 8. in ultimo luogo, ovvero ridotti Soldi 12. Denari 8. in parte di Scudi  $\frac{1}{2}$   $\frac{2}{5}$ . gl'altri numeri si mettono con l'ordine già detto, ponendo per numero sinistro l'andata, e per destro il ritorno. Fatte le riduzioni si dovrebbebbe moltiplicare per 30. Denominatore un numero sinistro: Ma in quel cambio si parta per essa 570. numero destro, e faranno uguali le parti, venendo dal partire 19. Dipoi per 5. si parta 140. sinistro, e 425. destro, e verranno 28. e 85. e ancora 19. e 418. per 19. viene 1. e viene 22. Pure 565. sinistro, e 85. destro per 5. vengo-



vengono 113. e 17. finalmente si partono 22. e 165319. per 11. restano 2. e 15029. sicchè i destri sono 15029. 17. 141. & i sinistri 28. 2. 113. e fatta la moltiplicazione, e partizione, verranno Scudi d'oro 5692. 17. 6. appunto, a' quali s'aggiungano sei provisioni con la brevità già detta, e si averanno di ritorno in Fiorenza Scudi 5807. 13. 5 &c.

141 $\frac{2}{3}$ — 142 $\frac{2}{3}$	139 $\frac{2}{3}$ — 141	140 — 141 $\frac{2}{3}$	555 — 555 $\frac{2}{3}$
565 — 570	418 — 141	140 — 425	165319
565 — 19	418 — 141	28 — 85	165319
113 — 1	22 — 141	28 — 17	165319
113 — 0	2 — 141	28 — 17	15029

39. D. Giulio ha preso à Cambio corrente Scudi d'oro 1672. li quali ha tenuto quattro Fiere. Nella prima andarono à Scudi d'oro 139  $\frac{2}{3}$  per Scudi Marche 100. Col ritorno à Scudi d'oro 140. Nella seconda à 138  $\frac{1}{3}$  col ritorno à 141  $\frac{2}{3}$ . Nella terza à 139  $\frac{2}{3}$  con il ritorno à 141  $\frac{2}{3}$ . Nella quarta poi andarono à 140. col ritorno à 142  $\frac{2}{3}$  per Scudi Marche 100. Si domanda con le solite provisioni di  $\frac{2}{3}$  per 100. all' andare, e tornare quanti Scudi d'oro dovrà Giulio restituire prr saldo di Capitale, e Frutti?

R. Si dispongano per ordine l' Andate, e Ritorni con mettere in ultimo luogo Sc. d'oro 1672. Si riducano i numeri e i suoi rotti, e faranno uguali i destri, e sinistri ne' Denominatori. Solo un sinistro è ridotto in terzi, che per uguagliare le parti si divida 555. numero sinistro per 3. e verrà 185. come nella terza fila. Pure si parte 835. sinistro, e 425. destro per 5. vengono 167. e 85. Si parte 418. sinistro, e 1672. destro per 418. vengono 1. e 4. Finalmente nella terza fila si parte 185. sinistro, e 85. destro per 5. e vengono 37. e 17. Sicchè sono numeri destri 17. 565. 285. e 4. li quali moltiplicati fanno 10949700. che si parte per 6179. prodotto di 167. via 37. numeri sinistri, e verranno Scudi d'oro 1772. Soldo 1. Denari 8. alli quali aggiunti li Scudi d'otto provisioni successivamente di  $\frac{2}{3}$  per 100. e verranno finalmente Scudi d'oro 1819. 17. 7. d'oro da rendersi da Giulio al Creditore.

139 $\frac{2}{3}$ — 140	138 $\frac{1}{3}$ — 141 $\frac{2}{3}$	139 $\frac{2}{3}$ — 141 $\frac{2}{3}$	140 — 142 $\frac{2}{3}$	1672
835 — 140	555 — 425	418 — 565	140 — 285	1772
167 — 1	185 — 85	1 — 565	1 — 285	4
167 — 0	37 — 17	0 — 565	0 — 285	4

Raggua-



# Ragguagli di Piazze, per i Cambj trovati per Regola del Tre moltiplice.

40. D. Roma cambia per Fiorenza a Scudi d'oro Stampe  $73 \frac{1}{2}$  e per Livorno a Soldi 112. per una Pezza. Si domanda a quanto cambierà Fiorenza per Livorno alla pari, Aggio di Roma 1523. R. Ecco come si devono disporre i numeri. Pezza 1. di Livorno uguale a Soldi 112. di Roma, Soldi 4. uguali a bajocchi 3. bajocchi 1523. Aggio uguali a Scudi d'oro Stampe 10. Scudi d'oro Stampe  $73 \frac{1}{2}$  uguali a Scudi d'oro 100. di Fiorenza, Scudo d'oro 1. uguale a Soldi 150. In ultimo Pezza 1. di Livorno, a quanti Soldi sarà uguale di Fiorenza. Fatta la riduzione, e schifazione, restano numeri destri 150. 150. 3. 23. che moltiplicati successivamente fanno 1890000. che si parte per 16753. prodotto di 1523. via 11. numeri sinistri, e verranno di quoziente Soldi 112. Den. 10. poco meno uguali ad una Pezza di Livorno. Ed a tanti Soldi resta il Cambio tra Fiorenza, e Livorno.

1 — 112 | 4 — 3 | 1523 — 10 |  $73 \frac{1}{2}$  — 100 | 1 — 150 | 1.  
0 — 28 | 1 — 3 | 1523 — 10 | 220 — 300 | 0 — 150 | 0

0 — 28 | 0 — 3 | 1523 — 0 | 11 — 150 | 0 — 150 | 0.

41. D. Roma cambia per Fiorenza Scudi d'oro Stampe  $73 \frac{1}{2}$  per Sc d'oro 100. e per Livorno Scudi  $85 \frac{1}{2}$  di Giulj 10. Puno per Pezze 100. Si domanda a quanti Soldi per Pezza resterà il Cambio tra Fiorenza, e Livorno? Aggio di Roma 1520.

R. Così si dispongono i numeri: Pezza 100. uguali a bajoc.  $85 \frac{1}{2}$  40. che sono Scudi  $85 \frac{1}{2}$  di Giulj 10. Puno. Bajocchi 1520. Aggio, uguali a Scudi d'oro Stampe 10. Scudi d'oro Stampe  $73 \frac{1}{2}$  uguali a Sc. d'oro 100. Sc. d'oro 1. uguale a Soldi 150. Pezza 1. a quanti Soldi sarà uguale? Fatta la riduzione de' rotti, e schifazione brevemente, sono numeri destri 2135. 3. e 15. che producono 96075. che partito per 836. prodotto di 38. via 22. numeri sinistri, verranno di quoziente Soldi 114. Den. 11.

100 — 8540 | 1520 — 10 |  $73 \frac{1}{2}$  — 100 | 1 — 150 | 1.

100 — 8540 | 1520 — 10 | 220 — 300 | 0 — 150 | 0

0 — 2235 | 38 — 0 | 22 — 3 | 0 — 115 | 130

42. D. Roma cambia con Fiorenza Scudi d'oro Stampe  $73 \frac{1}{2}$  per Scudi d'oro 100. e Fiorenza Soldi 113  $\frac{1}{2}$  per Pezza 1. di Livorno; si domanda a quanti Scudi di Giulj 10. resterà il Cambio tra Roma, e Livorno per Pezze 100? Aggio 1524.

O a

R. Inu-

R. I numeri si ordinano così per regola multiplize. Pezza 1. uguale a Soldi 113  $\frac{2}{3}$ . Soldi 150. uguali a Scudo d'oro 1. Scudi d'oro 100. uguali a Scudi d'oro Stampe 73  $\frac{1}{2}$ . Scudi d'oro Stampe 1000. uguali a Scudi di Giulj x. 1524. Aggio. Pezze 100. a quanti Sc. di Giulj x. uguali faranno? Si faccia la riduzione, e schifazione. I numeri destri sono 254. 14. 34. che fanno di prodotto 94906. Il quale si parte per 1125. prodotto di 150 e 15. numeri, e verranno Scudi 84. Bajocchi 44  $\frac{1}{2}$ . per il Cambio di Roma per Livorno.

113 $\frac{2}{3}$	150	1	100	73 $\frac{1}{2}$	1000	1524	100
3	149	150	0	800	220	1524	0
01524	15	0	15	14	16	568	0
0	14	15	0	15	11	5	254

43. D. Livorno cambia Pezza 1. per Soldi 113  $\frac{2}{3}$  di Fiorenza, e Pezze 100. per Scudi 84  $\frac{1}{2}$  di Giulj x. Puno di Roma. Si domanda a quanti Scudi d'oro Stampe per Scudi d'oro 100. resterà il Cambio tra Roma, e Fiorenza? Aggio 1523.

R. Si dispongono i numeri: Scudo d'oro 1. uguale a Soldi 150. Soldi 113  $\frac{2}{3}$  uguali a Pezza 1. Pezze 100. uguale a Scudi 84. bajocchi 40 e cioè a bajocchi 8440. Bajocchi 1523. Aggio uguali a Scudi d'oro Stampe 10. a quanti di questi faranno uguali Scudi d'oro 100. di Fiorenza? Facendosi la riduzione, e schifazione, restano numeri destri 4220. 3. e 150. quali moltiplicati fanno 89906. che partito per 2589. prodotto di 1523. via 27. numeri finistri verranno Scudi d'oro Stampe 73. 6. 14 &c.

150	113 $\frac{2}{3}$	1	100	8440	1523	10	100
0	150	17	3	0	4220	1523	0

44. D. Fiorenza cambia con Fiera a Scudi d'oro 140. per Sc. Marche 100. e Bologna a Scudi 184. di Bolognini 85. Puno, per Scudi Marche 100. Si domanda quanti Bolognini averà Fiorenza in cambio di Scudo 1. di Lire 7.?

R. Ecco come si ordinano i num. Lire 7  $\frac{2}{3}$  uguali a Sc. d'oro 1. Sc. d'oro 140. uguali a Sc. Marche 100. e di nuovo Sc. Marche 100. uguali a Soldi di Bologna 184. Il 100. destro, e sinistro si lascia perché uno annulla l'altro. Scudo di Bologna 1. uguale a Bolognini 85. a quanti di questi sarà uguale Scudo 1. di Lire 7? Fatta la riduzione, e schifazione restano destri 98. e 17. de quali il prodotto 1564. partito per 15. verranno Bolognini 104  $\frac{2}{3}$ .

7  $\frac{1}{2}$  — 140 — 184 | 1 — 85 | Lire 7  $\frac{1}{2}$  — 140 — 184 | 0 — 85 | 7

3 — 0 | 70 — 184 | 0 — 17  $\frac{1}{2}$  — 7

3 — 0 | 10 — 184 | 0 — 17  $\frac{1}{2}$  — 7

2 — 0 | 10 — 184 | 0 — 17  $\frac{1}{2}$  — 7

45. D. Bologna cambia con la Fiera Scudi 184 di Bolognini 85.

uno, e con Firenze Bolognini 104  $\frac{1}{2}$  per Scudi di Lire 7  $\frac{1}{2}$

Si domanda a quanti Scudi d'oro di Firenze resterà il Cambio per Scudi Marche 100 di Fiera 2

R. Si dica Sc. Marche 100, eguali a Sc. 184 di Bologna; Sc. 104  $\frac{1}{2}$  eguali a Sc. 100 di Firenze; Sc. 85 di Bolognini; Sc. 104  $\frac{1}{2}$  eguali a Lire 7  $\frac{1}{2}$ ; eguali ad uno Scudo d'oro. Scudi Marche 100 a quanti Scudi d'oro di Firenze faranno eguali 2. Si faccia la suddivisione in 15 scellini, ed in mezzi, si schifino i quozienti, restano di Lire 46, 185, 7, e 12, li quali si moltiplicano per 100, per 100, per 100, e si parte per 100, vengono 140 per li Scudi d'oro di Firenze in Cambio per la Fiera

100 — 184 | 1 — 85 | 104  $\frac{1}{2}$  — 7 | 7  $\frac{1}{2}$  — 1

0 — 184 — 10 — 85 — 104  $\frac{1}{2}$  — 7 | 7  $\frac{1}{2}$  — 1

0 22 46 | 0 — 85 | 391 — 7 | 0 — 1

46. D. Firenze cambia con la Fiera Scudi d'oro 140 per Scudi 100 Marche, e Bologna con Firenze Bolognini 104  $\frac{1}{2}$  per Sc. 1 di Lire 7. Si domanda quanti Scudi di Bolognini 85, uno?

cambierà per la Fiera Bologna, per avere Scudi Marche 100?

R. Offervisi (il che si doveva fare anche nella passata) che quando il primo, e l'ultimo è il medesimo numero, si lasciano, come nella passata, e qui Scudi Marche 100, ed allora il secondo numero del primo ordine tiene l'ultimo luogo. La Domanda si fa di Scudi Marche 100, che andrebbero l'ultimo, in Cambio di essi si pongano Scudi d'oro 140, equivalenti. Nel primo, Scudo d'oro 1. Nel secondo Lire 7  $\frac{1}{2}$ . Nel terzo Lire 7. Nel quarto, Bolognini 104  $\frac{1}{2}$ . Nel quinto Bolognini 85. Nel sesto, Scudo 1 di Bologna, ed operato al solito, verranno Scudi di Bologna 184.

1 — 7  $\frac{1}{2}$  | 2 — 104  $\frac{1}{2}$  | 85 — 1 | 140

2 — 0 | 0 — 184 | 85 — 1 | 140

0 — 184 — 10 — 85 — 104  $\frac{1}{2}$  — 7 | 7  $\frac{1}{2}$  — 1

0 22 46 | 0 — 85 | 391 — 7 | 0 — 1

Scudi 184

0 22 46 | 0 — 85 | 391 — 7 | 0 — 1

0 22 46 | 0 — 85 | 391 — 7 | 0 — 1

0 22 46 | 0 — 85 | 391 — 7 | 0 — 1

0 22 46 | 0 — 85 | 391 — 7 | 0 — 1

0 22 46 | 0 — 85 | 391 — 7 | 0 — 1

0 22 46 | 0 — 85 | 391 — 7 | 0 — 1

0 22 46 | 0 — 85 | 391 — 7 | 0 — 1

0 22 46 | 0 — 85 | 391 — 7 | 0 — 1

0 22 46 | 0 — 85 | 391 — 7 | 0 — 1

0 22 46 | 0 — 85 | 391 — 7 | 0 — 1

0 22 46 | 0 — 85 | 391 — 7 | 0 — 1

0 22 46 | 0 — 85 | 391 — 7 | 0 — 1

0 22 46 | 0 — 85 | 391 — 7 | 0 — 1

0 22 46 | 0 — 85 | 391 — 7 | 0 — 1

0 22 46 | 0 — 85 | 391 — 7 | 0 — 1

47. D. Milano cambia Scudo 1. Imperiale di Soldi 117. Imperiali per avere Soldi 155. di Banco di Venezia, e Cambia Soldi correnti 149. per avere in Roma Scudo 1. di Giulj x. Si domanda, essendo l' Aggio di Roma 1523. & il prezzo del Filippo di Soldi 106. Imperiali, e Soldi correnti 140. quanti Scudi d' oro Stampe di Roma resterà il Cambio per Ducati 100. di Banco di Venezia, per via di Milano?

R. Si comincia ad ordinare i numeri da Ducato 1. di Banco, perchè di Ducati 100. di Banco si fa la Domanda, che vanno in ultimo, come si è insegnato, dicendo, Ducati di Banco 1. uguale a Soldi 155. perchè un Ducato vale Lire 6  $\frac{1}{2}$ . Soldi 155. uguali a Soldi Imperiali 117. Soldi Imperiali 106. uguali a Soldi correnti 140. Soldi correnti 149. uguali a Scudo 1. di Roma di Giulj x. Scudi 1523. Aggio, uguali a Scudi d'oro Stampe 1000. In ultimo Ducati 100. di Banco a quanti Scudi d'oro Stampe saranno uguali? Si moltiplicano i numeri fanno 37281000. Pareitore, & i denari saranno di prodotto 2031188600. il quale partito, verranno di quoziente Scudi d'oro Stampe 54. Soldi 9. Denari 4. in circa.

1—124 | 155—117 | 106—140 | 149—1 | 1523—1000—100.  
Si risolve per Prova, per regole del Tre distinte, dicendo; Soldi di Banco 155. danno Soldi Imperiali 117. che daranno Soldi Imperiali 2466. uguali a Ducati di Banco 100. & daranno Soldi Imperiali 9360. Dipoi, se Soldi Imperiali 106. danno Soldi correnti 140. che daranno Soldi Imperiali 9360. & daranno Soldi correnti 12362. In oltre, se Soldi correnti 149. danno Scudo 1. di Giulj x. quanti ne daranno Soldi correnti 12362. & verranno Scudi 82. bajocchi 96. e mezzi quattrini 8. Finalmente se mezzi quattrini 1523. Aggio danno uno Scudo d'oro Stampe, quanti ne daranno mezzi quattrini 82968. & ne daranno Scudi d'oro Stampe 549.4 come per regola moltiplice.

Cambio doppj risoluto per regola del Tre moltiplice.

48. D. Uno di Fiorenza rimette Scudi d' oro 1600. per via di Roma a Venezia. Il Cambio da Roma a Fiorenza è a Scudi d'oro Stampe 73.  $\frac{1}{2}$  e da Roma a Venezia a Scudi d'oro Stampe 53.  $\frac{1}{2}$ . Si domanda quanti Ducati fur di Banco saranno in Venezia?

R. Si avverta, che i Mercanti non pongono il prezzo stabile, ma solo il variabile, siccome vedesi fatto nella Domanda. Lasciati Scudi d' oro 100. di Fiorenza, e Ducati 100. di Venezia, prezzi stabili, li quali già fra Mercanti si fanno, i numeri si ordinano così:

così: Già Scudi d' oro 1600. vanno in ultimo, de' quali si fa la Domanda. Scudi d' oro 100. uguali a Scudi d' oro Stampe 73  $\frac{1}{2}$ . Scudi d' oro Stampe 53  $\frac{1}{2}$  uguali a Ducati 100. di Banco: 100. di questi sono 120. correnti; e più brevemente 3. sono 6. mantenendo la medesima proporzione, che faranno 1600. & operato, come si è detto, verranno Ducati fuori di Banco 2649. Grossi 12.  $\frac{1}{2}$ . Il 100. sinistro, & il 100. destro s' annullano.

$$100 - 73\frac{3}{4} \quad | \quad 33\frac{1}{4} - 100 \quad | \quad 5 - 6 \quad | \quad 1600.$$

1 — 60	76 $\frac{1}{2}$ — 1	100 — 56 $\frac{1}{2}$	2700	10 — 3
0 — 60	153 — 2	300 — 170	2700	10 — 3
0 — 20	51 — 2	0 — 170	9	30 — 2
0 — 20	51 — 2	0 — 10	9	60 — 20
0 — 20	51 — 2	0 — 10	9	60 — 20

S. oro St. 1200

51. D. Sono stati rimessi in Londra da Roma Scudi 4530. di Giulij x. l'uno per via di Venezia, col Cambio da Roma a Venezia di Scudi d'oro Stampe 53  $\frac{1}{2}$  per Ducati 100. di Banco, e da Venezia a Londra col Cambio di Ducato di Banco 1 per Denari Sterlini 51  $\frac{1}{2}$ . Si domanda quante Lire Sterline faranno in Londra. i detti Scudi Aggio 1523.

R. Si comincia con l'Aggio, dicendo Sc. di Giulij x. 1523. uguali a Sc. d'oro St. 1000. Sc. d'oro St. 53  $\frac{1}{2}$  uguali a Ducati 100. Ducato 1. uguale a 51.  $\frac{1}{2}$ . a quanti Denari Sterlini faranno uguali Scudi 4530. Si faccia la moltiplicazione, e si moltiplichino i detti numeri 4530. 4. 1523. e 1000. Il prodotto si parta per 648798. prodotto di 1523. via 426. i numeri sinistri verranno Denari Sterlini 289758. che partiti per 12. vengono Soldi 24146. Denari 6. i quali si partono per 20. e vengono Lire Sterline 1207. 6. 6. che si cercavano.

1523 — 1000	53 $\frac{1}{2}$ — 100	1 — 51 $\frac{1}{2}$	4530.
1523 — 1000	426 — 100	0 — 415	4530.

52. D. Di Londra sono stati rimessi in Roma per via di Venezia Lire Sterline 1207.  $\frac{1}{2}$  col Cambio da Londra a Venezia di Sterlini 51  $\frac{1}{2}$ . Per Ducato di Banco da Venezia a Roma di Ducati di Banco 100. per Scudi d'oro Stampe 53  $\frac{1}{2}$ . Si domanda quanti Sc. di Giulij x. l'uno faranno in Roma? Aggio 1523.

R. Lire Sterline 1207.  $\frac{1}{2}$  si riducono in Denari 289766. li quali si pongono in ultimo luogo in primo luogo Denari 51  $\frac{1}{2}$ . come si vede in Carta, & operando secondo i dati insegnamenti, torneranno Scudi 4530. di Giulij x. l'uno.

1523 — 1000	53 $\frac{1}{2}$ — 100	1 — 51 $\frac{1}{2}$	289766.
415 — 0	100 — 426	1000 — 1523	289766.

Cambio doppio, col suo Ritorno, e Provisioni.

53. D. Di Roma si hanno a rimettere in Genova Scudi d'oro Stampe 1000. per via di Fiera. Il Cambio da Roma in Fiera è a Scudi d'oro Stampe 101  $\frac{1}{2}$  per Scudi Marche 100. e da Genova per Fiera

: Fiera à Scudi 119  $\frac{1}{2}$  per Scudi Marché 100: Donando essendo i  
 ritornati Scudi d'oro Stampe 101  $\frac{1}{2}$  & à Scudi 119  $\frac{1}{2}$  quanti Scu-  
 di d'oro Stampe torneranno in Roma con le Provisionsi folite di  
 1  $\frac{1}{2}$  e di  $\frac{1}{2}$  per 100.

Perchè si veda dove s'aggiunge la Provisione, & soddisaccia alla  
 Domanda per più regolo del Trè, dicentio: Scudi d'oro Stampe  
 101  $\frac{1}{2}$  danno Scudi Marché 100 che daranno 10002 e verranno  
 Scudi Marché 985.22. centesimi. Se Scudi Marché 100 danno  
 Scudi 119  $\frac{1}{2}$  di Genova; che daranno 985.22. e verranno Scudi  
 1174.87. centesimi, & i quali aggiunti Scudi 3.91. centesimo di  
 provisione &  $\frac{1}{2}$  per 100. faranno Scudi 1178.78. centesimi. Si fa-  
 cia il ritorno: Se 119  $\frac{1}{2}$  danno Scudi Marché 100. quanti ne di-  
 mancho 1178.78. e verranno Scudi Marché 987.85. & i quali ag-  
 giunti Scudi 3.94. Provisione di  $\frac{1}{2}$  per 100. faranno Scudi Marché  
 991.79. Utinano che se Scudi Marché 100 danno Scudi d'oro  
 Stampe 101  $\frac{1}{2}$  che Scudi 991.74. e verranno Scudi Stampe di ri-  
 torno 1003.64. centesimi cioè Soldi 12. Denari 8.

Per 1000000  $\frac{1}{2}$  per 100. faranno Scudi 1178.78. centesimi. Si fa-  
 cia il ritorno: Se 119  $\frac{1}{2}$  danno Scudi Marché 100. quanti ne di-  
 mancho 1178.78. e verranno Scudi Marché 987.85. & i quali ag-  
 giunti Scudi 3.94. Provisione di  $\frac{1}{2}$  per 100. faranno Scudi Marché  
 991.79. Utinano che se Scudi Marché 100 danno Scudi d'oro  
 Stampe 101  $\frac{1}{2}$  che Scudi 991.74. e verranno Scudi Stampe di ri-  
 torno 1003.64. centesimi cioè Soldi 12. Denari 8.

Per 1000000  $\frac{1}{2}$  per 100. faranno Scudi 1178.78. centesimi. Si fa-  
 cia il ritorno: Se 119  $\frac{1}{2}$  danno Scudi Marché 100. quanti ne di-  
 mancho 1178.78. e verranno Scudi Marché 987.85. & i quali ag-  
 giunti Scudi 3.94. Provisione di  $\frac{1}{2}$  per 100. faranno Scudi Marché  
 991.79. Utinano che se Scudi Marché 100 danno Scudi d'oro  
 Stampe 101  $\frac{1}{2}$  che Scudi 991.74. e verranno Scudi Stampe di ri-  
 torno 1003.64. centesimi cioè Soldi 12. Denari 8.

Provisione di  $\frac{1}{2}$  per 100. faranno Scudi 1178.78. centesimi. Si fa-  
 cia il ritorno: Se 119  $\frac{1}{2}$  danno Scudi Marché 100. quanti ne di-  
 mancho 1178.78. e verranno Scudi Marché 987.85. & i quali ag-  
 giunti Scudi 3.94. Provisione di  $\frac{1}{2}$  per 100. faranno Scudi Marché  
 991.79. Utinano che se Scudi Marché 100 danno Scudi d'oro  
 Stampe 101  $\frac{1}{2}$  che Scudi 991.74. e verranno Scudi Stampe di ri-  
 torno 1003.64. centesimi cioè Soldi 12. Denari 8.

Sc. oro St. 1003.64 Centesimi cioè Sol. 12. Den. 8.

Più spedatamente si risolve per regola moltiplice, aggiungendo  
 ultimo le Provisioni, tralasciandosi nell'ordinare i numeri di por-  
 re quattro volte Scudi Marché 100. perche vengono annullati fra  
 sé. Il primo ordine lo fanno 101  $\frac{1}{2}$  e 101  $\frac{1}{2}$ . Il 119  $\frac{1}{2}$  e 119  $\frac{1}{2}$   
 ponendo in ultimo Scudi d'oro Stampe 1000. Si operi, come  
 tante volte si è detto, verranno Scudi Stampe 996.74. centesimi  
 & aggiunti Scudi 3.94. centesimi &  $\frac{1}{2}$  per 100. e poi Scudi 998.98  
 centesimi

i centesimi a  $\frac{1}{4}$  per 100. Provisionsi, vèrrendo Scudi d'oro Stampe 1003. 64. centesimi, cioè Soldi 23. Dan. 8. come di là si scameate si vede.

Dalle sopradette Domande si conosce quanta commodità, e brevità apporti la regola del Trè moltiplicando ne' Cambj, ne quali si ricerca riduzione di Moneta immaginaria, in Moneta Reale: Ne' Cambj con i ritorni, e Provisionsi: Ne' spacci semplici, e composti in Fiera: ne' Cambj doppij; e sopra tutto ne' ragguagli di Piazze, per ritrovare il Cambio tra una Piazza, e l'altra servendo esso di sorta per ritrovare facilmente il modo d'operare: E però ho stimato bene farne le dette Domande, acciocchè poi nel Trattato particolare del Cambj, basti solo accennare tal regola, quando per essi si risolvano i quesiti senza averne allora a darne gli insegnamenti.

54. D. Avendo tolto a Censo Scudi 2000. a  $6\frac{1}{4}$  per 100 l'Anno; e datigli per Fiera de' Santi a 65. 10. che ritorno 679. ed il ritorno ricevuto in Cannella a Lire 145. il cento con 3. per 100 di Tara, e venduta con Tara  $\frac{1}{2}$  per 100. a Lire 160. Domando quanto mi torneranno in Borsa i sudetti Scudi 2000.?

R. Questa è la proposta ottava del Zucchetto a carte 93. il quale nel scioglierla era, postendo  $6\frac{1}{4}$  d'interesse sopra 100. e dicendo, per 106.8  $\frac{1}{4}$  doppi un Anno restano 100. ovvero 406.8  $\frac{1}{4}$  dopo mesi 3. restano 100. Onde, per bene operare si pigli il quarto di Scudi  $6\frac{1}{4}$ . per li mesi 3. quarta parte d'un'Anno, sarà Scudo  $1\frac{1}{4}$ . che si sottra da 100. restano Scudi 98  $\frac{1}{4}$ . perchè cosa chiara è, che se si pigliano Scudi 100. a Censo, a ragione di Scudi  $6\frac{1}{4}$  per 100. l'anno; passati mesi tre si paga Scudo  $1\frac{1}{4}$ . non rimangono più Scudi 100. ma 98  $\frac{1}{4}$ . che però il primo ordine lo fermeranno Scudi 100. è Scudi 98  $\frac{1}{4}$  per gli altri ordini, si facciano come esso Zucchetto, supponendo, che dove dice Tara debba dire dono; per i Paesi, dove la Tara si leva da 100. il che è più commune; Ridotti poi i numeri; e schisati saranno i numeri destri 787. 271. 103. 4. e 2. i finistri 79. 145. e 7. Si moltiplichino i destri, fanno di prodotto 175740168. il quale si parte 80185. prodotto de' numeri finistri, e verrà di quoziente questo numero di Scudi 2191. 238.  $\frac{1}{4}$ . e secondo il Zucchetto sono Scudi 2192. 5. 3. &c. da tornare in Borsa.

100	98 $\frac{1}{4}$	65. 10	679	103	105	160	2000
800	787	790	813	145	103	21	32
	787	79	271	145	103	7	32
	787	79	271	145	103	7	4

Adeffo



Adeffo fi risolva la medesima Proposta del Zucchetta per regole del Trè distinte, acciò chiaramente si veda quel che hò detto: Primieramente si trovi il frutto del Cenfo per mesi 3. dicendo: Se 100. in mesi 12. fruttano 6.  $\frac{2}{3}$ . che frutteranno 2000. in Mesi 3. e verranno 32.  $\frac{1}{2}$ . li quali si levino da 2000. restano 1967.  $\frac{1}{2}$ . Ma operando come il Zucchetta resterebbe 1968. — 4  $\frac{2}{3}$ . Il quale operare s' usa nelli Sconti, e non ne' meriti, del che à suo luogo. Ora si dica: Se Soldi 65. 10. tornano 67. 9. che torneranno Scudi 1967.  $\frac{1}{2}$ ? e verranno Scudi 2024.  $\frac{3}{4}$ . Di nuovo se 145. tornano 103. che torneranno 2024.  $\frac{3}{4}$ . e verranno 1438.  $\frac{1}{2}$ . Finalmente se 105. tornano 160. che torneranno 1438.  $\frac{1}{2}$ . e verranno Sc. 2191. 13. 8. &c. Come per Regola moltiplice.

Qui avverto, che il frutto, è interesse di Scudi 2000. del Cenfo vengono levati da Scudi 2000. & i restati sono mandati in Fiera. A me pare però, che non dovendosi pagare il frutto del Cenfo, se non passati mesi trè, si dovrebbero mandare in Fiera Scudi 2000. che col negozio di compra, e di vendita tornerebbero sc. 2227. 17. 9. da' quali levati scudi 32. soldi 10. di frutto del cenfo, resterebbero scudi 2195. soldi 7. Denari 9. il qual frutto bisogna trovare à parte, non potendosi connettere ne' termini della regola del Trè moltiplice.

$$\begin{array}{r} 65. 10 - 67. 9 \quad | \quad 145 - 103 \quad | \quad 105. 160 \quad | \quad 2000. \\ 2 / 20.00 - 6 \frac{2}{3} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10 \\ 120 \\ \hline 4 / 130 - \frac{1}{4} \text{ d' Ann.} \end{array} \quad \begin{array}{r} \text{Scudi } 2227. 17. 9 \\ 32. 10. - \text{ sottra} \\ \hline \text{Da imborfarsi Scudi } 2195. 7. 9. \end{array}$$

Frut. Scudi 32. 10

55. D. Avendo tolto à Cenfo Lire 2000. à Lire 6  $\frac{1}{2}$  per 100. l' Anno, e datele per Fiera de' Santi à soldi 169  $\frac{2}{3}$ . che ritornò à soldi 173.  $\frac{1}{3}$ . & il ritorno ricevuto in tanta Cannella è Lire 165. il centinaro, con libbre 3. per 100. di Tara, e vendutala con Tara di libbre 5. per 100. à Lire 180. il centinaro; Domando quante ritornano in borsa le sudette Lire 2000.?

R. Gio: Battista Pisani propone questa nel quesito decimoquarto della regola del Trè moltiplice, la quale poco varia, come è chiaro, da quella del Zucchetta, e come effo la risolve: Ma la soluzione loro è falsa, come hò già detto. Volendola rendere vera, e giusta, si muti il Cenfo in uno sconto, e la Tara in dono dicendo così.

P p

Uno è



$$\begin{array}{r}
 105 - 100 \mid 105 - 100 \mid 105 - 100 \mid 105 - 100 \mid 486.4.0 \frac{2}{3} \\
 21 - 20 \mid 21 - 20 \mid 21 \mid 20 \mid 21 - 20 \mid 486.4.0 \frac{1}{3}
 \end{array}$$

Scudi 400

58. D. Si vuol sapere come corrispondano le Mine di Genova in uguaglianza con Tomoli di Napoli in numero intero, e minore che si dia di Mine, e di Tomoli; sapendosi, che Mine 49. di Genova sono 144. Sesteri di Nizza, e Sesteri 184. sono Razzeri 49. di Larghero; e 15. Razzeri sono Starelli 46. di Cagliari, e Starelli 2432. sono Salme 449. di Sicilia; e Salme 11. sono 57. Tomoli di Napoli?

R. Gio. Battista Zucchetto nella Proposta 20. della regola moltiplice à Carte 109. trova la corrispondenza di Starelli 2432. di Cagliari uguali à Salme 429. di Sicilia. Io mi sono servito delle medesime misure, ed hò rivoltato il Quesito, cercando uguaglianza di Mine di Genova, con Tomoli di Napoli; Ma perchè questa uguaglianza si può dare trà numeri infiniti interi, e rotti, mi è parso bene restringerla trà due numeri, che siano interi, e minimi, acciò la risposta sia determinata, e ritornino i numeri proposti dall'Autore di mine 160. e Tomoli 351.

Nel Quesito non ci è Domanda di numero determinato, ò di tante Mine, ò Tomoli; però ci manca il numero ultimo solo; Onde si disporranno gl'ordini, ponendo uel primo luogo del primo ordine il numero 49. delle Mine di Genova, e gl'altri secondo che sono nominati, finendo con il numero destro di Tomoli 57. di Napoli. Si può ancora cominciare al contrario con Tomoli 57. di Napoli tornando indietro, e finire con Mine 49. di Genova; osservando di cominciare, e finire con le misure, che si vogliono uguagliare in numero diverso. Disposti i numeri, come si è detto, si moltiplicano i sinistri, lasciando 49. per essere anche 49. destre, annullandosi insieme, ed il prodotto 73835520. è di Mine di Genova; per trovarsi le Mine in luogo sinistro. Pure si moltiplicano i destri, lasciato 49. ed il numero prodotto 161976672. è di Tomoli di Napoli, per trovarsi li Tomoli in luogo destro, uguali alle dette Mine; Ma perchè questa uguaglianza si cerca trà minimi numeri, per 461472. Si partono le Mine 73835520. e verranno Mine 160. Per il medesimo si partono Tomoli 161976672. e verranno Tomoli 351. e viene soddisfatto alla Domanda, essendosi trovate Mine 160. di Genova uguali à Tomoli 351. di Napoli in numero intero, e minore, che si dia trà loro.

300.

49 — 144 | 184 — 49 | 15 — 46 | 2432 — 429 | 11 — 57.

0.

15

0

57

2760

2432

5520

8280

11240

5520

6712320

11

per 461472/73835520 Mine

2768832

— 0

Mine 160. di Genova.

3003

2145

24453

46

146718

97812

1124838

144

4499352

4499352

1124838

Per 461472 | 161976672 Tomoli.

2353507

Tomoli di Napoli 351

461472

Da questi due numeri di Misure si può arguire a trovarne altri, per regola del Trè, dicendo per esempio: Mine 160. sono uguali à Tomoli 351. Mine 100. à quanti Tomoli faranno uguali? e verranno Tomoli  $219\frac{1}{4}$ . &c.

Resterebbero alcune Domande di regola del Trè moltiplice roverscia, e mescolata; Mà perchè si risolvono per lo più per regola del cinque, ò del sette roverscia, che già si è insegnata; Si tralasciano per incominciare i Trattati particolari di tutto l' Abbaco, ne' quali si porranno in opera le Regole infino ad ora insegnate.



TRAT-

# TRATTATO QUINTO

## Delli Guadagni, e Perdite à ragione di un tanto per Cento

*Nel vendere, e comprare Mercanzie.*

### DISTINZIONE PRIMA.



L Mercante, che compra Mercanzie all'ingrosso, per venderle à minuto, può lecitamente ricevere qualche guadagno per la fatica, & incommodo, che hà in tal vendita: Et ancora nel vendere all'ingrosso, quando per sua industria fa venire Mercanzie da Paese, dove s'iano à buon mercato, e le vende in luogo dove più si stimano. Può avvenire ancora, che compri Mercanzie in un medesimo luogo à prezzo infimo, e le venda à prezzo mediocre, ò sommo, ovvero se compri à prezzo mediocre, e le venda à prezzo sommo ( si parla di Mercanzie di prezzo naturale, e non legale, il quale è indivisibile, secondo lo Statuto. ) Può avvenire ancora, che compri Mercanzie à vil prezzo, e con il tempo riacarino; in questo però è soggetto molte volte alla perdita. Per trovare dunque questo guadagno, e perdita, e quanto per 100. per sapere limitare il prezzo alle Mercanzie, si fanno le seguenti Domande.

1. D. Uno hà comprato Mercanzie per Scudi  $872 \frac{2}{3}$ . e le rivende per Scudi  $981 \frac{1}{4}$ . Si vuol sapere quanti Scudi guadagni per 100.  
R. In due modi si sodisfa à questa Domanda, servendo uno di prova all' altro. Nel primo si dice, se Scudi  $872 \frac{2}{3}$  si fanno Scudi  $981 \frac{1}{4}$  che si farà di 100. Et operato secondo la regola del Trè, vengono Scudi  $112 \frac{2}{3}$ . da' quali sottratti Scudi 100. restano Scudi  $12 \frac{2}{3}$  di guadagno. Nel secondo modo, da Scudi  $981 \frac{1}{4}$  si sottrano Scudi  $872 \frac{2}{3}$  restano Scudi  $109 \frac{1}{4}$ . e si dice: se Sc.  $872 \frac{2}{3}$ . guadagnano Scudi  $109 \frac{1}{4}$ . quanti ne guadagneranno Scudi 100. e verranno Scudi  $12 \frac{2}{3}$ . come per l'altro modo, e tanti ne guadagnerà per 100. il Mercante.

2. D. Un Mercante compra Mercanzie per Sc.  $872 \frac{2}{3}$ . Si domanda quanti Scudi le rivenderà per guadagnarci Scudi  $12 \frac{2}{3}$  per 100.

R. Questa è la passata rivoltata per prova, la quale pure in due modi si risolve; Prima dicendo: se 100. tornano col guadagno

Sc. 112

Sc. 112.  $\frac{2}{3}$  che torneranno Scudi 872  $\frac{2}{3}$ . e torneranno Scudi 981  $\frac{1}{2}$ .  
 Ovvero si dica: se Scudi 100. guadagnano Scudi 12  $\frac{1}{2}$ . quanti ne  
 guadagneranno Scudi 872  $\frac{2}{3}$ . e verranno Scudi 109.  $\frac{2}{3}$ . li quali si  
 sottranno con Scudi 872  $\frac{2}{3}$ . e torneranno Scudi 109.  $\frac{2}{3}$ . e tanti  
 Scudi rivenderà le Mercanzie con detto guadagno.

3. D. Uno vende Mercanzie per Scudi 981  $\frac{1}{2}$  e fa il suo conto, che  
 guadagna Scudi 12  $\frac{1}{2}$ . per 100. Si vuol sapere quanti Scudi, spese  
 egli in dette Mercanzie?

R. Eccola rivoltata in altro modo. Si sommino Scudi 100. e Scudi  
 12  $\frac{1}{2}$  fanno Scudi 112  $\frac{1}{2}$ . Ora si dica: se Scudi 112  $\frac{1}{2}$ . levato il gu-  
 dagno, sono Scudi 100. che saranno Scudi 981  $\frac{1}{2}$ . e saranno Scudi  
 872  $\frac{2}{3}$ . e tanti Scudi spese. Ovvero si dica: se Scudi 112  $\frac{1}{2}$  con-  
 tengono Scudi 12  $\frac{1}{2}$  di guadagno, quanti ne conterranno Scudi  
 981  $\frac{1}{2}$ . e verranno Scudi 109  $\frac{2}{3}$ . che sottratti da Scudi 981  $\frac{1}{2}$  re-  
 steranno Scudi 872  $\frac{2}{3}$ . spesi in compra di tali Mercanzie.

4. D. Uno compra Seta a Lire 18  $\frac{1}{2}$  la libbra, e poi, per bisogno la  
 rivende Lire 19. Si domanda quanto perda per 100.

R. Qui si deve avvertire, che la Domanda si fa per 100 di Moneta,  
 e non per 100 di Mercanzia; e si vuol sapere, con impiegare Li-  
 re 100. in Seta: quanto si venga a perdere, e non per Libbre 100.  
 che si comprino, e vendano, e così se' guadagni per 100. l'istesso  
 si deve intendere. Onde si dica: se Lire 18  $\frac{1}{2}$  con la perdita,  
 tornano Lire 19. che torneranno Lire 100. e operando torneran-  
 no Lire 80. che fino in 100. ci vogliono Lire 20. e tante si perdo-  
 no per 100. Ovvero si sottrino Lire 15. da Lire 18  $\frac{1}{2}$ . restano Lire  
 13  $\frac{1}{2}$ . per il che si dice: Se in Lire 18  $\frac{1}{2}$  si perdono Lire 3  $\frac{1}{2}$ . quan-  
 te in Lire 100. verranno Lire 20. di perdita, come per l'altro  
 modo.

5. D. Un Mercante ha comprato braccia 43  $\frac{1}{2}$  di Panno per Lire  
 145. 16. 8. Si domanda quanto lo venderà il braccio per guada-  
 gnarci 10. per 100.

R. Prima si veda quanto ha comprato il braccio, dicendo: Brac-  
 cia 43  $\frac{1}{2}$ . costano Lire 145. 16. 8. quanto braccio 1. e vengono  
 Lire 3. 6. 8. Ora si dica: Se 100. devono tornare col guadagno  
 10. che Lire 3. 6. 8. e torneranno Lire 3. 13. 4. e tanto venderà  
 il braccio detto Panno. Oppure si dica: Se 100. tornano 110.  
 col guadagno, che torneranno Lire 145. 16. 8. e torneranno Li-  
 re 160. 8. 4. E se braccia 63  $\frac{1}{2}$ . si devono vendere Lire 160. 8. 4.  
 per guadagnare 10. per 100. quanto si doverà vendere un brac-  
 cio? Et operando come si è insegnato, ne verranno Lire 3. 13.  
 4 per il prezzo di vendita d'un braccio.

6. D. Uno ha comprato braccia 43  $\frac{1}{2}$  di Panno per Lire 145. 16. 8.  
 e lo ven-

e lo vende il braccio Lire 3. 13. 4. Domandò quanto guadagna per 100.

R. E' manifesto, che se la passata è stata ben risolta, ne deve venire 10. per 100. di guadagno. Si valutino braccia  $43 \frac{1}{4}$  a Lire 3. 13. 4. il braccio, valeranno Lire 160. 8. 4. dalle quali si sottrano Lire 145. 16. 8. restano Lire 14. 11. 8. Onde si dice: Se Lire 145.  $\frac{1}{4}$  guadagnano Lire 14. 11. 8. che Lire 100. e verranno Lire 10. quante dovevano venire.

7. D. Un Mercante ha venduto Seta a Scudi 3. Lire 5. 6. 6. la libbra con guadagno di Scudi 12.  $\frac{2}{3}$  per 100. e ne ha vendute tante libbre, che in tutto ha guadagnato Scudi 35. Lire 2. 13. Si domanda quante libbre n'abbia vendute, e quanto gli costava la libbra?

R. Per trovare quanto gli costava la libbra, s'aggiungono a Scudi 100. gli Scudi 12  $\frac{2}{3}$ . fanno Scudi 112  $\frac{2}{3}$ . e si dice Se 112  $\frac{2}{3}$  torha senza guadagno 100. che torneranno Scudi 3. 5. 6. 6. prezzo d'una libbra? e verranno Scudi 3. Lire 2. 8. e tanto gli costava la libbra. Si sottrino Scudi 3. 2. 8. da Scudi 3. Lire 5. 6. 6. restano Scudi — Lire 2. 18. 6. guadagno d'una libbra; e se Lire 2. 18. 6. si guadagnano dalla vendita d'una libbra; dalla vendita di quante libbre si guadagneranno Scudi 35. Lire 2. 13. e verranno da libbre 84. once 8. e tante ne vendè.

8. D. Uno ha comprato libbre 84. once 8. di Seta a Sc. 3. Lir. 2. 8. la libbra, e la vendè a Scudi 3. 5. 6. 6. Si domanda quanto guadagna per 100. & in tutto?

R. Questa serve di prova alla passata: si sottrino Scudi 3. 2. 8. da Scudi 3. 5. 6. 6. restano Lire 2. 18. 6. Per il che si dica: se Sc. 3. 2. 8. guadagnano nella vendita Lir. 2. 18. 6. che guadagneranno Sc. 100. e verranno Sc. 12  $\frac{2}{3}$ . Di nuovo se in una Libbra si guadagnano Lire 2. 18. 6. quanti Scudi di Lire 7. l'uno si guadagneranno in Libbre 84.  $\frac{1}{4}$ ? Si faccia la moltiplicazione, e verranno Sc. 134. Lire 2. Soldi 13. e perchè torhano i numeri, che si proposero nell'altra Domanda, segno è star bene.

9. D. Uno compra Canne 14. di Panno di Braccia 4. per Canna a misura Fiorentina, qual Panno vende a ragione di Lire 3. 16. 8. il braccio, e trova perdere a ragione di Lire 4. per 100. si domanda quanto spende nella Canna, e la perdita in tutto?

R. Per trovare quanto spende nella Canna nel comprare il Panno, si veda quanto la vendè, con moltiplicare Lir. 3. 16. 8. per 4. verranno Lir. 13. 6. 8. Ora si levi 4. da 100. resta 96 e si dica: Se 96. con la perdita era 100. senza perdita, che saranno Lire. 15. 6. 8. e risulteranno dall'operazione Lire 19. 19. 5.  $\frac{1}{2}$  e tante ne spende nella compra d'una Canna. Adesso si sottrino Lire 15. 6. 8. da

Lire 15. 19.  $5\frac{2}{3}$  e restano Soldi 12.  $9\frac{2}{3}$  perdita in una Canna, li quali moltiplicati per Canne 14. viene la perdita in tutto, di Lir. 8. 18. 10. & è fatta.

Per farne prova per regola del Trè, si dica: Se in Lire 15. 19.  $5\frac{2}{3}$  si perdono Soldi 12.  $9\frac{2}{3}$  quante se ne perdono in Lire 100.? ed operato, verranno Lire 4. quante si disse perdere.

10. D. Uno ha comprato il 100. del Lino per tanto, che se l'avesse pagato Lire 1. 13. 4. più, e vendutolo poi Lire 29. avrebbe guadagnato Lire 16. per Lire 100. si domanda quanto gli costava il 100. del Lino di compra?

R. Si sommi 16. col 100. fa 116. e dicasi 116. era 100. senza guadagno, che saranno Lire 29. Si moltiplichi, e parta, faranno Lire 25. e tante gli sarebbe costato il 100. del Lino, se l'avesse pagato più Lire 1. 13. 4. Dunque l'ha pagato meno; per questo si sottri Lira 1. 13. 4. da Lire 25. restano Lire 23. 6. 8. che realmente spese nel 100. del Lino. Si prova con sottrarre da Lire 29. le Lire 25. restano Lire 4. onde si dica: Se Lire 25. danno di guadagno Lire 4. che daranno Lire 100. e verranno Lire 16. come si disse.

11. D. Uno ha comprato una Canna di Panno per tal prezzo, che se l'avesse pagata Lire 2. meno, e l'avesse venduta Lire  $15\frac{2}{3}$ . avrebbe guadagnato Lire 29. 3. 4. per 100. Domando, per quanto l'abbia comprata?

R. Si faccia così, dicendo: Lire 129.  $\frac{2}{3}$ . di guadagno vengono da Lire 100. da quante Lire verranno Lire  $15\frac{2}{3}$ .? ed operando, si troverà, che verranno da Lire 12. alle quali s'aggiungono Lire 2. e fanno Lire 14. e per tante comprò la Canna del Panno. Per farne prova, si sottrano Lire 12. da Lire  $15\frac{2}{3}$ . restano Lire  $3\frac{2}{3}$ . e si dice: Se Lire 12. guadagnano Lire  $3\frac{2}{3}$ . quante ne guadagneranno Lire 100.? Ed operando, verranno Lire 29. 3. 4. quante si disse.

12. D. Uno compra una quantità di braccia di Panno per tal prezzo, che vendendolo Lire 5. Soldi 15. guadagna in tutto Lire 21. e vendendolo 6. 6. 8. il braccio, guadagna Lire 37. 6. 8. Domando quante braccia di Panno erano, e per quanto lo compra il braccio?

R. Da Lire 6. 6. 8. si sottrano Lire 5. 15. restano Soldi 11. 8. ancora; Da Lire 37. 6. 8. si sottrano Lire 21. restano Lire 16. 6. 8. dipoi si dice: Se Soldi 11. 9. differenza si ha da braccio 1. da quante braccia s'averà l'altra differenza di Lire 16. 6. 8.? e si averà da braccia 28. Ora se braccio 1. Lire 5. 15. che valeranno braccia 28.? e verranno Lire 161. dalle quali levate Lire 21. di guadagno, restano Lire 140. le quali si partono per braccio 28. e vengono Lire 5. e per tante compra il braccio del Panno, & in tutto braccia 28.

13. D.



13. D. Un Mercante comprò libbre 2560 di Lana; con Tara di libbre 5; per 100. à ragione di Lire 48. 6. 8. per 100. Domando quanto le dovrà vendere per guadagnarci 25; per 100. vendendole però senza Tara?

R. Si moltiplicano libbre 2560 per 5. dal prodotto 12800. si levano due zeri per la partizione di 100. restano libbre 128. di Tara le quali si sottrano da 2560. restano libbre 2432. le quali se si apprezzano à Lire 48. 6. 8. il 100. vengono Lire 1175. 9. 4. e per tante comprò le libbre di Lana. Volehdole vendere con guadagno di 25. per 100. si dica. Se 100. deve tornare 125. ovvero 4. deve tornare sì che tiene la medesima proporzione, che torneranno Lire 1175. 9. 4. & operato verranno Lire 1469. 6. 8. e per tante dovrà vendere libbre 2560 che verranno à Lire 37. 7. 11. per 100.

14. D. Uno ha comprato libbre 2560 di Lana; con Tara di libbre 5. per 100. Pagandole Lire 48. 6. 8. il 100. e le rivende senza Tara Lire 57. 7. 11. pure il 100. Si domanda quanto guadagni per ogni 100. Lire impiegate in tal Mercanzia?

R. Se Lire 48. 6. 8. tornano Lire 57. 7. 11. che torneranno Lire 100. e torneranno Lire 118. 15. Adesso si sottra 5. da 100. restano 95. e le libbre 95. netto di Tara tornano libbre 100. con la Tara, che torneranno libbre 118. 15. e verranno Lire 125. dalle quali sottratte 100. restano Lire 25. di guadagno per 100. che si volevano.

15. D. Uno compra il cento del Lino per Lire 45. à Denari contanti; e lo rivende per Lire 48. tempo à pagamento Mesi 9. Domando quanto guadagna per 100. l' Anno?

R. Si sottrano da Lire 48. le Lire 45. restano Lire 3. Adesso per regola del Frè composta; Se Lire 45. in Mesi 9. guadagnano Lire 3. quante ne guadagneranno Lire 100. in Mesi 12. & operato ne verranno Lire 8. 3. e tante ne guadagna per 100. l' Anno.

16. D. Uno compra il cento del Lino per Lire 45. à Denari contanti; e lo vende per tante Lire, tempo à pagamento Mesi 9. che trova guadagnarci Lire 8. 3. per 100. l' Anno. Si domanda per quante Lire lo vende il cento.

R. Se la Eccezione passata è ben fatta, devono tornare Lire 48. col guadagno. Per regola del cinque si dica; Se Lire 100. in Mesi 12. guadagnano Lire 8. 3. che guadagneranno Lire 45. in Mesi 9. & moltiplicate Lire 8. 3. per 9. fa 80. questo si moltiplica per 45. fa 3600. il quale si parte per 100. prodotto di 12. via 100. vengono Lire 3. di guadagno, che aggiunte à Lire 45. fanno Lire 48. per quante le vende il 100.

17. D. Uno compra il 100. del Zucchero Lire 56.  $\frac{2}{3}$ . tempo à pagamento Mesi 10. e lo vende il medesimo giorno Lire 58. ad un'altro facendoli tempo Mesi 15. Si domanda, che guadagnerà per 100. l'Anno?

R. Prima si sottrano Lire 56  $\frac{2}{3}$  da Lire 58. resta Lira. 1  $\frac{1}{3}$ . Medesimamente si sottrano Mesi 10. da Mesi 15. restano 5. onde si dica; Se in Mesi 5. si guadagna Lira 1  $\frac{1}{3}$ . quanto in Mesi 12. e si guadagneranno Lire 3  $\frac{1}{3}$ . Di nuovo: Se con Lire 56  $\frac{2}{3}$  si guadagnano Lire 3  $\frac{1}{3}$ . quante con Lire 100? e verranno Lire 5  $\frac{1}{3}$ . e tante ne guadagnerà per 100. l'Anno.

18. D. Uno compra il 100. della Lana Lire 50. tempo à pagamento Mesi 8. e la rivende in contanti Lire 48. Si domanda quanto perda per 100. l'Anno?

R. Da Lire 50. si sottrano Lire 48. restano Lire 2. di perdita; Perchè si dica; Se in Mesi 8. con Lire 50. di spesa si perdono Lire 2. quante se ne perderanno con Lire 100. in Mesi 12? cioè in un' Anno? & operato per regola del 5. risulteranno Lire 6. per la perdita in un' Anno con Lire 100.

19. D. Uno compra il 100. della Lana per Lire 50. tempo à pagamento Mesi 8. e la rivende in contanti una quantità di Lire, con perdita di Lire 6. per 100. l'Anno. Si domanda, per quante Lire rivende il 100. della Lana?

R. Si dica così; Lire 100. in un' Anno danno di perdita Lire 6. quante Lire daranno di perdita Lire 50. in Mesi 8? e verranno Lire 2. le quali si sottrano da Lire 50. restano Lire 48. e per tante rivende il cento della Lana in contanti; Ovvero per due regole del Trè: Se in Mesi 12. si perdono Lire 6. quante in Mesi 8? si perdono Lire 4. e se con Lire 100. si perdono Lire 4. quante con Lire 50? e si perdono Lire 2. le quali si sottrano da 50. e restano Lire 48. &c.

20. D. Uno ha comprato da un'altro libbre 1250. di Seta, per tempo Mesi 12. à Lire 21. la libbra, ed egli l'ha rivenduta per Denari contanti Lire 17.  $\frac{1}{2}$  la Libbra. Si domanda quanto verrebbe à perdere per 100. l'Anno?

R. Il Forellani à carte 69. dice; Un certo Maestro d' Abbato detto il Mazzuolo, il quale sta in Pisa la risolve così, dice: Se Lire 17  $\frac{1}{2}$  mi danno di perdita Lire 3.  $\frac{1}{2}$ . quanto mi darà 100? per la qual cosa gli dà di perdita 20. e tanto dice, che perderebbe in Mesi 12. Dipoi dice così: Se in Mesi 12. si perde 20. quanto si perderà in 12. Mesi? per il che si perderebbe 12  $\frac{1}{2}$  per 100. la qual cosa è falsissima; così egli. Certo è che perde Lire 21. e non Lire 17  $\frac{1}{2}$ . Onde per regola del 5. si dice; Se con Lire 21. in Mesi

Mesi 18. si perdono Lire  $3 \frac{1}{2}$ . con Lire 100. in Mesi 12. quante si perderanno? e verranno Lire  $11 \frac{1}{2}$ . come al Forestani per due regole del Trè.

21. D. Uno ha comprato da un' altro lib. 1250. di Seta per tempo Mesi 18. a Lire 21. la libbra, ed egli l'ha rivenduta per denari contanti Lire  $17 \frac{1}{2}$  la libbra. Si domanda a quanto per cento doverà dare a frutto le Lire ricevute nella vendita, acciò non guadagni, ne perda?

R. Opera per questa Domanda come ha fatto il Mazzuolo nell' antecedente, e verranno Lire  $13 \frac{1}{2}$ . e a tante le doverà dare a frutto, per non perdere, ne guadagnare. Si provi: Si apprezzino Lib. 1250. a Lire  $17 \frac{1}{2}$ . valeranno Lire. 21875. le quali date a frutto a Lire  $13 \frac{1}{2}$ . per Mesi 18. ducendo: Lire 100. in Mesi 12. fruttano Lire  $13 \frac{1}{2}$ . che frutteranno Lire 21875. in Mesi 18. e frutteranno Lire 4375. le quali aggiunte a Lire 21875. fanno Lire 26250. quante ne spese in Lib. 1250. a Lire 21. la Libbra, da pagare dopo Mesi 18.

22. D. Uno compra Mercanzie per Sc. 480. e nell' istesso giorno le rivende Sc. 540. da pagarle in Anni 3. a Sc. 180. per Anno. Si domanda quanti Scudi guadagna per 100. l' Anno in tal Negozio.

R. Del ridurre e più pagamenti ad un sol pagamento si tratterà a suo luogo. Per adesso s' aggiunge 1. ad Anni 3. fanno 4. la metà 2. sono Anni, dopo i quali riceverebbe tutti li Sc. 540. senza danno delle parti. Si sottrano Scudi 480. da Sc. 540. restano Scudi 60. guadagnati in Anni 4. però si dica: Se Sc. 480. in Anni 2. guadagnano Scudi 60. che guadagneranno Scudi 100. in un' Anno? Et operando secondo si è insegnato nella Regola del 5. verranno Sc.  $6 \frac{2}{3}$ . e tanti ne guadagna per 100. l' Anno in tal Negozio.

23. D. Uno compra Mercanzie per Sc. 480. e nel medesimo giorno le rivende per tanti Scudi, da pagarle in 3. Anni, con essergli pagata ugual porzione ogn' Anno, che fa il suo conto guadagnare Sc.  $6 \frac{2}{3}$ . per 100. l' Anno. Si domanda per quanti Scudi le rivenda?

R. Come si è detto nell' antecedente si aggiunge 1. ad Anni 3. fanno 4. la metà 2. sono Anni, dopo i quali ricevendo tutti li Scudi, è come se ricevesse ugual porzione ogni Anno delli 3. Ora per regola del 5. Sc. 100. in 1. Anno guadagnano Sc.  $6 \frac{2}{3}$ . che guadagneranno Sc. 480. in Anni 2. e verranno Sc. 60. i quali sommati con Sc. 480. fanno Sc. 540. e per tanti le rivende, come si disse, nella passata.

24. D. Uno ha fatto venire in Fiorenza da Venezia Cera per Lire 324. 13. 4. & ha speso in Porto, e Gabella Lire 35. 6. 8. Si domanda per quante Lire dovrà rivendere detta Cera per guadagnarci 2. per 100.

Q. q. 2

R. A' Li-

B. A' Lire 324. 13. 4. s' aggiungano Lire 35. 6. 8. fanno Lire 360. e per Regola del Trè: Se 100. deve tornare 108, che torneranno Lire 360? Et operato, torneranno Lire 388. Soldi 16. e per tante deve rivendere la Cera

25. D. Uno ha speso una quantità di Lire in Cera, la quale ha rivenduto con guadagno di Lire 8. per 100. Si domanda: havendo guadagnato in tutto Lire 28. Soldi 16. quante Lire abbia speso, e per quante abbia rivenduto la Cera?

R. Facilmente si trova con dire: Lire 8. viene da 100. da quali Lire verranno Lire 28  $\frac{1}{2}$ ? & operato verranno da Lire 360. e tante ne spese; alle quali aggiunta Lire 28. Soldi 16. fanno Lire 388. Soldi 16: per quante rivende la Cera?

26. D. Uno compra libbre 1450. di Lana lorda a Lire 42. il 100. e la fa lavare, & asciugare, e gli cala libbre 10. per 100. Volendo la adesso rivendere con guadagno di Lire 10. per 100. quanto l' apprezzerà il 100.

R. Primieramente trovisi il calo, dicendo: 100. tornano 90. quante torneranno libbre 1450? e verranno libbre 1305. Adesso, se libbre 100. costano Lire 42. quante Lire costeranno libbre 1450? e verranno Lire 609. Di nuovo libbre 1305. costano Lire 609. che costeranno 100. e verranno Lire 46  $\frac{2}{3}$  e per tante le rivenderebbe senza guadagnarci il cento; Mà per trovare il guadagno di 10. per 100, si dica: 100. deve guadagnare 10. che guadagneranno Lire 46  $\frac{2}{3}$ ? e verranno Lire 4  $\frac{2}{3}$ . che aggiunte a Lire 46  $\frac{2}{3}$  fanno Lire 51  $\frac{2}{3}$ . e per tante le deve apprezzare il cento per il detto guadagno.

Mà per regola moltiplice si farà brevemente dicendo: Libbre 90. nette sono 100. lorde, e libbre 100. lorde costano Lire 42. Lire 100. col guadagno devono tornare 110. che costeranno libbre 100. nette? Operando come si è insegnato nella distinzione quinta, con annullare due centinaja destre; e due sinistre, un zero dextro, e sinistro, resta 42. da moltiplicarsi per 11. il prodotto 462. si parte per 9. e verranno Lire 51  $\frac{2}{3}$ . &c.

90 — 100 | 100 — 42 | 100 — 110 | 100. Lire 51  $\frac{2}{3}$

27. D. Uno avendo comprato Lana lorda a Lire 42. il 100. la quale ha fatto lavare, & asciugare, & è calata 10. per 100. ha poi venduto il 100. delle libbre nette Lire 51.  $\frac{2}{3}$ . Si domanda quante Lire ha guadagnato per 100.?

R. Brevemente per regola moltiplice. Se Lire 42. si fanno Lire 51.  $\frac{2}{3}$ . libbre lorde 100. tornano nette 90. che torneranno Lire 100.? Si annulla un centinajo dextro, & uno sinistro. Si moltiplichi dunque 51  $\frac{2}{3}$  per 90. fa 4620, il quale si parte per 42. e ne viene 110.

42 ) 4620

110

dal qua

dal quale si sottrai 100. e resta 10. per le Lire di guadagno.

$$\begin{array}{r} 42 - 51 \frac{1}{2} \quad | \quad 100 - 90 \quad | \quad 100. \text{ Lire } 110. \\ \hline 90 \\ \hline 30 \\ \hline 459 \end{array} \quad \begin{array}{r} 110 \\ \hline 100 \end{array}$$

Lire 10 per cento

Per 42 — 4620  
110

28. D. Uno vende 10. per 15. e trova guadagnare 20. per 100. Si domanda: Vendendo 18. per 21. se guadagnerà, o perderà, e quanto per 100.?

R. Per intendere bene la Domanda si spiega così: Uno vende lib. 10. d'alcuna Mercanzia per Lire 15. con guadagno di Lir. 20. per 100. Se vendesse libbre 18. della medesima Mercanzia per Lir. 21. guadagnerebbe, o perderebbe, e quanto per 100? Per soddisfare a questa Domanda, bisogna trovare quante Lire gli costino le libbre 10. e si fa così: S'aggiungono 20. a 100. fa 120. e si dice: Se 120. sono 100. levato il guadagno, che saranno Lire 15? Ovvero, se 61. sono 5. che saranno Lire 15? e verranno Lire 12  $\frac{1}{2}$ . o pure si parte 15. per 6. il quoziente 2  $\frac{1}{2}$  si sottra da 15. e verranno Lire 12  $\frac{1}{2}$ . e tante gli costano libbre 10. però si dica: Se libbre 10. vagliono Lire 12  $\frac{1}{2}$ . che valeranno libbre 18? e verranno Lire 22  $\frac{1}{2}$ . e per tante le dovrebbe vendere, per non perdersi, ne guadagnarci: ma le vende per Lire 21. dunque in Lire 22  $\frac{1}{2}$ . perde Lire 1  $\frac{1}{2}$ . che perderà in 100? ed operando si troverà perderà Lire 6  $\frac{2}{3}$  per 100.

29. D. Uno vende libbre 18. per Lire 21. e perde Lire 6  $\frac{2}{3}$  per 100. Si domanda volendo guadagnare 20. per 100. per quante Lire dovrà vendere libbre 10?

R. Brevemente per regola moltiplice: libbre 18. Lire 21. Lire 93  $\frac{1}{2}$  con la perdita sono Lire 100. Lire 100. col guadagno, sono Lire 120. che varranno libbre 10? Fatta l'operazione verranno Lire 15. e per tanto le dovrà vendere.

30. D. Uno compra un credito di Scudi 1000. per Scudi 600. li quali detto Compratore sborfa attualmente, fatto il Contratto, poi ha da riscuotere detto Credito in Anni 10. cioè Scudi 1000. in fine di ciascuno di essi 101. Anni: Si domanda, quanto guadagna per 100. all'Anno detto Compratore del suo Capitale e merito semplice?

R. Il Tartaglia sodisfa a questa Domanda, per Algebra; ma senza essa si opera così: Le dieci riscossioni di Scudi 100. per Anno, si ridu-

310

si riducono ad una riscossione di Scudi 1000. dopo Anni  $5\frac{1}{2}$ . ag-  
giungendo ad Anni 10. uno fanno 11. li quali si partono per 2. e  
vengono Anni  $5\frac{1}{2}$ . che però si dice: Se Scudi 600. in Anni  $5\frac{1}{2}$ .  
guadagnano Scudi 400. che guadagneranno Scudi 100. in Anno  
1. ed operato verranno Sc.  $12\frac{1}{2}$  di guadagno.

Anni 10      Se Sc. 600. — An.  $5\frac{1}{2}$  — Sc. 400 — Sc. 100 — An. 1.

1	11	11	2
8 / 11	66100		200
			400
An. $5\frac{1}{2}$			80000

Guadagno Sc.  $12\frac{1}{2}$  140

$\frac{1}{2}$  schif.  $\frac{1}{2}$

31. D. Uno comprò una Mercanzia il dì 16. Luglio 1708. per Scud.  
1450. sborsandogli alPora, e poi la vendè il dì 16. Ottobre 1710  
per Scudi 1800. ad essergli pagati in Anni 6. à Scudi 300. l' An-  
no. Si domanda quanto guadagna per 100. l'Anno del suo Ca-  
pitale?

R. Si riducono li sei pagamenti ad un solo, con aggiungere ad An-  
ni 6. uno, fa 7. il quale si parte per 2. e vengono Anni 3. Mesi 6.  
dopo li quali ricevendo li Scudi 1800. è come se li ricevesse à  
Scudi 300. in 6. Anni, per ciascun Anno; Si veda quanto tempo  
ei corre da' 16. Luglio 1708. fino a' 16. Ottobre 1710. che sarà  
d'Anni 2. Mesi 3. li quali si sommano con Anni 3. Mesi 6. fanno  
Anni 5. Mesi 9. Però, per regola del cinque si dica: Se Scudi 1450.  
in Anni 5. Mesi 9. guadagnano Scudi 350. che guadagnano Scu-  
di 100. in Anno 1. ed operato vengono Scudi  $4\frac{1}{2}$  di gua-  
dagno.

An. 6.	1710. 9. 16	Sc. 1450 — $5\frac{1}{2}$ — Sc. 350 — Sc. 100 A. 1.
1.	1708. 6. 16	23 — 4
		23 140000
per 2.7	An. 2. 3. —	4350 660
An. 3. 6		Schifato $\frac{1}{2}$
2. 3		2900 3335
		333510

An. 3. 9 Guadag. per 100. — Sc.  $4\frac{1}{2}$

32. D. Uno vende una Mercanzia per Lire 22. e guadagna alquan-  
to Lire per 100. Vende dipoi un'altra Mercanzia, che gli costava  
Lire 5. più della prima, per Lire 28. e guadagna Lire 2. più per  
100. che nella prima Mercanzia. Si domanda, che gli costò la  
prima Mercanzia? &c.

R. Per

R. Per regola di modo cavata dall'Algebra: Da Lire 28. si levano Lire 5. più, che costava la seconda Mercanzia; restano Lire 23. Dal cento si levano Lire 2. più di guadagno: restano 98. le quali si moltiplicano per 5. fanno 490. Si moltiplicano Lire 23. per 100. fanno 2300. Dure Lire 22. per 100. fanno 2200. e questo per 5. fa 11000. il quale si parte per 2. ne viene 5500. da 2200. si sottra 490. resta 1740. che si sottra da 2300. resta 560. che si parte per 2. e viene 280. il quale si quadra fa 78400. e perchè andava quadrato la metà, cioè 147  $\frac{1}{2}$ . Si parte 78400. per 4. e viene 19600  $\frac{1}{4}$ . dal quale si sottra 5500. resta 14100  $\frac{1}{4}$ . dal quale si cava la radice quadra che è 127  $\frac{1}{2}$ . che si sottra da 147.  $\frac{1}{2}$  e resta 20. Lire, che valeva la prima Mercanzia.

Si provi: la prima Mercanzia costa Lire 20. e la vende Lire 23. Se Lire 20. guadagnano Lire 2. che guadagnano Lire 100? e verranno Lire 10. di guadagno; e la seconda Mercanzia costa Lire 5. più, cioè Lire 25. e la vende Lire 28. ; Se Lire 25. guadagnano Lire 3. che guadagnano Lire 100? e verranno Lire 12. di guadagno; e perchè si guadagnano Lire 2. più per 100. che nella prima Mercanzia, come si disse nella Domanda doverli guadagnare; dunque sta bene; Per intendere la ragione dell'operare, si veda nell'Algebra a i Questi, che ricercano estrazione di Radici, ci farà un simile al detto.



# 312 TRATTATO SESTO

## De' Baratti in varj modi.

### DISTINZIONE PRIMA.

1. D.  
R.



He, cosa è Baratto?

Il Baratto è una computazione d'una Mercanzia in un'altra à fine di migliorare condizione; come di Zucchero in Cera.

2. D.  
R.

Di quante sorti è il Baratto?

Di tre sorti: Baratto semplice, quando si baratta una Mercanzia in un'altra: Baratto composto, quando si baratta Mercanzia con parte di Denaro in altra Mercanzia; ed al contrario. E finalmente Baratto col tempo, quando si pone termine d'alcun tempo al pagamento della Mercanzia. Di queste tre sorti di Baratto si faranno diverse Domande; acciò il Mercante non venga ad essere ingannato ne' prezzi del baratto, e gli possa determinare con qualche ragione-  
vol guadagno.

3. D. Due vogliono barattare Cera à Pepe: Quello della Cera l'apprezza il cento Lire  $133 \frac{2}{3}$ . Quel del Pepe apprezza la libbra Lire  $1 \frac{2}{3}$ . Si domanda barattando libbre  $864 \frac{2}{3}$  di Cera, quante libbre di Pepe verrà?

R. Si trova il prezzo della Cera dicendo: Libbre 100. costano Lire  $133 \frac{2}{3}$ ; che costeranno libbre  $864 \frac{2}{3}$ ? e verranno Lire  $1152 \frac{2}{3}$ . Le quali si partono per Lire  $1 \frac{2}{3}$  e vengono libbre  $691 \frac{6}{10}$ . e tante n'averà di Pepe in baratto: Ovvero per regola moltiplice dicendo; libbre 100. di Cera uguali à Lire  $133 \frac{2}{3}$  Lire  $1 \frac{2}{3}$  uguale à libbra 1. di Pepe libbre  $864 \frac{2}{3}$  di Cera, a quante libbre di Pepe uguali? ed operando per il modo insegnato nel suo Trattato, verranno libbre  $691 \frac{6}{10}$  come per l'altro modo.

$$\begin{array}{r}
 100 - 133 \frac{2}{3} \quad | \quad 1 \frac{2}{3} - 1 \quad | \quad 864 \frac{2}{3} \\
 \hline
 100 - 4.00 \quad | \quad 5 - 0 \quad | \quad 1729 \\
 \quad \quad \quad \quad | \quad 2 \quad \quad \quad | \quad 4 \\
 \hline
 10 \text{ Libbre } 691. \frac{6}{10} \text{ Schifato } \frac{2}{3}
 \end{array}$$

TANT

4. D.



313

4. D. Con libbre 691  $\frac{1}{2}$  di Pepe apprezzato la Libbra Lire 1  $\frac{1}{2}$ .  
 Quante libbre di Cera si averanno, valendo il 100; Lire 133  $\frac{1}{2}$ ?  
 R. Questa è la passata rivoltata, che serve di prova; dovendo ri-  
 tornare le libbre 864  $\frac{1}{2}$  di Cera; E così per lo più si faranno le  
 prove a gl'altri baratti, rivoltando la Domanda, che per li  
 Scolari è cosa assai profittevole. Si moltiplicano libbre 691  $\frac{1}{2}$   
 per Lire 1  $\frac{1}{2}$ , fanno Lire 1152  $\frac{1}{2}$ , le quali ridotte in terzi, sono  
 3458, pure ridotti in terzi, Lire 133  $\frac{1}{2}$ , sono 400, e levati li zeri  
 per 4, si parte 3458, e vengono libbre 864  $\frac{1}{2}$  di Cera; sicchè la  
 lezione passata, e questa stà bene.

Per regola moltiplice si opera più speditamente, dicendo: libbre 1  
 di Pepe è equivalente a Lire 1  $\frac{1}{2}$  Lire 133  $\frac{1}{2}$  sono equivalenti a lib-  
 bre 100 di Cera; a quante di queste saranno equivalenti libbre  
 691  $\frac{1}{2}$  di Pepe? Intavolati i numeri per ordine, e ridotti gl'in-  
 teri a i suoi rotti, per annullarsi i sinistri con i destri, resta solo  
 da partirsi 3458, per 4, risulteranno libbre 864  $\frac{1}{2}$  di Cera, come  
 per l'altro modo.

1 — 1 $\frac{1}{2}$	133 $\frac{1}{2}$ — 100	691 $\frac{1}{2}$	Per 4 / 3458
0 — 5	4.00 $\frac{1}{2}$ — 1.00	3456	Libbre 864 $\frac{1}{2}$

5. D. Due barattano Seta a Zucchero; la libbra della Seta vale in  
 contanti Lire 23. 16. 8, ed in baratto si pone Lire 25. 13. 4. ed il  
 Zucchero in contanti vale il 100. Lire 64  $\frac{1}{2}$ . Si domanda quanto  
 si deve mettere in baratto uguale?

R. Per regola del Trè si soddisfa alla Domanda: Se Lire 23  $\frac{1}{2}$  in  
 baratto sono Lire 25  $\frac{1}{2}$ , che saranno Lire 64  $\frac{1}{2}$  di contanti in ba-  
 ratto, ed operando come si è insegnato saranno Lire 69. Soldi 5.  
 7  $\frac{1}{2}$ , e a tante Lire si metterà in baratto il 100. del Zucchero, è  
 ben vero, che barattando le Mercanzie a prezzo di contanti, è  
 di baratto, verrà il medesimo.

6. D. Due barattano Seta a Zucchero: Il cento di questo vale in con-  
 tanti Lire 64  $\frac{1}{2}$ , e in baratto si pone lire 69. 5. 7  $\frac{1}{2}$  domando; po-  
 nendosi la libbra della Seta in baratto Lire 25. 13. 4. quante Lire  
 valeva in contanti.

R. Per regola del Trè: Se Lire 69. 5. 7  $\frac{1}{2}$  di baratto vengono da  
 Lire 64  $\frac{1}{2}$  di contanti, Da quante verranno Lire 25  $\frac{1}{2}$  di baratto?  
 Operando si troverà, che vengono da Lire 23. Soldi 16. 8, e tante  
 ne costa la libbra della Seta in contanti.

7. D. Due barattano Grano a Vino, lo stajo del Grano vale in con-  
 tanti Lire 3  $\frac{1}{2}$ , ed in baratto è messo Lire 4  $\frac{1}{2}$  Il Barile del Vino  
 s'apprezza Lire 11  $\frac{1}{2}$  più in baratto uguale, che in contanti. Si do-  
 manda il prezzo del Barile in contanti?

R. r

R. Da

R. Da Lire  $4\frac{1}{2}$  si sottrano Lire  $3\frac{1}{2}$ , restano  $\frac{1}{2}$  di Lire, onde si dica: se  $\frac{1}{2}$  differenza vengono da Lire  $3\frac{1}{2}$  di contanti, da quante Lire verranno Lire  $1\frac{1}{2}$ ? ed operando verranno da Lire 8. e tante val- se il Barile in contanti, ed in baratto Lire  $9\frac{1}{2}$ .

9. D. Due barattano Panno à Lana, la Canna del Panno vale in con- tanti Lire 14. 16. 8. ed in baratto si computò con guadagno di  $12\frac{1}{2}$  per 100. si domanda, valendo il 100. della Lana Lire 52. 13. 4. in contanti, quante Lire si deve computare in baratto uguale?

R. Si trova quanto si deva apprezzare in baratto l'una, e l'altra Mer- canzia dicendo: Se 100. deve tornare  $112\frac{1}{2}$ . che torneranno Lire 14. 16. 8? e verranno Lire 16. 13. 9. Medesimamente se 100. deve tornare  $112\frac{1}{2}$  che torneranno Lire 52. 13. 4? e torneranno Lire 59. 5. e tante Lire si devono computare le Mercanzie in baratto uguale. Si prova con la domanda seguente.

9. D. Due barattano Lana à Panno. Il cento della Lana vale à con- tanti Lire  $52\frac{1}{2}$ , e si mette in baratto Lire 59  $\frac{1}{2}$ . Si domanda, va- lendo la Canna del Panno in contanti Lire 14  $\frac{1}{2}$ . quante Lire si metterà in baratto uguale?

R. Per regola del Trè: se Lire  $52\frac{1}{2}$  in baratto Lire 59  $\frac{1}{2}$  quante Li- re in baratto Lire 14  $\frac{1}{2}$  di contanti? verranno appunto Lire 16. 13. 9. come nell'altra si disse.

10. D. Due barattano Bambagia à Zucchero; la Bambagia vale il 100. à contanti Lire 84. ed in baratto si mette Lire 90. Ed il 100. del Zucchero in contanti vale Lire 63. si domanda quanta si met- terà in baratto con guadagno di Lire 10. per 100.

R. Prima si trova quanto si metterà in baratto uguale. Se 84. si fa 90. che si faranno Lire 63? e si troverà farsi Lire 67  $\frac{1}{2}$ . per trovarsi quanto si computeranno col guadagno, si dica, se 100. torna 110. che torneranno Lire 67  $\frac{1}{2}$ ? e si averanno Lire 74  $\frac{1}{2}$ . e per tanti si apprezzerà il 100. del Zucchero per guadagnarsi alla ragione det- ta. Si opera pure per regola moltiplice dicendo 84. si fa 90. 1000 si fa 110. questo si faranno Lire 63? Si opera come si è insegnato. à suo luogo; e verranno Lire 74.  $\frac{1}{2}$  &c.

11. D. Due barattano Bambagia à Zucchero, la Bambagia vale in contanti Lire 84. e si pone Lire 90. in baratto, il Zucchero vale per 100. Lire 63. e si pone Lire 74  $\frac{1}{2}$  in baratto. Si domanda, quanto guadagna per 100. quello del Zucchero?

R. In questa alcuni sbagliano, e per questo l'ho messa per prova dell'ipotesi, e si opera in questo modo: se Lire 90. di baratto sono in contanti Lire 84. che dovrebbero esser Lire 74  $\frac{1}{2}$  di ba- ratto. Si moltiplichì 84. per 74  $\frac{1}{2}$  fa 6237. qual parti- to per 90. verranno Lire 69. 17. Ma non sono che Lire 63.

1. 1. 1.

1. 1. 1.

Dun-

Dunque si guadagnano Lire  $6\frac{1}{2}$  fino a Lire  $69\frac{1}{2}$ . Si dica dunque se Lire 63. di contanti guadagnano Lire  $6\frac{1}{2}$  che guadagnano Lire 100? e si troverà, che guadagnano 10. e tante per 100. guadagna quello del Zucchero. In altro modo si può operare come si può osservare nella seguente del Forestani.

12. D. Due barattano Lana a Panno, la canna del Panno vale Lire 20. & in baratto si contò Lire 25. & il 100. della Lana vale a contanti Lire 44 & in baratto si contò Lire  $58\frac{1}{2}$ . si domanda chi barattò meglio, e quanto per 100.

R. Fa così, dice il Forestani a carte 141. proposizione 6. dicendo 20. si mette 25. che si metterà 44. opera, si metterà Lire 55. e tanto si dovrebbe mettere in baratto il cento della Lana, e farebbe il baratto uguale, ma egli dice, che lo mette in baratto Lire  $58\frac{1}{2}$ . dunque sopra il baratto giusto guadagna Lire  $3\frac{1}{2}$ . Ma volendo sapere quanto guadagna per 100. bisogna intendere da colui, che ti fa la proposta, se vuol sapere quanto si guadagna per 100. del baratto, o del contante; se dice del baratto, farai così, dicendo, Se Lire 55. di baratto giusto, guadagnano Lire  $3\frac{1}{2}$ . che guadagnerà 100? opera, tu troverai, che guadagna  $6\frac{1}{2}$  per 100. di baratto; Ma se volesse intendere quanto guadagna per 100. di contanti, dirai così: Se Lire 44. di contanti guadagnano Lire  $3\frac{1}{2}$  più che non fanno (*rate porzione*) quelle del Panno, quanto guadagneranno Lire 100. opera, guadagneranno Lire  $7\frac{3}{4}$ . e tanto barattò meglio per 100. quello della Lana. E veramente il guadagno, che si fa per 100. si deve intendere sopra i contanti, e non sopra il baratto; Niente dimeno, noi abbiamo dato il modo di trovare chi baratta meglio, e quanto per 100. sopra quello, che mette in baratto per soddisfare a qualche persona cavillosa, ovvero poco capace di ragione. Sin qui il Forestani, il quale si è ingannato, stimando, che  $6\frac{1}{2}$  sia guadagno per 100. di baratto, come pare a prima vista, essendo veramente guadagno per 100. di Contanti, e le Lire  $7\frac{3}{4}$ . che dice guadagno per 100. di contanti non è tale, come si manifesta. Primieramente si operi come nella passata Domanda, dicendo: Se Lire 25. di Baratto sono Lire 20. in contanti, quante in contanti dovrebbero essere Lire  $58\frac{1}{2}$  di baratto? dovrebbero essere Lire  $46\frac{1}{2}$  di contanti; Ma perchè sono solamente Lire 44. di contanti, dunque si guadagnano Lire  $2\frac{1}{2}$ . onde si dica: se Lire 44. di Contanti guadagnano Lire  $2\frac{1}{2}$ . quante ne guadagneranno 100. di contanti? Si moltiplicano  $2\frac{1}{2}$  per 100. fanno 250. le quali si partono per 44. e vengono Lire  $6\frac{1}{2}$  di Contanti per 100. di più.

13. D. Due barattano Lana a Panno, la Canna del Panno vale Lire

R r 2

20. di

20. di Contanti, & in baratto si conta Lire 25. & il 100. della Lana vale à contanti Lire 44. Si domanda volendo guadagnare quello della Lana Lire  $6\frac{1}{11}$  per cento, quante Lire l'apprezzerà in baratto?

R. Certa cosa è, che se verranno Lire  $58\frac{2}{3}$ . le lir.  $6\frac{1}{11}$  sono il guadagno per 100. Si operi come nella 10. di questo; dicendo: Se Lire 20. si fanno Lire 25. in baratto, lir. 44. quante si faranno in baratto uguale? operato, verranno Lire 55. Di nuovo: Se 100. guadagna  $6\frac{1}{11}$ . che guadagneranno Lire 55. e verranno lir.  $3\frac{2}{3}$ . che aggiunte a lire 55. fanno lir.  $58\frac{2}{3}$ . che si volevano. Ovvero; se 100. torna  $106\frac{2}{11}$ . che torneranno Lire 55. e sarebbero venute le medesime Lire  $58\frac{2}{3}$ . e perchè non resti dubbio, che il guadagno di Lire  $6\frac{1}{11}$ . sia di contanti, si fa la seguente Domanda.

14. D. Due barattano Lana à Panno, la Canna del panno vale in contanti Lire 20. e si mette in baratto Lire 25. e la Lana vale in contanti per cento Lire 44. & in baratto si pone lir.  $58\frac{2}{3}$ . Si domanda per lib. 1000. di Lana quante Canne di Panno averà, e quanto guadagnerà per Lire 100. di contanti quello della Lana?

R. Si veda che valeranno Libbre 1000. di Lana à Lire  $58\frac{2}{3}$  di baratto per 100. Si troveranno valere Lire 585. Si trovi quante Canne di Panno daranno à Lire 25. di baratto l'una, e saranno Canne  $23\frac{1}{3}$ . e tante n'averà per libbre 1000. di Lana. Si veda che guadagna in contanti. Libbre 1000. à lir. 44. di contanti costano lir. 440. e Canne  $23\frac{1}{3}$  à lir. 20. di contanti la Canna, costano Lire 468. Dunque quello della Lana da l'equivalente di Lire 440. di contanti, e riceve l'equivalente di lir. 468. di contanti. Dunque lir. 440. guadagnano lir. 28. di contanti, che guadagneranno lir. 100? Si moltiplica 20. per 100., il prodotto 2800. si parte per 440. verranno lir.  $6\frac{1}{11}$ . guadagno di contanti, come apparisce chiaro à chi è capace di ragione. Sicchè le lir.  $7\frac{2}{3}$  non sono guadagno di Lire 100. contanti, e non hanno che fare con la proposta.

15. D. Avendo conosciuto, che quello della Lana guadagna lir.  $6\frac{1}{11}$  per 100. Si vuol sapere quanto perda per 100. quello del Panno.

R. Facilmente si saprà, con aggiungere  $6\frac{1}{11}$  al 100, facendo  $106\frac{2}{11}$ . e con dire  $106\frac{2}{11}$  danno di perdita  $6\frac{1}{11}$ . che darà di perdita 100? e darà Lire.  $5\frac{1}{11}$ . e tante ne perde per 100. quello del Panno. In altro modo si può trovare la perdita per 100. dicendo: Se lire  $58\frac{2}{3}$  di baratto sono di contanti lir. 44. quante di contanti saranno lir. 25. di baratto del Panno? e saranno lir.  $18\frac{1}{11}$ . le quali sottratte da lir. 20. di contanti resta lir.  $1\frac{1}{11}$  di per-

perdita; Onde si dica: Se lir. 20. hanno di perdita  $1\frac{1}{4}$ , che  
 averanno di perdita lir. 1002 e verranno le medesime lir.  $8\frac{1}{4}$ ,  
 che sono perdita di lire contanti.

16. D. Due vogliono barattare Seta à Panno, la libbra della Seta  
 vale lir. 24. in contanti, ed in baratto si pone lir. 27. con volere  
 il terzo in Denari, e  $\frac{1}{4}$ . in baratto di Panno. Il braccio del Pan-  
 no vale lir.  $5\frac{1}{4}$ . in contanti. Si domanda quante lire si metterà  
 in baratto uguale, e per libbre 56. di Seta, quante lire, e Brac-  
 cia di Panno si daranno?

R. Si avverta; Se quello, che hà apprezzato la Mercanzia in con-  
 tanti, ed in baratto deve avere qualche parte in Denari, quella  
 parte si leva dal prezzo in baratto, ed il medesimo numero si le-  
 va dal prezzo in contanti; Poi si fa la regola del Trè, con met-  
 tere in primo il numero rimasto de' Contanti, in secondo luo-  
 go il numero rimasto del Baratto, ed in terzo luogo il nu-  
 mero de' Contanti, del quale si cerca quanto farà in baratto.  
 ed operando, ne verrà il numero cercato. Se avvenisse, che la par-  
 te cercata del Baratto non si potesse levare dal numero di Con-  
 tanti, per essere minore, saria segno il caso non essere solubile; co-  
 me se una Mercanzia vale Lire 7. in Contanti, ed in baratto la  
 pone Lire 12. con volere di queste  $\frac{1}{4}$ . Ora perchè  $\frac{1}{4}$  sono lire 8. che  
 non si possono levare da lire 7. numero minore, il Quesito non è  
 possibile; Mà si torni alla Domanda: si pigli  $\frac{1}{4}$  di lire 27. in barat-  
 to, sono Lire 9. le quali si sottrano da Lire 24. in Contanti, e da Li-  
 re 27. in baratto, e restano lir. 15. e lir. 18. Per il che si dica: Se  
 15. torna 18. ovvero 5. torna 6. che torneranno lir.  $5\frac{1}{4}$ ? e verran-  
 no lir.  $6\frac{1}{4}$  per le Lire in baratto del braccio del Panno. Ora si ve-  
 da quante Lire costeranno libbre 56. di Seta à lir. 27. la libbra  
 moltiplicando, costeranno lir. 1512. le quali si partano per 3. ne  
 vengono lir. 504. per il terzo, che in Denari deve dare quello del  
 Panno: le lir. 504. si sottrino da lir. 1512. e restano lir. 1008. da  
 darli in braccia di Panno à prezzo di baratto; però si dica: Se  
 lir.  $6\frac{1}{4}$ . danno un braccio di Panno, quante braccia ne daranno  
 lir. 1008? e fatta la riduzione, e partizione, ne daranno brac-  
 cia  $157\frac{1}{2}$ . Sicchè dunque il braccio del Panno si metterà in barat-  
 to lir.  $6\frac{1}{4}$  e per lib. 56. di Seta avrà braccia  $157\frac{1}{2}$ . di Panno, e  
 lir. 504. La prova per la seguente Domanda.

17. D. Due barattano Panno à Seta. Il braccio del Panno vale lir.  
 5. 6. 8. ed in baratto si pone lir. 6. Soldi 8. e vuol dare  $\frac{1}{4}$  in Den-  
 ari contanti a quello della Seta, la libbra della quale vale in con-  
 tanti lir. 24. Si domanda quanto si doverà mettere in baratto  
 uguale, e quanto libbre di Seta saranno date per braccia  $157\frac{1}{2}$   
 con  $\frac{1}{4}$  di Denaro?

R. Quanti

**R.** Quando si vuol dare qualsivè parte in Denari à quello, la di cui Mercanzia è valutata solamente in contanti dell'altro, del quale la Mercanzia è apprezzata in contanti, ed in baratto; per sapere quanto si deva mettere in baratto, si fa così: Se vuol dare la metà, si raddoppia il numero del Baratto, e il numero del Baratto s'aggiunge al numero de' Contanti, e questa somma terrà il primo luogo della regola del Trè; il numero raddoppiato, del baratto il secondo; il numero de' Contanti, che si vuol sapere quanto si metterà in baratto in terzo, ed operando si troverà il numero che si cerca; Se poi vuol dare la terza parte, si aggiungerà la metà del numero del baratto al medesimo numero, ed al numero in Contanti. Se  $\frac{2}{3}$  si aggiungeranno a  $\frac{2}{3}$ , e per sapere queste parti d'aggiungerli, si leva il Numeratore dal Denominatore, quello che resta, sarà Denominatore, ed il Numeratore sarà il Numeratore levato; come nell'  $\frac{2}{3}$ . levato 2. Numeratore da 5. resta 3. Denominatore, con 2. Numeratore sono  $\frac{2}{3}$ . che si pigliano dal numero del Baratto, e s'aggiungono all'istesso numero, e à quello de' Contanti, &c.

Ora tornando alla Domanda, perchè vuol dare  $\frac{2}{3}$  in Denaro, e l'altro riceverlo dal 3. Denominatore; si sottrai 1. Numeratore, resta per Denominatore 2. col medesimo Numeratore 1. dice  $\frac{1}{2}$ . la metà dunque si pigli dal numero del Baratto; cioè di Lire 6. Soldi 8. sono lir. 3. Soldi 4. li quali s'aggiungono al medesimo numero di Baratto, cioè à Lire 6. 8. La somma lir. 9. Sol. 12. Pure s'aggiungono lir. 3. Soldi 4. al numero di Contanti, cioè à lir. 5. 6. 8. fanno lir. 8. 10. 8. Onde per regola del Trè: Se Lire 8. 10. 8. tornano lire 9. Soldi 12. che torneranno in baratto lire 24. di Contanti? Operando, si troverà tornare lir. 27. come si disse nella passata.

**18. D.** Si può in altro modo trovare le Lire 27. di Baratto?

**R.** In altro modo forse più facile si farà, e si troverà così: Si sottrano lir. 5. 6. 8. da lir. 6. 8. in Baratto, restano lir. 1. 1. 4. di queste si pigli  $\frac{2}{3}$ . perchè deve avere  $\frac{2}{3}$  in Denaro, partendo per 3. vengono Soldi 7.  $\frac{1}{3}$ . li quali s'aggiungono al numero di Contanti, cioè à lir. 5. 6. 8. vengono lir. 5. 13. 9.  $\frac{1}{3}$ . Ora si dica: Se lir. 5. 13. 9.  $\frac{1}{3}$ . torrano in Baratto lir. 6. Sol. 8. che torneranno lir. 24. ed operando, torneranno lir. 27. come per l'altro modo.

Per trovare adesso le libbre della Seta, ed il Denaro contante, che riceverà, si veda, che valeranno braccia 157  $\frac{1}{2}$  di Panno à Lire 6. 8. prezzo di baratto per braccio, moltiplicando, si troveranno valere lir. 1008, e perchè quello del Panno da  $\frac{2}{3}$  in Denaro, si pigli la metà di lir. 1008, partendole per 2, sono lir. 504. sicchè gli dà lir.

da. lir. 1008. di Panno, e Lire 504. in Denaro; e sommato, sono in tutto Lire 1512. per le quali deve ricevere libbre di Seta a lire 27. da libbra; onde partendosi Lire 1512. per Lire 27. risultaranno libbre 56. di Seta; sicché è stato soddisfatto alla Domanda; offendosi trovate le lir. 27. in baratto, e le libbre 56. di Seta con le lir. 504. di Denaro; e resta provata la passata.

19. D. Si può provare altrimenti la soluzione della 17. Domanda essere buona?

R. Più brevemente così: Si apprezzino braccia 197.  $\frac{5}{8}$  a lir. 5.  $\frac{5}{8}$  il braccio, prezzo in Contanti, costano lir. 840. alle quali aggiunte lir. 504. date in Denaro, fanno lir. 1344. e tante ne dà in Contanti quello del Panno: e riceve libbre 56. di Seta, che valutate a lir. 24. di Contanti la libbra, costano dir. 1344. sicché riceve le medesime Lire in Contanti, che viene a dare all' altro; Sicché il Baratto è giusto, e l' operazione sta bene.

20. D. Due vogliono barattare Drapperie a Cotone. La Ganna del Drappo costa in Contanti lir. 21. & in baratto si contò lir. 24. e di questo vuole il terzo in Denari, e il 100. del Cotone in Contanti costa lir. 4. 2. Domanda quanto si conterà in baratto, acciò sia uguale, e per Canne 63. quanti Denari, e quante libbre di Cotone dovrà avere?

R. Questo è il settimo Quesito de' Baratti del Ciacchi, il quale conchiude, che il 100. del Cotone si dovrà porre in Baratto Lire 48. e per Canne 63. dovrà avere libbre 2100. e Lire 504. in Denari, il che è errore; e l' abbaglio suo è stato, che non ha levato dal numero de' contanti  $\frac{1}{4}$  dal numero del baratto, ma  $\frac{1}{4}$  dal numero medesimo de' contanti, onde ha levato 7. e doveva levare 8. Per soddisfare dunque rettamente alla Domanda, si pigli  $\frac{1}{4}$  di lire 24. in Baratto, partendolo per 3. sarà 8. il quale si leva, come si è detto nella risposta della 16. di questo da lire 21. è da lire 24. e restano lire 13. è lire 16. per il che si dice: Se Lire 13. tornano 16. che torneranno lire 42. prezzo del 100. del Cotone in Contanti? e torneranno lire 51. 13. 10.  $\frac{1}{4}$  prezzo del 100. del Cotone in baratto uguale: Ora si valutano Canne 63. a lire 24. la Canna, costano lire 1512. dalle quali si levino lire 504. di Denaro che è  $\frac{1}{4}$  le lire 1008. restate si impiegano in Cotone, dicendo: Lire 51. 13. 10.  $\frac{1}{4}$  sono prezzo in baratto di libbre 100. di Cotone, di quante libbre saranno prezzo Lire 1008? e verranno libbre 1950. e tante n'averà di Cotone con lire 504. in Denari, per Canne 63. di Drappi. Si prova con la seguente.

21. D. Due vogliono barattare Drapperie, e Cotone; il 100. di questo

questo vale in Contanti lir. 42. & in Baratto si pone lir. 51. 13. 10  $\frac{7}{8}$ . e da quello del Cotone  $\frac{7}{8}$  de' Den. di Baratto delle Canne del Drappo, la Canna del quale vale in Contanti lir. 21. Si domanda quanto si metterà in Baratto uguale, e per libbre 1950. di Cotone, con  $\frac{7}{8}$  di Denaro, quante Canne quello del Cotone averà?

R. Perchè vuol dare  $\frac{7}{8}$  in Denaro a quello del Drappo, si levi 1. dal 3. Denominatore, resta 2. con 1. sopra, dice  $\frac{7}{8}$ . la metà dunque di lir. 51. 13. 10  $\frac{7}{8}$  cioè lir. 25. 16. 11  $\frac{7}{8}$ . S' aggiungano al prezzo in Contanti, & al prezzo in Baratto, e si dica se lire 67. 16. 11  $\frac{7}{8}$  tornano lir. 77. 10. 9  $\frac{7}{8}$ . che torneranno lir. 21. & operando si troveranno tornare lir. 24. Si apprezzino libbre 1950. di Cotone a lir. 51. 13. 10  $\frac{7}{8}$  il 100. valeranno lir. 1008. delle quali la metà, cioè lir. 504. in Denaro; si sommino, e fanno lir. 1512. e di queste lir. 504. sono  $\frac{7}{8}$ . Adesso per trovare le Canne del Drappo, si dica: Se lir. 24. danno una Canna: quante ne daranno lir. 1512. e verranno Canne 63, che dovevano venire; Si potrebbe fare la prova, come nella 19. di questo, la quale si tralascia.

22. D. Due vogliono barattare Seta a Pepe, la libbra della Seta vale in contanti lir. 25. & in baratto si pone 30. e di queste vuole  $\frac{7}{8}$  in Denaro. Il 100. del Pepe in Contanti vale lir. 126. Si domanda quanto si doverà mettere in Baratto, volendo di questo la metà in Denaro, e quanta Seta, e Denaro averà per libbre 680. di Pepe?

R. Si sottri  $\frac{7}{8}$  da  $\frac{7}{8}$ . resta  $\frac{1}{8}$ . che vorrà quello del Pepe in Denaro, e quello della Seta niente. Per la 17. di questo, si levi 1. Numeratore da 4. Denominatore, resta 3. Denominatore, col medesimo 1. Numeratore, dice  $\frac{1}{3}$ . Si pigli dunque  $\frac{1}{3}$  di lir. 30. prezzo in Baratto, sono Lire 10. le quali si aggiungono a Lire 25. e a Lire 30. fanno 35. e 40. e si dice: Se 35. torna 40. ovvero 7. torna 8. che torneranno Lire 126. e torneranno Lire 144. e tante si metterà in Baratto il 100. del Pepe: Ora si valutino libbre 680. di Pepe a Lire. 144. il 100. costeranno Lire 979  $\frac{2}{3}$ . Si partano per 4. per pigliarne il quarto, sono Lire 244  $\frac{1}{2}$ . da darsi in Denaro, le quali si sottrano da Lire 979  $\frac{2}{3}$ . restano Lire 734  $\frac{1}{3}$ . da darsi in Seta a Lire 30. la libbra, che importano libbre 24. once 5  $\frac{5}{8}$ . e tante ne saranno date con Lire 244  $\frac{1}{2}$ . per libbre 680. di Pepe, in baratto giusto. Se ne faccia la prova, si apprezzino libbre 680. di Pepe, a lire 126. contanti il 100. valeranno lire 856  $\frac{1}{2}$ . dalle quali si levino lire 244  $\frac{1}{2}$  avute in Denaro, restano lire 612, che partite per lire



381

per lire 25. prezzo in Contanti della libbra della Seta , vengono libbre 24. once  $5\frac{2}{3}$ . sicchè torna giusta .

23. D. Due barattano Pepe à Seta ; il 100. del Pepe fù messo in Baratto lire 144. con havere  $\frac{2}{3}$  in Contanti ; la libbra della Seta in contanti vale lire 25. & in baratto si pose lire 30. Si domanda quante lire valse il 100. del Pepe in Contanti ?

R. Questa serve di prova alla passata . Si piglia  $\frac{2}{3}$  di lire 144. sono lir. 36. quali si sottrano da lir. 144. restano lire 108. è tante apprezzò il 100. del Pepe , senza il quarto in Denaro . Ora per venire al vero Capitale, si dice . Se lire 30. in baratto, vengono da lire 25. in Contanti , da quante verranno lire 108? verranno da lire 90. e tanto fù il vero Capitale del 100. del Pepe, senza il quarto in Denari , che importa Lire 36. le quali aggiunte à Lire 90. fanno Lire 126. per il prezzo in contanti del 100. del Pepe , che si cercava .

24. D. Due barattano Panno à Zucchero ; la Canna del Panno vale in contanti Lire 18. & il Padrone la mise in baratto Lire 20. con volere del prezzo di questo  $\frac{1}{3}$  in Denaro , e  $\frac{2}{3}$  in Zucchero, il 100. del quale vale Lire 53. e fù messo in baratto lire 64. Si domanda chi meglio baratta , e quanto per 100?

R. Per modo da Maestro si risolve in questo modo : Per la 16. di questo si leva  $\frac{1}{3}$  di 20. in baratto , cioè 4. da Lire 18. e da Lire 20. restano Lire 14. e Lire 16. Ora per regola del Trè , se Lire 16. tornano Lire 14. che torneranno Lire 64. di Baratto? e torneranno Lire 56. dalle quali si sottrano Lire 53. prezzo del Zucchero in contanti restano Lire 3. di guadagno , che viene fatto da Lire 53. in Contanti, e da Lire 16. che è  $\frac{1}{3}$  di Lire 64. prezzo del Zucchero in Baratto, il 16. con 64. fa 80. rispetto del quale 16. è  $\frac{1}{3}$ . S' osservi dunque in altre ancora ; che volendo uno  $\frac{1}{3}$  del suo baratto ; del numero del Baratto dell' altro si piglia  $\frac{1}{3}$ . e volendo  $\frac{2}{3}$ . si piglia  $\frac{2}{3}$ . e volendo  $\frac{1}{2}$  si piglia  $\frac{1}{2}$ . il che si trova con sottrarre il Numeratore dal Denominatore, il restato numero è Denominatore col medesimo Numeratore , e tal parte, ò parti si pigliano dal numero del Baratto , come hò detto , Dipoi si somma Lire 53. con Lire 16. fanno Lire 69. Capitale , per regola del Trè . Se Lire 69. guadagnano Lire 3. che guadagneranno Lire 100? & operando si averanno Lire  $4\frac{1}{3}$  per 100. di guadagno da quello del Zucchero .

322					
Li. 20	—	Li. 18		Li. 69	— 3 —
4		4			3
—		—			—
Se 16	—	14	—	Li. 4	$\frac{8}{23}$
1		4			$\frac{300}{24}$
		—			$\frac{1}{69}$
		Li. 64			$\frac{8}{23}$
		4			
		—			
		Li. 56			
		4			
		—			
		Li. 53			
		—			
		Li. 3			
		—			
		53			

**Lire 69**

25. D. Come si risolve in altro modo la domanda passata?

R. Per modo pratico si barattano Canne 40. di Panno, che à Lire 20. in baratto la Canna, costano Lire 800. dalle quali si sottriao Lire 160. che sono  $\frac{2}{5}$ . che vuole in Denaro, restano Lire 640. s'averfi in Zuechiero à Lire 64. di baratto il cento; saranno lib. 1000. di Zucchero, le quali ora si veda quanto costano in Contanti à Lire 53. il 100. e costeranno Lire 530. alle quali s'aggiungano Lire 160. che dà in Denaro, fanno Lire 690. per Canne 40. di Panno, che à Lire 18. di Contanti la Canna vagliono Lire 720. dunque quello del Zucchero dà per Lire 690. e riceve per Lire 720. dalle quali sottratte Lire 690. restano lir. 30. di guadagno fatte da lir. 690. Per il che si dice: Se Lire 690. guadagnano lir. 30. quante Lire guadagneranno lir. 100? e verranno lir.  $4\frac{1}{3}$ . come per l' altro modo.

26. D. Giovanni barattò Rifo con Francesco per Damasco. Il Rifo valeva à contanti lir. 10. il 100., & in baratto si pose à lire 12. della cui valuta Giovanni volse il terzo, e valeva il palmo del Damasco Soldi 36. in contanti, e si barattò à Soldi 50. Domando chi di loro fece miglior baratto, e di quanto per 100?

R. Il Zucchetto à carte 289. propone questa, e conchiude che Fran-  
cesco avanzi  $5\frac{1}{2}$  per 100. in questo negozio, il che non è vero;  
Per essere in tutto simile alla passata, si opera come in quella: Il  
terzo di 12. in Baratto, cioè 4. si sottra da Lire 12. e da Lire 10.  
restano 8. e 6. e si dice: Se 8. tornano 6. che torneranno Sol. 50?  
La proporzione, che è da Lire à Lire, è ancora da Soldi, à Soldi,  
&c. Si moltiplica 50. per 6. il predetto 300. si parte per 8. ven-  
gono Soldi  $37\frac{1}{2}$ . da quali si sottrano Soldi 36. in Contanti, re-  
sta Soldo  $1\frac{1}{2}$ . guadagno fatto da Soldi 36. con Soldi 55. metà  
di Soldi 50. in baratto, perchè l'altro vuole  $\frac{1}{2}$ . ( per quello che hò  
detto nella passata ) la somma di Soldi 36. e 25. fa 61. onde si di-  
ce: Se 61. guadagna  $1\frac{1}{2}$ . che guadagnerà 100? si moltiplica 100.

per

per  $1\frac{1}{2}$ . il prodotto 150. si parte per 61. vengono  $2\frac{2}{3}$ . e tanti Soldi guadagna per 100. Soldi, ovvero Lire per Lire 100. &c.

27. D. Si può fare in altro modo per prova?

R. Per maggiormente assicurarsi della verità di tal conclusione; in pratica, Giovanni si supponga barattare centinaja 30. di Riso, che a Lire 12. il cento in Baratto, costano lir. 360. dalle quali si sottrino lir. 120. che sono  $\frac{1}{3}$  di lir. 360. che vuole in Denaro, restano lir. 240. in Baratto di Damasco a lis. 2.  $\frac{1}{2}$  il palmo, ovvero Soldi 50. in Baratto, importano palmi 96. Dunque Giovanni dà centinaja 30. di Riso, e Francesco lir. 120. in Denaro, e palmi 96. di Damasco. Centinaja 30. a lir. 10. di Contanti il 100. vagliono lir. 300. Palmi 96. a Soldi 36. di Contanti il palmo costano lir. 172.  $\frac{1}{2}$ . alle quali aggiunte lir. 120. che Francesco dà in Denaro, fanno 292.  $\frac{1}{2}$ . le quali guadagnano lir. 7.  $\frac{1}{2}$  fino in Lire 300. e se Lire 292.  $\frac{1}{2}$ . guadagnano lir. 7.  $\frac{1}{2}$ . che guadagneranno 100. e troveransi guadagnare  $2\frac{2}{3}$ . come per l'altro modo. Adunque non è vero, che Francesco guadagni  $5\frac{1}{7}$  per 100. non guadagnando più di  $2\frac{2}{3}$ .

La prova che fa il Zucchetto col baratto di centinaja 30. di Riso con 100. palmi di Damasco insieme con lir. 120. dimostra il Baratto essere uguale, apprezzando il palmo del Damasco in Baratto Soldi 48. il che non ci si contende; ma nella Proposta non si domanda questo, si bene, chi meglio baratti, e quanto per 100. mettendo il palmo del Damasco in baratto Soldi 50.

28. D. Due barattano Grano a Vino: Lo Stajo del Grano vale in contanti Soldi 80. & in Baratto si pone Soldi 90. con avere  $\frac{2}{3}$  di questo in Denaro. Il Barile del Vino vale in Contanti Soldi 144. & in Baratto si pone tanto, che quel del Grano guadagna 5. per 100. Domando quanto si pone?

R. Perché quello del Grano deve guadagnare a quella ragione, s'acresce il prezzo in Contanti di Soldi 80. dicendo a 100. tornano col guadagno 105. che torneranno Soldi 80. e verranno Soldi 84. Adesso da Soldi 90. in baratto. si pigli  $\frac{2}{3}$ . cioè 30. e si levi da 84. e da 90. restano 54. e 60. Ora si dica: se 54. torna 60. ovvero 9. torna 10. che torneranno Soldi 144. e verranno Sol. 160. e per tanti si apprezzerà il Barile del Vino in Baratto.

29. D. Uno baratta Staja 106.  $\frac{1}{2}$  di Grano, che vale in Contanti Lire 4. in Baratto si pone Lire 4.  $\frac{2}{3}$  lo Stajo con Vino, il Barile del quale vale in contanti lir. 7.  $\frac{1}{2}$  in baratto si pone lir. 8. e quello del Grano vuole  $\frac{2}{3}$  del prezzo in baratto in Denaro. Si domanda quanto guadagna per 100?

R. Questa serve di prova alla passata, S'apprezzino Staja 106.  $\frac{1}{2}$  a Lire

Lire  $4\frac{1}{2}$  di baratto valeranno Lire 480. si sottrino Lire 160. terzo d'averli in Denaro, restano Lire 320. per le quali s'averanno Barili 40. di Vino à Lire 8. il Barile, prezzo in baratto; Dunque da Staja 106  $\frac{1}{2}$  di Grano, che à Lire 4. lo Stajo in Contanti, vagliano Lire 426  $\frac{1}{2}$ . e riceve Barili 40. di Vino, che à Lire 7  $\frac{1}{2}$ . in Contanti costano Lire 288. alle quali aggiunte Lire 160. di Denaro fanno Lire 448: e tante ne da quello del Vino, e riceve Lire 426  $\frac{1}{2}$  da quello del Grano, le quali si sottrano da Lire 448. restano Lire 21  $\frac{1}{2}$  di guadagno, e se Lire 426  $\frac{1}{2}$  guadagnano Lire 21  $\frac{1}{2}$ . che Lire 100? verranno Lire 5. appunto guadagnata da quello del Grano.

30. D. Due barattano Seta à Lino, la libbra della Seta vale Lire 14. in Contanti; in Baratto si pose Lire 15. e della valuta di questo vuole  $\frac{1}{2}$  in Denaro, e  $\frac{1}{2}$  in Baratto di Lino, il 100. del quale vale Lire 36  $\frac{1}{2}$ . e fù messo tanto in Baratto, che quello della Seta perde Lire 5. per 100. Si domanda quanto si contò in Baratto?

R. Chi perde 5. per 100. di 100. fa 95. che si farà di Lire 14. in Contanti? si faranno Lire 13  $\frac{1}{4}$ . Adesso si pigliano  $\frac{1}{2}$  di lire. 15. in Baratto, che sono Lire 6. le quali si sottrano da lire. 13  $\frac{1}{4}$ . e da lire. 15. restano lire. 7  $\frac{1}{4}$ . e Lire 9. onde si dica: Se 7  $\frac{1}{4}$  tornano 9. che torneranno Lire 36  $\frac{1}{2}$ . prezzo in Contanti del cento del Lino? e torneranno Lire 45. e tanto fù messo in Baratto. Si provi.

31. D. Uno baratta Seta à Lino con dare lib. 10. la libbra della quale vale in contanti lire. 14. & in baratto si pone lire. 15. con volere  $\frac{1}{2}$  della valuta di questo: Il cento del Lino vale Lire 36  $\frac{1}{2}$  in Contanti, & in baratto si pone Lire 45. Si domanda chi guadagna, e chi perde, e quanto per 100?

R. Si valutino libbre 10. di Seta à lire. 15. la libbra, costano lire. 150. in Baratto, dalle quali si sottrano lire. 60. che sono  $\frac{1}{2}$  in Denaro, restano lire. 90. da averli in Lino à Lire 45. il 100. faranno libbre 200. Si veda quanto costano di Contanti à lire. 36  $\frac{1}{2}$ . il 100. costeranno Lire 73. alle quali aggiunte Lire 60. che quello del Lino dà in Denaro, fanno lire. 133. in tutto; Le libbre 10. di Seta à Lire 14. in Contanti, costano lire. 140. sicchè perde lire. 7. e se con lire. 140. perde lire. 7. con lire. 100. che perderà? e verranno lire. 5. sicchè la lezione passata è giusta. Per sapere quanto guadagna per 100. quello del Lino, si dice, se Lire 133. guadagnano lire 7. che guadagnano 100? e vengono lire. 5  $\frac{1}{4}$  di guadagno; O pure se 95. tornano 100. che torneranno 100. e torneranno 105  $\frac{1}{4}$ . il sopra 100. è il guadagno fatto da quello del Lino.

32. D. Due barattano Cera à Lana, il 100. della Cera vale  
Lire

Lire 140. in Contanti; in Baratto si pone Lire 144. vuole di questo  $\frac{2}{3}$  in Denaro. Il 100. della Lana vale in Contanti Lir. 57. ed in Baratto si contò tanto; che quello della Cera perse il quinto del suo Capitale; conseguentemente quello della Lana guadagnò il quarto del suo Capitale. Si domanda quanto si contò in Baratto il 100. della Lana?

R. Si sottrano Lire 28. che sono  $\frac{2}{3}$  di 140. dalle Lire 140. prezzo del 100. della Cera in Contanti, restano Lire 112. Adesso da Lire 112. e da Lire 144. si sottrano Lire 36. che sono  $\frac{2}{3}$  di 144. che vuole in Denaro, restano Lire 76. e Lire 108. però si dice: Se Lire 76. tornano Lire 108. quanto torneranno Lire 57. e verranno Lire 81. ed a tante si porrà in Baratto il 100. della Lana con le dette condizioni. Si prova.

33. D. Uno ha barattato 10. centinaia di Cera, valutata il 100. in Contanti Lire 140. in Baratto Lire 144. con Lana valutata il 100. Lire 57. Ma in Baratto Lire 81. con avere ricevuto quello della Cera  $\frac{2}{3}$  del prezzo della Cera in Baratto in Denaro. Si domanda chi abbia guadagnato, e chi perso; e qual parte del loro Capitale?

R. Si apprezzano 10. centinaia di Cera a Lire 144. in Baratto il 100. costano Lire 1440. dalle quali si sottrano Lire 360. che sono  $\frac{2}{3}$  in Denaro, e restano Lire 1080. da riceverli in Lana a Lire 81. in Baratto il 100. se n'averanno centinaia 13  $\frac{2}{3}$ . che a Lire 57. il centinaio in contanti, costano Lire 760. insieme con Lire 360. che dà in Denaro, viene a dare Lire 1120. quello della Lana, o riceve Lire 1400. che tante vagliono 10. Centinaja a Lire 140. in Contanti per centinaio; Si sottrano Lire 1120. da Lire 1400. restano Lire 280. che sono  $\frac{2}{3}$  di Lire 1400. che perde quello della Cera, che sono  $\frac{2}{3}$  di Lire 1120. che guadagna quello della Lana; Sicchè è giusta.

34. D. Due barattano; l'uno ha Panno, che in Contanti la Ganna vale lir. 16. ed in Baratto si pone lir. 20. vuole di questo  $\frac{2}{3}$  in Denaro. L'altro ha Seta, che la libbra in Contanti vale Lire 24. ed in Baratto si pone lir. 27. ed ancora ha Lana, il 100. della quale vale lir. 40. in Contanti. Si domanda; volendo quello del Panno tante libbre di Seta, quante centinaia di Lana, per quante Lire s'apprezzerà il 100. della Lana in Baratto uguale?

R. Si sottra  $\frac{2}{3}$  di lir. 20. cioè lir. 4. da lir. 20. e da lir. 16. restano lir. 12. e lir. 16. Si sommino ancora lir. 24. e lir. 40. prezzi in Contanti di Seta, e Lana; e fanno lir. 64. Ora per regola del Tre; se lir. 12. tornano 16. che torneranno lir. 64. e verranno lir. 85.  $\frac{2}{3}$  dalle quali si sottrano lir. 27. prezzo d'una libbra di seta in baratto restano lire 58.

lire 58  $\frac{1}{2}$  prezzo di libbre 100. di Lana in Baratto, che si cerca-  
va. Si provi con la pratica di Baratto.

35. D. Uno baratta Cotone 16. di Panno, del quale una Canda vale  
in contanti Lire 16. in baratto Lire 20. e della valuta di questo  
vuole  $\frac{1}{2}$  in denaro, con Seta, che in contanti vale la libbra Lire  
24. in baratto lir. 27. e con Lana, il cento della quale vale Lire  
40. ed in Baratto Lire 58.  $\frac{1}{2}$  Si domanda quante libbre di Seta, e  
quante centinaia di Lana con il Denaro averà quel del Panno?  
R. Si valutino Cotone 16. a lire 20. la Canna costano lir. 320. dalle  
quali si sottrano Lire 64. che son  $\frac{1}{2}$  in Denaro, restano lir. 256.  
e quali si partono per lire 25.  $\frac{1}{2}$  somma di lire 27. e lire 58.  $\frac{1}{2}$  prezzi  
in Baratto. Risulta 3. e tante libbre di Seta, e tante centinaia  
di Lana averà con lir. 64. in Denaro, e perchè si veggia che è ba-  
ratto uguale, si valutino Cotone 16. a lir. 16. di Contanti: Co-  
stano lir. 256. che da quel del Panno. Riceve libbre 3. di Seta  
che a lir. 24. la libbra costano Lire 72. e 3. centinaia di Lana a  
lir. 40. il 100. costano lir. 120. di Contanti. Si sommano lir.  
72. e lir. 120. e son lir. 64. in Denaro. Riceve in tutto lir. 256.  
quante ne dà. Sicchè il Baratto è uguale, e giusto.

36. D. Due barattano; Uno ha Cotone, e l'altro Cera, e Pepe; Il  
100. della Cera vale in Contanti lir. 145. & in baratto si pone lir.  
150. Il 100. del Pepe vale in Contanti lir. 168. & in Baratto si  
pone lir. 175. Il 100. del Cotone, vale in Contanti lir. 60. Si Do-  
manda quanto si doverà mettere in Baratto, volendo il Padrone  
la metà del prezzo in baratto del Cotone in Cera, e l'altra metà  
in Pepe con guadagnare 5. per 100?

R. Per Regola del Tre si dica: Se lir. 175. di Baratto di Pepe ven-  
gono da lir. 168. di Contanti, da quante Lire di Contanti ver-  
ranno da lir. 150. di baratto di Cera? e verranno da lir. 144. con le  
quali si sommano lir. 145. di Contanti della Cera, fanno lir. 289.  
dipoi per il guadagno di 5. per 100. si dica: Se 100. tornano 105.  
che torneranno lir. 60. prezzo del Cotone in Contanti? e torne-  
ranno lir. 63. si faccia un'altra regola del Tre dicendo, lir. 289.  
tornano lir. 300. doppio prezzo della Cera in Baratto, che tor-  
neranno lir. 63? e torneranno lir. 65  $\frac{1}{2}$  e tanto si metterà in  
baratto il 100. del Cotone, secondo le dette condizioni. Si prova.  
37. D. Uno baratta Centinaja 289. di Cotone, che in contanti va-  
le il 100. lir. 60. in baratto si conta lir. 65.  $\frac{2}{3}$   $\frac{1}{2}$  e l'altro da Cera  
valutata in Contanti lir. 145. & in Baratto lir. 150. per la metà  
del Denaro del Cotone, e per l'altra metà da Pepe apprezzato  
lir. 168. in Contanti per 100. & in baratto lir. 175. Domando,  
chi baratto meglio, e quanto guadagno per 100.?

R. Certa-

R. Certamente se la lezione passata è giusta deve venire 5. per 100. di guadagno a quel del Cotone. Si valutino 129. centinaia di Cotone a lir. 65  $\frac{2}{3}$  il 100. valeranno lir. 18900. e questo è prezzo in baratto: Si pigli la metà, cioè lir. 9450. e si veda quante centinaia di Cera si averanno a lir. 150. in baratto; e s'averanno centinaia 63. e quanto centinaia di Pepe a lire 175. in baratto per l'altra metà, e si averanno centinaia 54. Queste centinaia si valutino a Contanti, e per la Cera verranno lire 9235. e per il Pepe lire 9072. che sommate insieme fanno lir. 18207. e tante ne da in contanti quello della Cera, e Pepe. Si valutino centinaia 129. di Cotone a lir. 65. in contanti, verranno lir. 17340. le quali sottratte da lir. 18207. che riceve, restano di guadagno lir. 867. per il che si dice: Se lir. 17340. guadagnano lir. 867. che guadagneranno 1000. verranno lir. 38. quante ne doveva venire per guadagno di quello del Cotone.

38. D. Due barattano; Uno ha Lana, l'altro Zucchero, e Pepe; Il 100. del Zucchero vale in contanti lir. 58. ed in Baratto si pone lir. 65. Il 100. del Pepe in Contanti vale lir. 172. in Baratto si pone 180. Il 100. della Lana vale in Contanti lire 48. Si domanda; volendo questo barattare con guadagno di 12  $\frac{1}{2}$  per 100. ed avere tante libbre di Zucchero, quante di Pepe; quante lire metterà in baratto il 100. della Lana?

R. Questa è diversa dalla 35. di questo, e si scoglie così, dicendo: Se 100. col guadagno torrà 12  $\frac{1}{2}$  che torneranno lire 48. prezzo della Lana in contanti? e torneranno lire 54. di poi si sommano lir. 58. è lir. 172. prezzi in Contanti del Zucchero, e Pepe, fanno lir. 230. Si sommano ancora lir. 65. e lir. 180. prezzi in Baratto, fanno lir. 245. si dice: Se lir. 230. tornano in Baratto lir. 245. che torneranno lir. 54. e verranno lir. 57  $\frac{2}{3}$ . e tanto lire s'apprezzerà in Baratto il 100. della Lana con le dette condizioni. Si prova.

39. D. Due barattano; Uno dà centinaia 25. di Lana, valutata il 100. in contanti lir. 48. in Baratto lir. 57  $\frac{2}{3}$ . l'altro tante libbre di Zucchero, quante di Pepe, valutato il 100. del Zucchero in contanti lir. 58. in Baratto lir. 65. Il 100. del Pepe in Contanti, lir. 172. in Baratto lir. 180. Si domanda, chi guadagnerà, e quanto per 100?

R. Si valutino centinaia 25. di Lana a lir. 57  $\frac{2}{3}$ . prezzo di Baratto, costeranno lire 1233. Si sommano lir. 65. e lir. 180. prezzi di Baratto di Zucchero, e Pepe, e fanno lire 245. si dice: Se Lire 245. sono prezzo di lib. 200. di quante libbre faranno lire 2232. e faranno di Libbre 1080. la metà, cioè 540. di Zucchero, e 540. di Pepe, le quali libbre si apprezzeranno a lire 48. ed a lir. 172. di Contanti.

Contanti per 100. valeranno  $\text{lin. } 313 \frac{1}{4}$ . e  $\text{lin. } 928 \frac{1}{4}$ , le quali sommate fanno  $\text{lin. } 1242$ . e tante ne dà quello del Zucchero, e Pepe. Ora si apprezzino centinaja 23. di Lana a  $\text{lin. } 48$ . di Contanti il 100. costano  $\text{lin. } 1104$ . Etante ne dà quello della Lana, sicchè guadagna, e per sapere quanto per 100. si dica:  $\text{Lin. } 1104$ . tornano  $\text{lin. } 1242$ . che torneranno 100? e risulteranno  $\text{lin. } 112 \frac{1}{2}$ . dalle quali levate 100. di Capitale restano  $\text{lin. } 12 \frac{1}{2}$  per 100. quante si disse guadagnare nell'altra Domanda.

40. D. Due barattano Lino a Panno; la Canna del Panno vale in Contanti  $\text{lin. } 10$ . ed in Baratto si pone  $\text{lin. } 12$ . ; Il 100. del Lino vale in Contanti  $\text{lin. } 25$ . e si pone in Baratto  $\text{lin. } 28$ . Domando quale delle due ebbe parte in Denari, e quale acciò il Baratto sia uguale?

R. Si dica: Se  $\text{lin. } 10$ . si fanno  $\text{lin. } 12$ . in Baratto, che si faranno  $\text{lin. } 25$ ? Si moltiplicato  $\text{lin. } 25$ . per  $12$ . fanno 300. si partono per 10. e vengono  $\text{lin. } 30$ . e perchè il 100. del Lino si è apprezzato in baratto  $\text{lin. } 28$ . già si conosce che esso vuole, ed ha parte in Denaro, e per trovare qual parte, si mette in fila  $\text{lin. } 10$ . , e  $\text{lin. } 12$ . e sotto  $\text{lin. } 25$ . e  $\text{lin. } 28$ . si moltiplicano in croce  $\text{lin. } 12$  per  $25$ . fanno 300. e  $\text{lin. } 10$ . per  $28$ . fanno 280. che sottratte da 300. restano 20. il quale si pone sopra una linea per Numeratore, e di sotto si pone 56. per Denominatore fatta dalla moltiplicazione di 2. differenza, che è dal prezzo della Canna in contanti a quello di Baratto via 28. prezzo in baratto del Lino, il quale  $\frac{20}{56}$  schifato per 4. è  $\frac{5}{14}$ . e tanto deve avere in Denaro quello del Lino, è  $\frac{5}{14}$  in baratto di Panno.

Lire 10 — 12 — Lire 25?

Lire 3010

$$\begin{array}{r}
 10 \quad 25 \quad 12 \\
 52 \quad 28 \quad 10 \\
 \hline
 300 \quad 280 \quad 2 \\
 \hline
 20 \quad 56 \quad 5 \\
 \hline
 \end{array}$$

schifat.  $\frac{5}{14}$

41. D. Due barattano Lino a Panno. Il 100. del Lino vale in contanti  $\text{lin. } 25$ . ed in Baratto ne vuole  $\text{lin. } 28$ . e di più  $\frac{1}{4}$  di denaro e la Canna del Panno vale in contanti  $\text{lin. } 10$ . , si domanda quanto si dovrà mettere in Baratto uguale?

R. Questa serve di prova alla passata, e si risolve per la 16. di questo. Si pigliano  $\frac{1}{4}$  di  $\text{lin. } 28$ . sono  $\text{lin. } 7$ . che sottratte da  $\text{lin. } 25$ . e da  $\text{lin. } 28$ . restano  $\text{lin. } 18$ . e  $\text{lin. } 21$ . però si dica se di  $\text{lin. } 15$ . si fanno  $\text{lin. } 18$ . che si faranno  $\text{lin. } 10$ . ? ed operato verranno  $\text{lin. } 12$ . e tante si deve apprezzare la Canna in Baratto uguale; e la passata è bene sciolta.

42. D.



42. D. Dile. Barattano; L'uno hà Ferrò, che vale il cento a contanti lir. 6. & a Baratto lo mette lir. 7. e si fa termine Mesi 4.; L'altro hà Corame, che la Pelle à contanti vale Soldi 8. e à Baratto la mette Soldi 9. Domando quanto tempo doverà quel dal Corame à quello dal Ferro, acciò sia uguale?

R. Questa è la 37. di Fr. Luca à carte 165. il quale la risolve bene in questo modo: Fa così, tà dici, che quello dal Ferro, che vale Lire 6. glie lo mette Lire 7. e fa termine mesi 4. dunque ragionevolmente, quello del Corame doveria mettere la Pelle Soldi 9. e  $\frac{7}{6}$  à stare uguale. Ora moltiplica 7. via 8. fa 56. parti in 6. ne viene 9  $\frac{7}{6}$ . e questa è la prova, che nasce da questa regola. Se Lire 6. lui mi mette Lir. 7. che li doverò mettere io Soldi 8? Dunque li sopramette 1  $\frac{7}{6}$ . e dalli termine 4. mesi; parti mesi 4. in 1.  $\frac{7}{6}$ . ne viene 3. e tanti mesi darà termine quello dal Corame à quello dal Ferro; acciò sia uguale il Baratto. In due altri modi, fa la medesima conclusione; e nel secondo procede per Algebra alquanto oscuramente; Più sotto ne mostrerò operazioni più chiare.

43. D. Che cosa si deve dire di Niccolò Tartaglia, che nel Libro 13. num. 36. propone il detto Baratto di Fr. Luca, e prima lo riprende di falsa soluzione: In secondo luogo concedendo, che sia vera, e buona soluzione, nega che sia Baratto?

R. Si deve dire, che il Tartaglia in primo luogo muta: al contrario la Domanda alla proposizione di Fr. Luca; dalle parole del quale appare chiaro, che due barattano, dando di presente uno Ferro, e l'altro Pelli. Il Ferro, che di Contanti vale il 100. Lire 6. lo pone in Baratto Lire 7. da pagarsi da quello delle Pelli dopo mesi 4. La pelle, che vale Soldi 8. la mette in baratto Soldi 9. e perchè la mette meno del giusto in baratto, dovendola mettere in Baratto uguale Soldi 9  $\frac{7}{6}$ . per questo fa la Domanda, che tempo deva fare à quello del Ferro per il suo pagamento, per rifarsi nel tempo quello, che scapita nel baratto; e tal parlare non è ambiguo, e senza ragione al dire del Tartaglia, e ottimamente Fr. Luca risolve che gli deve far termine di mesi 3. dopo i quali quello del Ferro lo deva pagare delle Pelli, & egli passato un mese di più, cioè passati quattro mesi da principio, lo deva pagare del Ferro; Et il Tartaglia rivoltando al contrario la Domanda, ricerca quanto tempo doverà fare quello del Ferro à quello delle Pelli, da che gli averà consegnato il Ferro; per il che ne viene questa nuova Proposizione.

44. D. Due barattano; L' uno hà Ferro, che vale il Cento à contanti Lire 6. & à Baratto lo mette Lire 7. e si fa termine mesi 4. L'altro hà Cora-

T :

300

ha Corame, che fa pelle à Contanti vale Soldi 8. & Baratto fa  
motte Soldi 9. Si domanda quanto tempo doverà fare quello del  
Baratto à quello del Corame. à consegnare la Pelle, da che gli ave-  
rà consegnato il Ferro?

R. Certo è, che diversa Domanda, ricerca diversa risposta, &  
non si può verificare per l'altra; Due modori il Tartaglia,  
à i quali aggiungo il terzo, che è questo assai federa: si veda  
per Lir. 7. prezzo di libb. 100. di Ferro in baratto, quando Pelli  
si hanno à Soldi 9. la Pelle, e sono Pelli 15.  $\frac{1}{2}$  le quali costano à  
Soldi 8. di Contanti la Pelle Soldi 124  $\frac{1}{2}$ . & il 100. del Ferro in  
contanti costa Soldi 120. solamente, sicchè quella delle Pelli so-  
pira Soldi 4.  $\frac{1}{2}$ . per rifarsi de' quali si trovi il tempo che deve in-  
dugiare à consegnare la pelle, dicendo: Se à guadagnare Soldi  
20. ci vogliono. Mesi 4. che tempo ci vorrà à guadagnare Sol. $\frac{1}{4}$ .  
 $\frac{1}{2}$ . & operando secondo la regola del Trè, verranno  $\frac{1}{2}$  di mese,  
come per i modi del Tartaglia, e tanto tempo. aspetterà à con-  
segnare le Pelli dopo di aver ricevuto il Ferro; e così opera  
nelle simili.

45. D. Come nega il Tartaglia la Proposizione di Fr. Luca essere  
Baratto, quando si cerca il tempo da pagare la Mercanzia à pre-  
zzo di Baratto?

R. Il Tartaglia vuole, che sia vendita di Mercanzia à tempo, e  
benchè dica l'Unicorno ogni Vendita essere Baratto, è comun-  
mente di robba con Denari, & allora la Proposizione di Fr. Lu-  
ca secondo il Tartaglia, pure sarebbe baratto. Tuttavia non bi-  
sogna si deve pigliare sì largamente il nome di baratto; ma solo  
quando si comuta, e baratta Mercanzia, con altra Mercanzia,  
la quale si apprezzi in contanti, & in Baratto; e non offa, che  
dopo qualche tempo si paghi il prezzo della Mercanzia, il qua-  
le essendo prezzo non della Mercanzia in contanti, bensì prezzo  
di Mercanzia in Baratto, non si intendere, come il Tartaglia  
nega di essere Baratto, lo però m'avvedo, che di esso si avvera il  
proverbio: chi biasima vuol comprare; mentre propone molti  
Questiti di Fr. Luca, e come lui gli risolve con i medesimi nume-  
ri, variando solo il materiale della Mercanzia.

46. D. Che cosa si deve dire di Giuseppe Unicornio, il quale nel  
Questito 27. del lib. 5.º propone il sopradetto Baratto di Fr. Lu-  
ca appurato del Tartaglia nel Baratto 36. e dice che è stato dall'uo-  
ro, e dall'altro falsamente concluso?

R. Si deve dire, che ha errato, assai più del Tartaglia, non poten-  
dosi verificare la sua conclusione in alcun supposto; nell'assegnare  
mesi 3  $\frac{1}{2}$  di tempo da essere pagato quello delle Pelli da quello del  
Ferro.

**Ferro.** Per conoscere il suo abbaglio si sappia, che l'Unicorno si serve a determinare il tempo di mesi  $3\frac{1}{2}$  del Contante di Soldi 8. e del guadagno di Soldo  $1\frac{1}{2}$ . dicendo: Se Soldi 9  $\frac{1}{2}$  danno di tempo mesi 4. qualsevunque di tempo Soldi 9. che tanti si mette la Pelle in Baratto; cioè Soldi 8. di Contante con Soldo 1. di guadagno & c. ne viene il detto  $3\frac{1}{2}$ . ma non dovevasi servire che del puro guadagno in trovare il tempo; dicendo: Se Soldo  $1\frac{1}{2}$  di guadagno vuol mesi 4. che mesi vorrà Soldo 1. di guadagno & operato, venivano mesi 3. Alla determinazione di mesi  $3\frac{1}{2}$ . fa l'Unicorno questa prova, con dire: Se Lire 6. in mesi 4. tornano Lire 7. che torneranno Soldi 8. in mesi  $3\frac{1}{2}$ ? e torneranno Soldi 9. Non si arguisce dal Capitale con il tempo a Capitale, e Guadagno: trovare con altro Capitale, e tempo, corrispondente Capitale, e Guadagno: come si potrà osservare nel Trattato de' Meriti; perchè allora il Capitale, e Guadagno averà ragione di solo Guadagno. Nel proposto Esempio è come se dicesse con Lire 6. in mesi 4. si guadagnano Lire 7. che Soldi si guadagneranno con Soldi 8. in mesi  $3\frac{1}{2}$ . e vengono di guadagno Soldi 9. ma che ne risulta di buono da questo? che non si arguisca, come hò detto, si mostra con questo Esempio: Scudi 100. in Anni 3. a Scudi 5. per 100. guadagnano Scudi 15. Ora non vale il dire: Scudi 100. in Anni 3. tornano col guadagno Scudi 115. che torneranno Scudi 500. in Anni 4. perchè operando per regola del 5. torneranno Scudi 766  $\frac{2}{3}$ . e pure non guadagnano, che Scudi 100. che con Scudi 500. fanno Sc. 600. e non 766  $\frac{2}{3}$ . e la ragione di questo è, perchè Scudi 115. non hanno ragione di Capitale, e Guadagno: ma di solo guadagno: & allora è vero. Se 100. in Anni 3. guadagnano Soldi 115. Pure Scudi 500. in Anni 4. guadagnano Scudi 766  $\frac{2}{3}$ . Onde la prova dovevasi fare così, dicendo: Lire 6. in mesi 4. guadagnano Lire 1. che guadagneranno Soldi 8. in Mesi  $3\frac{1}{2}$ . e trovavasi venire Soldo  $1\frac{1}{2}$ . che aggiunto a Soldi 8. di Capitale, la somma 9  $\frac{1}{2}$ . faceva conoscere non essere stata buona la determinazione di mesi  $3\frac{1}{2}$ .

47. D. Facendo l'Unicorno una seconda prova, in che cosa è ella falsa?

R. La seconda prova che fa è questa. Trova, che quello delle Pelli da Soldi 124  $\frac{1}{2}$  in Pelli valutate in Contante, dove esso solo ripartì Soldi 120. in ferro valutate in Contante, e così dice: Se Soldi 4  $\frac{1}{2}$  sono guadagnati da Soldi 120. in mesi 4. da quello del Ferro, in quanti mesi faranno guadagnati Soldi 124  $\frac{1}{2}$  da quello del Corame? Questa è proposta di numeri non concludenti, e mancante di termini, e che operazione fa l'Autore? Moltiplica

dunque per regola del 3. al contrario la prima con la seconda, cioè 120. per il 4. prodotto parti per la terza, che è 124  $\frac{2}{3}$ . ne verranno mesi 3  $\frac{1}{3}$ . siccome fu proposto; sono sue parole, per le quali si conosce operare non per ragione, ma per avere intento di mesi 3  $\frac{1}{3}$ .

Hò detto che la Pco posta, è mancante di termini, perchè ci mancano i Soldi di Capitale, da i quali siano guadagnati Soldi 124  $\frac{2}{3}$  in quel tempo che si cerca, a quella ragione, che Soldi 4  $\frac{2}{3}$  sono guadagnati da Soldi 120. in mesi 4. Hò detto, che è proposta di numeri non concludenti; Perchè a che proposito si cerca il tempo, nel quale saranno guadagnati Soldi 124  $\frac{2}{3}$ ? se questi non sono Soldi di guadagno, ma prezzo di Contanti delle Pelli consegnate a quello del Ferro? Di più, come nella proposta dice, che Soldi 4  $\frac{2}{3}$  sono guadagnati da Soldi 120. in mesi 4. da quello del Ferro; lè è contro il supposto della Proposizione, in cui si dice guadagnarli Soldi 20. da Soldi 120. in mesi 4. da quello del Ferro? un'errore ne tira molti; Ora io dalli Soldi 124  $\frac{2}{3}$ . che da quello del Corame in tante Pelli valutate in Contante, provo vera la conclusione di Fr. Luca di mesi 3. e conseguentemente falsa questa di Giuseppe Unicornio di mesi 3.  $\frac{1}{3}$ . con questa Domanda, 48. D. Quello del Ferro con Lire 6. prezzo in Contante del cento del Ferro guadagna in Mesi 4. Lire 1. per ragione di Baratto. In quanto tempo con Soldi 124  $\frac{2}{3}$ . prezzo di Pelli valutate in Contanti, guadagnerà quello del Corame Soldi 15  $\frac{1}{3}$ ? che tanti ci vogliono di guadagno, assai con Soldi 124  $\frac{2}{3}$  di Capitale pareggino Soldi 140. ovvero Lire 7. che ha quello del Ferro dopo mesi 4?

R. Questa si risolve per la 14. della Distinzione 4. della regola del Cinque roverscia, intavolando i numeri come hò. vi insegnato, ponendo in primo luogo Lire 1. in secondo Soldi 124  $\frac{2}{3}$ . in terzo mesi 4. in quarto Lire 6., e nel quinto Soldi 15  $\frac{1}{3}$ . Ora moltiplicando i primi due numeri verrà il numero partitore, e moltiplicando i trè numeri, verrà il numero da partirsi, e fatta la divisione verrà di quoziente 3. e in tanti mesi saranno guadagnati Soldi 15  $\frac{1}{3}$ , che renderanno uguale il Baratto; come si potrà vedere rivoltando Domanda per regola del Cinque dritto e, dicendo: Quello del Ferro con Soldi 120. di Contante in mesi 4. guadagna Soldi 20. che guadagnerà quello del Corame con Soldi 124  $\frac{2}{3}$  di Contante in mesi 3? & operato secondo tal regola, o per due regole del Trè ne verranno Soldi 15  $\frac{1}{3}$ . li quali sommati con Soldi 124  $\frac{2}{3}$ . fanno Soldi 140. ovvero Lire 7. che dopo trè mesi deve ricevere quello del Ferro.

49. D. Nel fine dello  $\frac{1}{2}$  di questo dissi, che si deve seguitare a dichiarare di risolvere tali Baratti, se alcuno domanda: qual sia il modo di fare?

R. Dico, si regola efforzi del Cinque, e verifichi, la quale si è insegnata diffusamente al suo luogo; perchè quel prezzo di più, che si mette la Mercanzia in baratto è come guadagno, e il prezzo in Contante è come Capitale; onde versandosi il tempo, ovvero il prezzo in Contante, che fosse come tanto del guadagno, si opera per regola del Cinque, e verifichi; poi se si otterrà il prezzo in baratto, cioè sopra il contante, che è come guadagno, si opera per regola del Cinque, ditta; ovvero per due regole del Tre, e del Quattro di Br. Luca; il 100. del Ferro, che in Contante vale Lire 6. in baratto si pone Lire 7. di più, che è come guadagno, quella Lire, fatto in mesi 4. medesimamente la Pelle, che in Contante vale Soldi 8. in baratto si pone Soldi 9. di più, che viene ad esserli come guadagno. Onde si ricerca il tempo nel quale sarà guadagnato Soldo 1. da Soldi 8. Per il che come insegnai a collocare i numeri, in primo luogo si pone 12. in secondo Soldi 8. in terzo mesi 4. in quarto Lire 6. ed in quinto Soldi 1. Ora si moltiplicano i primi due fanno 8. partitore. Si moltiplicano li due ultimi numeri fanno 24. da dividersi il quale partitore per 8. nominista gli per intesi, che si cercano, così operati, nella simili.

50. D. Fra le cose risolte, la medesima proposta per Algebra, quanto si oscuramente, come più chiaramente si può risolvere?

R. Si opera per regola del Cinque, ditta, dicendo: Se Lire 6. in mesi 4. meritano Lire 1. Soldi 8. che cosa di tempo, che meritano tanto? si moltiplichi il 100. per 6. e per 4. per partitore, e si moltiplichi per 1. via 8. fa 8. e questo 8. medesimo 8. se si moltiplica per 124. ne viene 992. e si divide per 8. e viene 124. e questo 124. è quanto di più è valuto la Pelle in baratto; e cinque cose è uguale ad 1. questo si partono su come vuole la regola, e ne verrà 3. per il valore di 1. cosa, per inteso Centari. Per provare, che è buona e che non sia errore, si può rivolgerla Proposta, volendo Domanda cinque volte, come si disse nella regola del Cinque. E prima

51. D. Due barattano Corame a Ferro: Quello del Socrate valuta in Contanti la Pelle Soldi 8. in baratto di Soldi 9. tempo a pagamento mesi 3. e l'altro valuta in Contanti il cento del Ferro Lire 6. Si domanda quanto lo doverà mettere in baratto tempo mesi 4. a pagarlo?

R. Si sottrae Soldi 8. da Soldi 9. nominista Soldi 1. Ora si dice per regola del Cinque, ditta: Soldi 8. in Contanti meritano Soldo 1. che meritano Lire 6. in baratto, che il numero del fondo bene di.



baratto lo metta Lire 32. Domanda quanto tempo dovrà durare quella della Lana al quello del Beano, accio siano uguali nel baratto?

R. Questa è la proposta 38. di Fr. Luca Bartolomeo, la quale non è differente dalla 37. posta sopra nella Domanda 32. di questa. Si vien proposta dal Tartaglio, e Giuseppe Livicino, e sono conosciuti, e viene conclusa da loro, che per la Fr. Lana, si che vengono a vendannare le stoffe di quello che hanno detto. Anch'io concorro con loro nella conclusione, ma non nel modo di operare. Si dica dunque: Se Lire 8. si fanno Lire 9. che si faranno Lire 30. e avranno Lire 3.  $\frac{1}{2}$  di più. Se Lire 3.  $\frac{1}{2}$  di più danno termine mesi 10. Lire 2. di più sopra trenta che termine di tempo daranno? e avranno mesi 5.  $\frac{1}{2}$  di termine da darli a quello del Panno da quello della Lana.

Ma per regola del cinque, ovvero si dica: Se Lira 1. è meritata da Lire 8. in mesi 10. in che tempo saranno meritate Lire 2. da Lire 30? Cambiate di luogo Lire 8. e Lire 30. scambievolmente. Si moltiplica Lira 1. via Lire 30. partitore, e poi si moltiplicano mesi 10. Lire 8. e Lire 2. il prodotto 200. si parte per 30. e viene 5.  $\frac{1}{2}$  per i mesi di termine.

Per Algebra, facendo la regola del Cinque dritta. Se Lire 8. in mesi 10. meritano Lire 1. che meriteranno Lire 30. in quanti mesi di tempo? & operato verranno 4. cose uguali a Lire 30. uguali partite per 4. Vengono 5.  $\frac{1}{2}$  come prima.

53. D. Due barattano Zucchero, e Cera. Il 100. del Zucchero vale in contanti Lire 80. & in baratto si mette Lire 84. tempo mesi 6. Il 100. della Cera vale Lire 191.  $\frac{1}{2}$ . Si domanda che si dovrà mettere in baratto tempo mesi 8.

R. Si sottrino Lire 80. da Lire 84. restano Lire 4. onde per regola del Cinque dritta, si dica: Se Lire 80. in mesi 6. meritano Lire 4. che meriteranno Lire 191.  $\frac{1}{2}$  in mesi 8. & operato verranno Lire 12. 15. 6. che aggiunte a Lire 191. 12. 4. fanno Lire 204. 8. 10.  $\frac{1}{2}$ . e a tante si metterà in baratto il 100. della Cera tempo mesi 8. Si rholta per prova.

54. D. Due barattano Zucchero & Cera. Il 100. della Cera vale in contanti Lire 191. 12. 4. & in baratto si pone Lire 204. 8. 10.  $\frac{1}{2}$ . tempo mesi 8. Et il 100. del Zucchero, si mette in baratto Lire 84. tempo mesi 6. Si domanda quante Lire vale in contanti.

R. Si dica per regola del Tre: Se lir. 191.  $\frac{1}{2}$  s'accrescono a lir. 204. 8. 10.  $\frac{1}{2}$  che s'accrescerà lir. 12. & operato si accrescerà a Lir. 1. 1. 4 che sarà sol. 1. 4. di merito in mesi 8. Però si dica: se in mesi 8. sit me-

ria

rica Soldo 1. 4. che si meriterà in mesi 9 e verrà Soldo 1. Finalmente si dica 1604 lire 1. Soldo 1. viene da Lira 1. da quali Lire verranno Lire 84? & operato verranno da Lire 80. prezzo in contanti del 100. della Zucchero.

Per Algebra. Si dica per regola del Cinque dritta: Lire 191  $\frac{1}{2}$  in mesi 8. meritano Lire 12. 15. 6.  $\frac{1}{2}$ . che meriterà cosa 1. in mesi 6? & operato verrà  $\frac{1}{2}$  cosa, che aggiunto a cosa 1. Capitale, verrà cosa 1.  $\frac{1}{2}$  uguale a Lire 84. Capitale, e Brutto; e partite: Lire 84 per  $\frac{1}{2}$  verranno Lire 80. &c.

Al 1° caso. Si dica per regola del Cinque dritta: Lire 12. 15. 6.  $\frac{1}{2}$  — Cosa 1 — Mesi 6?

risponde. 0. n. b. lire 1.  $\frac{1}{2}$  —

— 191  $\frac{1}{2}$  lire 1. 16. 0. 8. —

— 1604 lire 1. 16. 0. 8. —

— 1604 lire 1. 16. 0. 8. —

— 1604 lire 1. 16. 0. 8. —

— 1604 lire 1. 16. 0. 8. —

— 1604 lire 1. 16. 0. 8. —

57. D. Due barattano Lana a Seta. Il 100. della Lana vale in Contanti alcuna cosa, in baratto si pone Lire 56. tempo a pagamento mesi 9. La libbra della Seta vale Lire 22.  $\frac{1}{2}$ . in Contanti, & in baratto si pone Lire 27.  $\frac{1}{2}$ . tempo a pagamento mesi 6. Domanda quanto vale il 100. della Lana in Contanti?

R. Si dica per regola del Cinque: Lire 22  $\frac{1}{2}$  in mesi 6. meritano Lire 9. che meriterà Lira 1. in mesi 9. e verrà  $\frac{1}{2}$  di Lira, che aggiunto a Lira 1. fa Lira 1  $\frac{1}{2}$ . e si dica: Lira 1  $\frac{1}{2}$ . viene da Lira 1. da quali verranno Lire 56? & operato verranno da Lire 42. prezzo del 100. della Lana in Contanti.

58. D. Due barattano Lana a Seta: La libbra della Seta vale in Contanti alcuna cosa, & in baratto Lire 27.  $\frac{1}{2}$ . e fa tempo a pagamento mesi 6. Il 100. della Lana vale Lire 42. & in baratto si pone Lire 56. tempo a pagamento mesi 9. Domando il prezzo della Seta in Contanti?

R. Si opera come nella passata, dicendo: Lire 42. in mesi 9. meritano Lire 14. che meriterà Lira 1. in mesi 6? verranno  $\frac{1}{2}$  di Lira, che aggiunti a Lira 1. fa Lira 1  $\frac{1}{2}$ . e se Lira 1  $\frac{1}{2}$  viene da Lira 1. da quali Lire verranno Lire 27  $\frac{1}{2}$ ? & operato risulteranno Lire 22  $\frac{1}{2}$ . prezzo in Contanti della Seta.



Lire 42 — Mesi 9 — Lire 14 — Lire 5 — Mesi 6

9

6

378

84

Schifato  $\frac{9}{9}$

378

Se Lira 1  $\frac{1}{2}$  — da Lira 1 — Lire 27  $\frac{1}{2}$

31

55

2

9

Per 22

495

Lire 22  $\frac{2}{3}$  Schifato  $\frac{2}{3}$

59. D. Due barattano Seta à Lana. Il cento della Lana vale in Contanti Lire 42. e si contò in baratto Lire 14. più, tempo à pagamento mesi 9. e la libbra della Seta si contò Lire 5. più in baratto, che in Contanti, tempo à pagamento mesi 6. Si domanda quanto costò in Contanti? &c.

R. Questa si risolve per regola del Cinque roverscia; perchè è come si domandasse il Capitale domandandosi il prezzo della Seta in Contanti; E però ponendo in primo luogo Lire 14. In secondo mesi 6. In terzo Lire 42. In quarto mesi 9. In ultimo Lire 5. e moltiplicato 14. via 6. fa 84. partitore, e moltiplicati gl'altri tre numeri fanno 1890. che si parte per 84. il quoziente 22  $\frac{1}{2}$  sono Lire di Contanti, che vale la libbra della Seta, &c.

60. D. Due s' accordano di barattare Lana à Panno. Il cento della Lana vale à tempo di mesi 4. Lire 40. e lo mette in baratto Lire 48. La Canna del Panno vale à tempo mesi 6. Lire 10. Si domanda quanto si metterà in baratto, scontando le Lire à ragione di 10. per 100. à capo d' Anno?

R. De' Meriti, e Sconti à capo d' Anno si parla à suo luogo; Qui solo si metterà la sola pratica per risolvere il detto baratto. Prima si meriti no lire 40. à 10. per 100. per mesi 3. e il Capitale, e frutto si sconti per un Anno, dicendo per regola del 5. Lire 100. in Anno 1. guadagnano lir. 10. che guadagneranno lir. 40. in  $\frac{3}{4}$  d' Anno? operato, verranno lire 2  $\frac{1}{4}$ . le quali aggiunte à lire 40. fanno 42  $\frac{1}{4}$ . Ora per scontarle si dica: Se 11. tornano 10. che torneranno lire 42  $\frac{1}{4}$ ? e torneranno lire 38.  $\frac{1}{4}$ . Dunque il cento della Lana vale lire 38  $\frac{1}{4}$  senza altro termine. In baratto si pone lire 48. Adesso pure si meriti no per mesi 6. lir. 10. à 10. per 100. verra di merito  $\frac{3}{4}$  di lira, che aggiunto à lire 10. fa lire 10  $\frac{3}{4}$ . le quali si sconti no per un Anno, dicendo: Se 11. tornano 10. che torneranno lir. 10  $\frac{3}{4}$ ? e torneranno lir. 9  $\frac{1}{4}$ . e tanto vale la Canna senza al-

V u

lenz'altro termine, che però si dica per regola del Trè : Se 38  $\frac{2}{3}$  si mettono in baratto lire 28. che si metteranno in baratto lire 9  $\frac{1}{2}$  ? & operato si metteranno lire 11  $\frac{1}{2}$ . e tante lire si apprezzerà in baratto la Canna del Panno, cioè lir. 111 sol. 16. den. 3.

61. D. Due vogliono barattare Canapa a Panno. La Canna del Panno vale a contanti lire 9. & in baratto si mette lire 12. e di questo vuole la metà in denaro in capo di mesi 10. l'altra metà in Canapa, il cento della quale vale in contanti lir. 24. & in baratto si pone lire 32. e si il baratto uguale. Si domanda quanto guadagno la lira il mese ?

R. Perchè Lire 9. di Contanti a Lire 12. di baratto, fanno come lir. 24. di Contanti a lire 32. di baratto, si operi brevemente. Così da Lire 12. si sottrimo Lire 9. restano lire 3. Adesso per regola del Quattro si dica : Se lire 9. in mesi 10. guadagnano Lire 3. che guadagnerà Lire 1. in mese 1. & operato, verranno Denari 8. per Lira il mese. Si prova così questo Baratto.

62. D. Uno baratta Canne 8. di Panno con Canapa, il cento della quale vale in Contanti Lire 24. & in baratto si pone lire 32. La Canna del Panno vale in Contanti lire 9. in baratto Lire 12. con volere la metà in Denaro passato mesi 10. e l'altra metà Canapa di presente. Si domanda per le dette Canne quante libbre di Canapa avrà di presente, e che verrà a guadagnare la Lira il mese ?

R. Si valutino Canne 8. di Panno a lire 12. in baratto la Canna, costano Lire 96. la metà delle quali, cioè lire 48. deve ricevere quello del Panno dopo mesi 10. l'altra lire 48. in Canapa a Lire 32. in baratto il 100. sicché riceverà libbre 150. di Canapa di presente, le quali a lire 24. in Contanti costano lire 36. e tante lire dovrebbe ricevere di presente, che con l'altra fanno Lire 72. Quante vagliono in Contanti Canne 8. a Lire 9. la Canna, ma ne deve ricevere lire 48. dopo mesi 12. Dunque Lire 36. in mesi 10. guadagnano lire 12. esse guadagnerà a questa ragione Lire 1. in mese 1. & guadagnerà Denari 8. sicché si prova torna. Quello del Panno ha di presente Canne 8. di Panno, che costano in Contanti lire 72.

Riceve libbre 150. di Canapa, che in Contanti costano lire 36. l'altra Lire 36. le tiene a guadagno per mesi 10. a Denari 8. per Lira il mese, e gli fruttano lire 12. & così riceverà Lire 48. dopo mesi 10. come si disse con baratto uguale.

63. D. Due barattano Lana a Panno. La Canna del Panno vale lire 8. & in baratto si conta alcuna cosa, e di quello ebbe la metà in Denari dopo mesi 8. e l'altra metà in Lana al presente. Si domanda quanto della

to della quale vale lir. 30. ed in baratto si conta Lire 36. e fu prestata la Lira il mese a Denari 6. Vogliò sapere la Canna del Panno in baratto?

R. Questo è il penultimo Baratto di Filippo Calandri Fiorentino, nel suo Pitagora, il quale presto si scioglie così dicendo: se Lire 30. si contano 36. in baratto, che si conteranno Lire 60. Ovvero se 5. si conta 6. che si conterà 60. e verità  $7\frac{1}{2}$ . per le Lire in baratto, è questo avviene per la ragione detta della Risposta della 61. di quello; per darli fra il Contante, e Baratto la medesima proporzione, e nel Panno, e nella Lana.

64. D. Due barattano Lana a Panno: La Canna del Panno vale Lire 6. ed in baratto si conta alcuna cosa, e di questo vuole la metà in Lana al presente, il cento della quale vale lir. 30. ed in baratto si conta lir. 35. e fu prestata la Lira il mese a Den. 6. voglio sapere la Can. del Panno in baratto quante Lire fu apprezata,

R. Questa è più difficile della passata; e il modo dato non serve per non avere la medesima proporzione; ma il modo seguente è universale. Si veda quanto dà di Contanti quello, che ha valutata la Mercanzia in contante, ed in baratto, cioè quello della Lana supponendo, ne dia un centinaio, che in Baratto vale lire 35. ed in altre lir. 35. deva passati mesi 8. delle quali se ne faccia lo conto semplice a ragione di Denari 6. per lire il mese, per mesi 8. per vedere quante Lire doveret be dare di presente. Si moltiplichino den. 6. per mesi 8. fanno den. 48. che sono Sol. 4. che aggiunti a sol. 20. fanno sol. 24. e si dica: se 24. tornano 30. ovvero 6.5. che torneranno lir. 35. e torneranno 29 $\frac{1}{2}$ . che sommate con lir. 30. che in contanti vale un centinaio di Lana, fanno lir. 59 $\frac{1}{2}$ . che sono lir. 70. di baratto. Dunque che faranno lir. 6. prezzo della canna in contanti? e faranno lir. 7 $\frac{1}{2}$  in baratto, che si cercavano, e così operarsi nelle simili.

65. D. Quel del Panno barattando Canne 71. di Panno con le condizioni dell' antecedente, quante centinaia di Lana averà, e quante lire dovrà avere dopo mesi 8. e come resterà provata la passata?

R. Si valutino Canne 71. a Lire 7 $\frac{1}{2}$  prezzo venuto in baratto, costano lir. 504. la metà cioè 252. in Lana a lir. 35. il cento; vengono centinaia 7 $\frac{1}{2}$ . di Lana al presente; e lir. 252. dopo mesi 8. essendo imprestata la Lira a Denari 6. il mese; Per provare la passata: Centinaia 7 $\frac{1}{2}$ . a lire 30. in Contanti il cento costano lir. 216. le quali sommate con lir. 252. da pagarsi dopo mesi 8. fanno lir. 468. dalle quali si sottrino lir. 426. prezzo di Canne 71. a Lire 6. in Contanti, restano Lire 42. guadagnate in mesi 8. di quel-

da quello del Panno con Lire 210. perchè tante restano a sottrarre da Lire 426. prezzo del Panno in contanti; Lire 216. prezzo di centinaja  $7\frac{1}{2}$  a Lire 30. in Contanti, che però per regola del Cinque si dica: Se Lire 210. in mesi 8. guadagnano lir. 42. che guadagnerà Lira 1. in un mese? & operato verranno Denari 6. sicchè resta provata la passata, e questa ancora, per essere venuti Denari 6. perchè per tanti fu prestata la Lira il mese.

66. D. Due barattano Lana a Panno. La Canna del Panno si conto più Soldi 30. in baratto, che non valeva in Contanti, e di questo prezzo in baratto ebbe  $\frac{1}{2}$  in Denaro dopo mesi 12. e  $\frac{1}{2}$  in baratto di Lana al presente. Il cento della Lana vale Lire 30. & in baratto lir. 40. e fu prestata la Lira il mese a denari 4. Si vuol sapere quanto valse la Canna, e quanto si conto in baratto?

R. Si procede come nella 64. di questo, supponendo, che quello della Lana gli dia di presente un centinajo di Lana, che vale in baratto lir. 40. e gli restia dare lire 20. dopo mesi 12. per essere  $\frac{1}{2}$ . Adesso si veda quante lire gli verrebbe a dare in contanti. Cento libbra di Lana costano lir. 30. Si contino lire 20. a denari 4. per lira il mese, per mesi 12. moltiplicando questi per denari 4. fanno denari 48. cioè soldi 4. che aggiunti a soldi 20. fanno soldi 24. e si dica: Se soldi 24. tornano scontati soldi 20. ovvero, se 6. tornano 5. che torneranno lir. 20. e torneranno lire 16  $\frac{1}{2}$ . che gli doveria dare di presente quello della Lana, che con lire 30. fanno lire 46  $\frac{1}{2}$ . e in baratto col tempo sono lire 60. dalle quali si sottrano lire 46  $\frac{1}{2}$ . restano lire 13  $\frac{1}{2}$ . differenza. Però per regola del Tre; Se lire 13  $\frac{1}{2}$  vengono da lir. 46  $\frac{1}{2}$  di contanti; da quali soldi verranno soldi 30. differenza tra il prezzo della Canna in contanti, & in baratto? & operato, verranno da soldi 105. e tanti valse la canna del Panno in contanti, a i quali aggiunti 30. fanno soldi 135. prezzo in Baratto; li quali prezzi si cercavano; E così si procede nelle simili; la prova si faccia con rivoltarla, facendo altra Domanda, e si operi come nell' antecedenti.

67. D. Due barattano Cera a Pepe: La libbra del Pepe vale soldi 54. & in baratto lo mette soldi 60. La libbra della Cera vale soldi 32. & in baratto la pone soldi 40. con questo però, che vuole il Pepe al presente, & esso vuol dare tal parte di denaro, e Cera dopo un' anno, che quello del Pepe guadagni 5. per 100. essendo d' accordo. Si domanda che parte darà?

R. Si faccia così, dicendo: Se 100. tornano 105. col guadagno, che torneranno Soldi 54. prezzo del Pepe in contanti? e torneranno

**OMITTE** **OMITTE**  
 hanno soldi 66. li quali si sottrino dalli soldi 60. prezzo in baratto restano 3  $\frac{1}{2}$ . per li quali si partano 60. vengono 18  $\frac{1}{2}$ . Medesimamente si sottrino soldi 32. prezzo in contanti da soldi 40. prezzo in baratto della libbra della Cera restano soldi 8. per questi si partano soldi 40. vengono 5. li quali adesso si partano per 18  $\frac{1}{2}$  di sopra vengono  $\frac{1}{2}$ . e tali parti di Cera, e  $\frac{1}{2}$  di denaro, dopo un anno, darà quello nella Cera all'altro del Pepe, il quale guadagnerà a ragione di 5. per 100. se ne faccia prova. Ricevè di presente libbre 40. di Pepe, che à soldi quaranta la libbra in baratto costano soldi 2400. de' quali  $\frac{1}{2}$  sono soldi 1740. da darli in denaro, restano soldi 660. che à soldi 40. in baratto, importano libbre 16  $\frac{1}{2}$  di Cera, da darli dopo un anno con soldi 1740. a quello del Pepe, il quale con aver dato libbre 40. di Pepe à Soldi 54. la libbra in contanti, ha dato soldi 2160. ed ha ricevuto libbre 16  $\frac{1}{2}$  di Cera, che à soldi 32. la libbra in contanti, importano soldi 528. che sommati con soldi 1740. fanno soldi 2268. per il che si dica: Se soldi 2160. tornano soldi 2268. che torneranno soldi 100? e torneranno soldi 109. appunto. Dunque resta provata la lezione.



**TRAT**

# TRATTATO SETTIMO

Del Merito Mercantile, e Sconto  
semplice, ed à Capo d'Anno,  
ò d'altro tempo,

*Con le loro pertinenze.*

## DISTINZIONE PRIMA.

Q. D.

R.

108

101

101



*Che cosa è merito semplice?*

Il Merito semplice nell'arte Mercantile è una quantità di denaro dovuta, secondo il patto, o legge, al Capitale d'un'altra quantità di denaro in determinato tempo, il quale Capitale deve stare sempre stabile, per qualsivoglia spazio di tempo, à diffe-

renza del merito à capo d'Anno, che non pagato si fa Capitale, e così viene à crescere; per esempio: Scudi 100. dati à Censo à Sc. 5. per 100. l'Anno: li scudi 5. sono il merito, ò si dica guadagno, frutto, utile, ed usura, il qual merito viene caufato e dal denaro, e dal tempo insieme, non fruttando denaro senza tempo, ne tempo senza denaro.

2. D. Che cosa è Sconto semplice?

R. Lo Sconto semplice è una diminuzione di denaro, che tutto si doveria pagare dopo uno stabilito tempo, fatta à ragione opposta al merito d'un tanto per quella quantità di denaro, che si è contrattata à causa di presente pagamento, per esempio: Un Mercante hà venduto roba per scudi 105. da pagarseli dopo un'anno; Mà per avergli oggi offerisce al compratore lo sconto di scudi 5. per 100. l'anno. Se il compratore si contenta per scudi 105. da pagarsi dopo un'anno, ne paga scudi 100. di presente, ed è saldata la partita; perchè tale diminuzione deve essere fatta in tal modo, che il denaro restato dopo lo sconto, meritato alla medesima ragione ritorni quel denaro appunto, sopra il quale si fece lo sconto; E per questo lo sconto dagli Arimmetici viene chiamato atto contrario al merito, e gli serve di

PROVA

rito

rito d' una quantità di denaro in certo tempo ad una data ragione per 100. l' anno, ovvero per lira, o scudo il mese, quanto lo sconto fatto sopra tal capitale; e merito insieme; e se di scudi 100. in un' anno il merito è di Scudi 5. dico che lo sconto di Sc. 105. merito; e capitale a ragione di 5. per 100. pure è di scudi 5. che levati da scudi 105. restano scudi 100. meritali; sicche nel merito scudi 100. si fanno scudi 105. e nello sconto sc. 105. tornano scudi 100.

3. D. Si deve approvare per buono l' operare li sconti a modo di merito con sottrarne tal merito dal capitale?

R. Non deve si approvare per essere contrario quasi a tutti gl' Autori d' Arithmetica, che dello sconto hanno trattato; & il Forestani nella Proposizione prima degli Sconti sempre chiama tal modo d' operare falso, & usurario. Nell' esempio di scudi 105. scontati a scudi 5. per 100. l' anno tornano scudi 99  $\frac{1}{4}$ . secondo il modo falso di trovare il merito di sc. 105. a sc. 5. per 100. l' anno, che è di sc. 5  $\frac{1}{4}$ . li quali si sottrano da scudi 105. e restano i detti sc. 99  $\frac{1}{4}$ . ma quello che riceve con tal modo di sconto scudi 99  $\frac{1}{4}$ . meritandoli a sc. 5. per 100. l' anno; non torna altro scudi di 105. bensì scudi 104  $\frac{1}{4}$ .

4. D. Scusa da questo male operare l' afferire la pratica di qualche Piazza mercantile?

R. Essendomi capitati alcuni manoscritti d' Abbatoni, ne quali era notato questo titolo: *Sconti fatti secondo l' uso della Piazza di Fiorenza*, & osservati poi trovar che erano fatti a modo di merito col sottrarre; e ch' gli aveva operati stimò di sottrarsi dalla saccia, che potevano avere con dire, che erano fatti secondo l' uso della Piazza di Fiorenza; per questo ho fatta la detta Domanda, alla quale rispondo, che non scusa, perchè per l' uso, o per dire meglio, per l' abuso, non si deve mutare l' operazione di sconto in operazione di merito; e pretendere che sia l' stesso; e poi come si può salvare, che lo sconto sia un atto contrario al merito secondo gl' Autori d' Arithmetica, se fosse operata a modo di merito? e come si proverebbe l' uno per l' altro, come si fa il moltiplicare per il partire, il sottrarre col sommare, se la sottrazione fosse atto contrario al merito?

5. D. Questo uso, e pratica d' operare gli sconti odè stato sempre in Fiorenza?

R. Può essere, che sia stato appreso il poco intendenti, i quali abbiano stimato, che scontare 5. per 100. l' anno sia abbassare, e diminuire il 100. a 95. come si suol fare nel tarare la mercanzia a 5. per 100. e così abbiano seguitato il medesimo modo d' operare per

re per offrire più facile; ma in verità, prima si deve aggiungere al capitale il merito, e poi procedere allo sconto; e così aggiunto il 5. al 100. fa 105. e si dice: Se 105. torna 100. levatq lo sconto, che tornerà 100. & operato, verrà  $95\frac{1}{5}$ . e tanti saranno scontati scudi 100. a ragione di 5. per 100. in un' anno; e se scudi  $95\frac{1}{5}$  si meriteranno a 5. per 100. per un' anno, ritorneranno con il merito di scudi  $4\frac{1}{5}$  come prima sc. 100. e questo è di giustizia, acciò quello, che riceve il denaro con lo sconto non sia danneggiato.

6. D. Come si sa, che i Periti, & Intendenti non abbiano seguitato tal' uso in Fiorenza?

R. Si sa dall' Opere, che hanno stampato; perchè si trova nell' Arimmetica stampata l'anno 1521. lib. VI. num. 22. di Francesco di Lionardo Galigai Fiorentino Autore assai intendente nell' Abbaco mercantile, e nell' Algebra ancora, che dello sconto dice così: Il modo dello scontare a tanto per 100. l' anno, è a tanto la lira il mese, s' intende meritato; cioè quando dice scontare tante lire per tanto tempo a 2. denari la lira il mese, è a quello ti pare, non intendere, che d' una lira si scontino 2. denari; ma d' una lira, e 2. denari si scontino 2. denari; e così parimente scontando 100. a 5. per 100. l' anno, di 100. non si scontano 5. ma di 105. si scontano 5. e pone l' esempio ivi giustamente operato; Medesimamente Filippo Calandri Fiorentino, nel suo Opuscolo intitolato Pittagora introduttore all' Arimmetica, stampato nell' anno 1518. e dedicato a Giuliano di Lorenzo Medici, pone questo per primo esempio de' sconti semplici. Uno deve avere da un' altro scudi 125. soldi 12. denari 6. a oro di qui a mesi 6. giorni 18. vorrebbe oggi, e farne lo sconto a denari  $2\frac{1}{2}$ . per lira il mese, meritando semplicemente, si domanda quanti scudi avrà con detto sconto? e risponde dopo l' operazione, che avrà scudi 117. soldi 10. denari 10. a oro; dal che si cava, che l' uso falso introdotto degli sconti non era allora in Fiorenza, siccome dal seguente par suo. Uno deve avere da un' altro sc. 87. soldi 16. denari 8. a oro di qui a 2. anni, 6. mesi, 12. di, vorrebbe oggi, e farne lo sconto a  $7\frac{1}{2}$ . per 100. l' anno, meritando semplicemente, e risponde che doverà avere scudi 73. soldi 16. denari 2. a oro con detto sconto; e quando averà insegnato l' operazione di tali sconti, per giustamente farli, allora potrà ciascuno vedere tali sconti esser bene scolti, e non secondo la pratica, e l' uso falso in Fiorenza, e forse in altro luogo introdotto.

7. D. Il Sig. D. Giuseppe Giacchi Fiorentino nel suo Libro stampato nell' anno 1675. a carte 82. dice, non è dubbio alcuno, che lo scon-



lo sconto è il viceversa del merito, ed in altro non varia, che il merito si aggiunge al capitale, e lo sconto si sottrae, volendo scontare à 5. per 100. l'anno scudi 200. scontreranno scudi 10. e questi moltiplicati via gl'anni 3. producano scudi 30. che sbattuti da scudi 200. restano scudi 170. e tanti si doveranno pagare prontamente per li scudi 200. con lo sconto di 5. per 100. in anni 3. mà questo modo di scontare è secondo l'uso di Fiorenza, come dunque gl'Intendenti non hanno seguitato tal' uso?

R. Questo Autore si è contraddetto, ò disdetto, perchè sapendo, che alcuni periti Autori dannano tal' uso per falso; tuttavia si protesta di non volerli partire da tal'uso; ò pratica, potendo dire di se stesso: *Video meliora, proboque; deteriora sequor*. A' carte 92. poi trattando dello Sconto à capo d'anno, riconosciutosi dell'errore dice così: Lo sconto è viceversa del merito, benchè non torni il medesimo à dire merita, per esempio scudi 450. à 10. per 100. in un'anno, meriteranno scudi 45. che sommati con scudi 450. producano scudi 495. Il voler fare lo sconto sopra sc. 495. à 10. per 100. non ritornerà mai la medesima somma di sc. 450. cioè operando con dire: Se 100. torna 90. che torneranno scudi 495. (che è l'uso che dicono della Piazza di Fiorenza), e soggiunge; mà se si osserverà la regola buona, e vera, che chi merita 10. per 100.: merita una decima parte del suo guadagno, deve dire del suo capitale; e chi sconta 10. per 100. viene à fare di 110. 100. e per conseguenza di 20. fa 10. Allora tornerà giusto lo sconto col merito. Anzi sono alcuni Autori, che chiamano tal modo usurario, e lo provano con ragione molto efficaci, e dicono non doverli usare altra regola, che quella del Tre: Perchè se si dirà, se 100. si vuole fare 110. quanto si farà 450. ne verranno scudi 495. che tanti tornano meritati à 10. per 100. mà se si vorrà cavare lo sconto à 10. per 100. sopra sc. 495. secondo la regola solita d'usarsi, e non per regola del Tre, ne verranno Scudi 49  $\frac{5}{10}$  di sconto, e non Scudi 45. come dovrebbe, e questo dipende dall'aumento, che fanno Scudi 45. che meritano Scudi 4  $\frac{5}{10}$ . mà usasi la giusta, e perfetta regola del Tre, e si avrà lo sconto di Scudi 45. come dicendo: Se Scudi 110. merito, e capitale si vogliono fare 100. quanto si doveranno fare Sc. 495? e ritorneranno Scudi 450. già proposti: Queste sono parole del Ciacchi; che condannano per falso l'uso, e per usuraria la pratica Fiorentina, sì come fa il Forestani nel luogo detto di sopra, e tutti gl'altri Arimmetici con dimostrarne pratica à quella contraria.

8. D. Il Ciacchi dice, usasi la giusta, e perfetta regola del Tre, che allora tornerà giusto lo sconto con il merito; Forse, che

R X

non ci

non ci è la regola del Trè nell' operare lo sconto nel modo falso?  
 R. Ci è la regola del Trè nel falso supposto, che 100. scemi à 90. che scemaranno Scudi 495. mà perchè in Fiorenza l' operazione de' meriti, e degli sconti fatti à modo di meriti la pongano sotto la regola de' Partitori, così detta, perchè si ricerca il partire à colonna, per essere in primo luogo della regola del Trè il 100. li di cui numeri di ripiego sono 10. e 10. mà facendosi lo sconto bene, si aggiunge al 100. il merito. allora per lo più si deve fare il partire à Danda, nel vero supposto, che 110. tornino scontati 100. che torneranno 495? Per questo il detto Ciacchi ha detto se si userà la regola del Trè: tal regola però è nell' uno, & altro modo, perchè non varia regola, ò si faccia il partire à colonna; ò à danda, ò in altra maniera.

Avendo detto, che cosa sia merito, e sconto, e come questo si deve intendere, si fanno alcune Domande per imparare ad abbreviare alcune operazioni, e prima.

9. D. Se la Lira, ò lo Scudo guadagna denari 2. il mese, che guadagneranno lire 100. ò Scudi 100. in un' anno?

R. Li denari, che guadagna la lira, ò lo scudo ( il quale s' intende diviso in 20. e 12. come in Soldi, e denari ) il mese, si moltiplicano per 5. il prodotto sono lire, che guadagnano lire 100. in un' anno. Onde moltiplicando denari 2. per 5. vengono 10. e tante lire guadagnano lir. 100. in un' anno. La ragione è, perchè guadagnando la lira denari 1. il mese, guadagna Soldi 1. in mesi 12, cioè in un' anno; e lire 100. guadagnano Soldi 100. li quali si partono per 20. per farne lire, e vengono lir. 5. per il quale numero si moltiplicano i denari &c.

10. D. Se lire 100. ò Scudi guadagnano lire 10. quanti denari guadagnerà la lira, ò lo Scudo il mese?

R. Si partono lire 10. per 5. e vengono denari 2. che guadagna la lira, ò Scudo il mese, per la ragione passata.?

11. D. Sapendosi quanti denari guadagna la lira, ò Scudo il mese come si può sapere qualsivoglia quantità di Lire, ò di Scudi quanto guadagni in un' anno?

R. Si parte la quantità delle lire per 20. ( quello che si dice delle lire s' intenda proporzionalmente delli Scudi ) il quoziente si moltiplica per i denari, il numero prodotto sono le lire, ò Scudi di guadagno in un' anno; per esempio lir. 650. in un' anno, che frutteranno 2 denari, 2. per lira il mese? Si partono lir. 650. per 20. e vengono 32  $\frac{1}{2}$ . che si moltiplicano per denari 2. e vengono lire 65. guadagnate in un' anno da lire 650. Si prova, guadagnando la lira denari 2. il mese, per la 9. lir. 100. guadagnano lir. 10.

347

lir. 20. in un'anno . Dunque si moltiplicano lir. 650. per 10. il prodotto 6500. si parte per 100. e tornano lir. 65. di guadagno , come prima .

Lire 650

20  $\frac{1}{2}$  — dan. 2

*Prova.*

Lire 650 — Li. 10

Lire 65. di guadagno

Lire 6500

13. D. Come si può sapere il tempo, nel quale si guadagni il Capitale , cioè si raddoppi , ed ancora se ne guadagni la metà , il terzo, il quarto, ò qualsivoglia altra parte ad una data ragione per 100. l'anno , ò per lira il mese .

R. Se si partirà il 100. per la data ragione ne risulterà il tempo, nel quale si guadagnerà il capitale , e se per la data ragione , per lira il mese si partirà il 20. si avrà il medesimo tempo , per esempio : Volendo sapere Scudi 500. à Scudi 5. per 100. in quanto tempo frutteranno Scudi 500. che si raddoppieranno . Si parta 100. per 5. e verrà 20. e in tanti anni si raddoppieranno Scudi 500. ò qualsivoglia quantità a quella ragione . Adesso volendo sapere in quanto tempo si guadagnerà la metà , il quarto , ò quinto del capitale , si piglia la metà di quel tempo , cioè anni 10. il quarto anni 5. &c. e si guadagnerà la metà , ò il quarto &c. di Sc. 500. ovvero d'altra quantità a quella ragione di Scudi 5. per 100. nel tempo trovato .

*Merito d' Anno 1.*

13. D. Uno ha dato à guadagno Sc. 480. à ragione di Scudi 4. per 100. l'anno . Si domanda quanto gli frutteranno in un' anno ?

R. Per regola del Trè ; Se Scudi 500. fruttano Scudi 4. che frutteranno Sc. 480. nel medesimo tempo ? Sc. 480. si moltiplicano per 4. il prodotto 1920. si parte per 100. ovvero per 10. e 10. facendo Soldi dell'avanzo , vengono Sc. 19. Sol. 4. e tanti gli frutteranno, li quali sommati con Scudi 480. di Capitale fanno Sc. 499. Sol. 4. ovvero si aggiungono Sc. 4. di guadagno al 100. vengono Sc. 104. e si dice : Se 100. tornano col guadagno 104. che torneranno, Scudi 480 ? è moltiplicato , e partito , torneranno Sc. 499. Sol. 4. da' quali sottratti Sc. 480. di capitale restano Sc. 19. Sol. 4. di guadagno .

*Sconto d' Anno 1.*

14. D. Uno è creditore di Sc. 499. Soldi 4. da pagarseli dopo un anno, da Pietro , il quale paga il debito con lo sconto di Scudi 4. per 100. l'anno , d'accordo . Si domanda quanti Scudi paghi Pietro al presente ?

R. Questo sconto serve di prova al passato merito dovendo tornare in questa Sc. 480. capitale ; li Scudi 4. di sconti si sommano con 100. fanno Scudi 104. e si dice : Se Scudi 104. danno di sconto

$\frac{4}{104}$

Scu-

Scudi 4. che ne daranno Scudi 499. Soldi 4? e verranno Sc. 19.4. li quali si levano da Scudi 499. Sol. 4. restano Scudi 480. da pagarsi al presente da Pietro. In altro modo si dica: Se Sc. 104. con lo sconto tornano Scudi 100. che torneranno Scudi 499 4? ed operando come vuole la regola del Trè, torneranno Scudi 480. da riceverli di presente dal Creditore, quali Scudi se li darà a guadagno a Scudi 4. per 100. l'anno; Dopo un' anno dovrà avere Scudi 499. Sol. 4. di quanti si disse essere creditore, ed in questo modo di sconti ci è giustizia, e non in quello a modo di merito col sottrarre.

*Secondo modo.*

Scudi 104 — Sc. 4 — Sc. 499. 4.	Sc. 104 — 100 — Sc. 499 $\frac{4}{100}$ .
26 — 1 2 249. 12.	5
Schiso per 4 13 19. 4	4 24960
	5210 13 6240
	Scudi 480

15. D. Uno ha dato a guadagno Scudi 860. Sol. 13. denari 4. a ragione di Scudi 100. l'anno. Si domanda quanto frutteranno in anni 4?

R. Per regola del Trè composta, ò del 5. si operano tutti i meriti dicendo; se Scudi 100. in un'anno guadagnano Scudi 5. che guadagneranno Scudi 860. 13. 4. in anni 4? ed operando come si è insegnato, guadagneranno Scudi 172. Soldi 2. den. 8. ma secondo la pratica si moltiplicano Scudi 860. 13. 4. per Sc. 5. il prodotto 4303. 6. 8. si parte per 10. il quoziente 430. 6. 8. si parte per 10. il quoziente Sc. 43. —. 8. è il guadagno d'un' anno, quale si moltiplica per anni 4. e tornano Scudi 172. 2. 8. come sopra, i quali si sommano con Sc. 860. 13. 4. Capitale vengono Scudi 1032. Soldi 16. da restituirsi per saldo dopo 4. anni.

Chi guadagna 5. per 100. guadagna la ventesima parte, che però partendo Scudi 860. 13. 4. per 20. il quoziente si moltiplichì per anni 4. verrà il medesimo guadagno, e per schiso basta partire li Scudi 860. 13. 4. per 5. e verrà il detto guadagno.

Scudi 860. 13. 4.	Scudi 860. 13. 4.
per 20. 43. —. 8 — An. 4	per 5. —————
—————	Scudi 172. 2. 8.

Scudi 172. 2. 8

16. D. Un Mercante è creditore di Sc. 1032. Soldi 16. da pagarsi dopo anni 4. Si domanda quanti ne dovrà avere al presente con lo sconto di Scudi 5. per 100. l'anno semplicemente.

R. Si moltiplicano li Scudi 5. di sconto, per il tempo, cioè per anni 4. e vengono Sc. 20. Perchè se un'anno danno Scudi 5. di sconto: Anni 4.

Anni 4. ne danno scudi 20. i quali si aggiungano al 100. fanno scudi 120. onde si dice : Se scudi 120. tornano con lo sconto scudi 100. e per schiso 6. torna 5. che torneranno scudi 1032. 16? e torneranno scudi 860. 13. 4. da riceverli di presente dal Mercante con detto sconto ; o pure dicendo : Scudi 120. danno di sconto sc. 20. che ne daranno sc. 1032. 16. ? e ne daranno scudi 172. 2. 8. guadagno passato , che sottratti da scudi 1032. 16. resteranno sc. 860. 13. 4. a pagamento presente .

17. D. Sono State date a frutto Lire 650. a ragione di lir. 4. per 100. l'anno : si domanda che averanno fruttato in mesi 7?

R. Senza regola del Cinque ; Si moltiplicano lire 650. per lire 4. dal prodotto 2600. si levino due zeri per la divisione di 100. restano lire 26. frutto d'un'anno , si partono per 12. vengono lire 2. 3. 4. frutto d'un mese ; queste si moltiplicano per 7. fanno lir. 15. 3. 4. frutto di mesi 7. che aggiunte a lire 650. fanno lir. 665. 3. 4. frutto , e capitale , le quali si troveranno anco così : Si moltiplicano lir. 4. via mesi 7. il prodotto si parte per 12. mesi , vengono lir. 2. 6. 8. che si sommano con 100. e si dice : Lire 100. tornano lir. 102. 6. 8. che torneranno 650? che per brevità fatto lo schiso per 50. del primo , e terzo numero , le lire 102. 6. 8. si moltiplicano per 13. il prodotto di lire 1330. 6. 8. si parte per 2. e torneranno lire 665. 3. 4. di Capitale , e frutto come per l'altro modo .

18. D. Un Mercante deve avere da Pietro lir. 665. 3. 4. dopo mesi 7? e si accordano di saldare al presente con lo sconto di lir. 4. per 100. l'anno . Si domanda , che doverà dare esso Pietro al Mercante ?

R. Si trovi il merito di mesi 7. a lir. 4. per 100. l'anno , con moltiplicare lir. 4. via 7. fanno lir. 28. che si partono per mesi 12. vengono lir.  $2\frac{2}{3}$ . che aggiunte a lir. 100. fanno lir.  $102\frac{2}{3}$  e si dice : Se lire  $102\frac{2}{3}$  danno di sconto lir.  $2\frac{2}{3}$ . che daranno lir. 665. 3. 4? e verranno lir. 15. 3. 4. che sottratte da lir. 665. 3. 4. resteranno a presente pagamento lir. 650. e resta provata la passata . Domanda : O pure si dice : Se lire  $102\frac{2}{3}$  tornano 100. che torneranno lir.  $665\frac{2}{3}$ ? torneranno le medesime lir. 650.

19. D. Avendo uno ricevuto Sc. 820. con dover pagare Sc.  $6\frac{2}{3}$  per 10. l'anno , gli restituisce dopo giorni 27. con il frutto ; Si domanda quanto sia ?

R. Secondo la pratica mercantile , facendo il mese di giorni 30. giorni 27. sono  $\frac{9}{10}$  di mese ; Onde per regola del 5. Se Scudi 100. in mesi 12. fruttano Sc.  $6\frac{2}{3}$ . che frutteranno Sc. 820. in  $\frac{9}{10}$  di mese ? verranno Sc.  $4\frac{2}{5}$  di frutto , che sommati con Scudi 820. fanno Sc.  $824\frac{2}{5}$  restituiti in tutto ,

20. D.

20. D. Un Meccante è creditore d'un'altro di Sc. 824  $\frac{1}{2}$ . da essergli pagati dopo giorni 27. e gli riceve di presente con lo sconto di Scudi 6  $\frac{2}{3}$  per 100. l'anno . Si domanda quanti, siano?

R. Si dice: Se in mesi 12. lo sconto è di Scudi 6.  $\frac{2}{3}$ . quanto farà di  $\frac{2}{3}$  di mese? ed operato, verrà  $\frac{1}{6}$ . che aggiunto a Sc. 100. fa 100  $\frac{5}{6}$ . Di nuovo se 100  $\frac{5}{6}$  tornano 100. che torneranno 824  $\frac{1}{2}$ ? si averanno li Sc. 820. che deve ricevere il Merc. al presente con tale sconto.

21. D. Sono stati dati à guadagno Sc. 2490. à ragione di Scudi 3  $\frac{1}{2}$  per 100. l'anno . Si domanda quanti Scudi faranno di guadagno in anni 2. mesi 5?

R. Per regola del 5. dritta: Se Scudi 100. in mesi 12. danno di guadagno Scudi 3  $\frac{1}{2}$ . quanti ne daranno Scudi 2490. in mesi 29? ed operato, si averanno Sc. 240. 11. 8. Ovvero si moltiplicano Sc. 2490. via Sc. 3.  $\frac{1}{2}$ . dal prodotto di Sc. 8300. si levino due zeri per la divisione per 100. restano Sc. 83. merito d'un' anno . Si partono per 12. vengono 34. 11. 8. merito d'un mese . Sc. 83. si moltiplicano per anni 2. e Sc. 34. 11. 8. per mesi 5. i prodotti si sommano, e si averanno Sc. 200. 11. 8. di guadagno, che sommati con Scudi 2490. Capitale, fanno in tutto Scudi 2690. 11. 8.

22. D. Uno deve avere da un'altro Sc. 2690. 11. 8. di qui ad anni 2. mesi 5. per avergli oggi è d'accordo di farne lo sconto à ragione di Scudi 3  $\frac{1}{2}$  per 100. l'anno . vuol sapere quanti Scudi di presente riceverà per saldo?

R. Si moltiplicano Scudi 3.  $\frac{1}{2}$ . via anni 2. mesi 5. fanno Sc. 8. 1. 1  $\frac{1}{2}$  che aggiunti à 100. fanno Sc. 108. 1. 1  $\frac{1}{2}$ . e si dice: se questi tornano 100. con lo sconto, che torneranno Sc. 2690. 11. 8? e torneranno Scudi 2490. da riceverli di presente dal Creditore.

23. D. Sono stati dati à Censo Sc. 720. à ragione di Scudi 4  $\frac{1}{2}$  per 100. l'anno . Si domanda quanto averanno fruttato passati mesi 7. giorni 25. à merito semplice?

R. Si operi brevemente così, dicendo; Se mesi 12. danno di frutto Scudi 4. 10. che daranno mesi 7  $\frac{1}{2}$ ? e daranno Scudi 2. 18. 9. Di nuovo: Se 100. guadagnano Sc. 2. 18. 9. che guadagneranno Scudi 720? e guadagneranno Sc. 21. Soldi 3. Ovvero volendo trovare capitale, e frutto, si dica: Se 100. tornano col frutto Sc. 102. 18. 9. che torneranno Scudi 720? e torneranno Sc. 741. 3. &c.

24. D. Un Mercante deve avere Sc. 741. Sol. 3. di qui à mesi 7. giorni 25. ed è d'accordo, che il debitore soddisfaccia adesso con lo sconto di Scudi 4.  $\frac{1}{2}$  per 100. l'anno . Si Domanda con quanti Scudi farà soddisfatto il Mercante?

R. Si trovi il merito di Scudi 100. in mesi 7.  $\frac{1}{2}$  à ragione di Scudi 4. Soldi 10. e farà di Scudi 2. 18. 9. che aggiunti al 100. si dica per

per regola del Trè , Se 102.18.9. tornano 100. che torneranno sc. 741. soldi 3. ? e facendo il partire per Apporre altrove insegna- to, torneranno sc. 720. e con tanti sarà sodisfatto il Mercante .  
 25. D. Un Mercante ha tenuto à guadagno sc. 4860. anni 6. mesi 11. giorni 23. à sc. 5. per 100. l'anno . Si vuol sapere quanto de- verà avere trà capitale , e frutto per saldo ?

R. Già hò detto che per regola del Trè composta , si può operare in tutti i meriti ; nel presente si moltiplicano Sc. 4860. via Sc. 5. il prodotto si parte per 100. verranno Sc. 243. merito d'un anno, i quali si partono per 12. verranno Sc. 25. Soldi 5. merito d'un me- se, questi si partono per 30. e verranno Soldi 13. denari 6. meri- to d'un giorno : Ora si fa la moltiplicazione per 6<sup>a</sup> anni 6. mesi 11. giorni 23. i prodotti si sommano , la somma di Sc. 1696. 5. 6. sarà il frutto di tutto il tempo, che col capitale sono Scudi 6556. 5. 6. da riceverfi dal Mercante per saldo à merito semplice .

26. D. Un Mercante è creditore di Scudi 6556. 5. 6. da pagarli dopo anni 6. mesi 11. giorni 23. Si domanda con quante sareb- be sodisfatto à pagarlo oggi con lo sconto di Scudi 5. per 100. l' anno ?

R. Si moltiplicano Sc. 5. per anni 6. 11. 23. per trovare il merito di tal tempo , e vengono Sc. 34. 18. —.  $\frac{7}{8}$ . si aggiungono à 100. e si dica , per regola del Trè : Se Sc. 134. Sol. 18. —.  $\frac{7}{8}$  tornano Sc. 100. che torneranno Sc. 6556. 5. 6? e torneranno Sc. 4860. che nella lezione passata si meritavano , e con tanti Scudi farebbe sodisfatto .

27. D. Uno pigliò da un' Ebreo lir. 840. con pagargli denari 2  $\frac{5}{8}$ . per lira il mese , e passati mesi 6. giorni 18. gli restituì il Capi- tale , e frutto : Si domanda quante lire furono in tutto ?

R. Avendo posti gl' Esemplj passati ad un tanto per 100. pongo que- sto à denari per lira il mese , accid non resti diffioltà . Si mol- tiplicano denari 2  $\frac{5}{8}$ . via mesi 6  $\frac{1}{2}$ . e vengono denari 16  $\frac{5}{8}$ . cioè Soldo 1. denari 4  $\frac{5}{8}$ . che sommati con Soldi 20. fanno Soldi 21. 4.  $\frac{5}{8}$ . Onde per regola del Trè : Se Soldi 20. tornano col merito Sol. 21. 4.  $\frac{5}{8}$ . che torneranno lir. 840. nel medesimo tempo ? & operato secondo la regola , versanno lire 897. Sol. 15. e tante furono restituite all' Ebreo .

28. D. Uno è creditore di lire 897  $\frac{1}{4}$ . da pagarli passati mesi 6. giorni 18. ma per averle al presente, offerisce al Debitore lo scon- to di denari 2  $\frac{5}{8}$  per lira il mese . Si domanda con tale sconto quante lire riceverà ?

R. Si moltiplicano li denari 2  $\frac{5}{8}$  via li mesi 6  $\frac{1}{2}$ . Soldo 1. den. 4  $\frac{5}{8}$ . di prodotto aggiunto à Soldi 20. fa Soldi 21. den. 4  $\frac{5}{8}$ . e si dica .  
 Se Soldi

Se Soldi 21. 4  $\frac{2}{3}$  tornano con lo sconto Sol. 20. che torneranno lir. 897  $\frac{1}{2}$ . & operato torneranno lir. 840. da riceverfi dal Creditore di presente, e resta provata la passata Domanda. Tanto nel passato merito, come in questo sconto si potevano den. 2  $\frac{2}{3}$  moltiplicare per 5. Il numero prodotto 12  $\frac{2}{3}$ . erano lire guadagnate da 100. in un' anno per la 9. di questo, & allora si poteva operare al solito; e veniva il medesimo.

29. D. Uno dà a guadagno Sc. 520. à ragione di Sc. 6  $\frac{2}{3}$  per 100. l'anno. Si domanda in quanti anni averà guadagnato Sc. 520. cioè averà raddoppiato il Capitale?

R. Per la 12. di questo: Si parta 100. per 6  $\frac{2}{3}$ . il quoziente 16. sono anni, ne quali si guadagneranno Sc. 520. Overo si raddoppierà qualsivoglia capitale. Se ne faccia prova con meritare Sc. 520. à Sc. 6  $\frac{2}{3}$  per 100. l'anno per anni 16. ne verranno Scudi 520. di frutto: Se avesse voluto guadagnare la metà del Capitale, ò il terzo, il quarto, ò qualsivoglia; allora si piglia la metà, il terzo, il quarto, ò altra parte di anni 16. per i quali si merita il Capitale, e si averà quello che si cerca.

30. D. Uno ha dato à frutto lire 486. 13. 4. à ragione di den. 1  $\frac{2}{3}$ . per lira il mese. Si domanda in quanto tempo averà guadagnato il quarto del suo Capitale, cioè lir. 121. 13. 4.

R. Per i denari, che guadagna la lira il mese, si parta 20. e verranno gl'anni, ne i quali si raddoppia il Capitale; per guadagnarne poi la metà, il terzo, &c. si piglia la metà, il terzo, &c. di quegli anni. Nell' Esempio dato si parta 20. per den. 1  $\frac{2}{3}$ . viene 13  $\frac{2}{3}$ . che sono anni 13. mesi 4. ne quali si raddoppia il Capitale; Si partano per 4. verranno anni 3. mesi 4. ne quali si guadagnerà il quarto; come facendone prova si può vedere.

Per intendere la ragione della passata, e di questa ultima Domanda, è manifesto, che se Sc. 100. meritano Sc. 5. in un' anno, partendo 100. per 5. viene 20. che sono anni, ne i quali da Sc. 100. si guadagnano 100. e se Sc. 100. meritano 100. qualsivoglia quantità di denaro meriterà nel medesimo tempo se stessa. La medesima ragione vale nel partire 20. per i Denari; che guadagna la lira, à lo Scudo il mese, per osservarsi la medesima proporzione, come per la 10. di questo è chiaro.

31. D. Il modo di scontare semplicemente insegnato da Fr. Luca à carte 174. per più commodo, riesce veramente così?

R. Non mi pare, che tale riesca; lo darò ad intendere in un' Esempio facile; perchè nell' Esemp. posto da Fr. Luca di scontare lire 150. per an. 1. mesi 7. giorni 7. à ragione di 8. per 100. la conclusione, che tornino con detto sconto lir. 132. Soldi 14. denari 5. non è precisa,



precisa, dovendo tornar 132. 19  $\frac{2}{3}$   $\frac{1}{4}$  appunto, operando per il modo ordinario, con moltiplicare lir. 8. per anno 1. 7. 7. fanno lir. 12. 16. 5  $\frac{1}{2}$  che aggiunte a lir. 100. fanno lir. 112. 16. 5  $\frac{1}{2}$  onde se queste tornano con lo sconto lir. 100. le lir. 150. torneranno lir. 132. Soldi 19. &c. O pure moltiplicando den. 1.  $\frac{1}{2}$  che a tanto è la lira il mese via mesi 19  $\frac{2}{3}$  vengono denari 30  $\frac{1}{2}$  che sono Soldi 2. denari 6  $\frac{1}{2}$  che aggiunti a Soldi 20. fanno Soldi 22. 6  $\frac{1}{2}$  per il che se questi tornano con lo sconto Soldi 20. lir. 150. torneranno le dette lir. 132. 19. &c.

L'esempio sia questo, si devino scontare Scudi 360. per un' anno, a Scudi 5. per 100. l'anno. Si meritano Scudi 360. a Sc. 5. per 100. in un' anno, che per essere Scudi 5. la ventesima parte di 100. basta partire 360. per 20. il quoziente di Scudi 18. farà il merito primo. Si meritano di nuovo Scudi 18. all' istessa ragione, e vengono Soldi 18. secondo merito. Si meritano Soldi 18. pure alla medesima ragione, vengono den. 11. in circa terzo merito. Si meritano denari 11. &c. Ma perchè non danno un denaro intero si lascia. Ora denari 11. terzo merito, si sottrano da Soldi 18. secondo merito, restano Soldi 17. denaro 1. questi si sottrano da Scudi 18. restano Sc. 17. 2. 11. finalmente questi si sottrano da Sc. 360. Capitale, restano Scudi 342. 17. 1. e tanti tornano con detto sconto.

Scudi 360	da Sol. 18.	da Sc. 18.	da Sc. 360
per 20 Sc. 18 pr. merito	11	17. 1	17. 2. 11

Sol. 18. fec. mer. Sol. 17. 1

Den. 11. terzo merito.

17. 2. 11. Sc. 342. 17. 1

Mà si veda quanto più facile, e commodò è il modo insegnato per farlo appunto: Chi sconta 5. per 100. di 105. sconta 5. e per schiso di 21. sconta 1. Onde che si sconterà di Scudi 360? Questi si partono per 21. vengono Scudi 17. 2. 10.  $\frac{2}{3}$  di sconto, i quali si sottrano da Scudi 360., e restano Scudi 342. Soldi 17. 1.  $\frac{2}{3}$  brevemente.

105 — 5 — Sc. 360
per 21 — 1
17. 2. 10 $\frac{2}{3}$

Scudi 342. 17. 1  $\frac{2}{3}$

32. D. Uno ha ricevuto lir. 258. trà capitale, e frutto per saldo dopo anni 2. mesi 5. giorni 20. e i suoi denari gl' hanno fruttato à ragione di den. 11  $\frac{1}{2}$  per lira il mese. Si Domanda, quante lire aveva dato a frutto?

R. Per trovarle bisogna far lo sconto di lir. 258. per il detto tempo à ragione di den. 11  $\frac{1}{2}$  per lira il mese. Anni 2. mesi 5. giorni 20.

Y y

sono

sono mesi  $29\frac{2}{3}$ , i quali si moltiplicano per denari  $1\frac{2}{3}$  fanno denari  $44\frac{2}{3}$  cioè Soldi 3. denari  $8\frac{2}{3}$  che aggiunti a Soldi 20. fanno Soldi  $23\frac{8}{3}$ . e se questi tornano con lo sconto Soldi 20. che torneranno lir. 258? e operando, si averanno lir. 217. 12.  $10\frac{4}{3}\frac{2}{3}$ . e tante ne aveva dato a frutto. Potevasi moltiplicare denaro  $1\frac{1}{2}$ . per 5. venivano lir.  $7\frac{2}{3}$  per 100. l'anno, le quali moltiplicate per anni  $2\frac{5}{3}$ . si avevano lir. 18. 10. 10. che si aggiungono a lire 100. e fanno lir. 118. 10. 10. Ora facendo la regola del Trè, con dire, se lir. 18. 10. 10. tornano lir. 100. scontate, che torneranno lire 258? venivano le medesime di sopra.

33. D. Uno diede a frutto una quantità di lire a den. 2. per lira il mese; dopo il primo anno riebbe lir.  $40\frac{7}{3}\frac{2}{3}$ . così dopo il secondo anno, e terzo riebbe lir.  $40\frac{7}{3}\frac{4}{3}$ . e restò soddisfatto di Capitale, e frutti. Si domanda la quantità delle lire date a frutto?

R. Si fa così: Si sa, che a den. 2. per lira il mese, sono a lire 10. per 100. l'anno. Sicché 100. torna 110. ovvero 10. torna 11. onde pigliando del Capitale, e merito insieme  $\frac{11}{10}$ . quello sarà il merito solamente. Per questo le lire  $40\frac{7}{3}\frac{2}{3}$  nel terzo anno pagate, se si partono per 11. ne viene  $3\frac{2}{3}\frac{2}{3}$  merito, il quale si sottra da lir.  $40\frac{7}{3}\frac{2}{3}$  resta  $36\frac{2}{3}\frac{2}{3}$  Capitale, che restò il secondo anno dopo essere state pagate lir.  $40\frac{7}{3}\frac{2}{3}$ . le quali dunque si aggiungono a  $36\frac{2}{3}\frac{2}{3}$  fanno  $76\frac{2}{3}\frac{2}{3}$  del secondo anno col merito, il quale si levi con partire per 11. e sottrarre; restano lire  $69\frac{2}{3}\frac{2}{3}$  alle quali aggiunte lir.  $40\frac{7}{3}\frac{2}{3}$  pagate dopo il primo anno fanno o lir. 110. Capitale, e merito dopo il primo anno, dalle quali levato il merito con partire per 11. e sottrarre, restano lire 100. date a frutto.

Avanti di trattare de' meriti, e sconti a capo d' anno voglio dare due avvertimenti, uno circa i meriti, e l' altro circa li sconti semplici nell' operare.

34. D. Qual' avvertimento si ha d' avere circa i meriti semplici nell' operare?

R. Quando avverrà, che si abbia a meritare qualche quantità di denaro a qualche ragione difficile per cento, allora si può meritare a qualche ragione facile, e in fine dell' operazione, si deve rifiorare il manco, ovvero levare il più. Per esempio, volendosi sapere il merito d' un' anno di Sc. 386. 13. 4. a Sc.  $7\frac{2}{3}$  per cento l'anno. Si meritino Sc. 386. 13. 4. a Sc. 5. i quali sono la ventesima parte di cento, che però basta partire Sc. 388. 13. 4. per 20. e Sc. 19. 6. 8. sono il merito d' un' anno; ma perchè si sono meriti per Sc.  $2\frac{2}{3}$  meno, che sono la metà di Sc. 5. Si pigli la metà di Scudi

di Scudi 19. 6. 8. con partirli per 2. e li venuti Scudi 9. 13. 4. si sommino con Scudi 19. 6. 8. fanno Sc. 29. di merito à Sc. 7  $\frac{2}{3}$  per 100. mà se si fossero meritati à ragione di Scudi 10. per 100. l'anno, perchè 10. è la 10. parte di 100. si farà pigliata la decima parte di Sc. 386. 13. 4. con partirli per 10. li Scudi 38. 13. 4. fariano il merito d'un'anno; mà perchè si sono meritati per Sc. 2  $\frac{1}{2}$  più, i quali sono un quarto di Scudi 10. si piglia un quarto di Sc. 386. 13. 4. con partirli per 4. e li Sc. 9. 13. 4. venuti si levano da Sc. 38. 13. 4. e restano Scudi 29. di merito à Sc. 7  $\frac{2}{3}$  per 100. l'anno.

Sc. 386. 13. 4 — à Sc. 7  $\frac{2}{3}$

Sc. 386. 13. 4 — à 7  $\frac{2}{3}$

per 20    19. 6. 8  
per 2     9. 13. 4    somma

per 10    38. 13. 4  
per 4     9. 13. 4    sottra

Sc. 29. —. —

Sc. 29. —. —

Acciò s'intenda meglio anche in un merito di più anni, mesi, e giorni si fa la seguente Domanda.

35. D. Uno dà à guadagno Sc. 3492. Soldi 6. à ragione di Sc. 9  $\frac{2}{3}$  per 100. l'anno; Si domanda passati anni 4. mesi 6. giorni 16. quanti Scudi faranno di guadagno?

R. In cambio di Sc. 9  $\frac{2}{3}$ . per 100. l'anno; Si domanda passati anni 4. mesi 6. giorni 16. quanti Scudi faranno di guadagno?

R. In cambio di Sc. 9.  $\frac{2}{3}$ . Si meritano à Scudi 10. con partire Scudi 3492. Sol. 6. per 10. vengono Sc. 349. 4. 7.  $\frac{2}{3}$ . merito d'un'anno, da moltiplicarsi per anni 4., i quali si partono per 12. vengono Scudi 29. 2. 0  $\frac{2}{3}$ , merito d'un mese da moltiplicarsi per mesi 6. e questi si partono per 15. stante che giorni 16. per essere  $\frac{1}{3}$  di mese schisati sono 7  $\frac{1}{2}$ . e vengono Scudo 1. 18. 9  $\frac{1}{2}$  in circa da moltiplicarsi per 8. onde fatte le moltiplicazioni, ed i prodotti sommati, la somma di Scudi 1587. 1. 1. è il merito. Mà perchè si sono meritati per un mezzo Scudo di più, e  $\frac{2}{3}$  è la ventesima parte di Sc. 10. per i quali sono meritati, per questo si partono Scudi 1587. 1. 1. per 20. li Sc. 79. 7. 1. si sottrano da Sc. 1587. 1. 1. e restano Sc. 1507. Soldi 34. e tanti faranno di guadagno. Chi di questa industria si saprà fervire, faciliterà l'operazione, e gli servirà di prova ad altra operazione già fatta.

36. D. Qual'avvertimento si deve avere negli sconti semplici?

R. Si deve avvertite di non ridurre più pagamenti ad un solo pagamento in un giorno, e poi farne lo sconto; perchè sarebbe indanno di chi dovesse essere pagato; mà si deve fare lo sconto del

denaro di ciascun pagamento , per quel tempo , che si anticipa , e sommare le partite del denaro scontate , e la somma farà il giusto pagamento con lo sconto, e in questo si stia avvertito, perchè alcuni Autori si sono ingannati, tra gl' altri Niccolò Tartaglia nella seguente Domanda del lib. xi. cap. viii. num. iv.

37. D. Uno piglia una possessione in Affitto per 5. anni à Ducati 80. all'anno , à pagare tale Affitto di anno in anno , in capo dell'anno : Fatto l'Istrumento di tale Affittanza , accade , che il padrone di tale Possessione , per varj accidenti viene in bisogno di denari , per la qual cosa va dall'affittuale , e dice : Se mi puoi dare tutti li denari di questi 5. anni al presente te li voglio scontare à ragione di 10. per 100. all'anno , à merito semplice , e costui si contentò . Si domanda quanto gli doveria dare , ovvero sborsare al presente?

R. Il Tartaglia reca gli 5. pagamenti ad un solo pagamento di Ducati 400. dopo anni 3. con molta lunghezza bastando aggiungere 1. al 5. fa 6. la metà del quale 3. sono gl'anni &c. de quali Ducati 400. fa lo sconto semplice ; à ragione di 10. per 100. con dire 130. tornano 100. che torneranno Ducati 400? e verranno Ducati  $307 \frac{1}{3}$  . e tanti dice doverà sborsare l'Affittuale; tuttavia non essendoli fatto patto di recare i pagamenti ad un solo pagamento , si devono scontare i Ducati per quel tempo , che gli riceve avanti, partita, per partita ; E prima si scontino Ducati 80. per un' anno : dicendo : Se 120. tornano 100. ovvero 11. tornano 10. che torneranno Duc. 80? e torneranno Duc.  $72 \frac{1}{3}$  . Poi per 2. anni, dicendo: Se 120. tornano 100. che torneranno Duc. 80? e torneranno Duc.  $66 \frac{1}{3}$  . Poi per 3. anni , dicendo : Se 130. tornano 100. che torneranno Duc. 80? e torneranno Duc.  $61 \frac{1}{3}$  . Poi per 4. anni . Se 140. tornano 100. che torneranno Duc. 80? e torneranno Ducati  $57 \frac{1}{3}$  . e finalmente per 5. anni, dicendo : Se 150. tornano 100. che torneranno Ducati 80? e torneranno Ducati  $53 \frac{1}{3}$  . le quali partite tornate con lo sconto si sommano , e fanno Ducati  $311 \frac{1}{3} \div \frac{2}{3}$  da sborsarsi di presente dall'Affittuale al Padrone della Possessione , che sono Ducati 4. quasi di più, che per il modo del Tartaglia .

38. D. Uno è creditore di Sc. 5000, da pagarsegli dopo qualche tempo da Carlo , il quale di presente li paga Scudi 3492. Soldi 6. con lo sconto semplice di Sc.  $9 \frac{2}{3}$  per 100. l'anno d' accordo . Si domanda il tempo , dopo il quale doveva essere pagato ?

R. Questa si risolve per regola del 5. roverscia , per domandarli il tempo , della quale si è detto à suo luogo . Si sottrino Sc. 3492. Sol. 6. da Sc. 5000. restano Sc. 1507. Soldi 14. che si fariano guadagnati

dagnati nel tempo, che si cerca. Ora fatta la disposizione de' numeri à suo luogo insegnata; Si moltiplicano Sc. 3492. Soldi 6. per Sc.  $9\frac{2}{3}$ . e verrà il partitore. Si moltiplicano Sc. 1507. Sol. 14. per 100. verrà il numero da partirsi, e partendo verranno anni 4. mesi 6. giorni 16. in circa; e così resta provata la Risposta fatta alla Domanda 35. di questo.

Sc.  $9\frac{2}{3}$  — Sc. 3492. 6. — An. 1. — Sc. 100 — Sc. 1507. 14. An. 4. 6. 16. 39. D. Con Ducati 800. in mesi 8. si guadagnano Ducati 20. più, che con Ducati 320. in 6. mesi. Si domanda à che ragione fù prestato il cento l'anno?

R. Il Forestani à carte 137. dice, opera, che troverai, che il 100. fù prestato à Ducati  $8\frac{2}{3}$  l'anno; Facendone però prova con Ducati 800. in mesi 8. si guadagnerebbero Ducati  $31\frac{2}{3}$  più, che con Ducati 320. in mesi 6. alla detta ragione.

Si veda à Ducati 5. per 100., partendo Ducati 800. per 20. vengono Ducati 40. l'anno. Si piglino li  $\frac{2}{3}$ . per 8. mesi sono Ducati  $26\frac{2}{3}$  li guadagno. Si partono ancora 320. per 20. vengono Duc. 16. l'anno. Si pigli la metà per 6. mesi, sono Ducati 8. di guadagno, si sottrano da Ducati  $26\frac{2}{3}$ . restano Ducati  $18\frac{2}{3}$ . e dovevano restare Ducati 20. Però per regola del Trè: Se Ducati  $18\frac{2}{3}$ . vengono da Ducati 5. da che verranno Ducati 20? e verranno da Ducati  $5\frac{1}{3}$ . e à tanti fù prestato il 100. e così le simili.

Si poteva arguire con i Ducati  $31\frac{2}{3}$ . dicendo: Se questi vengono da Duc.  $8\frac{2}{3}$ . da che Duc. 20? e iarebbero venuti Duc.  $5\frac{1}{3}$  &c.

## DISTINZIONE SECONDA.

*Delli Meriti, e Sconti a capo d'Anno, ò d'altro determinato tempo.*

1. D. **C**He cosa è Merito à capo d'Anno, ò d'altro tempo?

R. **E** il frutto, e guadagno fatto per mezzo di qualche quantità di denaro dopo qualche tempo, e non pagato, il quale s'aggiunge al Capitale, e con esso guadagna altro frutto, per altro simile termine di tempo, e così sempre il Capitale cresce, il che ne i meriti semplici non succede restando sempre il medesimo Capitale per qualsivoglia tempo. Onde meritare à capo d'anno, secondo Fr. Luca, non vuole dire altro, se non saldare la ragione ad ogni fine d'anno, e ridare, ò lasciare il Capitale, e frutto, per un'altro anno alla medesima ragione à quello, che ha pigliato il denaro à guadagno.

2. D.

2. D. Vitale Ebreo ha dato à frutto à Livio Sc. 500. à ragione di Sc. 10. per 100. l'anno à fare à capo d'anno, cioè che non pagando Livio il frutto dopo ciascun'anno, il frutto diventi Capitale, per l'altro anno; essendo passati anni 3. senza alcun pagamento: Domandasi quanti Scudi pagherà Livio trà Capitale, e frutti all'Ebreo?

R. Diversi modi possono usarsi, i quali s'accennano, cioè ciascuno si serva di quello, che gli parerà più comodo, e breve. Il primo sia l'aggiungere il merito, è frutto di Sc. 10. al 100. fa 110. Adesso per regola del Trè: Se Sc. 100. tornano Scudi 110. trà capitale, e frutto, che torneranno Sc. 500? ed operato torneranno sc. 550. cioè Sc. 500. di Capitale, e Sc. 50. di frutto. Di nuovo, per il secondo anno: Se Sc. 100. tornano Sc. 110. che torneranno Sc. 550? e si averanno Sc. 605. e finalmente; Se Scudi 100. tornano Sc. 110. che torneranno sc. 665  $\frac{5}{2}$ . da darsi all'Ebreo da Livio, per saldo? Nel modo detto si farà seguito ad operare, se fossero stati più di 3. anni.

Potendosi schifare i due primi numeri della regola del Trè deve farsi per più brevità, come in essa regola s' insegna. Qui dunque si schifino 100. e 10. per 10. e vengono 10. e 11. e con questi si dica se 10. tornano 11. che torneranno Sc. 500? e così seguendo finalmente s'averanno sc. 665  $\frac{5}{2}$ . da i quali sottratti sc. 500. restano sc. 165  $\frac{5}{2}$ . de' soli frutti.

10 — 11 — Sc. 500    10 — 11 — Sc. 550    10 — 11 — Sc. 605.  
Del pr. an. sc. 550. o Del secondo sc. 605. o Del terzo sc. 665.  $\frac{5}{2}$ .

3. D. Avendo detto il primo modo d'operare, qual'è il secondo?

R. Nel passato modo si è fatta la regola del Trè per trovare il Capitale, e merito, in questa si farà per trovare il solo merito, il quale ogni volta si aggiungerà al suo Capitale, dicendo: Se scudi 100. fruttano scudi 10., che frutteranno sc. 500? e schifando per 10. il primo, e secondo numero della regola del Trè, il primo verrà 10. il secondo 1. e perchè 1. non moltiplica, basta partire sc. 500. per 10. e vengono sc. 50. di frutto, che aggiunti à sc. 500. fanno sc. 550. che partiti per 10. vengono sc. 55. che aggiunti à sc. 550. fanno 605. che finalmente partiti per 10. vengono sc. 60.  $\frac{5}{2}$ . che aggiunti à sc. 605. fanno sc. 665  $\frac{5}{2}$ . come per l'altro modo.

4. D. Qual'è il terzo modo?

R. Il terzo modo è per regola moltiplice, dicendo: Se 100. torna 110. e per schifo; Se 10. torna 11. per il primo anno, e 10. torna 11. per il secondo anno, e 10. torna 11. per il terzo anno, e così si seguirebbe, se fossero più anni, che torneranno sc. 500? e moltiplicati i numeri destri, cioè 11. 11. 11. e 500. fanno 665500. da partirsi, e moltiplicati i sinistri 10. 10. e 10. fanno

1000. par-

1000. partitore, & fatto il partire verranno li Scudi 665  $\frac{5}{8}$ .

10 — 11. 10 — 11. 10 — 11. 500. Scudi 665  $\frac{5}{8}$ .

5. D. Qual' è il quarto modo di operare?

R. Si meritano, per il secondo modo sola Sc. 100. per essere numero, col quale facilmente si parte per anni 3. à 10, per 100. l' anno; vengono dopo il terzo anno Sc. 133  $\frac{5}{8}$  fra merito, e Capitale, si dica per regola del Trè: Se 100. torneranno 133  $\frac{5}{8}$ . che torneranno Sc. 500? e operato torneranno Scudi 665  $\frac{5}{8}$ . Quando si hanno le Tavole del merito preparate, questo è il più breve, comodo, e meno soggetto ad errore, delle quali Tavole parlerò più avanti.

per 10 — 100  
10

Se Sc. 100 — Sc. 133  $\frac{5}{8}$  — Sc. 500.  
3

per 10 — 110  
11

Scudi 665  $\frac{5}{8}$  schisat.  $\frac{5}{8}$

per 10 — 121  
12  $\frac{5}{8}$

133  $\frac{5}{8}$

6. D. Qual' è il quinto modo d'operare?

R. Questo seguente da me spesso è stato usato per essere facilissimo, e puntuale, per non perderli alcun rotto, & anno, per anno si conosce il merito, & il Capitale, e merito insieme. Si fa per regola del Trè, con cercare il merito, ò frutto, dicendo: Se 100. fruttà 10. che frutteranno Sc. 500? nel moltiplicare Sc. 500. per 10. si tengono avanti due figure per virtuale partire, che per 100. si fa. Il merito sarà il primo anno Sc. 50. e zeri centesimi; si sommino con Sc. 500. il che sempre riesce facile, per venire le figure di sotto ben' ordinate, fanno Sc. 550. li quali si moltiplicano per 10. per il secondo anno, tenendo innanzi due figure del prodotto, per la ragione detta. gli Sc. 55. di merito si sommano con Scudi 550. fanno Sc. 605. che moltiplicati per 10. con tenere innanzi le figure, il merito di Sc. 60. 50. si somma con Sc. 605. e vengono Scudi 665. 50. il quale 30. sono centesimi, che schisati sono  $\frac{5}{8}$ .

Meglio s'offervi questo nell'Esempio di meritare Sc. 347. à Sc. 6. per 100. l' anno à capo d'anno, per 4. anni, e si potrà seguitare per quanti anni bisognasse, sempre con il medesimo ordine; la prima volta le figure tenute innanzi sono centesimi; la seconda sono dieci millesimi, la terza millionesimi, al qual rotto in fine si riduce in Soldi, e denari facilmente.

Per

260					
Per 100	Sc. 500	10	Per 100	Sc. 347	6
	50.00			20.82.	
	Sc. 550	10		367.82	6
	55.00			22.06.92	
	Sc. 605.	10		389.88.92	6
	60.50			23.39.33.52	
	Sc. 665.	$7\frac{1}{2}\frac{2}{3}$ schif. $\frac{2}{3}$		Sc. 413.28.25.52	
				100 00 00	

7. D. Qual' è il sesto modo d' operare ?

R. Quando la ragione per 100. aliquota , & integrale dell' istesso 100. allora si piglia tal parte di Capitale posto à guadagno , & è il merito, ò frutto d' un' anno, quale si aggiunge , e dalla somma si piglia la medesima parte , che è il merito del secondo anno , il quale s' aggiunge , e si seguita nel medesimo modo, e nell' esempio dato l' operazione viene ad esser la medesima fatta nel secondo modo della terza Domanda . Ma se si avessero a meritare, Sc. 1600. à Sc. 12  $\frac{2}{3}$  per 100. l'anno, a capo d' anno, per 12.  $\frac{2}{3}$  è l'ottava parte di 100. si partano sc.1600. per 8. per aver l'ottava parte , vengono sc. 200. di merito, i quali si sommano con scudi 1600. fanno scudi 1800. trà merito , e Capitale del primo anno. i quali 1800. di nuovo si partono per 8. e vengono sc.225. merito del secondo anno &c.

Adeffo avanti di trattare de i meriti à capo d'anno più difficili, e di termini non intieri stimo bene assegnare i modi d'operare i sconti a capo , che servono di prova a i passati meriti a capo d' anno .

8. D. Che Cosa è sconto à capo d' anno ?

R. E' una diminuzione di moneta, che si fa anno per anno d' una quantità di denaro fatta a ragione opposta al merito à capo d'anno : Perchè nel merito, Se 100. torna 110. nello sconto 110. torna 100 ; come si disse anche nello sconto semplice, e serve di prova al merito à capo d'anno, per dovere ritornare anno per anno la quantità del denaro meritata, e finalmente il Capitale dà principio messo à guadagno . Si è operato il merito , come dalle Domande seguenti si manifesta .

9. D. Lucio deve avere da un' Ebreo sc. 665  $\frac{1}{2}$  passati che saranno 3.anni, e gli vorrebbe di presente, e l'Ebreo che ce li darà con lo sconto di 10. per 100. all' anno , facendo à capo d' anno. Si Domanda essendo contento Lucio, quanti scudi doverà ricevere con detto sconto ?

R. Per



R. Per il primo modo, si aggiungono sc. al 100. fanno 110. e si dice. Se 110. tornano con lo sconto 100. e per lo schifo 11. tornano 10. che torneranno Scudi 665  $\frac{5}{7}$ ? e moltiplicate per 10. e partito il prodotto per 11. torneranno Scudi 605. scontati per un' anno. Di nuovo: Se 11. tornano 10. che torneranno Sc. 605. e operato, torneranno Sc. 550. scontati per due anni. Finalmente se 11. tornano 10. che torneranno Scudi 550. e torneranno Scudi 500. scontati per 3. anni, e tanti ne dovrà ricevere Lucio dall' Ebreo.

Sc. 11. — 10 — Sc. 665  $\frac{5}{7}$  Se 11 — 10 — Sc. 605 Sc 11. — 10 — 550

6635

6050

5500

Scudi 605

Scudi 550

Scudi 500

10. D. Qual' è il secondo modo d' operare?

R. Si trova lo sconto, il quale anno per anno si sottra dicendo. Se 11. danno di sconto 10. che Scudi 665  $\frac{5}{7}$ ? e schisati i primi due numeri. Se 11. danno 1. che Sc. 665.  $\frac{5}{7}$ ? e partiti questi per 11. vengono Sc. 60.  $\frac{5}{7}$ . li quali si sottrano da 665  $\frac{5}{7}$ . restano Sc. 605. scontati per un' anno; li Sc. 605. si partono per 11. vengono Scudi 55. li quali si sottrano da Sc. 605. restano Sc. 550. scontati per due anni; finalmente si partono Sc. 550. per 11. li Sc. 50. che vengono si sottrano da Sc. 550. e restano Sc. 500. scontati per 3. anni da pagarsi dall' Ebreo a Lucio.

11. D. Qual' è il terzo modo d' operare gli sconti?

R. Corrisponde al terzo d' operare i meriti, e si fa per regola moltiplice, dicendo: 11. torna 10. per un' anno, 11. torna 10. per due anni, e 11. torna 10. per 3. anni; che torneranno Sc. 665  $\frac{5}{7}$ ? questi si moltiplicano tre volte per 10. ovvero in una volta per 1000. il prodotto si parte tre volte per 11. ovvero in una volta per 1331. e verranno Sc. 500.

12. D. Qual' è il quarto modo d' operare gli sconti?

R. Anco questo si ha dal quarto modo usato ne' meriti, si merita qual numero facile uno vuole, come 100. per 3. anni alla ragione dello sconto; qui à 10. per 100. e 100. tornerà come sopra nella 5. Domanda 133.  $\frac{1}{3}$ . Onde per regola del Trè: Se 133.  $\frac{1}{3}$ . vengono da 100. da quali verranno Sc. 665  $\frac{5}{7}$ ? e verranno da Scudi 500. che restano con lo sconto.

13. D. Qual' è il quinto modo d' operare?

R. Questo corrisponde al sesto modo d' operare ne' meriti; perchè essendo la ragione per 100. la quinta, sesta, ottava, decima, o altra parte di 100., nello sconto si fa uno di più, e la quinta si fa

resta, l'ottava si fa aona, e la decima l'undecima parte, che si deve pigliare dalla quantità del denaro da scontarsi, e sottrarla da quella: Et è manifesto, che se 10. è la decima parte di cento, 10. è l'undecima di 110. per la qual cosa si partono Sc. 66  $\frac{2}{3}$  per 11. li Sc. 60.  $\frac{2}{3}$  si sottrano, restano Sc. 605. scontati per un'anno; Si partono Sc. 605. per 11. li Sc. 55. si sottrano, restano Sc. 550. li quali di nuovo si partono per 11. li Sc. 50. si sottrano, e restano Sc. 500. scontati per tre anni.

14. D. Un' Ebreo ha imprestato lir. 480. à lir. 6  $\frac{2}{3}$ . per 100. l' anno à fare à capo d' anno à Giulio, il quale, già sono 4. anni passati, senza alcun pagamento; Vuol sapere quante lire doverà restituire all' Ebreo per saldo?

R. Perchè lire 6  $\frac{2}{3}$  sono la quinta decima parte di 100. si partiranno lir. 480. per 15. e verranno lir. 32. d' interesse, le quali si aggiungono à lir. 480. fanno lir. 512. per il primo anno: Ora si leghi partendo lir. 512. per 15. verranno lir. 34.  $\frac{2}{3}$ . 8. che s' aggiungono à lir. 512. fanno lir. 546.  $\frac{2}{3}$ . 8. per il secondo anno. Queste si partono per 15. li. 36.  $\frac{2}{3}$ . 8. s' aggiungono à lir. 546.  $\frac{2}{3}$ . 8. fanno lir. 582.  $\frac{2}{3}$ . 10. per il 3. anno; finalmente queste si partono per 15. le lir. 38.  $\frac{2}{3}$ . 8. si aggiungono à lir. 582.  $\frac{2}{3}$ . 10. fanno lire 621.  $\frac{2}{3}$ . 6. per il quarto anno da restituirsi da Giulio all' Ebreo, per saldo. Si fa lo sconto per prova.

15. D. Un' Ebreo deve avere da Giulio lire 621.  $\frac{2}{3}$ . 6. passati anni 4. ma si contenta di scontarle à lir. 6  $\frac{2}{3}$  per 100., facendo à capo d' anno, per averle adesso. Si domanda, quanto lire s'borserà al presente Giulio per saldo all' Ebreo? R. Essendo lire 6  $\frac{2}{3}$ . la decima 2. sista parte di lir. 106  $\frac{2}{3}$ . Si partono lir. 621.  $\frac{2}{3}$ . 6. per 16. le lire 38.  $\frac{2}{3}$ . 8. si sottrano da lir. 621.  $\frac{2}{3}$ . 6. e restano lir. 582.  $\frac{2}{3}$ . 10. per il primo anno. Queste di nuovo si partono per 16. le lire 36.  $\frac{2}{3}$ . 8. si sottrano da lire 582.  $\frac{2}{3}$ . 10. restano lir. 546.  $\frac{2}{3}$ . 8. per il secondo anno. Queste ancora si partono per 16. le lir. 34.  $\frac{2}{3}$ . 8. si sottrano, restano lir. 512. per il terzo anno, e finalmente queste si partono per 16. le lir. 32. si sottrano, e restano lir. 480. per il quarto anno, da pagarsi da Giulio all' Ebreo.

16. D. Uno dà à frutto lir. 698. 13. 40. à ragione di denari 2. per lira il mese à fare à capo di 6. mesi, cioè, che non pagando il frutto, quello diventi Capitale per l'altro termine à Capo il quale gl' ha tenuti anni 3. mesi 6. senza avere pagato alcuna cosa. Si domanda, quanto doverà pagare Capo, per saldare detto conto?

R. Quando la lira guadagna il mese denari 2. ogni lira in un' anno guadagna lir. 10. e in 6. mesi lir. 5. le quali per essere la ventesima

tesima parte di 100. si partiranno le lir. 698. 13. 4. per 20. e verrà il frutto di 6. mesi, che si sommerà con le lire 698. 13. 4. e le lire 733. 12. si partono per 20. e verrà il frutto dell'altro termine di 6. mesi, e seguitando per 7. termini, finalmente si averanno lir. 983. 1. 10. da pagarsi da Cajo per saldo.

17. D. Uno è creditore di lire 983. 1. 10. da pagarseli passati anni 3  $\frac{1}{2}$ . da Tizio, il quale al presente glie le dà con lo sconto di denari 2. per lira il mese, al capo di 6. mesi. Si domanda quante siano con tale sconto?

R. Come ho detto guadagnando la lira denari 2. il mese, 100. lire guadagnano lire 10. in un'anno, e lir. 5. in 6. mesi, che sono la ventesima parte di 100. e la ventesima di 105. per la qual cosa si partiranno per 21. lir. 983. 1. 10. e verranno lir. 46. 16. 4. di sconto, che si sottrano, e restano scontate lir. 936. 5. 6. per il primo termine; si seguiti per gl'altri termini a partire, ed a sottrarre, resteranno a presente pagamento lir. 698. 13. 4.

18. D. Giulio ha dato a guadagno Sc. 1000. a Sc. 5. per 100. l'anno, a fare a capo d'anno a Donato; e passati anni 3. e mesi 9. Giulio richiede Capitale, e frutti. Si domanda, contentandosi Donato, quanti Scudi doverà dare a Giulio per saldo?

R. In due modi si sodisfa a tali Domande con qualche differenza, quando gl'anni, o altri termini non sono interi. Il primo, che s'è il migliore, è questo a favore di chi ha ricevuto il denaro a frutto, insegnate da Fr. Luca, da Girolamo Cardano, da Francesco Galigai, e Filippo Calandri, ambedue Fiorentini, da Giovanni Sfortunati, da Fr. Lorenzo Forestani, e da molti altri. Si meritano li Scudi 1000. a Sc. 5. per 100. l'anno a capo d'anno, per anni 4. interi, partendo Sc. 1000. per 20. essendo Sc. 5. la ventesima parte di 100. li Scudi 50. sono il frutto del primo anno, i quali s'aggiungono a Sc. 1050. e li Sc. 1050 si partono per 20. per trovare il frutto del secondo anno, e così si prosegue insino al quarto anno, e verranno fra Capitale e frutti Sc. 1215. Sol. 10. den. 1  $\frac{1}{2}$ . E perchè Sc. 1000. si sono meritati per mesi 3. più del dovere, degli Sc. 1215. Sol. 10. den. 1  $\frac{1}{2}$  se ne fa lo sconto vedendo di Sc. 5. all'anno, quanti appartengano a mesi 3. con partire Sc. 5. per 4. ne verrà Sc. 1  $\frac{1}{4}$ , che aggiunto a 100. fa 101  $\frac{1}{4}$ . Onde si dica Sc. 101  $\frac{1}{4}$  di di sconto Sc. 3  $\frac{1}{4}$ . che ne daranno Sc. 1215. Sol. 10. den. 1  $\frac{1}{2}$  e verranno Sc. 15. 11. 1  $\frac{1}{2}$ . che sottratti da Sc. 1215. 10. 1  $\frac{1}{2}$  restano a pagamento Sc. 1200. Sol. 10. O pure se 101  $\frac{1}{4}$  tornano con lo sconto 100. che torneranno Sc. 1215. 10. 1  $\frac{1}{4}$  e torneranno Sc. 1200. Sol. 10.

19. D. Si può avere in altro modo la medesima conclusione?

R. Mi piace di mostrare un'altro modo, col quale si viene a conoscere la ragione, che ha mosso i sopradetti Autori a procedere allo sconto. Si meritano, come si è detto, o in altro modo li Sc. 1000. per anni 3. intieri à 5. per 100. l'anno à capo d'anno, e tornano trà Capitale, e frutti Sc. 1157. 12. 6. de' quali si trova il frutto dovuto à mesi 9. che restano, e sarà di Sc. 43. 8. 2  $\frac{1}{2}$ . il qual frutto non è tenuto à pagare Donato, se non finito l'anno; perchè allora si deve saldare, che questo importa fare à capo d'anno; E se pure Giulio volesse tal frutto, siccome riceve Scudi 1157. 12. 6. dopo 3. anni, e 9. mesi, è di dovere, che ne patisca lo sconto alla medesima ragione del merito di Scudi 5. per 100. per li mesi 3. che lo riceve avanti. Onde come di sopra si è fatto: Sc. 1  $\frac{1}{2}$  dovuto à 3. mesi s'aggiunge al 100. e fa 101  $\frac{1}{2}$ . e si dice: Se 101  $\frac{1}{2}$  torna 100. che torneranno Sc. 43. 8. 2  $\frac{1}{2}$  ed operato torneranno Sc. 43. 17. 6. con tale sconto, i quali aggiunti à Sc. 1157. 12. 6. dopo il terzo anno, fanno Sc. 1200. Sol. 10. come per l'altro modo, che è più spedito; ma l'uno; e l'altro dà il medesimo, e in questo secondo si conosce più chiara la ragione di tal operare.

20. D. Qual'è il secondo modo d'operare, che importa qualche differenza dal passato?

R. Questo è più facile, e favorevole à chi ha dato à guadagno, per non farsi sconto del frutto dovuto à termine non intero di tempo, insegnato da Niccolò Tartaglia, e seguito da Giuseppe Unicorno, da Giulio Bassi, da D. Giuseppe Giacchi, e da altri. In quanto à g'anni, e termini di tempo intieri, non ci è differenza; che però trovato il frutto del quarto anno di Sc. 57. 17. 7  $\frac{1}{2}$ . si parte per 12. per trovare il frutto d'un mese di Scudi 4. 16. 5  $\frac{1}{2}$ . il quale si moltiplica per mesi 9. e viene di essi il frutto di Sc. 43. 8. 2  $\frac{1}{2}$ . che aggiunti à Sc. 1157. 12. 6. fanno Sc. 1201. 11. 8  $\frac{1}{2}$  da restituirsi da Donato à Giulio secondo il parere del Tartaglia.

21. D. Giulio deve avere da Donato Sc. 1200. Sol. 10. da pagarli dopo anni 3. mesi 9. ma volendogli di presente, offerisce lo sconto di Sc. 5. per 100. l'anno à ragione di capo d'anno. Si domanda, essendo contento Donato, quanti Scudi dovrà dare à Giulio di presente per saldo?

R. Per far questo sconto, secondo l'opinione di Fra Luca, corrispondente al merito à capo d'anno; si meritano li Sc. 1200. Sol. 10. à Sc. 5. per 100. l'anno, per mesi 9. il che si farà con partire Sc. 1200. Sol. 10. per 20. li Sc. 60. —. denari 6. sono frutto d'un

d'un'anno, i quali si partono per 4. li. Sc. 15. —.  $8\frac{1}{4}$  sono frutto di 3. mesi, li quali Scudi si sommano con Sc. 1200. Sol. 10. fanno sc. 1215. 10.  $1\frac{1}{4}$ . de i quali si fa lo sconto con partirgli per 21 e li sc. 57. 17.  $7\frac{1}{2}$  da essi si sottrano, e restano sc. 1157. 12. 6. scontati per un'anno; questi si partono per 21. li. sc. 55. 2. 6. si sottrano, e restano sc. 1102. 10. scontati per due anni, li quali si partono per 21. e li sc. 52. 10. si sottrano, e restano sc. 1050. scontati per 3. anni finalmente questi si partono per 21. e li sc. 50. si sottrano, e restano sc. 1000. scontati per 4. anni, e tanti ne darà di presente Donato à Giulio per saldo; e resta provato il rito della 18.

22. D. Giulio deve avere da Donato sc. 1201. —.  $8\frac{1}{4}$ . di qui ad anni 3. mesi 9. e volendogli adesso offerisce lo sconto di sc. 5. per 100. l'anno à capo d'anno. Si domanda contentandosi Donato quanti scudi darà adesso à Giulio per saldo?

R. Volendo far questo sconto, per prova al merito fatto, secondo il parere del Tartaglia, prima si fa lo sconto per mesi 9. trovando di essi il merito à 5. per 100. l'anno, e sarà di sc.  $3\frac{1}{4}$ . li quali aggiunti al 100 fanno 103  $\frac{1}{4}$ . Ora se 103  $\frac{1}{4}$ . tornano 100. con lo sconto, quanti se torneranno sc. 1201. —.  $8\frac{1}{4}$ . ed operato torneranno sc. 1157. 12. 6. li quali si scontano per anni 3. interi, come nella passata, partendo per 21. e sottrando tre volte, si averanno sc. 1000. da darsi adesso da Donato à Giulio; La ragione di partire per 21. è, perchè in questa regola del Frè ci è lo schifo per 5. dicendo 105. danno den. 4. di sconto, che daranno sc. 1157. 12. 6. onde 105. si fa 21. ed il 5. si fa 1. ritenendo la medesima proporzione.

23. D. Si può avere per altra maniera d'operare la medesima conclusione, secondo il parere del Tartaglia?

R. Si può avere, e perchè se ne abbia cognizione qui lo ponga con proporre lo sconto del Tartaglia del lib. 11. num. 7. Uno deve dare ad un'altro Ducati 360. in termine d'anni 2. mesi 3. giorni 20. e colui, che deve avere tali denari, ne ha di bisogno adesso, e però d'accordo gli riceve con lo sconto di 10. per 100. l'anno à ragione di capo d'anno. Si domanda à quanti fiano? secondo la nostra opinione, dice il Tartaglia sconta Duc. 360. semplicemente per quei mesi 3. e di 20. alla detta ragione di 10. per 100. all'anno, torneranno scontati Duc.  $349\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}$ . e questi sommati per 2. anni interi à ragione di capo d'anno, troverai che torneranno Duc.  $128\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}$ . che faranno Duc. 288. pic. 21. mescando il tutto. Li questi numeri ci sono due errori. La prima partita deve dire Duc. 288. la seconda pic. 25. e lo sconto è risoluto.

risoluto secondo il modo detto nella passata.

Volendo operare in altra maniera, il denaro da scontarsi si merita à capo d'anno per tutto quel tempo, che doveria scontare alla ragione data. Dipoi si fa la regola del Trè, ponendo in primo luogo il Capitale, e fructi. In secondo luogo il solo Capitale, ed in terzo il denaro da scontarsi, che pure stà nel secondo luogo, ed operato risulterà il denaro scontato. Dunque Ducati 360. si meritano per due anni intieri à capo d'anno à 10. per 100. vengono Ducati 435. Soldi 12. di questi si trovi il frutto in mesi  $3\frac{1}{2}$ . sono Ducati 13. Sol. 6. Den.  $1\frac{1}{2}$ . li quali aggiunti à Ducati 435. Soldi 12. fanno trà Capitale, e frutti Duc. 448. 18.  $2\frac{1}{2}$ . Ne dia fastidio, che per più facilità io abbia ridotti i Ducati in Soldi, e denari, perchè facendosi nella regola del Trè la riduzione: nell'operare si caveranno grossi, e piccioli. Dicasi dunque Ducati 448. 18.  $2\frac{1}{2}$  tornano con lo sconto Duc. 360. che torneranno li medesimi Ducati 360. con lo sconto? li Ducati nel primo: e terzo luogo si riducano in Soldi, in denari e quinti, farà partitore 134673. e moltiplicati i ridotti nel terzo per 360. farà da partirsi 15552000. e fatta la partizione risultano Ducati 288. grossi 16. piccioli  $25\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}$ . e tanti sono da pagarsi adesso al Creditore. Avvertasi, che Grossi 24. fanno un Ducato, Piccioli 32. un Grosso.

24. D. Un Ebreo hà imprestato lir. 1500. à ragione di lir. 6. per 100. l'anno, à fare à capo d'anno ad un Mercante, il quale gli hà tenuti anni 2. mesi 7. giorni 18. Si Domanda: che doverà dare detto Mercante all' Ebreo per saldo?

R. Si meritano lir. 1500. per anni 3. intieri à lir. 6. per 100. l'anno à capo d'anno, e verranno fra Capitale, e frutti, lir. 1786. 10. 6. pigliando per un denaro il rotto, e perchè si sono meritati per mesi 6.  $\frac{1}{2}$  di più, per questo tempo si faccia lo sconto, pigliando di lir. 6. l'anno, quelle che competono à mesi 6.  $\frac{1}{2}$ . che sono lir.  $3\frac{1}{2}$ . che aggiunte al 100. fanno 105  $\frac{1}{2}$ . Ora se 103  $\frac{1}{2}$  danno di sconto lir.  $3\frac{1}{2}$  che ne daranno lir. 1786. 10. 6? e ne daranno lir. 55. 7. 11. le quali sottratte da lir. 1786. 10. 6. resteranno lire 1731. 2. 7. di Capitale, e frutti da pagarsi all' Ebreo, secondo Pr. Luca, &c.

25. D. Come si risolve tal merito secondo il Tartaglia,

R. Si meritano lir. 1500. per 2. anni à 6. per 100. à capo d'anno. Dipoi si trova il frutto del terzo anno, del quale si pigli quel che appartiene à mesi 5. e giorni 18. e si sommi col capitale, e frutti del secondo anno, e si averanno lir. 1722. 11. 9  $\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}$  da pagarsi all' Ebreo.

-FINE-

26. D.

26. D. Un' Ebreo avendo prestato una quantità di lire à lire 6. per 100. l' anno à capo d' anno , hà fatto il suo conto che passati anni 2. mesi 5. giorni 18. gli si devono lire 1731. 2. 7. trà Capitale, e frutti . Si Domanda quante lire aveva prestato ?

R. Per trovare quelle lire , si scontino lir. 1731. 2. 7. con aggiungerci prima il merito di mesi 6. giorni 18. à lir. 6. per 100. l' anno che sono lir. 55. 7. 11. che fanno lire 1786. 10. 6. le quali si scontano per 3. anni à capo d' anno , dicendo : lire 106. tornano 100. lir. 106. tornano 100. è lir. 106. tornano 100. che torneranno lire 1786. 10. 6. si opera per regola moltiplice , e torneranno lire 1500. e tante ne aveva prestato l' Ebreo , e resta provata la 24. Operando secondo l' opinione di Fr. Luca , la quale s'imo migliore ; Ma secondo il Tartaglia , si opererà come nella seguente .

27. D. Un Ebreo havendo prestato una quantità di lire à lir. 6. per 100. l' anno , à fare à capo d' anno hà fatto il suo conto , che passati anni 2. mesi 5. giorni 18. gli si devono lir. 1732. Sol. 11. den. 9  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$  è pure lir. 1732  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$  trà Capitale , e frutti . Si domanda quante lire aveva prestato ?

R. Prima bisogna far lo sconto di lir. 1732. 80. per mesi 5  $\frac{1}{2}$ . à lir. 6. per 100. fanno semplicemente come si è insegnato , e si fa così : di lir. 6. l' anno , si pigliano quelle , che competono à mesi 5  $\frac{1}{2}$ . e sono lir. 2  $\frac{1}{2}$ . che si aggiungono à lir. 100. fanno lir. 102  $\frac{1}{2}$ . Ora se 102  $\frac{1}{2}$ . tornano con lo sconto 100. che torneranno lire 1732  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$ , e torneranno lir. 1685. 40. centesimi . Adesso si scontano per 2. anni interi , dicendo . Se 106. tornano 100. che torneranno lir. 1685. 40. e torneranno lir. 1590. e se ancora se 106. tornano 100. che torneranno lire 1590. e torneranno lire 1500. e tante ne aveva prestato l' Ebreo , e torna la prova della 25.

28. D. Meritando Fiorini 100. per tempo di 9. mesi à ragione di 20. per 100. l' anno , à fare à capo d' anno , quanti torneranno col merito ?

R. Questa è di frà Luca a car. 178. num. 20. il quale conchiude , che torneranno Fiorini 100. R. R. 1720000. con soggiungere 820. bene . A<sup>a</sup> carte 174. Hà meritato lir. 100. per 6. mesi à den. 4. per lira il mese , è si vogli dire à 20. per 100. l' anno , facendo à capo d' anno , E benchè secondo il Tartaglia torneranno lire 110. la qual cosa sarà vera , se il merito si intende semplicemente : Ma perchè il patto s' intende al termine d' un' anno , chi hà preso à guadagno non è tenuto à dare se non lir. 100. e lir. 10. al fine dell' anno , le quali se da capo à 6. mesi se ne faccia lo sconto.

sconto per 6. mesi à 20. per scottarano  $\text{Lir. } 9$ . Soldi 1. den. 9  $\frac{1}{2}$ . che con  $\text{Lir. } 100$  faranno  $\text{Lir. } 109$ . 9. 1.  $\frac{1}{2}$ . sicchè la differenza, ovvero errore di quelli tali è manifesto per questo esempio, Parla di quelli, che hanno avuto l'opinione, che hà seguitato il Tartaglia.

Si sciogla dunque il quesito del merito à capo d'anno di 9. mesi, siccome hà sciolto quello di 6. mesi in due modi. Fiorini 100. in capo all'anno torneranno Fior. 120. se ne faccia lo sconto per 3. mesi; di Fior. 20. in un' anno, si pigliano quei che competono à 3. che sono Fior. 5. che aggiunti a i Fior. 100. fanno 105. e si dica: Se 105. tornano con lo sconto 100. che torneranno Fior. 120. & operato verranno Fior. 114  $\frac{2}{3}$ . Nel secondo modo à mesi 12. si devono Fior. 20. à mesi 9. si devono Fior. 15. di merito da pagarsi finito l' anno. Se ne faccia lo sconto, dicendo: se 105. tornano con lo sconto 100. che torneranno Fior. 120. & operato torneranno Fior. 14  $\frac{2}{3}$ . o pure si poteva dire: Se 105. danno di sconto 5. che daranno Fior. 15? & operato venivano  $\frac{2}{3}$  di Fiorino, che sottratti da Fior. 15. restavano Fior. 14  $\frac{2}{3}$ . come prima, i quali aggiunti à 100. fanno Fior. 114  $\frac{2}{3}$ . e tanti sono da pagarsi Fior. 100. col merito di 20. per 120. à capo d' anno in mesi 9. e secondo il Tartaglia sarebbero Fior. 115. de' quali 15. secondo Fr. Luca, si devono pagare dopo l' anno, ovvero si devono pagare 14  $\frac{2}{3}$ . con lo sconto; Ed ecco la differenza trà essi. Per farne prova si proponga il seguente sconto à capo d' anno di Fiorini 114  $\frac{2}{3}$ .

29. D. Uno è creditore di Fior. 114  $\frac{2}{3}$  da pagarli in termine di mesi 9. e gli riceve adesso con lo sconto di Fior. 20. per 100. à capo d' anno. Si domanda quanti siano?

R. Di Fior. 20. d'un' anno si pigliano gl' appartenenti à 3. mesi, sono Fior. 5. che aggiunti à 100. si dica: Se 100. tornano in mesi 3. 105. che torneranno Fior. 114  $\frac{2}{3}$ . nel medesimo tempo, e torneranno 120. e di questi facendo lo sconto alla ragione detta saranno con lo sconto Fior. 100. e tanti ne riceve il creditore à presente pagamento.

Molti altri meriti, e sconti potrei apportare à capo d' anno, che hò scritti à mano; ma questi stimo bastanti, perchè ciascuno sappia operare in qualsivoglia, che gli sia proposto.

30. D. Nella 12. della distinzione si è assegnata regola di trovare il tempo ne i meriti semplici, nel quale venga raddoppiato il Capitale: negli meriti à capo d' anno si dà regola per trovare il tempo, nel quale il Capitale si raddoppi?

R. Fr. Luca à carte 181. num. 44. dice così: A' voler sapere ogni quanti-





32. D. Avendo detto il modo di trovare il tempo, quando avanza sopra il doppio del Capitale; Come si trova il tempo, quando manca a venire doppio il Capitale?

R. Sc. 100. a Sc. 72. per 100. l'anno; partendo 72. per 72. viene 1. che in un' anno si dovrebbero raddoppiare Sc. 100. e farsi 200. che farebbe contro il supposto di Sc. 72. l' anno, mancando Sc. 28. fino al guadagno di Sc. 100. Onde per regola del Cinque rovescia, si dica: Se da Sc. 100. Sono guadagnati Sc. 72. in giorni 365. cioè in un' anno, in quanti giorni saranno guadagnati Scudi 28. da Sc. 172. Capitale, e frutto dopo un' anno? e moltiplicando 72. via 172. il prodotto 12384. è il partitore, e moltiplicati gl'altri tre numeri, il prod. 1022000. è da partirsi, e fatto il partire vengono  $82\frac{4}{7}\frac{2}{7}$ . che sono gior. si che in un' anno gior.  $82\frac{4}{7}\frac{2}{7}$ . si raddoppieranno Sc. 100. e qualsivoglia quantità alla detta ragione. In altro modo, e serve di prova. Si veda quanti Sc. guadagneranno Sc. 172. il secondo anno a 72. per 100. guadagneranno Sc. 123. 84. li quali aggiunti a Sc. 172. fanno Sc. 295. 84. centesimi, che sono Sc. 95. 84. centesimi più di Sc. 200. Adesso per regola del Tre; Se Sc. 123. 84. sono guadagnati in giorni 365. in quanti giorni saranno guadagnati Sc. 95. 84. di più? e verranno in giorni  $282\frac{4}{7}\frac{2}{7}$ . li quali sottratti da giorni 365. resteranno giorni  $82\frac{4}{7}\frac{2}{7}$ . li quali aggiunti ad un' anno, fanno An. 1. giorni  $82\frac{4}{7}\frac{2}{7}$ . e in tanto tempo si raddoppierà qualsivoglia Capitale a Sc. 72. per 100. l'anno a capo d'anno mercantilmente. E così si potrebbe trovare a qualsivoglia ragione per 100. venisse raddoppiato il Capitale, ed ancora facilmente da chi avesse preparate le Tavole per li meriti, e sconti a capo d' anno.

33. D. Come si compongono le Tavole per li meriti, e sconti a capo d' anno?

R. Fr. Luca à car. 174. accenna il modo di comporre, ed usarle, e si compongono così: Si meritano Sc. 100. Sc. 1000. o altra quantità di Scudi a quella ragione, che è più in uso. Come a ragione di Sc. 5. per 100. ovvero a ragione di altra quantità di Sc. a capo d' anno, per quanti anni uno vuole. Si meritino Sc. 100. a 5. per 100 l'anno, e si ponga il Capitale, e Merito del primo anno, cioè Sc. 105. con dirimpetto Anno 1. Si meritano di nuovo Scudi 105. con moltiplicarli per 5. ed il prodotto si parte per 10. e per 10. ripiego di 100. con ridurre l'avanzo in Sol. e den. avvertendo di porre decimi di denaro, se qualche cosa sopravanzasse ad essi, e verrà il merito, che qui è di Sc. 5. Sol. 5. che si aggiunge a Scudi 105. e vengono Sc. 110. 5. che si pongono sotto Scudi 105. con dirimpetto Anno secondo, e così si prosegue ponendo

371

ponendo Sc. 115. 15. 3. con Anno terzo, &c. Benchè si possano le tavole comporre così, più esatte si averanno componendole con meritare il Capitale per il modo quinto della festa, tenendo innanzi due figure, e sommando si avrà il Capitale, e frutto appunto anno, per anno, ed acciò io sia inteso, il Capitale, e frutto del primo anno sono sc. 105. questi si moltiplicano per 5. il prodotto 525. tenuto avanti due figure, e sommato con scudi 105. fanno sc. 110. 25. Capitale, e frutto del secondo anno. Nell'istesso modo si moltiplicano 110. 25. per 5. con tenere innanzi due, che è un virtuale partire per 100. il prodotto 5. 51. 25. sommate con scudi 110. 25. fa sc. 115. 76. 25. cioè sc. 115  $\frac{2}{3}$   $\frac{2}{3}$   $\frac{2}{3}$  Capitale, e frutto del terzo anno, e così si seguita senza perdersi alcuna cosa; e se non si vuole comporre le Tavole con tal rotto decinale, per dire così; si riduca in Soldi, e denari, il che, per essere facile, non mi essendo in altre parole a dichiararlo, e si potrà conoscere dalla seguente Tavola fatta per 10. Anni à 7. per 100.

	100 — 5
	5 00
An. primo	105 — 5
	5. 25
Secondo	110. 25 — 5
	5. 51. 25
Terzo	115. 76. 25 — 5
	5. 78. 81. 25
Quarto	121. 55. 06. 25

## Tavola à 7. per 100.

An. Primo Scudi 107

Secun. Sc.	— 114. 49	—	cioè Sol.	9.	9 $\frac{1}{2}$
Terzo Sc.	— 122. 50. 43	—	Sol.	10.	1
Quar. Sc.	— 131. 07. 56. 01	—	Sol.	1.	7 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$
Quint. Sc.	— 140. 25. 51. 73. 07	—	Sol.	5.	1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$
Sesto Sc.	— 150. 07. 30. 35. 18. 49	—	Sol.	1.	5 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$
Sett. Sc.	— 160. 57. 81. 47. 64. 78. 42	—	Sol.	11.	6 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$
Ottav. Sc.	— 171. 81. 86. 17. 98. 31. 92. 03	—	Sol.	16.	4 $\frac{1}{2}$
Nono Sc.	— 183. 84. 59. 21. 24. 20. 15. 47. 21.	Sol.	16.	11.	
Deci. Sc.	— 196. 71. 51. 35. 72. 89. 56. 55. 51. 47.	Sol.	14.	3 $\frac{1}{2}$	

## Tavola à 5. per 100

Tavola à 5  $\frac{1}{2}$  per 100.

An. Primo .	Sc. 100.
Secondo	Sc. 110. 5.
Terzo	Sc. 115. 15. 3
Quarto	Sc. 121. 11. 6
Quinto	Sc. 127. 12. 6
Sesto	Sc. 134. —. 2
Settimo	Sc. 140. 14. 2
Ottavo	Sc. 147. 14. 11
Nono	Sc. 155. 2. 8
Decimo	Sc. 162. 17. 10
Undecim.	Sc. 171. —. 8
Duodec.	Sc. 179. 11. 9
Decimot.	Sc. 188. 11. 4
Decimoq.	Sc. 197. 19. 11
Decimoq.	Sc. 207. 17. 11
Decimof.	Sc. 218. 5. 10
Decimof.	Sc. 229. 4. 1 $\frac{1}{2}$
Decim'et.	Sc. 240. 13. 4
Decimon.	Sc. 252. 14. —
Vigefimo	Sc. 265. 6. 8 $\frac{1}{2}$

Scudi 100. 10. —
111. 6. —
117. 8. 5
123. 17. 7
130. 13. 11
137. 17. 8
145. 9. 4
153. 9. 4
161. 18. 2
170. 6. 3
179. 13. 7
189. 11. 3
199. 19. 9
210. 19. 9
222. 11. 10
234. 16. 8
247. 15. —
261. 7. 6
275. 15. —
290. 18. 4 $\frac{1}{2}$

34. D. A che servono simili Tavole?

R. Servono per operare con brevità prestamente senza essere tanto soggetto ad errare; Perchè quel merito, ò sconto, che si dovrebbe trovare con molte operazioni, con le Tavole si riduce ad una sola operazione della regola del Trè, per esempio; Si vuol sapere quanto farà il Capitale, e merito di sc. 1346.  $\frac{1}{2}$ . a ragione di sc. 5. per 100. in anni 4. facendo à capo d' anno? Vedasi il Capitale, e frutto di sc. 100. à 5. per 100. dopo il quarto anno, sarà di sc. 121. 11. —  $\frac{1}{2}$ . Onde si dica per regola del Trè; se sc. 100. tornano in quattro anni trà frutti, e Capitale sc. 121. 11. —  $\frac{1}{2}$ . che torneranno nel medesimo tempo sc. 1346  $\frac{1}{2}$ ? ed operato si averanno in tutto sc. 1637. 1. 7. poco più Capitale, e frutti di anni 4. Ecco, che con una regola del Trè si è brevemente fatto il conto; e tanto maggiore si conoscerà la brevità, quanto maggiore farà la quantità degl'anni, per li quali si deva fare il conto del merito à capo d'anno per li detti scudi, ò altra quantità, come farebbe d'anni 14. dove 100. tornano 198. che torneranno sc. 1346  $\frac{1}{2}$ ? e si averanno dall'operazione sc. 2666. 14. 7. e pigliando come sta nella Tavola den. 1. memo, dicendo, che 100. tornino sc. 197. 19. 11. allora tornerebbero sc. 2666. 13. 5. &c.  
Ora

373

Ora chi non conosce, che se si fossero dovuti meritare per anni 14. ci sarebbe bisognato fare 14. operazioni con essere soggetto facilmente a qualche errore.

Sc. 100. — Sc. 121. 11. —  $\frac{1}{8}$  — 1346  $\frac{1}{8}$

10    12. 3. 1  $\frac{1}{8}$   
20    1. 4. 3  $\frac{1}{8}$   
6    4. —  $\frac{1}{8}$

---

1215. 10. 2

364. 13. —

48. 22. 5

7. 5. 10

1. —. 2

---

Scudi 1637. 1. 7

---

1346. 16. 8 — 198

10 134. 13. 8

10 13. 9. 4  $\frac{1}{2}$

---

1346. 16. 8

1212. 3. —

107. 14. 11

---

Sc. 2666. 14. 7  $\frac{5}{8}$

---

A' denaro uno meno, come nella Tavola. Sc. 2666. 13. 5

35. D. Come si adoprano le medesime Tavole per gli Sconti à capo d'anno?

R. Si adoprano con rivoltare ragione, e così si può fare la Prova alli meriti à capo d'anno; perchè dovendosi scontare Sc. 2666. 14. 7  $\frac{5}{8}$  per anni 14. à Scudi 5. per 100. si vede, che nell'anno decimoquarto Sc. 100. tornano Sc. 198. e Sc. 198. con lo sconto tornano 100. che torneranno Sc. 2666. 14. 7  $\frac{5}{8}$ ? Questi si moltiplicano per 5. e per 20. numeri di ripiego di 100. il prodotto 266673. si parte per 198. e verranno Sc. 1346. 16. 8. che si meritano nella passata.

36. D. Quando negli meriti à capo d'anno ci sono mesi, e giorni oltre gl'anni intieri, come si opera?

R. Il merito de' mesi, e giorni si trova come si è insegnato; Come se Scudi 1346. 16. 8. si fossero dovuti meritare per anni 14. mesi 8. giorni 10. Trovato il capitale, e frutti di Sc. 2666. 14. 7  $\frac{5}{8}$ . Si moltiplicano per 5. che è la ragione del merito. Sc. 13333. 13. si partono per 10. e per 10. li Sc. 133. 6. 8. sono il frutto di un'anno; questi si partono per 12. e vengono Sc. 11. 2. 2  $\frac{1}{2}$ . i quali si partono per 3. per essere giorni 10. un terzo di mese; e vengono Sc. 3. 4. 1. i quali si sommano con Sc. 88. 17. 9. prodotto di Sc. 11. 2. 2  $\frac{1}{2}$  via mesi 8. e fanno Sc. 92. 11. 10. frutto di mesi 8.  $\frac{5}{8}$  che sommati con Sc. 2666. 14. 7. fanno Sc. 2759. 6. 5. Capitale, e frutti d'anni 14. mesi 8. giorni 10. secondo il Tartaglia, & altri dopo lui.

37. D.

37. D. Ma secondo Fr. Luca, ed altri Autori, come si opera?
- R. Gli Scudi 92. 11. 10. frutto di mesi 8  $\frac{2}{3}$ . non si devono pagare, che finito l'anno; o pure è di dovere, che chi gli deve ricevere ne patisca lo sconto a ragione di Sc. 5. per cento l'anno, per li mesi 3  $\frac{1}{3}$ . che li riceve avanti, dicendo: mesi 12. vogliono Sc. 5. che ne vorranno mesi 3  $\frac{1}{3}$ . e veranno Sc. 1. 10. 6  $\frac{2}{3}$ . che aggiuntato al 100. fa Sc. 101. 10. 6  $\frac{2}{3}$ . onde si dica: Se questi tornano Sc. 100. con lo sconto, che torneranno Sc. 92. 11. 10. e torneranno Sc. 91. Sol. 4. i quali si aggiungono à Sc. 2666. 14. 7. fanno Sc. 2757. 18. 7. e tanti saranno gra Capitale, e frutti. O pure, come hò già insegnato, si merita per un'anno intiero Scudi 2666. 14. 7  $\frac{2}{3}$ . à 5. per 100. verranno Sc. 2800. 1. 4. de quali se ne fa lo sconto per li mesi 3  $\frac{1}{3}$ . come sopra, dicendo: Se 101. 10. 6  $\frac{2}{3}$ . tornano 100. che torneranno Sc. 2800. 1. 4. e torneranno li detti Sc. 2757. 18. 7.
38. D. Come si opera circa lo Sconto à capo d' Anno, quando ci sono Mesi, e Giorni, oltre à gl' Anni?
- R. Se il Merito è fatto, secondo il Tartaglia, e per esempio si abbiano da scontare à capo d' anno Sc. 2759. 6. 6. per 14. anni, 8. mesi 10. giorni. Prima si fa lo sconto semplice per mesi 8  $\frac{2}{3}$  di Sc. 2759. 6. 6. e tornano Sc. 2666. 14. 7  $\frac{2}{3}$ . Adesso si faccia lo sconto à capo d' anno per anni 14. intieri, come si è insegnato per le Tavole di Sc. 2666. 14. 7  $\frac{2}{3}$ . torneranno Sc. 1346. 16. 8. ma se il merito è stato fatto, secondo Fr. Luca, come si devano scontare Sc. 2757. 18. 8. Questi si meritano à 5. per 100. per mesi 3  $\frac{1}{3}$ . Il merito si aggiunge à Sc. 2757. 18. 8. e verranno Sc. 2800. 1. 4. li quali si scontino per anni 14. intieri à capo d' anno, con l'uso delle Tavole brevemente, e si averanno Sc. 1346. 16. 8. per tale sconto à capo d' anno.
39. D. Uno dà à guadagno Scudi 1500. à Scudi 4  $\frac{2}{3}$  per 100. l'anno à capo d' anno. Si domanda, passati anni 3. mesi 7. giorni 12. quanto doverà avere?
- R. Si meritano Sc. 1500. per anni 4. e vengono Sc. 1788. 15. 7. e se ne fa lo sconto per mesi 4  $\frac{1}{3}$ . che si sono meritati di più: e torneranno Sc. 1758. Sol. 9. e tanti ne doverà avere. Ma secondo il Tartaglia, si piglia dal frutto del quarto anno, cioè da Sc. 77. 1. 7. la porzione corrispondente à mesi 7  $\frac{2}{3}$ . che sono Sc. 47. 10. che sommati con Sc. 1711. 15. Capitale, e frutti, dopo il terzo anno, fanno Sc. 1759. 5. e tanti ne doverà avere.
40. D. Uno è creditore di Sc. 1758. Sol. 9. da essergli pagati dopo Anni 3. mesi 7  $\frac{2}{3}$ . e gli riceve adesso con lo sconto di Sc. 4  $\frac{2}{3}$ . per

per 100. l'anno à ragione di capo d'anno . Si domanda , quanti siano gli feudi ricevuti ?

R. Si meritano sc. 1758. sol. 9. per mesi  $4\frac{1}{2}$  à sc.  $4\frac{1}{2}$ . per 100. l'anno , il merito di sc. 30. 6. 7. s'aggiunge à feudi 1758. 9. e li sc. 1788. 15. 7. si scontano per anni 4. à capo d'anno , e torneranno scontati sc. 1500. ma se si dovessero scontare , à modo del Tartaglia sc. 1759. sol. 5. si scontano per mesi  $7\frac{1}{2}$ . à ragione di sc.  $4\frac{1}{2}$  semplicemente sc. 1711. 15. i quali si scontano per anni 3. alla medesima ragione di sc.  $4\frac{1}{2}$  à capo d'anno , e torneranno sc. 1500. Si potrebbe operare per regola moltiplice, dicendo ; Se  $102\frac{1}{2}$  tornano 100. per lo sconto de' mesi  $7\frac{1}{2}$ . e  $104\frac{1}{2}$  torna 100. ovvero 209. torna 200. trè volte , che torneranno 1759. sol. 5 ? e torneranno sc. 1500.

$102\frac{1}{2} -- 100 \mid 209-200 -- \mid 209-200 \mid 209-200 \mid --$  sc. 1759. 5 ?

41. D. Uno avendo dato ad interesse sc. 360. dopo 2. anni , riceve per saldo sc. 396. ginalj 9. Si Domanda à quanto per 100. l'anno , à fare à capo d'anno , abbia datogli sc. 360 ?

R. Ne i meriti semplici si trova facilmente la ragione per 100. ma ne i meriti à capo d'anno , si ricerca l'estrazione di radice diversa secondo il numero degl'anni , ne i quali il denaro è stato à guadagno . Bisogna sapere , che il Capitale è il primo numero proporzionale , il capitale , e merito del primo anno è il secondo ; il capitale , e merito del secondo anno è il terzo , il capitale e merito del terzo anno è il quarto , il capitale , e merito del quarto anno è il quinto numero proporzionale &c. Per il che sapendosi il primo , ed il terzo numero proporzionale è necessario l'estrarre la radice quadrata : e sapendosi il primo , e quarto numero proporzionale è necessario l'estrarre la radice cuba : e sapendosi il primo , e quinto è necessario l'estrarre la radice quadra quadra &c. Per trovare il secondo numero proporzionale che sarà Capitale , e guadagno dopo il primo anno . Ora venendo alla domanda fatta , li sc. 360. sono il primo , e li sc. 396  $\frac{1}{2}$  sono il terzo proporzionale ; per trovare il secondo , si moltiplica il primo 360. via il terzo  $396\frac{1}{2}$ . dal prodotto 142884. si cava la radice quadrata 378. che è il secondo numero proporzionale capitale , e guadagno dopo il primo anno , da 378. levato 360. resta 18. guadagno , onde si dica : Se 360. guadagna 18. che guadagnerà 100? e verà 5. che sono feudi 5. quanti diede à guadagno per 100. à capo d'anno . Dell' estrazione di radice si parla à suo luogo abbondantemente .

42. D. Uno vuol dare à guadagno sc. 200. per 3. anni a fare à capo d'anno, e vuole ricevere d'interesse sc. 50. si domanda a quanto per 100. l'anno gli deva dare?

R. Si moltiplicano sc. 200. in se, cioè via 200. il prodotto si moltiplica via sc. 250. Capitale, e guadagno dopo 3. anni dal prodotto 10000000. si cava la radice cuba propriaqua, che è  $215 \frac{1}{5} \frac{2}{5} \frac{2}{5}$  in circa, che è il secondo numero proporzionale, sicche sc. 200. guadagnano dopo un'anno scudi  $15 \frac{1}{5} \frac{2}{5} \frac{2}{5}$ , che guadagnano sc. 100? e vengono sc.  $7 \frac{1}{5} \frac{2}{5} \frac{2}{5}$ . e ridotta tal minuzia à lire, soldi, e denari sono l. 5. 1. 1. Dunque gli deve dare à sc. 7. lir. 5. sol. 1. den. 1. per 100. l'anno à capo d'anno, si sappia che lir. 7. fanno sc. 1.

43. D. Danielle ha dato ad interesse una quantità di scudi ad un tanto per 100. l'anno a fare à capo d'anno, ed ha fatto il conto, che l'interesse dopo il primo anno sarà di sc. 26. 13. 4. e dopo il quarto anno, sarà di scudi 30. 17. 4  $\frac{2}{3}$ . si cerca con questa cognizione quanti scudi abbia dato ad interesse, e a quanto per 100?

R. I guadagni à capo d'anno sono in proporzione continua: Onde per sapere il guadagno dopo il secondo anno; Si moltiplica il guadagno di sc. 26.  $\frac{1}{3}$ . dopo il primo anno in se fa  $711 \frac{1}{3}$ . qual si moltiplica per il guadagno di sc. 30. 17. 4  $\frac{2}{3}$ . dopo il quarto anno, e fa 21952. del quale si cava la radice cuba, che è 28. tanti scudi sono il guadagno dopo il secondo anno. Ora si sottra il primo guadagno sc. 26.  $\frac{1}{3}$ . da sc. 28. resta scudo 1.  $\frac{2}{3}$ . Però si dice: Se sc. 1.  $\frac{2}{3}$ . di guadagno di più è derivato da sc. 26.  $\frac{1}{3}$ . da quali scudi sono derivati sc. 26.  $\frac{1}{3}$ ? ed operato verranno sc. 533  $\frac{2}{3}$ . dati à guadagno. Di nuovo: Se sc. 533  $\frac{2}{3}$ . guadagnano sc. 26.  $\frac{1}{3}$  in un'anno, che guadagneranno sc. 100? verranno sc. 5. per 100. l'anno.

44. D. In altra maniera si può trovare il guadagno dopo il secondo Anno?

R. Certo, brevemente così: Per sc. 26.  $\frac{1}{3}$ . si partono sc. 30. 17. 4  $\frac{2}{3}$ . ne viene  $1 \frac{2}{5} \frac{2}{5} \frac{2}{5}$ . dal quale si cava la radice cuba, che è  $1 \frac{2}{5}$ . ascendente della proporzione; per il che moltiplicando  $26 \frac{1}{3}$ . per  $1 \frac{2}{5}$ . il prodotto 28. farà la seconda quantità proporzionale, ed il guadagno dopo il secondo anno. Di più  $1 \frac{2}{5}$ . dimostra, che il Capitale guadagna  $\frac{2}{5}$  di se stesso, che è 5 per 100. e moltiplicando  $26 \frac{1}{3}$ . via 20. verrà 533  $\frac{2}{3}$ . che sono gli scudi di Capitale dato à guadagno.

45. D. Un Mercante era creditore di sc. 665  $\frac{2}{5}$  da pagarsegli da Marco dopo 3. anni, e da esso ricevè sc. 500. con sconto à ragio-



ragione di capo d'anno. Si domanda à quanto per 100. fa detto sconto?

R. E da sapere, che è la medesima ragione dello sconto, che del merito; Onde trovando à quanto per 100. l'anno fa. 500. meritali per 3. anni, à capo d'anno vengono sc.  $66\frac{2}{3}$ . sarà trovata la ragione dello sconto. Come si è detto nella 42. di questo, si moltiplichino 500. in se fa 250000. il quale si moltiplica via  $66\frac{2}{3}$ . fa 166375000. dal quale si cava la radice cuba, che è 550. seconda quantità proporzionale, Capitale, e guadagno dopo il primo anno, e da 550. sottratto 500. resta 50. guadagno; Ora se sc. 500. guadagnano sc. 50. che guadagneranno sc. 500? e verranno sc. 10. e à tanti per 100. fa lo sconto. Ovvero per la passata, per 500. si parte  $66\frac{2}{3}$  dal quoziente  $1\frac{1}{3}\frac{2}{3}$ . Si cava la radice, che è  $1\frac{1}{3}$ . che dimostra che il Capitale guadagna  $\frac{1}{3}$  di se, che di 100. è 10. e nello sconto scema  $\frac{1}{3}$ . come si è detto di sopra.

46. D. Si può operare in altro modo?

R. Alcuni pratici fanno così: riducono sol. 20. à cubo, terza dignità; per essere 3. anni, e fanno 8000. che si moltiplicano via  $66\frac{2}{3}$ . e vengono 5334000. che si partono per 500. dal quoziente 10668. si cava la radice cuba, che è 22. dalla quale si sottra. 20. cubato, restano 2. che sono denari, e à tanti fa lo sconto d'un scudo il mese, i quali den. 2. si moltiplicano per 5. il prodotto 10. sono gli scudi di sconto per 100. l'anno à capo d'anno. adesso se si scontreranno sc.  $66\frac{2}{3}$ . à den. 2. il mese, dicendo: Se 22. tornano 20. con lo sconto; ovvero 11. tornano 10. che torneranno sc.  $66\frac{2}{3}$ ? e verranno sc. 605. per un' anno. Si replichi due volte per gl'altri due anni, e torneranno sc. 500. benchè per regola moltiplice era più spedita, ponendo 11. tornano 10. tre volte, che torneranno sc.  $66\frac{2}{3}$ ? torneranno sc. 500.

Se 11 | 10 | 11 — 10 | 11 — 10 —  $66\frac{2}{3}$ ? | Se. 500.

47. D. Si vuol sapere quanti scudi abbia dato Flavio à guadagno à den. 2. per scudo il mese à fare à capo d'anno, che dopo 3. anni ne deve ricevere sc.  $66\frac{2}{3}$ . trà Capitale, e frutti?

R. A 2. den. per scudo il mese sono sc. 10. per 100. l'anno. Si meriti qualsivoglia quantità di scudi, quel sc. 100. per 3. anni, tornano sc. 133  $\frac{1}{3}$  trà Capitale, e frutti; onde si rivolti ragione dicendo: Sc. 133.  $\frac{1}{3}$ . vengono da sc. 100. da che verranno scudi  $66\frac{2}{3}$ ? ed operando si troverà venire da sc. 500. e tanti ne diede Flavio à guadagno.

48. D. Lucio diede ad interesse alquante lire à Carlo. senza saperli à quanti denari per lira il mese, nè per quanto tempo, si sa bene, che

B b b

che quante lire diede à frutto, à tanti denari si imprestata la lira il mese, e per tanti anni, e dopo riceve per saldo per ogni  $1000$  lire  $4 \frac{1}{2}$ . Si domanda quante lire diede Lucio ad interesse, e quante ne riceve per saldo?

R. Da lire  $4 \frac{1}{2}$ . si leva  $1$  di Capitale restano  $3 \frac{1}{2}$ . d'interesse, le quali si moltiplicano per  $20$ . per farne soldi, vengono  $64$ . si cava la radice quadra, che è  $8$ . che sono lire che Lucio diede ad interesse per tanti denari fa lira il mese, e per tanti anni, e moltiplicando  $1000$  lire  $8$ . via  $3 \frac{1}{2}$  d'interesse per ciascuna lira, fanno lire  $25 \frac{1}{2}$ . quante ne riceve per saldo Lucio da Carlo, e così si fanno le simili.

49. D. Carlo diede alcune lire à guadagno, ne si sa à quanti denari la lira il mese à Lucio, ne quante lire gli diede: tanti mesi gli fece termine, e à tanti denari si data la lira il mese à guadagno; al fine del tempo riceve Carlo da Lucio di suo guadagno lire  $4$ . Soldi  $3$ . denari  $4$ . Si cercano le lire date à guadagno?

R. Questa è simile alla 48. che si risolve da lui, per Algebra; ma senza di essa si riduce così:  $4 \frac{3}{4}$ . in den. e faranno  $1000$ . la radice cuba è  $10$ . da quali sono le lire date à guadagno, i mesi di termine; ed identari per lira il mese.

50. D. Uno presta lire  $87$ . per annui. dopo si accorda che il Debitore gli dia di presente lire  $58$  scontando à capo d'anno. Si addimanda à che ragione si scontata la lira il mese?

R. Fr. Luca à carte  $1770$  num. 10. dice, fa così: Poni, che la lira stesse a ciò, che vuole: or poni, che stesse à denari  $2$ . Vedi quello, che la lira torna in tutto à capo d'anno per  $3$ . anni, che vedi, che il capitale sempre guadagna  $2 \frac{1}{2}$  di se medesimo, che verrà per tutto soldi  $26 \frac{1}{2}$ . sicché lira  $1$ . viene à guadagnare soldi  $2 \frac{1}{2}$ . s'imo sia errore, e deva dire sol.  $6 \frac{1}{2}$ . Or vedi quanto vengono à guadagnare lire  $58$ . cava di  $87$ . resta  $29$ . e tante lire le  $58$ . guadagnano in anni  $3$ . Vedi per una lira, parti  $29$ . per  $58$ ; ne viene  $2 \frac{1}{2}$  che sono soldi  $10$ . sicché vedi che la tua posizione è stata falsa, perchè ella ti dà sol.  $6 \frac{1}{2}$ . dunque dirai: Se  $6 \frac{1}{2}$  fosse  $10$ . che faria den.  $2$ . à che mi appoi? opera ti verranno denari  $3$ .  $2 \frac{1}{2}$ . e à ragione di tanti si scontata la lira il mese à merito sopra merito. Sicché ti reggerai sempre per meno bñga con una lira. Con la Cosa verria più presto; ma li grassi non fanno. Benchè Fr. Luca abbia insegnato il vero modo di sciogliere simili quesiti; tuttavia questo non ha bene sciolto, e stimò, che per falsa posizione non si possa, per richiederli l'estrazione di radice cuba, la quale in questo quesito essendo sorda, bisogna servirli

ferirsi del modo, che il medes. Autore ha insegnato a cap. 12. numero 48. dove vuole, che 20. si rechi alla dignità significata da gl' anni; Onde per anni 2. si riduce a quadrato, per 3. a cubo, per 4. a quadrato quadrato, per 5. a relato, per 6. a quadrato cubo, &c. E perchè il quesito dice di 3. anni, il 20. si riduce a cubo, che sarà 8000. il quale si moltiplica per 87. il prodotto 696000. si parte per 58. e ne viene 12000. dalla radice cuba di questo, levato 20. che si cubò. Restano i denari per lira il mese, per li quali si fece lo sconto; ma perchè 12000. non ha radice cuba discreta, si dirà, che i denari dello sconto per lira il mese sono radice cuba di 1200. meno 20.

Per rispondere mercantilmente si cava la radice cuba vicina di 12000. sarà 22  $\frac{2}{3}$ . poco più, dalla quale levato 20. restano denari a  $7\frac{2}{3}$  di sconto per lira il mese, che sono lire 14.  $\frac{2}{3}$  per 100. l'anno; e meritando lir. 58. a detta ragione, mancherà meno di  $\frac{2}{3}$ . a tornare lir. 87. ma meritandole a lire 14.  $\frac{2}{3}$ . avanzaria più di  $\frac{2}{3}$ . sopra lire 87. Tuttavia per numeri razionali mai si averà precisa ragione; Bene si averà della Domanda posta num. 15. cap. 177. dall' istesso Fr. Luca, ma non per il suo modo, come pretende.

51. D. Uno avendo dato ad interesse una quantità di scudi ad un tanto per 100. l'anno a fare a capo d'anno, ha fatto il suo conto, che il guadagno dopo il primo anno sarà di scudi 26  $\frac{2}{3}$ . e dopo il quinto anno sarà di sc. 32. sol. 8. den. 3  $\frac{2}{3}$ . ovvero di scudi 32  $\frac{2}{3}$ . Si domanda quanti scudi abbia dato ad interesse, & è quanto per 100.

R. Nella 43. di questo il primo guadagno di scudi 26  $\frac{2}{3}$  si quadrò per essere di quattro anni l'altro guadagno, ma qui per essere di 5. si cuba, e se fusse di 6. si riquadrarebbe, se di 7. si farebbe relato, &c. Adunque 26  $\frac{2}{3}$ . cubato fa 18963.  $\frac{2}{3}$ . che si moltiplica via 32  $\frac{2}{3}$ . dal prodotto 614656. si cava la radice quadrata quad. e sarà 28. scudi di guad. del secon. anno. Il resto si opera come nella 43. e verrà il Capitale di sc. 533  $\frac{2}{3}$ . dati a guadagno a sc. 5. per 100.

52. D. Si opera in altro modo?

R. Per 26  $\frac{2}{3}$  si parte 32  $\frac{2}{3}$ . dal quoziente 1  $\frac{2}{3}$ . si cava la radice quadrata quadrata, che è 1.  $\frac{2}{3}$ . Ora si moltiplica 26  $\frac{2}{3}$ . per 1.  $\frac{2}{3}$ . ascendente della proporzione, verrà 28. che sono scudi di guadagno del secondo anno. Quello a 1.  $\frac{2}{3}$ . mostra che il Capitale guadagna la ventesima sua parte, che di 100. è 5. e moltiplicando 20. via 26  $\frac{2}{3}$ . primo guadagno, ne verranno sc. 533  $\frac{2}{3}$  di Capitale. Questo è il modo più spedito, quando la domanda

B b b a

è di nu-



100. Capitale farà  $100 \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2}$ . ma lasciando il Denominatore 1000. si dica per regola del Trè: Se seu. 100. tornano sc. 103. 714. che torneranno sc. 1000. e verranno sc. 1037. 14. Capitale, e frutto del primo anno; il qual numero si moltiplichi per 1037 14. verrà A 10756593790. e tagliate 5. figure, due per i bajocchi, restano sc. 1075. 65. per il Capitale, e frutto del secondo anno. Medesimamente si moltiplichi A 10756593790. per 103714. farà B 1115609368336060. che tagliate da mano destra 10. figure, e poi due per i bajocci, sono sc. 1115. 60. Capitale, e frutto dopo il terzo anno. Pure B si moltiplichi per 103714. farà C. 115704310027606126840. e tagliate 15. figure, e s. per i bajocchi sono sc. 1157. 04. Capitale, e frutto dopo il quarto anno; finalmente si moltiplichi il numero C. per 103714. farà il num. D, dal quale tagliate 20. figure, e due per i bajocchi, restano sc. 1200. 01. Capitale, e frutto dopo il quinto anno, e resta provato, &c.

D 1200. 01. 5681003141839083760.

56. D. Uno avendo dato ad interesse sc. 400. passati mesi 20. trova, che gl' anno fruttato sc. 55. bajoc. 04. moneta Romana. Si domanda a quanto per 100. l'anno a fare a capo d' anno gli diede?

R. Quando gl' ann inon sono intieri non si può sodisfare alla Domanda, per le quantità proporzionali, che non ci sono, nè per Abbaco commune; ma si ricerca l' Algebra; della quale a suo luogo; tuttavia, per chi l' intende; si ponga per il guadagno d' un' anno fatto da sc. 400. fra 1. cosa. Dunque dopo un' anno sono sc. 400. più 1. cosa. Adesso per regola del Cinque: Se scudi 400. in mesi 12. fruttano 1. cosa, che frutteranno sc. 400. più 1. cosa in mesi 8? Primieramente si schisi il primo numero 400. e l' ultimo 8. per 8. il primo sarà 50. l' ultimo 1. si moltiplichino via 19. fa 600. partitore. Si moltiplichino 400. più 1. cosa per 1. cosa, ne viene 1. quadrato più. 400. cose, che si parte per 600. e viene un q. più  $\frac{400}{600}$  co. guadagno di mesi 8. il quale si somma con

1. cosa guadagno d' un' anno a modo di sommare i rotti ne verrà un q. più  $\frac{1000}{600}$  cose uguale a sc. 55. bajoc. 04. Si moltiplichino in

croce per levare il rotto: Sarà un q. più 1000. cose uguale a 33024. e trasportate 1000. cose dall' altra parte, sarà 1. q. uguale a 33024. meno 1000. cose; la metà delle cose 500. si quadra fa 250000. al quale s' aggiunge 33024. fa 283024. del quale la radice quadra 532. e da questa levato 500. metà delle cose, per avere il segno di meno, resta 32. valore di 1. cosa, e perchè si pose per il guadagno

guadagno di sc. 400. In un' anno ; dunque il guadagno è di scudi 32. che sono sc. 8 per 100. l' anno , che si cercavano . Quando le domande sono di numeri irrazionali , o di più anni con mesi , e giorni , sono difficilissime a soddisfare , se non impossibili ; & allora mette conto operare per via di raziocinio , adoprando diversi numeri per soddisfare a quelle , secondo il costume de' Mercanti .

37. D. Un Mercante ha dato a cambio sc. 1346. sol. 6. den. 8. ed in termine d' anni 4. mesi 8. gli è stato restituito sc. 1735. 13. 4. Vorrebbe sapere quanta ha fruttato il suo denaro per cento l' anno a capo d' anno .

R. Questa domanda sia finita nel porche il Signore Saverio Dotti , quando veniva da me a pigliare lezione d' Abbaco in Firenze , e gli risposi , che il suo denaro aveva fruttato a ragione di sc. 6. soldi 5. denari 7. per 100. l' anno . E volendone far prova esatta , si opera così : sc. 100. a ragione di sc. 6. 5. 7. l' anno ; Dopo esso sono sc. 106. 3. 7. questi ridotti in danari sono 25507 i quali si moltiplicano in se , & il prodotto un' altra volta in se , e verranno per anni 4. di prodotto 423289532208488401. adesso per li due mesi sc. 100. a ragione di sc. 6. 5. 7. l' anno sono sc. 101. —. 11. 5. che ridotti finalmente in festi sono 145507. con questo si moltiplica il num. di 4. anni , e fa 61591588063060521764307. adesso questo si moltiplica per 4099. cioè per sc. 1346  $\frac{1}{2}$  ridotti in terzi fa 248768414186701447406035972. e questo a numero da partirsi . Per trovare il partitore si riducono sc. 100. in soldi , e questi in denari sono 2400. qual numero moltiplicato in se stesso , & il prodotto di nuovo in se farà 3317760000000000. il quale si moltiplica per 44000. prodotto di sc. 100. ridotti in sc. den. e festi , con moltiplicare questi per 3. per essere ridotti in terzi sc. 1346  $\frac{1}{2}$  . e verrà il prod. 1433272520000000000000. e questo è il partitore : e fatto il partire ne risulterà un quoziente sc. 1735. 13. 4. &c. Capitale , e frutti , dopo anni 4. mesi 8.



**DISTIN.**

# DISTINZIONE TERZA

## Pigionì, Locazioni, ed Affitti.

*No i quali si ricercano Meriti, e Sconti semplici; Et  
à capo d'anno, e con addurre Questi da altri non  
hane scialti, e qui emendati da loro errori.*

1. D. **U** No togliere a pigione per 9. anni à lire 50. l'anno una Casa, e il Padrone dice, dammi li denari. di presente che son moneto: scartatogli à den. 2. la lira il mese. Si Domanda quante lire gli dovrà dare di presente?

R. Fr. Luca à carte 160. scouta lire 50. per anni 9. alla detta ragione, e tornano lire 33. 5. 8. e tanto risponde ne dà à il presente al Padrone, il quale tiene defraudato; non ne dovendo ricevere meno di lire 37. 18. 6. Avvertasi dunque, che il Padrone della Casa per il primo Contratto cioè verrebbe lire. 20. dopo un' anno, e lire. 10. dopo anni 2. e lire. 10. dopo anni 3. e lire. 10. dopo anni 4. e lire. 10. finalmente dopo anni 5. e non tutte le lire 50. dopo anni 5. Per lo che non si deve fare lo sconto di tutte le lire 50. per anni 5. ad un tratto; Ma di lire 10. per l'anno, à den. 2. la lira il mese, aggiungendo denari 2. à 20. fa 22. dicendo: Me 22. tornano 20. che torneranno con lo sconto lire 10. e torneranno lire 9. 7. 7. e di lire 10. per 2. anni; aggiungendo den. 2. à 22. fa 24. dicendo: Se 24. tornano 20. che torneranno lire 20. e torneranno lire 8. 7. medesimamente per 3. anni, aggiungendo den. 2. à 24. fa 26. dicendo: Se 26. tornano 20. che torneranno lire 20. e torneranno lire 7. 7. e per 4. anni, aggiungendo den. 2. à 26. fa 28. e dicendo: Se 28. tornano 20. che torneranno lire 20. e torneranno lire 7. 7. e finalmente per 5. anni, aggiungendo den. 2. à 28. fa 30. dicendo: Se 30. tornano 20. che torneranno lire 10. e torneranno lire 6. 7. Ora si sommano lire. 9. 7. 7. lire. 8. 7. lire. 7. 7. lire. 6. 7. fanno lire. 37. 18. 6. qual tutto importa sol. 18. 6. 7. 3. e tante ne deve ricevere il Padrone della Casa. La prova si fa moltiplicando lire. 9. 7. 7. per un' anno, à denari. 2. per lire il mese, e lire. 8. 7. per due anni, e lire. 7. 7. per 3. anni, e lire. 7. 7. per 4. anni, e lire. 6. 7. per 5. anni, ne torneranno sempre lire. 20. che dopo tali anni, dovrebbero ricevere in vigore del primo Contratto.

2. D. Uno toglie una Casa à pigione à lire. 40. l'anno ed il Padrone della

della Casa dice al pigionante, Se tu mi vuoi dare al presente tutti i denari della pigione di 5. anni, sono contento fartene lo sconto a den. 2. per lira il mese. Si domanda quante lire gli dovrà dare al presente.

R. Il Forestani Libro terzo proposizione terza carte 112. segue Frà Luca, e sconta semplicemente lir. 200. per anni 5. come se il Padrone dovesse ricevere lir. 200. dopo 5. anni, e non lire 40. dopo ciascun anno, e però dicendo: Se 30. tornano 20. che lire 200? e torneranno lir.  $133 \frac{1}{3}$ . e tante conclude ne deva dare al presente il pigionante al Padrone. Ma operando come nell' antecedente con dire: Se 22. tornano 20. che lire 40? e torneranno lir.  $36 \frac{1}{4}$ . e per 2. anni: Se 24. tornano 20. che lire 40? e torneranno lir.  $33 \frac{1}{2}$ . e per 3. anni: Se 26. tornano 20. che lire 40? e torneranno lir.  $30 \frac{2}{3}$ . e per 4. anni. Se 28. tornano 20. che lire 40? e torneranno lire 28.  $\frac{1}{2}$ . e per 5. anni: Se 30. tornano 20. che lire 40? e torneranno lir.  $26 \frac{2}{3}$ . che sommate le partite tornate con lo sconto, fanno lir.  $155 \frac{8}{9}$ . e tante ne dovrà dare il pigionante al Padrone, che sono lire 22. &c. di più.

3. D. Uno toglie una Casa a pigione per Duc. 30. l'anno; ed il Padrone vuol esser pagato per 3. anni innanzi, e farli lo sconto a ragione di 20. per 100. l'anno semplicemente. Si Domanda quanti Ducati dovrà dare innanzi.

R. Il Forestani Libro terzo carte 113. sconta Ducati 90. per 3. anni dicendo: Se 160. tornano 100. ovvero 8. tornano 5. che torneranno Duc. 90? e torneranno Duc.  $56 \frac{2}{3}$ . da darli innanzi. Ma scontando Duc. 30. per 1. anno, dicendo: Se 120. tornano 100. ovvero 6. tornano 5. che Duc. 30? e torneranno Duc. 25. Pure Se 140. tornano 100. ovvero 7. tornano 5. che Duc. 30? e torneranno Duc. 21.  $\frac{1}{2}$ . e finalmente: Se 160. tornano 100. che Duc. 30? e torneranno Duc.  $18 \frac{1}{2}$ . che sommati con Duc. 25. e Duc.  $21 \frac{1}{2}$ . fanno Duc.  $65 \frac{1}{4}$ . da pagarsi innanzi dal Pigionante al Padrone.

4. D. Uno toglie a pigione una Casa per anni 4. a lir. 140. l'anno. Il Padrone della Casa vorrebbe quattro annate anticipate, e si contenta fargliene lo sconto a den.  $1 \frac{1}{4}$ . per lira il mese. Vedasi quante lire gli dovrà pagare presentemente?

R. Seguita il Ciacchi a carte 190. il Forestani, e sconta lire 560. per anni 4. il che brevemente si fa dicendo: Se 25. tornano 20. ovvero 5. tornano 4. che torneranno lire 560. e verranno lir. 448. e tante conclude dovrà pagare: Ma scontando lir. 140. per 1. anno, tornano lir.  $131 \frac{2}{3}$ . per 2. anni tornano lir.  $124 \frac{1}{3}$ . per 3. anni, tornano lir.  $117 \frac{1}{3}$ . e per 4. anni, tornano lir. 114. le quali



quali si sommano, e fanno lire 488. soldi 2  $\frac{2}{3}$ . da pagarsi  
 antecedentemente per la pigione di 4. anni. Ecco che ci è la  
 differenza di lire 40. Soldi 2. &c. in danno del Padrone.

5. D. Uno dà a frutto lire 131  $\frac{1}{2}$ . per 1. anno, lire 124  $\frac{1}{2}$ . per 2.  
 anni, lir. 117  $\frac{1}{2}$ . per 3. e lir. 114. per 4. anni, a denari 1  $\frac{1}{2}$ .  
 per lira il mese. Si domanda quante lire tornerà ciascuna  
 partita?

R. Questa serve di prova alla passata, dovendo tornare ciascuna  
 partita di lire 140. col frutto, s'aggiunga a 20. den. 1  $\frac{1}{2}$ . fa 21  $\frac{1}{2}$ .  
 e si dice: Se 20. tornano 21  $\frac{1}{2}$ . che lir. 131  $\frac{1}{2}$ . e torneranno lir.  
 140. Ora a 21  $\frac{1}{2}$ . s'aggiunge 1  $\frac{1}{2}$ . fa 23  $\frac{1}{2}$ . e si dice: Se 20. tornano  
 22  $\frac{1}{2}$ . che li. 124  $\frac{1}{2}$ . e torneranno lir. 140. Pare a 22  $\frac{1}{2}$ . s'aggiun-  
 ge den. 1  $\frac{1}{2}$ . fa 23  $\frac{1}{2}$ . e si dice: Se 20. tornano 23  $\frac{1}{2}$ . che lire  
 117  $\frac{1}{2}$ . e torneranno lir. 140. e finalmente si aggiunge den. 1  $\frac{1}{2}$ .  
 a 23  $\frac{1}{2}$ . fa 25. e si dice, se 20. tornano 25. che lir. 114. e torne-  
 ranno lir. 140.

6. D. Uno piglia in affitto una Casa per anni 3. a pagarli Scu. 90.  
 all' anno; il Pigionale si offerisce pagare tutti tre gli affitti anti-  
 cipatamente all' entrare, che fa in Casa, se il Padrone vuole  
 scontare Sc. 10. per 100. all' anno; Se dice di sì, quanto deve  
 sborsare?

R. Questo è del Figatelli a car. 144. e lo scioglie così: per il primo  
 anno se 110. viene da 100. da che Sc. 90. è operato, verranno da  
 Sc. 81  $\frac{1}{2}$ . di nuovo, se 110. da 100. da che Sc. 81  $\frac{1}{2}$ . e verran-  
 no da Sc. 74  $\frac{1}{2}$ . finalmente se 110. da 100. da che Sc. 74  $\frac{1}{2}$ .  
 e verranno da Sc. 67  $\frac{1}{2}$ . e sommati Sc. 81  $\frac{1}{2}$ . Sc. 74  $\frac{1}{2}$ .  
 e Sc. 67  $\frac{1}{2}$ . fanno Scudi 223  $\frac{1}{2}$ . e tanti appunto ne deve  
 sborsare il Fittajolo.

Tuttavia doveva operare, come ha fatto a carte 100. questo terzo,  
 dicendo per il primo anno 110. torna 100. che Sc. 90. e vengono  
 Sc. 81  $\frac{1}{2}$ . per secondo anno 120. torna 100. che Sc. 90. e ven-  
 gono Sc. 75. e per il terzo anno 130. torna 100. che Sc. 90. e  
 vengono Sc. 69  $\frac{1}{2}$ . le quali partite sommate sono Sc. 276  $\frac{1}{2}$ .  
 da sborsarsi dal Fittajolo a sconto semplice; Ma se il Figatelli  
 avesse detto, che il Padrone vuole scontare 10. per 100. l' anno,  
 a ragione di capo d' anno, allora la sua operazione, e conto  
 sarebbe stato buono.

7. D. Uno affitta una Possessione per anni 9. a ragione di lire 60.  
 all' anno; & il padrone vorrebbe tutti gli affitti innanzi per un suo  
 bisogno, e gli promette di scontrarli a ragione di 5. per 100. al-  
 l' anno. Domando quante lire gli dovrà al presente il Fittajolo?

C c c

R. Que-

- R. Questo è il quarto secondo del lib. vi. parte 364. di Giuseppa Unicorna, il quale dopo il Tartaglia fa assai meno errore degli Autori passati, perchè reca li 9. pagamenti di lire 60. ad un solo pagamento di lir. 540. e viene dopo 5. anni, come si dirà a suo luogo. Per ora si sappia, che essendo pagamenti della medesima partita, ed equidistanti di anno in anno, si aggiunge 1. al 9. fa 10. del quale la metà 5. mostra gl'anni di termine da farsi un solo pagamento di tutto il denaro, ed in questo non ci è dubbio. Tuttavia dovendo procedere allo sconto, non verrà il medesimo a scontare semplicemente lir. 60. per un'anno, per 2. e per 3. fino a 9. e sommare le partite rimaste che scontando tutte le lire 540. per 5. anni a lire 5. per 100. benchè ci sarà meno (vario, e differenza in questo che operando secondo gl' Autori sopra apportati. Giuseppa Unicorna dunque moltiplica anni 5. vii. lir. 5. per 100. fa 535. che si aggiungono al 100. e si dice: Se 125. tornano 100. ovvero le 5. tornano 4. che torneranno lir. 540. con lo sconto in settantasei anni, lir. 439. da sborsarsi innanzi dal Fittajo al Padrone; ma facendo lo sconto di lir. 60. per 1. anno, condirà: Se 105. tornano 100. che lir. 60. e verranno lir. 57  $\frac{1}{2}$ . che restano con lo sconto per un'anno. Si aggiunge 5. a 105. fa 110. e si dice: Se 110. tornano 100. che lir. 60. e verranno lir. 54  $\frac{1}{2}$ . con lo sconto di 2. anni. Medesimamente si aggiunge 5. a 110. fa 115. e si dice: Se 115. tornano 100. che lire 60. e verranno lir. 52  $\frac{1}{2}$ . scontate per 3. anni. Pure si seguita: Se 120. tornano 100. che lir. 60. e verranno lir. 50. per 4. anni. Se 125. tornano 100. che lir. 60. e verranno lir. 48. per 5. anni. Se 130. tornano 100. che lir. 60. e verranno lire 46  $\frac{1}{2}$ . per 6. anni. Se 135. tornano 100. che lir. 60. e verranno lir. 44  $\frac{1}{2}$ . per 7. anni. Se 140. tornano 100. che lir. 60. e verranno lir. 42  $\frac{1}{2}$ . per 8. anni. Se 145. tornano 100. che lir. 60. e verranno lir. 41  $\frac{1}{2}$ . le quali partite sommate importano lir. 435. 14. 4.  $\frac{1}{2}$ . Ecco, che il Padrone nell'altro modo riceve meno lir. 4. 4. 4. &c. Il che si deve avvertire, siccome l'avvisai nella 37. risposta del passato, appostando un quesito del Tartaglia posto nel lib. xi. cap. 8. n. 4. simile all'antecedente. La prova si fa come per la 5. di questo.
3. D. Uno piglia una Casa a pigione, ovvero in affitto, e deve pagare ogn'anno lir. 24. & il Padrone della Casa vuol esser pagato per anni 2. innanzi; scontando li denari a ragione di 20. per 100. all'anno a fare a capo d'anno, Domanda quanti denari dovrà dare il conduttore di presente?
- R. Questo è il quarto quesito di fra Luca a cap. 160. e così lo risolve, dicendo, fa così, tu vedi che a 20. per 100. di 5. si fa 6. però dirai:

dirai : Se 6. guadagno , e Capitale viene da 5. puro Capitale,,  
da che verrà 24? e verrà da 20. & hai il primo anno. Ora fa per  
il secondo, dicendo : Se 6. viene da 5. da che verrà 20. e verrà  
da 16 $\frac{1}{2}$ . e tante lire faranno quelle del secondo anno, le quali  
aggiunte a lire 20. del primo, fanno lire 36  $\frac{1}{2}$ . da pagarsi avanti  
2. anni.

Giuseppe Unicompo lib. sexto car. 366. quanto quinto dice, che tale  
soluzione è falsa ; e che si dovrebbe recare quello sconto di due  
anni ad un solo termine . Ne meriti semplici, va bene , non negli  
sconti, come ho detto ancora nell'antecedente . Ora egli le lire  
24. da pagarsi dopo 1. anno, e lire 24. da pagarsi dopo 2. an-  
ni riduce ad un solo pagamento di lire 48. dopo anno 1.  $\frac{1}{2}$ . Onde  
procede allo sconto a capo d'anno così : Se 120. erano 100. che  
faranno 48? e faranno 40. Poi per 6. mesi : Se 120. erano 110. che  
faranno 40? e faranno lire 36. 13. 4. da pagarsi &c. che è la Con-  
clusione di Fr. Luca, ma fatta venire non legittimamente; Perchè  
per li 6. mesi deve dire se 110. tornano 100. che torneranno 40? e  
verranno lire 36. fol. 7. 3  $\frac{1}{2}$ . sicchè in esso è falsa la soluzione.  
non in Fr. Luca.

D. Uno avendo pigliata una Casa a pigione a Tir. 24. l'anno,  
diede anticipatamente lire 36  $\frac{1}{2}$  al Padrone, con patto che gli  
fruttasse 20. per 100. l'anno a capo d'anno . Si domanda quan-  
to tempo terrà detta Casa per le dette lire 36.  $\frac{1}{2}$ ?

R. Questa serve di prova alla passata; Si meritano lire. 36.  $\frac{1}{2}$  alla  
detta ragione con partirle per 5. e sommare, verranno lire 44.  
dopo 1. anno, dalle quali si levano lire. 24. di pigione, restano  
lire 20. che di nuovo si meritano con partirle per 5. e sommare  
verranno lire 24. che pagate per la pigione del secondo anno,  
resta niente; Sicchè torna bene, avendo pagato per 2. anni  
lire 36  $\frac{1}{2}$  con detto merito.

10. D. Uno avendo pigliato una Casa a pigione, con obbligo di  
pagare lire 24. dopo ciascun anno, diede al padrone lire 36  $\frac{1}{2}$ .  
nell'entrare della Casa, dicendo con fruttarmi queste lire un tan-  
to per 100. a capo d'anno, voi siete soddisfatto per 2. anni. Si  
domanda a quanto per 100. gli dovevano fruttare, con pigliarsi  
il padrone lire 24. di pigione l'anno?

R. Per sciogliere il questo ci vuole l'Algebra, non bastando la dop-  
pia falsa posizione; Si arguisce così: Il padrone della Casa rice-  
ve lire 36  $\frac{1}{2}$ . e dovrebbero ricevere lire 48. a lire 24. l'anno; Dun-  
que le lire 36  $\frac{1}{2}$ . devono meritare in 2. anni lire 11  $\frac{1}{2}$ . sino in lire  
48. Si ponga il merito di lire 36  $\frac{1}{2}$ . dopo il primo anno 1. cosa.  
Dunque il Capitale, e meritoria lire 36  $\frac{1}{2}$  più 1. cosa, da questo

C c c 2

si levino

si levino  $\text{lit. } 24.$  di pigione, restano  $\text{lit. } 12 \frac{1}{2}$ . più 1. cosa, si vede che guadagna il secondo anno, con dire:  $\text{lit. } 36 \frac{1}{2}$ . guadagna 1. cosa, che guadagnerà  $\text{lit. } 12 \frac{1}{2}$  più 1. cosa, e ne verrà  $\text{lit. } 9.$  più  $12 \frac{1}{2}$  cosa

$36 \frac{1}{2}$  guadagno del secondo anno, al quale s'aggiunga 1. cosa guadagno del primo à modo di sommare i rotti la somma sarà  $\text{lit. } 9.$  più  $49 \frac{1}{2}$  cosa

uguale à  $\text{lit. } 11 \frac{1}{2}$  guadagno de' 2. anni; si moltiplichì in croce sarà  $\text{lit. } 9.$  più  $49 \frac{1}{2}$  cosa uguale à  $415 \frac{1}{2}$ . trasportato  $49 \frac{1}{2}$  cosa, e sarà  $\text{lit. } 9.$  uguale à  $415 \frac{1}{2}$  meno  $49 \frac{1}{2}$  cosa, la metà di  $49 \frac{1}{2}$ . è  $24 \frac{1}{2}$ . questo quadrato fa  $608 \frac{1}{2}$ . al quale s'aggiunge  $415 \frac{1}{2}$  numero assoluto fa  $1024$  dalla radice quadra 32. del quale si sottra  $24 \frac{1}{2}$  metà detta, resta  $7 \frac{1}{2}$ . valore di 1. cosa, e guadagnano nel primo an. di  $\text{lit. } 36 \frac{1}{2}$ . Ora si dica Se li  $36 \frac{1}{2}$  guadagnano  $\text{lit. } 7 \frac{1}{2}$ . che guadagnerà 100, e verrà 20. sicchè 20. per 100. l'anno à capo d'anno gli dovevano fruttare, siccome si è veduto nelle due passate.

11. D. Uno piglia una Casa à pigione, per 2. anni, e dà innanzi  $\text{lit. } 36 \frac{1}{2}$ . con questo, che gli fruttino 20. per 100. l'anno à capo d'anno, essendo contento, e sodisfatto il Padrone. Si domanda quante lire importava la pigione l'anno?

R. Si ponga che importi 1. cosa. Si meritino lire  $36 \frac{1}{2}$  alla detta ragione con partirle per 5. il merito del primo anno è di  $\text{lit. } 7 \frac{1}{2}$ . che aggiunte à  $\text{lit. } 36 \frac{1}{2}$  fanno  $\text{lit. } 44$ . dalle quali si leva 1. cosa di pigione, restano  $\text{lit. } 44$ . meno 1. co. queste si partano per 5. à trovare il merito del secondo anno, verranno  $\text{lit. } 8 \frac{1}{2}$  m.  $\frac{1}{2}$  cosa, che aggiunte à  $\text{lit. } 44$ . m. 1. cosa, fanno  $\text{lit. } 52 \frac{1}{2}$  m.  $1 \frac{1}{2}$  cosa, dalle quali si leva 1. cosa di pigione, restano  $\text{lit. } 52 \frac{1}{2}$  meno  $2 \frac{1}{2}$  cosa, e queste sono uguali à 0. perchè nulla deve restare, pagata appunto la pigione, e trasportando all'altra parte meno  $2 \frac{1}{2}$  cosa, faranno  $2 \frac{1}{2}$  cosa, uguali à  $\text{lit. } 52 \frac{1}{2}$ . le quali si partano per  $2 \frac{1}{2}$ . vengono 24. valore di 1. cosa, e lire di pigione cercate. Per regola di modo, cavata dall' Algebra. Si meritino  $\text{lit. } 36 \frac{1}{2}$ . per 2. anni alla detta ragione, verranno  $\text{lit. } 52 \frac{1}{2}$ . Si meriti ancora  $\text{lit. } 1.$  e verrà  $\text{lit. } 1 \frac{1}{2}$ . si aggiunga  $\text{lit. } 1.$  per il secondo anno farà  $\text{lit. } 2 \frac{1}{2}$ . per li quali si partano  $\text{lit. } 52 \frac{1}{2}$ . e vengono  $\text{lit. } 24$ . di pigione. Nel medesimo modo si opera, se saranno più anni, come si vedrà più innanzi.

12. D. Uno piglia una Casa à pigione per 2. anni à  $\text{lit. } 24$ . l'anno, e dà tale quantità di lire nel principio al Padrone, che fruttano gli 20. per 100. à capo d'anno, resta pagato appunto. Si domanda quante fusiero dette lire?

R. Que-

R. Questa è variata solo in parole dall'ottava, e poco varia nella soluzione. Si scontino lir. 24. da pagarsi il secondo anno alla detta ragione, dicendo: Se 120. tornano 100. ovvero 6. tornano 5. che torneranno 24. e torneranno lir. 20. le quali si sommano con lir. 24. che si pagano di pigione il primo anno, e fanno lir. 44. le quali si scontano nel medesimo modo, dicendo: Se 6. fussero 5. che sarebbero lir. 44. & operate, si averanno lir.  $36\frac{2}{3}$ . e tante furono date innanzi da meritarsi, e così fu soddisfatto il Padrone per la pigione di 2. anni, e così le simili.

13. D. Appigione una Casa ad un Mercante per anni 3. à lir. 440. l'anno, cioè che in fine d'ogn'anno di quelli 3. ei mi debba pagare lir. 440. avviene, che il Mercante mi compiace di pagarmi tutte le pigioni innanzi, con patto però, che io gli lasci il beneficio che n'avrebbe à 10. per 100. l'anno. Domando quanto mi deve dare al presente per tutte 3. le pigioni da venire.

R. Questo Quesito è di Gio: Battista Zucchetto, carte 294. il quale non l'ha proposto chiaro; Onde chi non leggesse la soluzione, si potrebbe pensare, che il Mercante volesse lire 44. frutto d'un Anno, di lir. 440. lir. 88. per 2. anni, e lir. 132. per 3. anni, che sottratte da lire 1320. restano à pagamento presente lir. 1056. ma considerando la sua soluzione, si conosce esser pigione con lo sconto à capo d'anno. Però si dice: Se 110. torna 100. e per schiso 11. torna 10. che lir. 440. e tornano lir. 400. Di nuovo se 11. torna 10. che 400. e tornano lir.  $363\frac{1}{3}$ . e finalmente se 11. torna 10. che lir.  $363\frac{1}{3}$ . e tornano lir.  $330\frac{1}{3}$ . si sommano lir. 400. del primo anno, lir.  $363\frac{1}{3}$ . del secondo anno, e lir.  $330\frac{1}{3}$ . del terzo anno, e fanno lir.  $1094\frac{2}{3}$ . da pagarsi innanzi per la pigione. Si prova con la seguente.

24. D. Un Mercante mi paga innanzi lir.  $1094\frac{2}{3}$ . con patto che gli fruttino 10. per 100. l'anno à capo d'anno, e si levino dal Capitale, e frutto lire 440. ogni anno di pigione d'una mia Casa da esse condotta. Si domanda quanto tempo doverà stare il Mercante nella mia Casa per detto denaro?

R. Si faccia così dicendo: Se 100. frutta 10. e per schiso 10. frutta 1. che frutteranno lir.  $1094\frac{2}{3}$ . Si piglia il decimo di lir.  $1094\frac{2}{3}$ . che sono lir. 109  $\frac{2}{3}$ . ed aggiunte à lir.  $1094\frac{2}{3}$ . fanno 1203  $\frac{2}{3}$ . dalle quali sottratte lir. 440. per il primo anno, restano lir. 763  $\frac{2}{3}$ . delle quali si piglia il decimo cioè 76  $\frac{2}{3}$ . che sommato con 763  $\frac{2}{3}$ . fanno lir. 840. dalle quali sottratte lir. 440. per il secondo anno, restano lir. 400. delle quali si decimo cioè lir. 40. sottratte con lir. 400. fanno lir. 440. dalle quali levate lir. 440. per il terzo anno resta nulla, sì che il Mercante deve stare in Casa 3. anni.

15. D.

15. D. Uno deve dare ad un'altro Ducati 450. in termine di 50. mesi à Duc. 9. ogni mese, e costui gli vorria sborsare à un'altro, che haveffe à pagar lui questo debito, vero è, che egli vorria sborsare, se non tanti Ducati, li quali meritandogli à ragione di  $9 \frac{1}{2}$ . per 100. all'anno, che tal debito, e denari venissero à restare annullati: Si domanda quanti fariano detti Ducati?

R. Caso realmente accaduto, posto da Nicolo Tartaglia lib. xi. Cap. ottavo il quale riduce 50. pagamenti ad un solo dopo mesi  $25 \frac{1}{2}$ . e per detti mesi scanta semplicemente Ducati 450. à ragione di  $9 \frac{1}{2}$ . per 100. l'anno, e gli vengono Duc. 374. grossi 9. piccioli  $30 \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2}$ . e tanti Ducati, dico, doverà sborsare innanzi.

Questa conclusione è falsa, perchè se si meriteranno li detti Ducati à ragione di  $9 \frac{1}{2}$ . per 100. l'anno per il primo mese, e dal Capitale, e merito si leveranno Duc. 9. di pagamento, e gli restati si meriteranno per il secondo anno, alla medesima ragione, e dal Capitale, e merito si leveranno Duc. 9. e gli restati Ducati si meriteranno per il terzo mese &c. e così fino al cinquantesimo mese con levare ogni volta Duc. 9. si troverà avanzare denari, e così non saranno annullati, come vuole la proposta.

Si deve operare come nella penultima con lo sconto à capo d'anno, perciò si veda à ragione di  $9 \frac{1}{2}$ . per 100. l'anno, quanto viene il mese partendo per 12. Ducati  $9 \frac{1}{2}$ . viene  $\frac{2}{3} \frac{1}{2}$ . quale aggiunto al 100. si dice: Se 100  $\frac{2}{3} \frac{1}{2}$  tornano 100. che torneranno Duc. 9. e torneranno Duc.  $8 \frac{2}{3} \frac{1}{2} \frac{1}{2}$ . per il primo mese; di nuovo: Se 100.  $\frac{2}{3} \frac{1}{2}$  tornano 100. che torneranno 8.  $\frac{2}{3} \frac{1}{2} \frac{1}{2}$ . e così per 50. mesi, cinquanta volte si sommano i risultanti dalle regole del Trè, e si averanno i Duc. meno de' trovati dal Tartaglia, da pagarsi al presente.

Si può cominciare ancora al contrario, cioè dal cinquantesimo mese, nel quale il Capitale, e merito devono essere Duc. 9. i quali pagati resta nulla, come vuole la Domanda. Si dica dunque: Se 100  $\frac{2}{3} \frac{1}{2}$  tornano 100. che torneranno Duc. 9. e verranno Duc.  $8 \frac{2}{3} \frac{1}{2} \frac{1}{2}$  di puro Capitale, restati al quarantesimo nono mese. fatto il pagamento di Duc. 9. i quali si aggiungono à Ducati  $8 \frac{2}{3} \frac{1}{2} \frac{1}{2}$ , fanno Duc. 17  $\frac{2}{3} \frac{1}{2} \frac{1}{2}$  Capitale, e frutto nel quarantesimo nono mese, avanti di avere pagato Duc. 9. Ora di nuovo si dica: Se 100.  $\frac{2}{3} \frac{1}{2}$  tornano 100. che torneranno Duc. 17  $\frac{2}{3} \frac{1}{2} \frac{1}{2}$ ? e quelli, che verranno saranno il puro Capitale del quarantesimo ottavo mese, e i quali s'aggiungono Duc. 9. che si pagano, e così si prosegue fino da principio, e si averanno li Duc. appunto, meno di quelli del Tartaglia. Qui sento, che alcuno dica, che

ciò sug-

cio suppongo, ma non lo provo; Ciascuno Abbachista però lo può provare con avergli assegnato due modi d'operare; siccome io provo nel seguente esempio, nel quale si ricerca assai meno fatica, e mi servo di quello del Zucchetto posto nella 13. di questo.

16. D. Un Mercante ha pigiato una mia Casa a pigione per lire 440. l'anno, per tre anni; Egli vorrebbe sborsare ad un altro tante lire, che col frutto di lir. 10. per 100. l'anno mi pagasse le tre annate di pigione, e le lire venissero a restare annullate nel terzo pagamento di lir. 440. Si domanda quante lire sborserà con tali condizioni?

R. Ecco proposta la Domanda ne i termini del Tartaglia, il quale ridarrebbe li tre pagamenti, ciascuno di lir. 440. in tre anni ad un solo pagamento di lir. 1320. dopo 2. anni, e moltiplicando anni 2. per 10. merito per 100. averebbe 20. che aggiunto al 100. farebbe 120. ed operando lo sconto con dire: Se 120. tornano 100. e per scisso 6. tornano 5. che tornerebbero lir. 1320? averebbe da tale operazione lir. 1100. e tante direbbe ne dovesse sborsare il Mercante, &c. Se ne faccia prova: Si meritino lire 110. per un'anno a 10. per 100. verranno col merito lir. 1210. dalle quali si levino lir. 440. pigione nel primo anno, restano lire 770. le quali si meritano per il secondo anno alla medesima ragione verranno col merito lir. 847. dalle quali si levino lire 440. pigione nel secondo anno, restano lir. 407. si meritano queste per il terzo anno, e verranno col merito lir. 447  $\frac{7}{8}$ . dalle quali si levino lire 440. pigione del terzo anno, e restano lire  $7 \frac{7}{8}$ . e dovevano restare annullate, sicchè il modo d'operare del Tartaglia è falso, e succede che il denaro non sia annullato, come ho detto. Nella risposta della 13. si è detto il primo modo, con scontare a 10. per 100. l'anno a capo d'anno lir. 440. per un'anno per 2., e per 3. anni, con sommarne le partite rinate, e fecero lir. 1094  $\frac{7}{8}$ . da sborsarsi dal Mercante. Per mio secondo modo, si opera cominciando da ultimo, con dire: Se 110. tornano 100. che torneranno lir. 440? pigione del terzo anno, e torneranno 400. Capitale puro, dopo il secondo anno, avendo pagato lire 440. pigione del secondo anno, le quali lir. 440. si sommano con lire 400. fanno lir. 840. le quali si scontano, dicendo 11. tornano 10. che lir. 840? e torneranno 763  $\frac{1}{2}$ . puro. Capitale dopo il primo anno, avendo pagato lir. 440. di pigione, le quali si sommano con lir. 763  $\frac{1}{2}$ . fanno lir. 1203  $\frac{1}{2}$ . le quali si scontano con dire 11. tornano 10. che torneranno lire 1093  $\frac{7}{8}$ ? e verranno lire 1094  $\frac{7}{8}$ . da sborsarsi nel principio dal Mercante all'altro, che col merito di 10. per 100. paghi la pigio-

pigione di lir. 440. l'anno; e restino le lire annullate.

17. D. Uno deve dare ad un' altro scudi 200. di lire 7. per scudo, à sc. 28. lir. 4. ogni anno, finendo il pagamento in termine di 7. anni, ma d'accordo gli dà presentemente tanti Scudi, che fruttandogli 5. per 100. l'anno, e pigliandosi il Creditore ogn'anno li sc. 28. 4. restino annullati dopo 7. anni. Si domanda quanti siano gli scudi, che gli dà?

R. Secondo il Tartaglia si risolve prestamente, ma non bene, così si riducono li 7. pagamenti, in un sol pagamento di sc. 200. dopo 4. anni, i quali si moltiplicano per 5. ragione per 100. fa 20. che si aggiunge al 100. fa 120. Però si dica: Se 120, torna 100. di puro 6. tornano 5. che sc. 200? e verranno sc. 166. lir. 4. soldi 13. den. 4. li quali dà antecedentemente il debitore. Ma facendone prova con meritargli à 5. per 100. e levarne ogni anno scu. 28. lir. 4. dopo il settimo anno, resteranno Scudo 1. lire 6. 4. in circa. Dunque non restano annullati, come vuole la proposta.

Si risolve con lo sconto a capo d'anno, dicendo: Se 105. danno di sconto 5. per schiso 21. danno 1. di sconto, che sc. 28. 4? e vengono sc. 1. lir. 2. 10. 5  $\frac{1}{2}$ . di sconto, che si sottrano da scudi 28. 4. restano sc. 27. lir. 6. sol. 9. 6  $\frac{3}{4}$ . per il primo anno. Di nuovo questi si partono per 21. e sc. 1. lir. 2. 1. 4. e rotto si sottrino da sc. 27. &c. restano sc. 25. 6. 8. 1. e rotto per il secondo anno. e così fino al settimo. Si sommino le partite restate ciaschaduno anno, e la somma di sc. 165. lir. 2. soldi 5. den. 6. pigliando il rotto per den. 1. dà di presente al creditore.

Nell' altro modo si può operare cominciando dal settimo anno, nel fine del quale devono essere tra Capitale, e merito scudi 28. lir. 4. Però si dica come nella passata. Se 21. dà di sconto 1. che sc. 28. 4? e sarà di scu. 1. 2. 10. 5  $\frac{1}{2}$ . li quali sottratti da sc. 28. 4. restano sc. 27. 1. 9. 6  $\frac{3}{4}$ . di puro capitale, a i quali aggiunti sc. 28. 4. di pagamento fatto nel sesto anno, sono sc. 55. 5. 9. 6  $\frac{3}{4}$ . di Capitale, e merito dopo il sesto anno. Si trovi il puro capitale, dicendo. Se 21. dà 1. di sconto, che sc. 55. 5. 9. 6  $\frac{3}{4}$ ? e verranno scudi 2. 4. 11. 10  $\frac{1}{2}$ .  $\frac{1}{2}$ . li quali sottratti da sc. 55. 5. 9. 6  $\frac{3}{4}$ . ed a i restati aggiunti sc. 28. 4. s'averanno sc. 81. 4. 17. 7  $\frac{1}{2}$ .  $\frac{1}{2}$ . Capitale, e merito dopo il quinto anno. Si profeguisca in questo modo fino al principio del primo anno, e verranno come sopra sc. 165. 2. 5. 6. &c.

18. D. Uno deve pagare di pigione al fine di ciascun' anno sc. 28. 4. per una Casa, ma nell'entrare in essa pagò al Padrone sc. 165. 2. 5. 6. con patto, che gli fruttassero à sc. 5. per 100. l'anno, e  
dal





conto, e si vanno levando li sc. 60. ed in fine avvanzerà meno di un millesimo, che è meno d' un mezzo quattrino, ed acciò si veda in pratica, pongo l' operazione di 2. anni .

Scudi 486. 654 — 4

Somma 19. 466. 16 merito .

Capitale, e Merito Sc. 506. 120. 16 dopo il primo anno .

Sottra Sc. 60.

446. 120. 16 — 4

17. 844. 80. 64 merito .

Capitale, e Merito Sc. 463. 964. 96. 64 dopo il sec. anno .

Sottra Sc. 60

Sc. 403. 964. 96. 64 — 4

*Lezione della Domanda seguente 21.*

Per 20. Sc. 600 merito Sc. 30

An. Pr. 70

Sc. Sc. 70. - An. 1. - Sc. 143  $\frac{2}{3}$  ? An. 2. - 16

Sc. 530 — Sc. 26  $\frac{1}{2}$

An. 8. 6. 25  $\frac{1}{2}$   
2. — 16  $\frac{1}{2}$

Ter. 460 — Sc. 23

An. 10. 7. 12

Quar. 390 — Sc. 19  $\frac{2}{3}$

Se An. 10. 7  $\frac{2}{3}$  — Sc. 600 — An. 12

Quin. 320 — Sc. 16

127 — 60 — 12

Sesta 250 — Sc. 12  $\frac{1}{2}$

637 — 3600 — 12

Setta 180 — Sc. 9

Se. 56. 10. 3 — 4150 — 5

Sett. 110 — Sc. 5  $\frac{2}{3}$

6560 — 20 — 60

Otta. 70

6560 — 190 — 12

Mesi 6. 25  $\frac{1}{2}$  40 — Sc. 1  $\frac{2}{3}$

Scudi 143  $\frac{2}{3}$

21. D.

21. D. Carlo vuol pigliare à pigione una Casa, che paga l'anno Sc. 70. e paga innanzi al Padrone Sc. 600. con patto che si scemi la pigione in maniera, che venga à guadagnare Sc. 5. per 100. à merito semplice sopra Sc. 600. anticipati. Si domanda quanto tempo starà in detta Casa, e quanti Scudi pagherà l'anno delli Scudi 600?

R. In due modi si opera: Il primo è questo: Si meritano Sc. 600. à 5. per 100. con pigliarne il ventesimo faranno Sc. 30. che si tengono da parte. Da Sc. 600. si levano Sc. 70. di pigione, e restano Sc. 530. che si meritano per un'altro anno alla medesima ragione con pigliarne il ventesimo, faranno Sc. 26  $\frac{2}{5}$ . li quali si pongono sotto Sc. 30. e da Sc. 530. si levano Sc. 70. e restano Sc. 460. li quali si meritano, e si seguita fino che avanzano Sc. 40. che meritano Sc. 1  $\frac{2}{5}$  in mesi 6. giorni 25  $\frac{1}{2}$ . i quali si aggiungono ad anni 8. intieri, fanno anni 8. 6. 25  $\frac{1}{2}$ . si sommano tutti i meriti, o frutti, sono Sc. 143  $\frac{2}{5}$ . dipoi per regola del Trè si dica: Se Scudi 70. fanno stare in Casa un' anno, quanto tempo faranno stare Sc. 143  $\frac{2}{5}$ ? e verranno anni 2. mesi —. giorni 16  $\frac{2}{5}$ . i quali si sommano con anni 8. mesi 6. gior. 25. fanno an. 10. mesi 7. giorni 12. in circa, che Carlo starà in Casa; Ora si dica se per anni 10. mesi 7  $\frac{1}{2}$ . si pagano Sc. 600. che si pagherà per un' anno? e verranno Sc. 56. Sol. 10. 3. &c.

22. D. Come si opera nel secondo modo?

R. Si riducono gli 8. pagamenti di Sc. 70. e l'ultimo di Sc. 40. ad un solo pagamento di Sc. 600. dopo An. 4  $\frac{3}{4}$ . li quali anni si moltiplicano per Sc. 30. merito d' un' anno sopra Sc. 600. fanno Sc. 143  $\frac{2}{5}$ . li quali si sommano con Sc. 60. fanno Sc. 743  $\frac{2}{5}$ . Ora si fa la regola del Trè, dicendo: Sc. 70. fanno stare an. 1. in Casa, quanto tempo faranno stare Sc. 743  $\frac{2}{5}$ ? e verranno anni 10. mesi 7. giorni 12. in circa, come per l' altro modo. Di nuovo: se an. 10. 7  $\frac{1}{2}$ . vogliono Sc. 600. quanti Sc. an. 1? e verranno Scudi 56. 10. 3. e tanti ne viene à pagare

Sc. 70 An. 1 —	70
l' anno per l' anticipato pagamento	70 — 2 — 140
Per ridurre ad un solo pagamento si	70 — 3 — 210
parte 600. per 70. vengono anni 8. $\frac{3}{4}$ .	70 — 4 — 280
Ora si moltiplicano Sc. 70. per an. 1. per	70 — 5 — 350
anni 2. per an. 3. &c. in ultimo Sc. 40.	70 — 6 — 420
per an. 8. $\frac{3}{4}$ . si sommano i prodotti, la	70 — 7 — 490
somma 2862 $\frac{2}{5}$ si parte per Sc. 600. e	70 — 8 — 560
vengono 4 $\frac{3}{4}$ . che sono anni, ne i qua-	40 — 8 $\frac{3}{4}$ — 342 $\frac{2}{5}$
li si guadagnano Sc. 143 $\frac{2}{5}$ à Sc. 30. l'	
anno, &c.	per Sc. 600

D d d 2

2862  $\frac{2}{5}$   
23. D.

23. D. Uno toglie una Casa à pigione per lir. 20. l'anno, e colui, che la toglie dette innanzi tratto al Padrone della Casa lire 48. e gli promette di scontargliela à denari 2. per lira il mese. Si domanda quanto tempo costui doverà stare, ovvero tenere la Casa, acciò siano pagati appunto.

R. Questo quesito è di Fr. Luca à car. 160. il quale conclude il Pigionante doverci stare anni 2. mesi 10. gior. 29  $\frac{2}{3}$   $\frac{2}{3}$   $\frac{2}{3}$ , la quale conclusione è falsa, e molti Autori in simili quesiti hanno errato; L'errore, che fa Fr. Luca è, che merita lir. 16  $\frac{2}{3}$   $\frac{2}{3}$  per un'anno intiero, non dovendole meritare, che per quel tempo, che deve tenere il Pigionale la Casa, onde gli vengono da 15. giorni in circa di più; Adunque si operi così: Il merito di den. 2. per lira il mese, è il medesimo che 10. per 100. l'anno; sicché si merita la decima parte del Capitale; Per lo che si partano lir. 48. per 10. lir. 4. Sol. 16. di quoziente sono il merito d' un' anno, si somm. con lir. 48. fanno lir. 52. Sol. 16. dalle quali sottratte lire 20. di pigione, restano lir. 32. 16. le quali di nuovo si partono per 10. lir. 3. 5. 7  $\frac{2}{3}$  merito nel secondo anno, si sommano con lire 32. 16. e fanno lir. 36. 1. 7  $\frac{2}{3}$ . dalle quali si sottrano lire 20. pigione del secondo anno, restano lir. 16. 1. 7  $\frac{2}{3}$  che sono l'istesse che lir. 16  $\frac{2}{3}$  di Fr. Luca. Or qui si noti la difficoltà, dalla quale nasce l'errore: Lire 16  $\frac{2}{3}$  non si devono meritare per un' anno, come fa Fr. Luca; perchè il Pigionale per lir. 16  $\frac{2}{3}$  non deve abitare un' anno, ma il tempo, che ci deva abitare non si sa, e per quello si devono meritare lir. 16  $\frac{2}{3}$ . Per questo si usi questa regola di modo cavata dall' Algebra, e l' accennerò più innanzi; delle lir. 16. 1. 7  $\frac{2}{3}$ . si trovi il merito d' un' anno, con partirle per 10. farà di lir. 1. 12. 1  $\frac{2}{3}$   $\frac{2}{3}$  la quale sottratti da lir. 20. pigione annua, restano lir. 18. 7. 10  $\frac{2}{3}$ . Ora si fa la regola del Tre, dicendo: Se lir. 18. 7. 10  $\frac{2}{3}$ . ( che vengono ad essere lire 20. senza il merito d' un' anno ) fanno abitare la Casa mesi 12. quanto tempo la faranno abitare le lire 16. 1. 7  $\frac{2}{3}$  senza il merito del suo tempo? ed operato verranno mesi 10. giorni 14  $\frac{2}{3}$   $\frac{2}{3}$   $\frac{2}{3}$ . Dunque il Pigionale deve stare in Casa An. 2. Mesi 10. Giorni 14. &c. che sono in circa giorni 15. meno, che per la conclusione di Fr. Luca.

24. D. Come si prova essersi bene operato?

R. Adesso, che si sa il tempo di mesi 10. gior. 14  $\frac{2}{3}$  in circa, si meritano lir. 16. 1. 7  $\frac{2}{3}$ . per detto tempo à ragione di 10. per 100. dicendo: Se 10. in mesi 12. fruttano 1. che frutteranno lire 16. 1. 7  $\frac{2}{3}$ . in mesi 10. 14  $\frac{2}{3}$  & operato per regola del 5. verranno lir. 1. 8. 1  $\frac{2}{3}$ . il qual frutto, ò merito si somma con lir. 16. 1. 7  $\frac{2}{3}$ . fanno lir. 17. 9. 8  $\frac{2}{3}$ . che però si dica: Se Lir. 20. fanno abitare la Casa

397

Casa mesi 12. quanto tempo la faranno abitare le lire 17. 9. 8  $\frac{1}{2}$  ?  
e verranno mesi 10. 14. ed ore 18. in circa cioè  $\frac{1}{2}$ . che il tempo  
venuto dall'operazione passata : Sicchè stà bene .

25. D. Uno piglia una Casa à pigione da un' altro , e deve pagare  
ogn'anno lire 50. e quello di chi è la Casa vuole avanti tratto li-  
re 200. meritandole à 10. per 100. à fare à capo d'anno, e si con-  
tenta , che stia costui tanto in Casa, che questi denari siano scon-  
ti . Domando quanto tempo starà nella detta Casa, volendo ;  
chè restino pari , senza che nessuno resti debitore al Compagno ?

R. Francesco Pagani da Bagnacavallo , à car. 161. iv. dice che  
starà in Casa an. 5. mesi 4. gior. 14. avendo seguitato Fr. Luca .  
ma operando come si è insegnato nell'antecedente , per l'avanza-  
te lir. 16  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$  . con il suo frutto , doverà stare mesi 4. giorni 5.  
in 6. e non gior. 14. perchè trovando il merito di lir. 16  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$  .  
à 10. per 100. in un'anno sarà di lir. 1  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$  . il quale sottratto  
da lir. 50. restano lir. 48  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$  . onde si dice : Se lir. 48. 31631  
danno mesi 12. che daranno lir. 16. 8470. avanzate ? e verranno  
mesi 4. giorni 5. anzi quasi 6.

26. D. Affitto una Villa à lir. 400. l'anno , e l'Affittuale mi dà an-  
ticipatamente lir. 1000. da dovere scontare negli affitti : facen-  
dogli però buono il più de' suoi denari à 5. per 100. Domando  
quanto tempo colui hà da possedere la Villa per quei denari ?

R. Questa è la Proposta seconda del Zucchetto à car. 297. posta da  
Gio: Battista à car. 210. del suo Giardino Arimmetico . Si me-  
ritano lir. 1000. à 5. per 100. partendole per 20. il quoziente 50.  
sono lir. di merito , che si sommano con lir. 1000. fanno lir. 1050.  
dalle quali si sottrano lir. 400. restano lir. 650. queste si partono  
per 20. lir. 32  $\frac{1}{2}$  di merito si sommano con lir. 650. e fanno  
lire 682  $\frac{1}{2}$  . dalle quali si sottrano lir. 400. e restano lire 282  $\frac{1}{2}$  .  
Ora il Zucchetto , come Fr. Luca merita lire 282  $\frac{1}{2}$  . per  
un'anno intiero che il merito sarà di lir. 14  $\frac{1}{2}$  . le quali somma  
con lir. 282  $\frac{1}{2}$  , fanno lir. 296  $\frac{1}{2}$  . e dice ; se lir. 400. fanno tenere  
la Villa mesi 12. quante tempo la faranno tenere lir. 296  $\frac{1}{2}$  ? e  
gli vengono mesi 8. giorni 26  $\frac{1}{2}$  . che con gli due anni sono anni  
2. mesi 8. gior. 26  $\frac{1}{2}$  . Così dice il suo fedele Pisani ancora ; Ma  
operando , come hò insegnato per regola di modo , il merito di  
un'anno , cioè lir. 14  $\frac{1}{2}$  . si sottrano da lir. 400. di fitto, e restano  
lir. 385  $\frac{1}{2}$  . Per lo che si dica : Se lir. 385.  $\frac{1}{2}$  . danno mesi 12. che  
daranno lir. 282  $\frac{1}{2}$  avanzate ? e daranno mesi 8. giorni 23. hore  
13  $\frac{1}{2}$  . in circa .

27. D. Qual' è la sua prova ?

R. Per regola del cinque si dica : Se 100. in mesi 12. meritano lire  
5. che

5. che meriteranno  $\text{lit. } 282 \frac{1}{2}$ . in mesi 8. 23. 13.  $\frac{1}{2}$  2 e verranno lire 10. sol. 7. denari 2. qual merito aggiunto a  $\text{lit. } 282$ . sol. 10. fanno lire 292. 17. 2. che però si dice; Se lire 400. fanno tenere la Villa mesi 12. quanto tempo la faranno tenere  $\text{lit. } 292$ . 17. 2? e verranno mesi 8. 23. hora 13. &c. sicchè la soluzione è buona, e quella del Zuochetta è falsa, il quale se la provava si accorgeva dell' errore; ma disse questa soluzione è tanto chiara, che se gli faria torto a provarla.

Il Forestani a carte 212. proposizione prima, e quarta delle Pigioni. Il Dottor Bassi a carte 283. Questo serao. Giuseppe Ciacchi a carte 189. Questo secondo fanno il medesimo errore, il quale può essere emendato per quello che ho detto, senza più allungarmi, solo apporterò il quesito primo degl' Affitti, posto a carte 143. dal Figatelli, propostoli, come dice dal Signor Mannelli.

28. D. Un Gentiluomo affitta una Casa per scudi 60. all' Anno, l'affittuario anticipatamente sborsa scudi 200. con patto, che 10. per 100. li siano scontati. Si Domanda, quanto tempo deve stare in Casa?

R. Il Figatelli conchiude, che l'affittuario deve stare in Casa anni 4. mesi 2. giorni 2. ore 10. minuti 20  $\frac{1}{2}$ , cioè poco più d' un terzo d'ora.

Questa conclusione è falsa, si veda  $\text{sc. } 200$ . in un' anno, a 10. per 100. diventano col merito  $\text{sc. } 220$ . da quali si sottrano  $\text{sc. } 60$ . di fitto, restano  $\text{sc. } 160$ . li quali col merito sono  $\text{sc. } 176$ . dopo il secondo anno, dalli quali si sottrano  $\text{sc. } 60$ . e restano  $\text{sc. } 116$ . che col merito sono dopo il terzo anno  $\text{sc. } 127 \frac{1}{2}$ . da quali si sottrano  $\text{sc. } 60$ . restano  $\text{sc. } 67 \frac{1}{2}$ . che col merito sono dopo il quarto anno scudi 74  $\frac{1}{2}$ . da quali si sottrano scudi 60. è restano scudi 14  $\frac{1}{2}$ . ed il Figatelli dice, che restano  $\text{sc. } 13 \frac{1}{2}$ . gli Scudi restati si devono meritare per il tempo, che il Fittuario deve stare in Casa, e questo il trasaccia, e dove Fr. Luca merita per un'anno intero, questo per opposto non gli merita per alcun tempo. Di più in supposizione, che fossero restati  $\text{sc. } 13 \frac{1}{2}$ . e senza aggiunger merito, operando come dice: Se  $\text{sc. } 60$ . fanno abitare la Casa un'anno, quanto tempo la faranno abitare  $\text{sc. } 13 \frac{1}{2}$ ? ne verrebbero mesi 2. giorni 22. ore 13  $\frac{1}{2}$ . e non il tempo da lui posto.

Per trovare dunque quanto tempo deve stare il Fittuario in Casa oltre anni 4. per li  $\text{sc. } 14 \frac{1}{2}$ . questi si meritano per un' Anno a 10. per 100. il frutto scudo 1  $\frac{1}{2}$ . si sottrai da scudi 60. di fitto, restano scudi 58  $\frac{1}{2}$ . onde si dica: Se  $\text{sc. } 58 \frac{1}{2}$ . danno 12. mesi,

mesi, che Sc. 14.  $\frac{1}{2}$  e daranno mesi 2. gior. 28. ore 6  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$ . e tanto tempo doverà stare in Casa oltre an. 4. e perchè si conosca di dove viene questo modo d'operare, che viene dall'Algebra, si suppone che il Fattuario per li Scudi 14  $\frac{1}{2}$  abbia da stare in Casa 1. cosa di tempo. Ora si dica: Se anno 1. ricerca di fitto Scu. 60. quanti ne ricerca 1. cosa di tempo? e verranno Sc. 60. cosa si veda che fruttano Sc. 14  $\frac{1}{2}$ . in un'anno, à 10. per 100, e verrà di frutto Sc. 1  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$ . adesso. Se anno 1. frutta Sc. 1  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$ . the 1. cosa di tempo? e verrà 1  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$ . cosa, il quale con Sc. 14  $\frac{1}{2}$ . fa Sc. 14  $\frac{1}{2}$ . più 1  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$ . cosa uguali à Scudi 60. cosa. Si levi da ogni parte il superfluo 1  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$ . cosa, sarà 58  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$ . cosa uguale à Sc. 14  $\frac{1}{2}$ . e questi si partano per 58  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$ . verrà  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$ . d'anno. cioè mesi 2. giorni 28. ore 6  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$ . &c. dal che si cava, che il merito del denaro avanzato, si sottra dal denaro del fitto, ò pigione, e per il restato da questo sottrarre si parte il denaro avanzato, e verrà il rotto d'anno, che si reca in mesi, giorni &c.

29. D. Qual' è la sua prova?

R. Si faccia come la 27. per regola del Cinque: Se Scudi 100. in mesi 12. meritano Sc. 10. che meriteranno Sc. 14  $\frac{1}{2}$ . in mesi 2. giorni 28  $\frac{1}{2}$  lascio il rotto dell'ore, & operato meriteranno lir. 2. 9. 3. si sommano con Scudi 14  $\frac{1}{2}$ . riducendo  $\frac{1}{2}$ . in lir. 2. 10. 5. valendo lo scudo Fiorentino lire 7. fanno Scudi 14. 4. 19. 8. Adesso per regola del Trè si dice: Se Sc. 60. fanno abitare la Casa mesi 12. quanto tempo la faranno abitare Scudi 14. 4. 19. 8? e verranno mesi 2. giorni 28. ore 6. &c. Dunque così sta bene risoluto il quesito, e non come conclude il Figatelli.

Si avverta, che senza regola del Cinque, si potevano avere Sc. 14. lir. 4. 19. 8. Capitale, e merito, ma per regola del Trè dicendo: Se Sc. 58  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$ . fossero Sc. 14  $\frac{1}{2}$ . che farebbero Sc. 60 e verranno Sc. 14. 4. 19. 8. pigliando il rotto per un denaro, il medesimo si potrà fare nella prova della 27. dicendo: Se lire 385  $\frac{1}{2}$ . fossero lir. 282  $\frac{1}{2}$ . avanzate, che farebbero lir. 400 e verranno lire 292. 16. 10. dipoi: Se lir. 400. danno mesi 12. quanto tempo daranno lire 292. 16. 10. e verranno mesi 8. 27. 13. come si disse.

30. D. Carlo piglia una Casa à pigione, e paga al principio al Padrone Sc. 78. lir. —. Sol. 15. 4. con questo, che gli fruttino à ragione di Scudi 5. per 100. l'anno à capo d'anno, con levare però al fine dell'anno i denari della pigione, e fatto il conto Carlo trova, che dopo anni 2. deve uscire di Casa senza debito, e credito. Si domanda quanto pagavagli di pigione l'anno, per detta Casa.

R. Nella 11. passata s' insegna a servirsi della regola di modo, che è questa,

è questo : Si meritano Sc. 78. —. 13. 4. à Sc. 5. per 100. l' anno , partendo per 20. e sommando il quoziente di Scudi 3.6.6. 8. con Sc. 78. —. 13. 4. fanno Scudi 82. li quali si partono per 20. e il quoziente di Sc. 4. —. 14. si somma con Sc. 82. fanno Sc. 86. —. 14. che si devono partire per quello ne viene dal seguente merito à capo d'anno ; si piglia Scu. 1. e si merita à 5. per 100. l' anno , partendo per 20. merito  $\frac{1}{20}$ , che s'aggiunge , fa Sc. 1.  $\frac{1}{20}$ . al quale s'aggiunge 1. per il secondo anno , fa Sc. 2  $\frac{1}{20}$ . per li quali si partono Scudi 86. —. Soldi 14. e verranno Sc. 42. prezzo della Pigioue . Si prova con meritare Sc. 78. —. 13. 4. alla ragione detta vengono Sc. 82. dopo un' anno , da i quali si sottrano Scudi 42. di pigioue , restano Sc. 40. che meritandogli per il secondo anno , vengono col merito Sc. 42. da i quali levati Sc. 42. di pigioue , resta nulla , e sta bene la soluzione .

Soggiungerò due fimili di trè anni , e la prima si scioglierà per Algebra, e la seconda per regola di modo , cavata da essa , acciò si capisca la ragione di tale operare , anche ne i casi di più di due anni .

31. D. Lello pigliò in Affitto un Podere per trè anni , e diede anticipatamente Scu. 126  $\frac{1}{2}$  . con questo , che gli fruttassero à ragione di 20. per 100. e trova avere sodisfatte al Padrone con quel denaro anticipato . Si domanda quanti Scudi doveva pagare d' affitto l' anno ?

R. Per Algebra ; si supponga , che paghi una cosa d' affitto , dipoi si meritino Scudi 126  $\frac{1}{2}$  per un' anno , dicendo : Se 100. tornano 120. ovvero 5. tornano 6. che Sc. 126  $\frac{1}{2}$  ? e tornano Sc. 151  $\frac{1}{2}$ . dalli quali sottrasi 1. cosa d' affitto , restano Sc. 151  $\frac{1}{2}$  meno 1. co. Di nuovo , per il secondo anno : Se 5. tornano 6. che Sc. 151  $\frac{1}{2}$  meno 1. cosa ? e tornano Sc. 182. meno 1  $\frac{1}{2}$  cosa , dalli quali sottratto 1. cosa , restano Sc. 182. meno 2  $\frac{1}{2}$  cosa . Di nuovo , per il terzo anno : Se 5. tornano 6. che tornano Sc. 182. meno 2  $\frac{1}{2}$  cosa ? e tornano Sc. 218  $\frac{1}{2}$  meno 2  $\frac{1}{2}$  cosa , dalli quali si sottra 1. cosa d' affitto , e restano Sc. 218  $\frac{1}{2}$  meno 3  $\frac{1}{2}$  cosa , uguale a niente ( stante che , pagato il terzo affitto restano pari ) ; mà ristorando le parti , con aggiungere à ciascuna 3  $\frac{1}{2}$  cosa , sarà 3  $\frac{1}{2}$  cosa , uguale a 218  $\frac{1}{2}$ . onde partiti questi per 3  $\frac{1}{2}$  ne verrà 60. valore dell' cosa , e Scudi di Fitto .

32. D. Giulio piglia in affitto una Possessione per anni 3. e dà al Padrone nel principio Sc. 168. 19. 8  $\frac{2}{3}$ . con patto , che gli fruttino à Sc. 6  $\frac{2}{3}$  per 100. l' anno , à capo d' anno , con levare ogn' anno li Scudi dell' affitto , con dirgli , che per 3. anni l' ha sodisfatte . Si cerca quanto era il prezzo dell' affitto ?

R. Per,



R. Per regola di modo, si meritano Sc. 168. 19. 8  $\frac{2}{3}$  à Sc. 6.  $\frac{2}{3}$ . per 100. l'anno per 3. anni à capo d'anno; trà Capitale, e meriti faranno Sc. 205. 1. 8.  $\frac{1}{3}$ . da partirsi. Ora si merita Sc. 1. per un'anno à Sc. 6.  $\frac{2}{3}$ . per 100. l'anno; sarà trà Capitale, e merito dopo 1. anno Sc. 1.  $\frac{2}{3}$ . al quale s'aggiunge 1. per il secondo anno, e farà Sc. 2.  $\frac{1}{3}$ . questi si meritano alla medesima ragione, e vengono Sc. 2.  $\frac{1}{3}$ . a i quali si aggiunge 1. per il terzo anno, e fanno Sc. 3.  $\frac{1}{3}$ . per questi si partono li Sc. 205. 1. 8.  $\frac{1}{3}$ . ne vengono Sc. 64. e tanti erano per il prezzo dell' affitto. La prova si fa come alla 30.

33. D. Giulio piglia in affitto un Podere da Carlo, con obligo di pagare Sc. 64. l'anno, & anticipatamente sborsa à Carlo Sc. 168. Sol. 19. den. 8.  $\frac{2}{3}$ . con patto, che gli fruttino un tanto per 100. l'anno à ragione di capo d'anno, e Carlo gli paghi ogn' anno l'Affitto di Sc. 64. Si domanda quanto per 100. l'anno gli devono fruttare, acciò Giulio tenga il Podere anni 3. appunto?

R. Opera per Algebra; come si disse nella 10. passata, e troverai, che gli devono fruttare a Sc. 6.  $\frac{2}{3}$ . per 100. &c.

34. D. Si poteva soddisfare alla penultima in altro modo, cioè alla 32?

R. Per doppia falsa posizione ponendo, che il Fitto fusse di Sc. 60. e meritando Sc. 168. 19.  $\frac{2}{3}$ . à Sc. 6.  $\frac{2}{3}$  per 100. l'anno; che si fa con partire per 15. e verrà il merito, che si somma con 168. 19. 8  $\frac{2}{3}$ . e vengono Sc. 180. Sol. 5. da i quali si sottrano Sc. 60. e così si opera due altre volte, e si troveranno avanzare Sc. 18. 16. 4  $\frac{1}{3}$ . Dunque per 60. più i detti Scudi; si ponga la seconda volta per il fitto Sc. 70. si operi come si è detto, si troveranno mancare Scudi 19. 4. 6  $\frac{1}{3}$ . Dunque per 70. meno i detti Scudi. Si riducono le partite finalmente in quindicesimi, e i prodotti sommati delle moltiplicazioni in croce fanno 7383040. da partirsi, e la somma delle partite degl' errori 115360. per la quale si parte, e vengono Sc. 64. di Fitto.



# 402 DISTINZIONE QUARTA

## Modo di saldare Ragioni Mercantili;

*Si per Merito, sì per Sconto, di recare più pagamenti di diverso tempo ad un solo pagamento in un solo giorno: di tirare in rosso più partite di denaro di credito, e di debito con tirarle indietro, e avanti ne i Libri: secondo che più presto, o tardi vien fatto il pagamento per uguagliare in merito di tempo la soluzione non fatta in denaro dal debitor. &c. E prima del modo di trovare la differenza di due tempi.*

**E'** Da sapere da qual mese principia l'anno. In Venezia comincia il di primo Marzo, & in Firenze il dì 25. Marzo. Più comunemente comincia con la 4. Chiesa dell'anno Germano, e nelle seguenti Domanda si comincerà da esso, assegnando a Genaro 1. e Febbraro 2. a Marzo 3. ad Aprile 4. a Maggio 5. a Giugno 6. a Luglio 7. ad Agosto 8. a Settembre 9. ad Ottobre 10. e Novembre 11. a Dicembre 12. Ma cominciandosi da Marzo; ad esso si assegnerà 1. ad Aprile 2. a Maggio 3. a Giugno 4. a Luglio 5. a Agosto 6. a Settembre 7. a Ottobre 8. a Novembre 9. a Dicembre 10.

In Mercanzia il mese si conta per 30. giorni.

**I. D.** Si vuol sapere dal giorno 18. Maggio 1706. sino all'17. Aprile 1708. quanto tempo mercantile è scorsito.

**R.** Nel tempo mercantile non si computano l'oro il li maggior numero degl'anni; cioè 1708. si segna a mano. Sinistra, dopo un punto si sogha 8. numero del mese di Marzo antecedente al mese di Aprile, e dopo un' altro punto 27. giorni del mese di Aprile. Di sotto si segna il minor numero degl'anni, cioè 1706. e 4. numero antecedente il mese di Maggio, e 18. giorni di Maggio. dipoi si sottrano giorni 18. da 27. restano 9. che si segnano sotto. Se fusse stato maggiore il numero de i giorni di sotto, a quello di sopra si farebbero aggiunti giorni 30. e si farebbe sottratto. Di poi si sottrano mesi 3. da 8. perchè non si può, si aggiungono mesi 12. a 3. e da 25. si sottrano 4. e restano 11. che si segnano sotto: li mesi 12. aggiunti fanno 1. anno da levarsi da 1708. e restano 1707. da i quali si sottrano 1706. restano in tutto anno 1. mesi 11. giorni 9. e tanto tempo è scorsito; sommando per prova an. 1. 11. 9. con an. 1706. mesi 4. e 18. vengono anni 1707. 3. 27.

Anni

Anni 1708. 3. 27  
1706. 4. 18

An. 1. 11. 9

Anni 1708. 1. 27  
1706. 2. 18

An. 1. 11. 9

Se l'anno si cominciava da Marzo, veniva la medesima differenza di tempo solo sarebbero stati diversi i numeri de' i mesi nel segnare le partite come si vede nel secondo esempio di sopra.

2. D. Si trovano tutte queste differenze di tempo; cioè da 6. Settembre 1706. fino alli 5. Aprile 1701. e da 15. Aprile 1701. fino alli 17. Agosto 1703. e da 17. Agosto 1703. fino al primo Marzo 1706. e dal primo Marzo 1706. fino alli 16. Ottobre 1708.

R. Si operi come si è detto, e qui si vede, e si averanno quattro differenze di tempo.

An. 1701. 3. 15    1703. 7. 17  
1700. 8. 6    1701. 3. 15

1706. 2. 1    1708. 9. 16  
1703. 7. 17    1706. 2. 1

7. 9

2. 4. 2

2. 6. 14

2. 7. 15

Le quali differenze si sommano, e fanno anni 8. 1. 10. e per prova si vede se è la medesima differenza di tempo; da 6. Settembre 1700. prima partita, fino a' 16. Ottobre 1708. ultima partita, che se sarà di anni 8. mesi 1. 10. farà segno essersi bene operato.

Differenze 7. 9.

2. 4. 2

2. 6. 14

2. 7. 15

Anni 8. 1. 10

Da Anni 1708. 9. 16

1700. 8. 6

Anni 8. 1. 10

3. D. Come s'aggiungono anni, mesi, e giorni a dato giorno.

Per esempio an. 2. mesi 5. giorni 10. a di 15. Maggio 1706?

R. Si segnano anni 1706. poi 4. mesi esclusive fino a Maggio, di poi giorni 15. e sotto si segna-

Anni 1706. 4. 15

2. 5. 10

no anni 2. 5. 10. e si sommano;

la somma di anni 1708. 9. 25.

mostra il di 25. Settembre.

1708.

1708. 9. 25

## Modo di saldare Ragioni mercantili col Merito .

4. D. Adì 26. Gennaio 1706. Antonio diede a frutto sc. 860. a scudi 5. per 100. l'anno a Francesco, li quale gli restituit sc. 480. il dì 14. Ottobre 1707. Volendo trà loro saldare il dì 8. Novembre 1708. Si domanda, che doverà dare Francesco ad Antonio per saldo?

R. Prima si trova quanto tempo sia scorsò dal dì, che Antonio diede a frutto, fino al dì del saldo, e sarà di anni 2. mesi 9. giorni 12. per il qual tempo si meritano sc. 860. a sc. 5. per 100. e verranno trà frutto, e Capitale sc. 979. 13. 8.

Poi si veda quanto tempo sia scorsò dal dì della restituzione di Francesco al dì del saldo, e sarà di anno 1. giorni 24. per il qual tempo si meritano sc. 480. restituiti a sc. 5. per 100. e verranno trà frutto, e Capitale sc. 505. sol. 12. li quali si sottrano da scudi 979. 13. 8. resteranno sc. 474. 1. den. 8. da darsi da Francesco per saldo ad Antonio il dì 8. Novembre 1708.

5. D. Si fa in altro modo detto saldo?

R. Si meritano sc. 860. dati a frutto a 5. per 100. l'anno per anno 1. 8. 18. fino alla restituzione di sc. 480. e sarà il merito di sc. 73. 16. 4. si sottrano sc. 480. da sc. 860. e restano sc. 380. li quali si meritano fino al saldo alla medesima ragione, cioè per anno 1. —. giorni 24. li sc. 20. 5. 4. il merito si sommano con sc. 380. di Capitale, e con scudi 73. 16. 4. merito di sc. 860. fanno in tutto sc. 474. 1. 8. da darsi da Francesco ad Antonio per saldo, come sopra.

Altri meritano sc. 860. sommano il merito di sc. 73. 16. 4. con i medesimi sc. 860. dalla somma di sc. 933. 16. 4. sottrano scudi 480. e li restati sc. 453. 16. 4. li meritano per an. 1. gior. 24. fino al saldo, ed il merito sommato con sc. 453. 16. 4. fa scudi 477. soldi 19 &c. da darsi da Francesco, &c.

6. D. Adì 8. Maggio 1705. Un mercante vendè Seta a Pietro per scu. 630. con obbligo, che Pietro paghi a ragione di scu. 4  $\frac{2}{3}$  per 100. l'anno, per quel tempo, e denaro, che non paga fino al totale pagamento. Detto Pietro adì 12. Aprile 1706. pagò scudi 120. ed adì 18. Marzo 1707. sc. 250. ed adì 24. Gennaio 1708. sc. 200. Si domanda; volendo saldare il dì 20. Settembre 1708. quanto doverà pagare Pietro al Mercante?

R. Si trovi il tempo scorsò da 8. Maggio 1705: fino a 20. Settembre 1708. e sarà d' anni 3. 4. 12. per questo tempo si meritano sc. 630. a sc. 4  $\frac{2}{3}$  per 100. l'anno. Il merito, e Capitale importano sc. 725. 8. 10. Dipoi si meritano i denari restituiti da Pietro per il suo tempo fino al saldo; cioè Scudi

Scudi 120. adì 12. Aprile 1706. d' an. 2. 5. 8 — Sc. 13. 3. 4.  
 250. adì 18. Marzo 1707. d' an. 1. 6. 2 — Sc. 16. 18. 9.  
 200. adì 24. Gennaro 1708. d' an. —. 7. 26 — Sc. 5. 18.

Scudi 570

Sc. 36. —. 1.

Sc. 370. —. 0

Li quali si sottrano da Sc. 725. 8. 10. credito del Mercante, restano  
 Scu. 119. 8. 9. da pagarsi da Pietro per saldo il dì 20. Sett. 1708.

Capitali, e Meriti sono — Sc. 606. —. 1

Si sappia, che in cambio di meritare à ragione di Sc. 4  $\frac{2}{3}$  si potrebb-  
 bero meritare Sc. 630. per an. 3. mesi 4  $\frac{2}{3}$ . à Sc. 5. per 100. Il meri-  
 to farebbe di Sc. 106. Sol. 1. e perchè si è meritato per  $\frac{2}{3}$  di più  
 si leva  $\frac{2}{3}$  di Sc. 106. 1. e restano Sc. 95. 8. 10. &c. vero merito;  
 ovvero si meritano per Sc. 1. il merito di Sc. 21. 4. 2  $\frac{2}{3}$ , si multipli-  
 ca per Sc. 4  $\frac{2}{3}$  e verranno li medesimi Sc. 95. 8. 10.

7. D. Si fa in altro modo detto Saldo per prova?

R. Si meritano li Sc. 630. del Mercante per mesi 11. 4. alla ragione  
 detta, che è il tempo scorso fino che Pietro pagò Sc. 120. il me-  
 rito di Sc. 26. Sol. 6. si pone da parte, e si sottrano Sc. 120. da  
 Sc. 630. restano Sc. 510. li quali si meritano per mesi 11. 6. fino  
 alla paga di Sc. 250. il merito di Sc. 21. 8. 4. si pone sotto l'altro,  
 e si sottrano Sc. 250. da Sc. 510. restano Sc. 260. che si meritano  
 per mesi 10. 6. fino alla paga di Sc. 200. e il merito di Sc. 9. 18. 10.  
 si pone sotto gl'altri due, e si sottrano Sc. 200. da Sc. 260. restano  
 Sc. 60. che si meritano per mesi 7. giorni 26. fino al saldo, e il  
 merito di Sc. 1. 15. 4. si pone sotto gl'altri trè, che si somma-  
 no con Sc. 630. fanno Sc. 689. 8. 6. si sommano ancora Sc. 120.  
 Sc. 250. e Sc. 200. e fanno Sc. 570. li quali si sottrano da Sc. 689.  
 8. 6. e restano Sc. 119. 8. 6. da pagarsi al Mercante per saldo.

8. D. Si fa ancora in altro modo detto Saldo?

R. Le trè partite di Scudi pagate in diversi tempi si recano ad un  
 solo pagamento da farsi in un giorno in una sola partita, e si fa  
 così. Il tempo di giorni 336. dalla prima partita di Sc. 200. alla  
 seconda Sc. 250. si pongono dirimpetto à questa, e dirimpetto  
 à Sc. 200. si pongono giorni 642. Si moltiplicano Sc. 250. via  
 giorni 336. e Scudi 200. via giorni 642. la somma de' prodotti  
 212400. si parte per la somma degli Scudi pagati, cioè per Scudi  
 570. e vengono giorni 372. cioè an. 1. giorni 12. che aggiunti à  
 1706. 3. 12. quando fu pagata la prima partita di Sc. 120. ven-  
 gono 1707. 3. 24. cioè adì 24. Marzo 1707. & in tal giorno vie-  
 ne il solo pagamento di Sc. 570. li quali meritandogli à Sc. 4  $\frac{2}{3}$   
 per 100. l'anno per an. 1. mesi 4. gior. 26. fino al saldo, il meri-  
 to di Sc. 136. aggiunto à Sc. 570. fanno Sc. 606. da sottrarsi da Sc.

725. 8. 10. resteranno da pagarsi per saldo Sc. 119. 8. 10. come per gl' altri modi.

1726. 3. 12.	Sc. 120	Giorni	Prodotti
• 1. —. 12	250	336	84000
	200	642	128400

1707. 3. 24

Per 3700

812400

414

Gio. 372 An. L. —. 12.

150

26

9. D. Marco ha preso a guadagno Sc. 2800. il dì 15. [Novembre 1699. con l' interesse di Sc. 4. per 100. l' anno a merito semplice da Luca, e nel dì 20. Maggio 1705. vogliono saldare. Si domanda quanti Scudi Marco sborserà avendo fatto gl' appresso pagamenti, cioè nel dì 15. Aprile 1701. Scudi 200. e nel dì 20. Agosto 1704. Scudi 900?

R. Si trova il merito di Sc. 2800. fino adì 15. Aprile 1701. sarà di Sc. 158. 13. 4. che si tiene da parte. Si sottrano Sc. 800. da Scudi 2800. restano Sc. 2000. de i quali si trova il merito fino adì 20. Agosto 1704. e sarà di Sc. 267. 15. 7. che si pone sotto l' altro merito. Dipoi si sottrano da Sc. 2000. li Sc. 900. pagati, restano Sc. 1100. de' quali si trova il merito fino a' 20. Maggio 1705. giorno del saldo, che sarà di Sc. 33. li quali si sommano con gli Scudi degl' altri due meriti, fanno Sc. 459. 8. 11. che sommati con Sc. 1100. si hanno Sc. 1559. 8. 11. da sborsarsi da Marco a Luca per saldo il dì 20. Maggio 1705.

10. D. Come si fa in altro modo detto saldo?

R. Si trova il tempo scorso dal dì 15. Novembre 1699. fino al dì 20. Maggio 1705. giorno del saldo, e sarà di anni 5. mesi 6. giorni 5. per li quali si meritano Sc. 2800. a Sc. 4. per 100. l' anno; li Sc. 617. 11. 1. di merito s' aggiungono a Scudi 2800. e fanno Scudi 3417. Sol. 11. 1. credito di Luca. Medesimamente si meritano li Scudi 800. pagati per anni 4. mesi 1. giorni 5. tempo fino al saldo alla medesima ragione, e vengono Scudi 121. 2. 2. di merito, che con Sc. 800. fanno Sc. 931. 2. 2. ancora si meritano Sc. 900. per mesi 9. fino al saldo Sc. 27. di merito con Sc. 900. e con Scudi 931. 2. 2. fanno Sc. 1858. 2. 2. credito di Marco. li quali sottratti da Sc. 3417. 11. 1. restano Scudi 1559. 8. 11. da pagarsi da Marco a Luca per saldo. E così si usa trà Mercanti; Tuttavia altri fanno il detto saldo così differentemente.

11. D. Come si fa da altri differentemente detto saldo?

R. Si meritano Scudi 2800. alla detta ragione fino adì 15. Aprile 1701

1792. li scudi 158. 13. 4. di merito s'aggiungono à scudi 2800. fanno sc. 2958. 13. 4. e da questi si sottrano sc. 800. e restano sc. 2158. 13. 4. li quali si meritano per Anni 3. mesi 4. giorni 5. fino adì 20. Agosto, li scudi 289. —. 5. di merito, si sommano con sc. 2158. 13. 4. e fanno sc. 2447. 13. 9. dalli quali si sottrano sc. 900. pagati, e restano scudi 1547. 13. 9. che col merito di scudi 46. 8. 7. per 9. mesi fino al saldo, fanno sc. 1594. 2. 4. da restituirsi da Marco à Luca.

Si avverta, che i denari pagati siano più del merito.

12. D. Come si farebbe fatto il saldo passato, se il merito fusse dovuto essere à ragione di capo d'anno?

R. Nel fare il saldo à ragione di capo d'anno, il merito non s'aggiunge al Capitale, se non dell'anno intiero, acciò frutti per il seguente tempo, perchè à ciascun termine d'anno si fa un parziale saldo. Si meritano dunque sc. 2800. à scudi 4. per 100. l'anno, per un'anno, li scudi 112. di merito s'aggiungono à scudi 2800. fanno sc. 2912. degli quali il merito di mesi 5. fino al pagamento di sc. 800. sono scudi 48. 10. 8. che si tengono da parte, e li sc. 800. si sottrano da sc. 2912. e restano scudi 2112. li quali si meritano per mesi 7. fino adì 15. Novembre 1701. à finire l'anno, li sc. 49. 5. 7. di merito di sc. 48. 10. 8. merito di mesi 5. si sommano con scudi 2112. e fanno scudi 2209. 16. 3. li quali si meritano per un'anno fino adì 15. Novembre 1702. e li sc. 88. 7. 11. di merito si aggiungono à sc. 2209. 16. 3. fanno sc. 2298. 4. 2. che si meritano per un'anno, fino adì 15. Novembre 1703. sc. 91. 18. 7. s'aggiungono à sc. 2298. 4. 2. fanno scu. 2390. 2. 9. li quali si meritano per mesi 9  $\frac{2}{3}$ . fino adì 20. Agosto 1704. e li sc. 73. —. 6. di merito si tengono da parte, e si sottrano scudi 900. pagati in tal giorno da sc. 2390. 2. 9. e restano sc. 1490. 2. 9. li quali si meritano per mesi 2  $\frac{1}{3}$ . à finire l'anno fino adì 15. Novembre 1704. li scudi 14. 2. 5. con sc. 73. —. 6. si sommano con scudi 1490. 2. 9. fanno sc. 1577. 5. 8. che si meritano per mesi 6  $\frac{2}{3}$ . fino adì 20. Maggio 1705. giorno del saldo, sc. 32. 8. 4. di merito, per doverli pagare finito l'anno, si scontano à scudi 4. per 100. l'anno ragione di merito, e tornano con lo sconto sc. 31. 16. li quali si sommano con scudi 1577. 5. 8. fanno scudi 1609. 1. 8. da pagarsi da Marco à Luca per saldo, il dì 20. Maggio 1705.

13. D. Questo saldo à ragione di capo d'anno si può fare in altro modo?

R. Si può far così, e serve di prova. Si meritano scudi 2800. à sc. 4. per 100. l'anno à capo d'anno, per anni 5. mesi 6. giorni 5. tempo

tempo scorso dal dì 15. Novembre 1699. fino al dì 20. Maggio 1705. giorno del saldo; e torneranno col merito di anni 5. scudi 3406. 12. 6. li quali si meritano in mesi 6  $\frac{2}{3}$ . scudi 70. denari 5. li quali si scontano a scudi 4. per 100. l'anno, per mesi 5  $\frac{1}{2}$ . e tornano con lo sconto sc. 68. 13. 9. li quali sommati con sc. 3406. 12. 6. fanno sc. 3475. 6. 3. e tanti ne dovrebbe ricevere Luca da Marco, se questo non avesse pagato alcuna cosa. Ma avendo pagato sc. 800. il dì 15. Aprile 1701. fino al dì 20. Maggio 1705. giorno del saldo, ci sono anni 4. mesi 1. giorni 5. per li quali si meritano a capo d'anno con scontare il merito delli mesi, e torneranno tra merito, e capitale sc. 939. 8. siccome gli scudi 900. si meritano per mesi 9. fino al saldo; li sc. 27. di merito si scontano per mesi 4. e tornano sc. 26. 14. 8. li quali sommati con sc. 900. e con sc. 939. 8. fanno per Marco sc. 1866. 2. 8. li quali si sottraggono da sc. 3475. 6. 3. credito di Luca, restano sc. 1609. 3. 7. da pagarsi da Marco per saldo.

### Saldare Ragioni Mercantili con lo Sconto.

14. D. Fausto deve avere da Giulio l'infrascrutte partite di scudi da pagarsi, cioè sc. 480. il dì 10. Dicembre 1708. sc. 360. il dì 15. Agosto 1709. sc. 230. il dì 14. Giugno 1711. e vorrebbe essere pagato il dì 16. Ottobre 1708. con dare lo sconto semplice di scudi 5. per 100. l'anno. Si domanda, essendo contento Giulio, quanto pagherà per saldo in tal giorno?

R. Si scontano le partite di Fausto a sc. 5. per 100. l'anno, ciascuna per il tempo, che deve essere pagata avanti, cioè sc. 480. per mesi 1. giorni 24. scontati, sono sc. 476. 3. 6. sc. 360. per mesi 9. gior. 29. scontati, sono sc. 345. 12. 11. e sc. 230. per an. 2. mesi 7. gior. 28. scontati sono sc. 202. 19. 10. li quali si sommano, e fanno sc. 1025. 1. 3. da pagarsi da Giulio per saldo a Fausto il dì 16. Ottobre 1708. L'operazioni degli sconti si sono insegnate a suo luogo.

Qui avverto quello, che hò detto altrove ancora, che chi riducesse quelle partite ad un pagamento in un dì, e poi facesse lo sconto, non s'incontrerebbe con la medesima quantità di scudi; perchè verrebbe un solo pagamento di sc. 1070. adì 16. Settembre 1709. che sono mesi 11. dopo, che però facendone lo sconto a sc. 5. per 100. l'anno, verrebbero con lo sconto sc. 1023. 2. 1. che non confrontano con sc. 1025. 1. 3. di sopra.

15. D. Carlo è creditore di Pietro di sc. 100. da pagarlegli dopo un' anno, e di scu. 100. da pagarlegli dopo 2. anni, e d'altri sc. 100. da pagarlegli dopo 3. anni; essendo d' accordo di fare il saldo



il saldo oggi con lo sconto à capo d'anno à ragione di sc. 10. per 100. l'anno . Si domanda quanti scudi Pietro doverà oggi sborsare per saldo ?

R. Si scontino sc. 100. per 1. anno dicendo 110. tornano 100. ovvero 11. tornano 10. che torneranno sc. 100. con lo sconto ? e torneranno sc. 90  $\frac{9}{10}$ . di nuovo per 2. anni : Se 11. tornano 10. che sc. 90  $\frac{9}{10}$  ? e torneranno sc. 82  $\frac{9}{10}$ . e finalmente per 3. anni, se 11. tornano 10. che sc. 82  $\frac{9}{10}$  ? e torneranno sc. 75  $\frac{9}{10}$ . Si sommino sc. 90  $\frac{9}{10}$ . e sc. 82  $\frac{9}{10}$ . e sc. 75  $\frac{9}{10}$ . fanno scudi 248  $\frac{27}{100}$  da sborsarsi oggi da Pietro per saldo .

Avvertasi, che recando li Tre pagamenti in un solo di sc. 300. verrebbe dopo 2. anni . Ora facendo lo sconto di sc. 300. alla detta ragione per 2. anni , dicendo : Se 11. tornano 10. che sc. 300. tornano scudi 272.  $\frac{2}{10}$ . Di nuovo : Se 11. tornano 10. che scudi 272.  $\frac{2}{10}$ . tornano sc. 248  $\frac{27}{100}$ . da sborsarsi da Pietro , li quali non confrontano con i sopradetti sc. 248  $\frac{27}{100}$ .

### Del recare più Pagamenti di diverse Partite di Denari, in diverso tempo, ad un solo pagamento in un dì.

16. D. Come si recano brevemente ad un dì, se le partite de' Denari fossero uguali, e le differenze del tempo da una partita all'altra pure uguali ?

R. Benchè altri Autori abbiano insegnato un modo commune ; ma perchè in molti casi riesce assai lungo, mi pare bene prima di insegnare quello, accennare alcuni modi brevi in detti casi. Ora quando le partite sono uguali , e le differenze da una partita all'altra uguali , si aggiunge il primo termine di tempo con l'ultimo , la somma si parta per 2. il quoziente dà il tempo cercato ; Per esempio :

17. D. Mario il dì primo Maggio 1710. avendo preso una Casa, à pigione per anni 15. con patto di pagare al fine di ciascun'anno sc. 20. è d'accordo col Padrone di fare un solo pagamento di scudi 300. Si domanda in che giorno verrà senza danno d'alcuno tal pagamento ?

R. Perchè le paghe sono uguali, e da una ad un'altra ci corre un'anno, si aggiunga 1. primo termine ad anni 15. ultimo termine fa 16. il quale si parte per 2. e ne vengono 8. che sono anni, dopo i quali Mario deve pagare sc. 300. per la pigione di 15. anni à sc. 20. per anno , i quali anni 8. aggiunti ad anni 1710. fanno 1718. sicchè nel primo Maggio 1718. verrà il pagamento di sc. 300.

FFF

Niccolò

Niccolò Tartaglia nel cap.ottavo lib.xl. ed altrove insegna il modo lungo. Uno deve dare ad un'altro Duc.450. in termine di 50. mesi à Duc.9. ogni mese, &c.Bisogna recare quelli 50.pagamenti à un termine solo, dice egli, per il modo dato nel capo sesto, cioè moltiplicando ciascun pagamento di Duc. 9. via li mesi, che gli dà avanti tratto, cioè gli primi Duc. 9. che hà da dare in capo d'un mese, moltiplicati per 1. e farà pure 9. e così li secondi due 9. via mesi 2. farà 18. e così andarai procedendo di mano in mano fino in termine i 50. mesi, e dipoi somma quelle 50. moltiplicazioni, e tal somma parti per li Duc. 450. e verranno mesi  $25 \frac{1}{2}$ . e così in termine di mesi  $25 \frac{1}{2}$ . doverà dargli li detti Duea- ti 450. così egli; dalchè ciascuno può conoscere, che operazio- ne lunga sarebbe; ma come hò detto, si aggiunga 1. à 50. fa 51. il quale si parte per 3. e viene  $25 \frac{1}{3}$ . per li mesi cercati.

18. D. Se uno dovesse avere sc. 120. da un'altro in quattro partite uguali, cioè sc. 30. dopo mesi 3. e sc. 30. dopo mesi 4. e scu- di 30. dopo mesi 6. e sc. 30. dopo mesi 8. Si domanda dopo quanti mesi riceverà in un solo pagamento sc. 120. senza danno del Creditore, e Debitore.

R. Ancora in questa Domanda le partite sono uguali, e le differen- ze del tempo da una partita all'altra uguali; Perloche alli mesi 8. s'aggiunge il primo termine di mesi 2. e vengono mesi 10. li quali si partono per 2. e risultano mesi 5. dopo i quali il Creditore riceverà sc. 120. in un solo pagamento senza danno suo, e del Debitore.

19. D. Come si prova, che facendosi un solo pagamento di sc. 120. dopo mesi 5. non si fa danno del Debitore, ne del Creditore.

R. Si prova con il meritare li scudi à qualche ragione, per il tempo, che uno gli tiene, e poi per quello, che gli terrebbe; se farà il medesimo merito sarà segno non esserci danno; e prima per il Creditore si meritano sc. 30. per 6. mesi per più facilità à sol. 1. per sc. il mese, vengono sc. 9. di merito, e sc. 30. per 4. mesi, alla medesima ragione, vengono sc. 6. di merito, e sc. 30. per 2. mesi, vengono sc. 3. di merito, gl'ultimi 30. scudi, che riceve dopo 8. mesi, non ci è tempo, per il quale si meritino: li som- mano li scudi di merito, fanno sc. 18. mà perchè gli riceve do- po mesi 5. in una paga di sc. 120. questi si meritano per mesi 3. che restano fino à mesi 8. à sol. 1. per sc. il mese, e perchè vengo- no sc. 18. di merito, segno è il Creditore non aver danno in un solo pagamento in tal di. Per il Debitore si meritano sc. 120. per 2. mesi, fino al primo pagamento di sc. 30. vengono sc. 12. di merito; pure si meritano sc. 90. per mesi 2. vengono sc. 9. di me-

di merito; ancora sc. 60. per mesi 2. meritano sc. 6. e finalmente Sc. 30. per mesi 2. sopra à Sol. 1. per Scudo il mese, vengono Sc. 3. di merito, che si sommano, e fanno Sc. 30. di merito, ma perchè meritando Sc. 120. per mesi 5. all' istessa ragione, vengono Sc. 30. di merito, dunque è segno non aver danar il Debitore, ancora in fare un solo pagamento in tal tempo.

20. D. Se uno dovesse ricevere Sc. 20. dopo mesi 7. altri Scu. 20. dopo mesi 10. altri Sc. 20. dopo mesi 13. e finalmente Scu. 20. dopo mesi 16. Si domanda dopo quanti mesi riceverebbe in un solo pagamento Sc. 80. senza danno suo, e del Debitore.

R. Perchè le partite del denaro sono uguali, e le differenze del tempo uguali. Però si aggiunga il primo termine 7. all' ultimo 16. fa 23. il quale si parte per 2. vengono 11  $\frac{1}{2}$ . per li mesi, dopo i quali doverà ricevere Sc. 80. & è come se li ricevesse in diversi pagamenti ne' tempi detti.

21. D. Come si recano diverse partite ad un dì, quando le partite sono uguali, ma le differenze de' tempi diverse, e disuguali?

R. Si recano facilmente, e brevemente con sommare le differenze de' tempi trà la prima partita, e l' altre, e la somma si parte per il numero delle partite; cioè per quante sono, e verrà il tempo d'aggiungersi al tempo della prima partita, ovvero con sommare le differenze de' tempi trà l'ultima, e l'altre partite antecedenti, e la somma pure si parte per il numero delle partite, e verrà il tempo da sottrarsi dal tempo dell'ultima partita, e resterà il tempo, dopo il quale viene un sol pagamento di tutte le partite senza danno delle parti; Per esempio.

22. D. Marco trova di essere creditore di Flavio di Sc. 240. da pagarlegli in sei volte, cioè Sc. 40. il dì 15. Agosto, Sc. 40. il dì 10. Settembre, Sc. 40. il dì 20. Dicembre dell' anno 1711. e Sc. 40. il dì 5. Marzo, Sc. 40. il dì 25. Giugno, e finalmente Sc. 40. il dì ultimo Ottobre dell' anno 1712. Si domanda, essendo Flavio d' accordo di fare un sol pagamento di Sc. 240. in che giorno verrà?

R. Si trovano le differenze di tempo dal dì 15. Agosto a dì 10. Settembre dell' anno 1711. sono giorni 25. e dalli 15. Agosto a dì 20. Dicembre del medesimo anno; mesi 4. gior. 5. e dal dì 15. Agosto a dì 5. Marzo 1712. mesi 6. giorni 20. e dal dì 15. Agosto 1711. a dì 25. Giugno 1712. mesi 10. gior. 10. e finalmente dal dì 15. Agosto 1711. a dì ultimo Ottobre 1712. mesi 14. gior. 15. li quali mesi, e gior. si sommano, e fanno mesi 36. gior. 15. che si partono per 6. numero delle partite, vengono mesi 6. gior. 2  $\frac{1}{2}$ . i quali si aggiungono ad an. 1711. 7. 15. tempo della prima partita, cioè 15. Agosto 1711. fanno 1712. L. 17  $\frac{1}{2}$ . ed in tal giorno,

no cioè nel 18. Febbraro del 1712. viene il pagamento di Scudi 240.

23. D. Come si ritrova tal tempo, cominciando dall' ultima partita a trovare le differenze de' tempi all'altre partite antecedenti.

R. Trovate tali differenze, e prima dall' ultima, alla penultima mesi 6. gior. 5. all' antepenultima mesi 7. 25. all' altra per ordine, mesi 10. gior. 10. all' altra mesi 13. gior. 20. finalmente alla prima mesi 14. giorni 15. li quali si sommano, e fanno mesi 52. gior. 15. che si partono per 6. numero delle partite, vengono mesi 8. giorni 12.  $\frac{5}{6}$ . questi si sottrano da 1712. 10. tempo dell' ultima partita, e restano 1712. 1. 17  $\frac{5}{6}$ . e in tal giorno 18. Febbraro 1712. si deve fare il pagamento, come si è detto.

24. D. Come si recano due, o più partite disuguali tra loro da pagarsi in diverso tempo ad un pagamento in un dì?

R. Si accomodano le partite per ordine, dipoi come si è detto nell' antecedenti ancora, si trova che tempo ci corre dalla prima partita alla seconda, e tal tempo si pone di contro alla seconda, e che tempo ci corre dalla prima alla terza, e tal tempo si pone di contro alla terza, e che tempo ci corre dalla prima alla quarta, e tal tempo si pone di contro alla quarta, e così fino all'ultima; Dipoi si moltiplica il denaro di ciascuna partita, per il tempo, che hà di contro: i prodotti si sommano, la somma si parte per la somma del denaro di tutte le partite: il numero quoziente dimostra il tempo d' aggiungerli al tempo nel quale si deve pagare la prima partita, e questo è più breve modo.

25. D. Un Mercante deve avere da Pietro queste partite di lire, cioè lir. 360. a dì 15. Maggio 1706. lir. 480. a dì 18. Febbraro 1708. lir. 240. a dì 8. Luglio 1710. lir. 725. a dì 10. Agosto 1712. e lir. 350. a dì 11. Gennaro 1714. Si domanda volendo fare d' accordo Pietro un solo pagamento in un dì, in quale si farà?

R. Si trova quanto tempo ci corre da 15. Maggio 1706. a dì 18. Feb. 1708. e sarà di anno 1. mesi 9. gior. 3. cioè di giorni 633. li quali si pongono di contro alla seconda partita di lir. 480. adesso si trova il tempo da 15. Maggio 1706. a dì 8. Luglio 1710. sarà d'an. 4. mese 1. gior. 23. cioè di giorni 1493. da per di contro a lir. 240. e così giorni 2245. di contro a lir. 725. e finalmente gior. 2757. di contro a lir. 350. le lire si moltiplicano via i giorni di contro, i prodotti si sommano, e fanno 3254735. da partirsi, si sommano tutte le partite delle lire, e fanno 2155. per le quali si partono 3254735. e vengono giorni 1510. che a giorni 360. per l'anno alla mercantile sono an. 4. mesi 2. giorni 10. da aggiun-

aggiungerli à 1706. 4. 15. cioè a' 15. Mag. 1706. tempo del pagamento della prima partita, fanno 1710. 6. 25. che è a' 25. Luglio 1710. & in tal giorno Pietro farà un solo pagamento di lir. 2155. benchè per il rotto di giorno verria il pagamento nel dì 26. di Luglio 1710.

15. Maggio	1706. Lir.	360.	Giorai	Prodotti
18. Febbre	1708. Lir.	480.	633	303840
8. Luglio	1710. Lir.	240.	1493	358320
10. Agosto	1712. Lir.	725.	2245	1627625
12. Gennaro	1714. Lir.	350.	2757	964950
			fi parte	3254738

Per 2155. 10997

An. 1706. 4. 15. Gior. 1510. 2223  
4. 2. 10 685

An. 1710. 6. 25. cioè 25. Luglio 1710.

26. D. Quale è l' altro modo di recare ad un dì?

R. Avendo posto il tempo di contro alle partite delle lire; Si merita ciascuna partita à quella ragione, che uno vuole ad esso; si merita per lir. 1. per 100. l' anno, per il suo tempo di contro, cioè lir. 480. per an. 1. mesi 9. gior. 3. vengono lir. 8. 8. 9.  $\frac{1}{4}$  di merito, e lir. 240. per an. 4. 1. 23. vengono lir. 9. 19.  $\frac{1}{4}$  di merito, e lir. 725. per anni 6. mesi 2. gior. 25. vengono lir. 46. 4. 2.  $\frac{1}{2}$  di merito; e finalmente lir. 350. per an. 7. 7. 27. vengono lir. 26. 16. 1. di merito; le quali lire di merito si sommano, e fanno lir. 90. 8. 3. Adesso per due regole del Trè si dica: Se lire 100. meritano lir. 1. che meriteranno lir. 2155? e verranno lire 21  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$  di nuovo; Se lire 21  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$  si meritano in un' anno, in quanto tempo si meriteranno lir. 90  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$ ? Sol. 8. den. 3. sono 7. 8.  $\frac{1}{2}$  in circa, e verranno anni 4. mesi 2. gior. 10. ovvero 11. pigliando il rotto per un giorno, li quali s' aggiungono ad anni 1706. 4. 15. della prima partita, e fanno 1710. 6. 26. cioè a' dì 26. di Luglio 1710. Questa mode si usa per esercizio delli scolari; ma per facilità uno non si deve partire dal modo passato, o dal seguente.

Lire	An.	Mesi	Gior.	Meriti.
Lire 360.	1.	9.	3.	Lire 8. 18. 9. $\frac{1}{4}$
Lire 480.	4.	1.	23.	Lire 9. 19. $\frac{1}{4}$
Lire 240.	6.	2.	25.	Lire 46. 4. 2. $\frac{1}{2}$
Lire 725.	7.	7.	27.	Lire 26. 16. 1.
Lire 350.				Lire 21. 10. 8. 3.
Lire 2155				Lire 90. 8. 3.
				4 $\frac{1}{2}$ centesimi
				Se Lire

414  
 Se Lire 100 — Lir. 1 — Lir. 2155? Lir. 21. 55  
 Se Lire 21. 55 — An. 1. — Lir. 90. 41?

421 — 12  
 An. 4. 2. 10 5052  
 1706. 4. 15 742 — 30  
 42260

An. 1710. 6. 25 710

27. D. Quale è il terzo modo di recare ad un di?

	Gior.	Prodotti
12. Gennaio 1714. Lir. 350	312	371200
10. Agosto 1712. Lir. 725	1264	303360
8. Luglio 1710. Lir. 240	2133	1019520
18. Febbraio 1708. Lir. 480	2757	992520
15. Maggio 1706. Lir. 360		

Per 2155

2686600

5316

Da An. 1714. — 12 360 — 1246 — Giorni  
 3. 5. 16 30 166  
 16

10060

14400

1470

An. 1710. 6. 25

An. 3. 5. 16

R. Si comincia dall' ultima partita trovando, che tempo ci è tra essa, e la penultima, e tal tempo si mette di contro alla penultima, e che tempo ci è dall' ultima all' antepenultima, e tal tempo si pone di contro all' antepenultima, e così fino alla prima partita; Dipoi si moltiplica il denaro di ciascuna partita per il suo tempo di contro, i prodotti si sommano, e la somma si parte per la somma del denaro di tutte le partite, e verrà il tempo da sottrarsi dal tempo del pagamento dell' ultima partita, e resterà il tempo dopo il quale si farà un totale pagamento in un di; Per esempio si rechino ad un di 7 partite della 25. passata dal di 12. Gennaio 1714. a di 10. Agosto 1712. ci corre il tempo d' anni 1. mesi 5. gior. 2. che ridotto in giorni sono 512. da porsi di contro à lir. 725. e da di 12. Gennaio 1714. a di 8. Luglio 1710. ci è il tempo d' anni 3. 6. 4. che ridotto in giorni sono 1264. da porsi di contro à lir. 240. e da di 12. Gennaio 1714. a di 18. Febbraio 1708. ci è il tempo d' anni 5. 10. 24. che ridotto in giorni sono 2132. da porsi di contro à lir. 480. finalmente da di 12. Gennaio 1714. a di 15. Maggio 1706. ci è il tempo d' anni 7. 7. 27. che ridotto in giorni, sono 2757. da porsi di contro à lir. 360. Si moltiplica il Denaro di ciascuna partita, per li giorni di contro, li numeri prodotti si sommano, e fanno

2686600.

2686600, che si partono per *lir. 2155*, somma del denaro di tutte le partite, e vengono giorni 1246. cioè *an. 3. mesi 5. gior. 16.* li quali si sottrano da *An. 1714.* —. 12. cioè da' 12. Gennaio 1714. restano 1710. 6. 26. cioè il dì 26. di Luglio 1710. nel quale giorno deve si fare un solo pagamento di *lire 2155.*

Per recare più partite ad un dì si può cominciare dall'ultima; ed agli Scolari giova operare in tutti due i modi, essendo una prova dell'altro.

28. D. Qual'è il quarto modo di recare ad un dì?

R. Si opera per via di merito: Ciascuna partita di denaro si merita per il tempo di contro à quella ragione, che uno vuole, quì à 10. per 100. l'anno per più facilità; Ora *lir. 725.* meritano in anno 1. mesi 5. giorni 2. *lir. 103.* —. 3. e *lir. 240.* in anni 3. 6. 4. meritano *lir. 84.* 5. 4. e *lir. 480.* meritano in anni 5. 10. 24. *lire 283.* 4. e finalmente *lir. 360.* in anni 7. 7. 27. *lir. 275.* 14. si sommano le lire di merito fanno *lir. 746.* 3. 7. per regola del Trè si dica: Se 100. merita 10. che meriteranno *lire 2155.* somma di tutte le partite? ed operate, vengono *lire 215*  $\frac{7}{10}$ . Da nuovo. Se *lire 215*  $\frac{7}{10}$ . di merito si hanno in un'anno, in quanto tempo s'averanno *lir. 746.* 3. 7. somma de' meriti? e si averanno in anni 3. mesi 5. giorni 16. li quali si sottrano da 1714. —. 12. e restano 1710. 6. 26. cioè il dì 26. Luglio 1710. come per gl'altri modi.

29. D. Fausto a dì 25. Marzo 1711. trova esser debitore di Scudi 420. da pagarsi dopo anni 3. à Mauro, e di scudi 280. da pagarsi al medesimo dopo anni 5. Si domanda volendo unire queste due partite in un pagamento, in che giorno sarà fatto da Fausto à Mauro senza danno?

R. Si moltiplicano scudi 420. via anni 3. e scudi 280. via anni 5. gli prodotti 1260. e 1400. si sommano, e fanno 2660. che si partono per 700. somma delli Scudi, e vengono anni 3. mesi 9. giorni 18. i quali aggiunti ad anni 1711. a. 25. fanno 1715. —. 13. Dunque si farà un sol pagamento, il dì 13. Gennaio 1715. da Fausto à Mauro.

Sc. 420 — An. 3 — 1260

Sc. 280 — An. 5 — 1400

Per Sc. 700

7 — 2660

An. 1711. 3. 25

10 — 38

3. 1. 18

Anni 3. 9. 18

1715. 1. 13

30. D.

30. D. Come si recano ad un dì le dette partite in altro modo?

R. Come si è detto nella 25. si trova la differenza di tempo dalla prima di sc. 420 dopo 3. anni alla seconda partita di scu. 280. dopo 5. anni, che è di 2. anni, che si pongono di contro a sc. 280. e per essi si moltiplicano, il prodotto 560. si parte per 700. somma delle partite di Scudi, vengono mesi 9. giorni 18. d'aggiungersi ad anni 3. della prima partita, e verranno anni 3. 9. 18. come per l'altro modo. Medesimamente cominciando dalla seconda partita, la differenza d'anni 2. si pone di contro a sc. 420. li quali si moltiplicano per 2. il prodotto 840. si parte per 700. vengono An. 1. mesi 2. giorni 12. che si sottrano da anni 5. della seconda partita, restano An. 3. 9. 18. dopo i quali si deve fare un pagamento dal dì 25. Marzo 1711.

An. 3. Sc. 420

Sc. 420 — 2 — 840

An. 5. Sc. 280 — 2 — 560

Sc. 280

Per 700

Per 700

Mesi 9. 18.

An. 1. 2. 12

31. D. Come si recano ad un dì per via di merito?

R. Si meritano sc. 420. à qual ragione uno vuole, adesso à 10. per 100. l'anno per anni 3. e vengono scudi 126. di merito; ancora sc. 280. per anni 5. e vengono scudi 140. di merito, si sommano e fanno sc. 266. di merito. Adesso per regola del Trè: Se 100. merita 10. che 700? e vengono sc. 70. Di nuovo: Se sc. 70. vogliono anno 1. di tempo à meritarsi, che vorranno sc. 266? e vorranno anni 3. 9. 18. dopo i quali si farà un sol pagamento. Si poteva operare per regola del 5. roverscia dicendo: Se sc. 10. sono guadagnati da scudi 100. in un' anno, in quanto tempo saranno guadagnati sc. 266. da sc. 700? ed operato, verranno anni 3. 9. 18.

Sc. 10. — Sc. 700. — An. 1. — Sc. 100. — Sc. 266?

Per 7 — 266

Per 10 — 38

An. 3. 9. 18

32. D. Carlo il dì primo Aprile 1711. si trova debitore ad Antonio di queste partite di lire; cioè di lir. 600. da pagarsi adesso il dì detto, di lire 380. da pagarsi il primo Gennaro 1712. e di lire 460. da pagarsi il dì primo Febbraro. Si domanda in che giorno verrà un sol pagamento di dette partite, senza danno d'alcuno?

R. Perchè lir. 600. si pagano di presente il dì primo Aprile non hanno tempo, da questa alla seconda partita ci corrono mesi 9. li quali





418.  
 R. Si sottrano da anni 1710. 4. 15. gli anni 1707. 9. 1. restano anni 2. mesi 7. giorni 14. e tanto tempo più tardi furono restituiti scudi 460. quelli si meritano a che ragione uno vuole, qui a ragione di scudo 1. per 100. l'anno, faranno scudi 12. 1. 3. di merito. Adesso si trovi in quanto tempo faranno meritati li scudi 12. 1. 3. da scudi 400. restati alla medesima ragione di scudo 1. per 100. l'anno, dicendo: Se scudi 100. meritano scudi 1. che meritano sc. 400? e vengono scudi 4. dipoi per l'altra regola del Trè: Se scudi 4. di merito vogliono anno 1. di tempo, quanti ne vorranno sc. 12. 1. 3? ed operato vengono anni 3. giorni 6. pigliando il rotto per un giorno, li quali si sottrano da anni 1707. 9. 1. restano anni 1704. 8. 25. onde il 25. Settembre 1704. da Pietro sarà fatto debitore il Compratore, di scudi 400. e volendo saldare il debito il Compratore, doverà pagare oltre di scudi 400. il merito d'essi a scudi 5. per 100. dal detto giorno 25. Settembre 1704. fino al giorno, che effettivamente paghi; e così si hanno da intendere simili resti, tirati in dietro, circa il tempo ne i Libri, 35. *Do si opera in altro modo?*

R. Si trovano anni 2. 7. 14. di tardanza al pagamento, dopo il tempo assegnato, e si fa la regola del Trè roverscia, con dire: Se sc. 460. furono pagati anni 2. mesi 7. gior. 14. dopo, sc. 400. restati quanto tempo si doveranno pagare avanti al tempo assegnato? Si moltiplicano anni 2. 7. 14. per sc. 460. il prodotto si parte per sc. 400. da pagarsi, e vengono anni 3. giorni 6. pigliando il rotto per un giorno, li quali si sottrano da anni 1707. 9. 1. restano 1704. 8. 5. come per via di merito; ma qui è d'avvertire se il merito nella passata si fosse trovato a ragione di 100. per 100. l'operazione si sarebbe incontrata con quella della regola roverscia; perchè, certo è: Se sc. 100. meritano sc. 100. ancora scudi 460. meritano sc. 460. e sc. 400. meritano sc. 400. in un' anno, e se in un' anno si meritano sc. 460. quanti se ne meriteranno in anni 2. 7. 14? moltiplica; verranno sc. 1206. 4. 5. Di nuovo; se sc. 400. si meritano in un' anno, in quanto tempo si meriteranno sc. 1206. 4. 5? e verranno, come si è detto anni 3. giorni 6. pigliando il rotto per un giorno, e se bene si offerva, si moltiplicano anni 2. 7. 14. per sc. 460. il prodotto si parte per sc. 400. come si è detto per la regola roverscia, la quale è d'adoprarli in questi conti di resti come più speditiva, senza ricorrere a i meriti, se non fusse per esercizio delli Scolari.

36. D. Uno doveva pagare a dì 25. Febbraro 1709. sc. 386. e ne ha pagati sc. 120. il dì 10. Giugno 1710. Si domanda in qual giorno sarà fatto debitore di sc. 266. restati?

R. Si

Re. Si trovi quanto tempo ha pagato dopo, farà d'anni 1.3.18. li quali si moltiplicano per 120. il prodotto si parte per 266. e vengono mesi 6. giorni 29, che sottratti da anni 1709. i. 25. restano 1708. 6. 26. Dunque si farà debitore il dì 26. Luglio 1708. di Sc. 266. benché sottraendo mesi 7. pigliando il rotto per un giorno, allora verrà il dì 25. Luglio 1708.

37. Dr. Unopporendo pagato Sc. 120. il di 10. Giugno 1710. è stato fatto debitore di Sc. 266. il di 25. Luglio 1708. per aver pagato li Sc. 120. dopo il tempo dovuto. Si domanda in che giorno era obbligato di pagare li Sc. 386. somma di tutto il suo debito?

R. Questa serve di prova alla passata, & è recare ad un dì questi due pagamenti, il che facendosi per il modo della 30. Si trova dal dì 25. Luglio 1708. fino al dì 16. Giugno 1710. corrervi anno 1. 10. 14. cioè gior. 674. li quali moltiplicati per Sc. 120. il prodotto 80880. si parte per So. 386. e vengono mesi 7. li quali s'aggiungono ad an. 1708. 6. 25. fanno: 1709. 1. 25. & a dì 25. Febbraio 1709. era obligato pagare li Sc. 386. e torna la passata:

1708. 6. 25 — 266 Gioeni Prodotto  
1710. 9. 10 — 182 — 674 — 888

386 289 386

1708-6-25 30/210

1709. l. 25      7 Meli  
38. D. Pietro doveva pagare il dì 24. Luglio 1709. Sc. 840. e dopo un' anno a detto tempo pagò solamente al Creditore Sc. 360. si domanda in che giorno si doverà fare debitore della Scudi 480. restati?

R. Per regola roverscia: Si moltiplicano Sc. 360. pagati per mesi 12. tempo di tardanza, il prodotto 4320. si parte per Sc. 480. restati, e vengono mesi 9. li quali si sottrano da 1709. Sc. restano 1708. 9. cioè il dì 24. Ottobre 1708. si farà debbono di Scudi 480.

1709. 6. 24 Sc. 480 ~~12~~ Sc. 360  
2. 1

1708. 9. 24. Mesi. 9. 4320

39, D. Pietro, doveva pagare il di 24. Luglio 1709, una quantità di Scudi, & avvenne, che ne pagò solamente una parte dopo un'anno di detto tempo; per il che il Creditore lo fece debitorè il di 24. Ottobre 1708. di Sc. 480. che restava avere. Si domanda quanti Scudi aveva avuto di pagamento: A.

Ggg 2 R. Si troz

R. Si trovi quanto tempo fu risata indietro la partita di Scudi 480. e si troveranno mesi 9. Per lo che per mesi 9. si moltiplicano Scudi 480. e per mesi 12. tempo di tardanza al pagamento della partita degli Scudi, che si cercano, si parte il prodotto 4320. e vengono Sc. 360. e tanti ne aveva avuti il Creditore in pagamento, e resta provata la passata.

1709. 6. 24	Mesi 12	Sc. 480	Mesi 9
1708. 9. 24		9	
<hr/>		<hr/>	
Mesi 9.		4320	
		<hr/>	
		Sc. 360	

40. D. Filippo deve avere da Marco Sc. 720. il di primo Aprile 1710. de quali ne riceve una parte il di primo Settembre del medesimo anno, per lo che fece debitore Marco il di primo Gennaio 1710. degli Scudi restati. Si domanda quanti Scudi Filippo riceve, e quanto restò ad avere?

R. Si trovi il tempo, che più tardi fu pagata una parte, e sarà di mesi 5. Runt si trovi quanto tempo fu tirata indietro l'altra parte di Scudi rimasta, e sarà di mesi 5. Si sommino mesi 5. e mesi 3. fa 8. Poi per regola del Tre. Se mesi 8. vogliono Sc. 720. che mesi 3? e verranno Sc. 270. ricevuti; Che mesi 5? e verranno Sc. 450. da riceverli da Filippo.

1710. 8. 12	Sc. 8.	Sc. 720	( 3? Sc. 270
1710. 3. 1			5? Sc. 450
<hr/>		<hr/>	

5 3  
 Mesi 8.  
 La prova si faccia con rivoltare Domanda, come una delle due precedenti.

41. D. Un Mercante avendo venduto mercanzie il di primo Giugno 1707. per lire 620. ha fatto tempo mesi 16. al Compratore a pagarlo, con questo, che pagandole più presto, o più tardi, ciascuno sia rinfrancato del tempo. Avvenne, che la metà, cioè di lir. 310. pagò mesi 4. avanti; Si domanda in che giorno dovrà pagare l'altra lire 410?

R. E di giustizia, che avendo pagato lir. 310. mesi 4. avanti, paghi l'altra lir. 310. mesi 4. dopo, cioè dopo mesi 20. che fanno anno 1. mesi 8. che aggiunti al di primo Giugno 1707. viene il

paga-

pagamento il dì primo Febbraio 1709. E' superfluo il fare la regola del Trè roverscia, per essere le partite delle lire uguali.

42. D. Luca comprò il dì primo Marzo 1708. mercanzie per lire 480. da pagarsi il dì 20 Luglio 1709. delle quali furono pagate al Mercante lir. 210. il dì primo Gennaio 1709. Si domanda in che giorno Luca dovrà pagare le restate lir. 270?

R. Sono state pagate lir. 210. mesi 6. avanti, però per essi moltiplicandosi fanno 1260. che si parte per lir. 270. da pagarsi, vengono mesi 4. giorni 20. che aggiunti a dì primo Luglio 1709. verrà il pagamento il dì 21. Novembre 1709.

270 — 6 — 210 ?	1709. 6. 1	1709. 6. 1
—————	1709. — 1	4. 20
—————	1260	
Mesi 4. 20. — 18 — 30	Mesi 6. —	1709. 10. 21

43. D. Giulio è debitore à Pietro il dì 12. Aprile 1708. di sc. 580. da pagarsi dopo mesi 2. dal detto giorno, nel quale paga scudi 340. Si domanda in che giorno si farà debitore delli restati sc. 240?

R. Medesimamente si moltiplicano sc. 340. per mesi 2. pagati avanti, il prodotto 2720. si parte per sc. 240. da pagarsi. Mesi 11. gior. 10. che vengono, si aggiungono al dì 12. Aprile 1708. viene il pagamento il dì 22. Marzo 1709.

44. D. Giulio ha pagato à Pietro il dì 12. Aprile 1708. scudi 340. e per averli pagati avanti tempo, è stato fatto debitore di sc. 240. restati il dì 22. Marzo 1709. Si domanda dopo quanto tempo dal dì 12. Aprile 1708. doveva Giulio pagare tutta la somma di sc. 580?

R. Quando una parte si paga avanti il termine dato, l'altra parte si paga dopo; Si trovi il tempo, che ci è dal dì 12. Aprile 1708. fino a dì 22. Marzo 1709. farà di mesi 11  $\frac{2}{3}$ . Però, per regola del Trè se sc. 340. sono pagati avanti mesi 11  $\frac{2}{3}$ . all'altra partita, sc. 240. quanto tempo dovevasi pagare dopo la prima partita? Si moltiplicano sc. 240. per 11  $\frac{2}{3}$ . il prodotto 2720. si parte per sc. 340. e vengono mesi 8. dopo i quali Giulio doveva pagare sc. 580. dal dì 12. Aprile 1708. e torna da passata.

45. D. Paolo deve à Floro sc. 840. dopo mesi 4. e Floro deve à Paolo sc. 280. dopo mesi 12. Si domanda come s'accorderanno dette partite?

R. Si moltiplicano sc. 840. per mesi 4. e sc. 280. per mesi 12. e si sottra un prodotto dall'altro. Si sottrano sc. 280. da sc. 840. a

resta

restano sc. 560. e perchè dal primo sottrarre è restato zero non ci è che partire. Per lo che Paolo deve pagare sc. 560. a Floro di presente; e sarà saldato trà loro.

Scudi 840 ——— 4 ——— 3360

Scudi 280 ——— 12 ——— 3360

Scudi 560

46. D. Emilio deve pagare lire 1400. a Marco dopo mesi 12. e Marco deve lire 640. dopo mesi 16. Si domanda, come si aggiusteranno trà loro in un solo pagamento?

R. Si moltiplicano le lire per il suo tempo, il prodotto minore si sottra dal maggiore, il numero restato si parte per la differenza delle lire, cioè per 760. Emilio 1400 ——— 12 ——— 16800

e vengono mesi 8. gior- Marco 640 ——— 16 ——— 10240

ni 19. pigliando il rot-

to per intero. Sicchè

Lire 76.0

656.0

Emilio resterà debito-

48+30

re a Marco di lir. 760.

Mesi 8. 19

dopo mesi 8. giorh. 19.

1440

dal giorno, che conteggiano.

47. D. Ilario deve dare a Flavio lire 1200. dopo mesi 4. e Flavio deve a lui lir. 600. dopo mesi 10. Si domanda come si aggiusteranno dette partite?

R. Si moltiplicano le lire per il suo tempo, si sottra il minor prodotto dal maggiore, il numero restato si parte per 600. differenza delle lire, e vengono mesi 2. dopo li quali Flavio deve pagare lir. 600. ad Ilario, il quale deve pagare di presente lir. 1200. a Flavio.

Ilario Lire 1200 ——— 4 ——— 4800

• Flavio Lire 600 ——— 10 ——— 6000

Lire 600

1200

Mesi 2.

48. D. Come si prova essere giusta tal composizione trà Ilario, e Flavio?

R. Se ciascuno guadagna ad una data ragione la medesima quantità di denaro avanti; che dopo la composizione trà loro fatta, sarà segno essere giusta.

Ora Ilario tenendo mesi 4. lir. 1200. a den. 1. per lira il mese per più facilità, guadagnerebbe lir. 20. ma restituendo di presente, e ricevendo lir. 600. mesi 8. prima che gli guadagnano pure lire 20. sicchè la composizione per lui è giusta. Medesimamente Fla-

vio

vio tenendo avanti lir. 600. mesi 10. à denaro 1. per lira il mese, gli guadagnano lir. 25. e per ricevere dopo mesi 4. lir. 1200. li guadagnano in mesi 6. che restano lir. 30. che in tutto sono lire 55. mà dopo ricevendo di presente lir. 1200. in mesi 10. li guadagnano lir. 50. e lir. 5. gli guadagnano lir. 600. in mesi 2. dopo li quali le deve restituire, che sommate fanno lir. 55. si che per l' uno, e per l' altro è giusta composizione.

Nel medesimo modo si possono provare l' antecedenti, e seguenti risposte; mà per brevità si tralasciano tali prove, bastando provarne alcuna per indirizzo nell' altre.

49. D. Marco è creditore di lir. 360. da pagarsegli da Luca passati mesi 15. delle quali lire ricevè da Marco già mesi 5: sono lir. 140. Si domanda quando verrà il pagamento delle restate lire 220?

R. Si sommano mesi 15. e mesi 5. fanno mesi 20. li quali si moltiplicano per lir. 140. pagate, il prodotto 2800. si parte per lire 200. e vengono mesi 12. giorni 22. pigliando il rotto per intero li quali s'aggiungono à mesi 15. e fanno mesi 27. giorni 22. cioè ann. 2. mesi 3. gior. 22. e dopo tal tempo verrà il pagamento di lir. 220. da farsi da Luca à Marco.

50. D. Luca doveva avere da Carlo Sc. 600. già mesi 16. sono; mà ne ebbe Scu. 240. già mesi 20. fa. Si domanda quando doverà fare debitore Carlo delli Sc. 360. restati, essendo oggi a dì 18. Marzo 1711.

R. Si sottrano da mesi 20. li mesi 16. restano mesi 4. li quali si moltiplicano per Scu. 240. pagati; il prodotto 960. si parte per li Scu. di 360. e vengono mesi 2. gior. 20. che si sottrano da mesi 16. e restano mesi 13. gior. 10. i quali si sottrano da an. 1711. 2. 18. e verrà il pagamento delli Sc. 360. restati li 8. Febbraro 1711 ed in tal giorno sarà fatto debitore di Carlo.

51. D. Carlo è debitore di Pietro di Sc. 500. da pagarsegli il dì 10. Agosto 1709. e Carlo ne pagò Scu. 250. il dì 20. Aprile 1708. e ne pagò Scu. 100. il dì 15. Maggio 1710. Si domanda quando si farà debitore Carlo delli Sc. 150. restati?

R. Si trova quanto tempo prima del terminè dato Carlo ha pagato Scu. 250. e sarà d' an. 1. mesi 3. giorni 20. e perchè sono giusto la metà degli Scudi, gl' altri Scudi doverà pagare dopo an. 1. mesi 3. giorni 20. al dato giorno 20. Aprile 1708; cioè il dì ultimo Novembre 1710. mà ne ha pagati Scudi 100. il dì 15. Maggio 1710. che sono avanti mesi  $6\frac{2}{3}$ . Però questi si moltiplicano per Scu. 100. pagati. Il prodotto 650. si parte per Scu. 150. da pagarsi, e vengono mesi 4. giorni 10. che aggiunti al dì ultimo Novembre 1710. fanno 1711. 3. 10. cioè il dì 10. Aprile 1711. nel qual giorno sarà

farà fatto debitore Carlo delli Sc. 150. restati.

52. D. Alessio è Creditore di Mario di Scudi 400. da pagarsegli il dì 20. Giugno 1709. e Mario già gli pagò Scudi 80. il dì 10. Gennaro. 1709. e di poi gli pagò Scudi 120. il dì 10. Agosto 1710. Si domanda in che giorno sarà fatto debitore Mario di Sc. 200. restati?

R. Scudi 80. sono stati pagati avanti mesi  $5 \frac{1}{4}$ . li quali si moltiplicano insieme, il prodotto si parte per 320. Scudi rimasti da pagarsi e vengono mesi 1. giorni 10. d'aggiungerli a dì 20. Giugno 1709. sicché il pagamento viene l'ultimo Luglio 1709. di Scudi 320. ma ne paga Mario Scudi 120. il dì 25. Agosto 1710. che viene dopo anno 1. giorni 25. che si moltiplicano per Sc. 120. pagati, il prodotto si parte per Scudi 200. da pagarsi, e vengono mesi 7. giorni 21. che si sottrano dal dì ultimo Luglio 1709. e resta il dì 9. Dicembre 1708. nel quale si farà debitore Mario di Scudi 200. ad Alessio.

53. D. Francesco doveva pagare a Pietro Sc. 1420. il dì 25. Novembre 1708. con patto, che pagando avanti qualche parte del debito, l'altra parte gli fosse prolungata dopo il termine dato: Francesco restituì a dì 15. Gennaro 1706. Sc. 530. a dì 20. Agosto 1707. Sc. 420. & a dì 5. Marzo 1708. Sc. 200. Si domanda quando si farà debitore di Sc. 270. restati?

R. Si meritano a che ragione uno vuole, quel à 5. per 100. l'anno, Sc. 530. per An. 2. mesi 10. giorni 10. tempo, che sono stati prima, il merito è di Scudi 75. 16. 4  $\frac{2}{3}$ . e Scudi 420. per an. 1. 3. 5. il merito è di Scudi 26. 10. 10. e finalmente Scudi 200. per mesi 8. 20. il merito è di Sc. 7. 4. 5  $\frac{2}{3}$ . si sommano questi meriti fanno Scudi 109. 11. 8. Ora si meritano li Sc. 270. restati alla medesima ragione per un' anno, il merito è di Sc. 13.  $\frac{2}{3}$ . onde per regola del Trè: Se Sc. 13  $\frac{2}{3}$  di merito si hanno in un' anno, in quanto tempo si averanno Sc. 109. 11. 8. di merito? e si averanno in an. 8. 1. 12. lasciando il rotto, li quali si sommano con anni 1708. 10. 25. fanno an. 1717. —. 7. cioè il dì 7. Gennaro 1717. & in tal giorno si farà debitore di Scudi 270. Francesco di Pietro.

54. D. Si opera in altro modo?

R. Si opera facilmente, e brevemente così: Si moltiplicano li Scudi restituiti per il suo tempo ridotto in giorni, cioè Scudi 530. per gior. 1030. Sc. 420. per 455. e Sc. 200. per 260. i prodotti si sommano, la somma 789000. si parte per Sc. 270. da pagarsi, e vengono giorni 2922. cioè an. 8. mese 1. gior. 12. li quali aggiunti ad anni 1708. 10. 25. termine del pagamento, fanno anni

1717.



1717. —. 7. cioè il dì 7. Gennaro 1717. come sopra ?

Per intendere la ragione di tale operare si avverta, che se la somma de' prodotti 789000. si fusse partita per Sc. 1150. somma delli Scudi restituiti, per recare quei pagamenti ad un solo, sarebbero venuti gior. 686  $\frac{2}{3}$  tempo antecedente al termine dato, nel quale viene un solo pagamento delli Sc. 1150. onde si direbbe per regola roverscia: Se Sc. 1150. sono stati pagati avanti giorni 686  $\frac{2}{3}$ . quanto tempo dopo al termine si pagarebbero Scudi 270. restati a pagare? e moltiplicando Sc. 1150. via giorni 686  $\frac{2}{3}$ . fanno 789000. somma, se bene si avverte de' prodotti sopra fatta, che se si parte, come si è fatto, per Sc. 270. vengono giorni 2922. cioè anni 8. 1. 12. da aggiungerfi al dì 25. Novembre 1708. termine del pagamento, e si averanno anni 1717. —. 7. cioè il dì 7. Gennaro 1717.

55. D. Uno doveva pagare à Pietro il dì primo Lugl. 1708. lir. 1420. & hà pagato lir. 380. il dì primo Febbrajo 1709. e lir. 420. il dì primo Ottobre 1709. e lir. 200. il dì 19. Agosto 1710. Si domanda in che giorno farà notato debitore di lir. 420. restate?

R. Nella passata le partite erano state pagate avanti il termine, & in questa dopo lir. 380. dopo mesi 7. lir. 420. dopo mesi 15. e lire 200. dopo mesi 25  $\frac{1}{4}$ . Si moltiplica ciascuna partita per il suo tempo; li prodotti sommati fanno 14080. che si partono per Scudi 420. da pagarsi, e vengono mesi 33. gior. 16. pigliando il rotto per intiero, cioè an. 2. 9. 16. li quali si sottrano dal primo Luglio 1708. e viene il dì 15. Settembre 1705. & in quel giorno si farà debitore di Pietro di Sc. 240.

Il medesimo verrà operando per via di merito. Perchè lir. 380. à 5. per 100. l'anno meritano in mesi 7. lir. 111. 1. 8. lir. 420. meritano in mesi 15. lir. 26. 5. e lir. 200. in mesi 25  $\frac{1}{4}$ . meritano lir. 21. 6. 8. li quali meriti sommati fanno lir. 58  $\frac{1}{4}$ . lir. 240. poi da pagarsi in un' anno, meritano alla medesima ragione lir. 21. Onde si dice: Se lir. 21. si meritano in un' anno, in quanto tempo si meriteranno lir. 58  $\frac{1}{4}$ ? e verranno, come sopra, an. 2. 9. 16. pigliando il rotto per intiero, &c.

56. D. Antonio doveva pagare à Carlo a dì 8. Giugno 1710. Scudi 1860. con patto, che pagando prima, o dopo, sia senza danno. Antonio prima il dì 18. Agosto 1709. pagò Sc. 420. il dì 10. Novembre 1710. pagò Sc. 160. & il dì 20. Marzo 1711. pagò Sc. 340. & il dì 16. Luglio 1711. Sc. 260. Si domanda in che giorno farà fatto debitore di Sc. 680. Antonio di Carlo?

R. La prima partita di Sc. 420. è stata pagata avanti mesi 9. gior. 20. cioè gior. 290. che si moltiplicano via Sc. 420. fanno 121800.

H h h

la

la seconda partita di Sc. 160. dopo gior. 152. che si moltiplicano via 160. fanno 24320. la terza partita di Sc. 340. dopo giorni 82. che si moltiplicano via 340. fanno 95880. la quarta finalmente di Sc. 160. dopo gior. 398. che si moltiplicano via 260. fanno 103480. questi ultimi tre prodotti sommati fanno 223680. dalla qual somma si sottra 121800. prodotto fatto dalla prima partita pagata avanti, e resta 101880. il qual numero si parte per li Sc. 680. restati a pagare, e vengono gior. 150. pigliando il sotto per intiero; cioè mesi 5. da sottrarsi dal dì 8. Giug. 1710. e resterà il dì 8. Gennaro 1710. nel quale sarà fatto debitore Antonio di Carlo di Sc. 680.

57. D. Come si opera per via di merito?

R. Si può fare il merito a che ragione uno vuole, quì à 5. per 100. l'anno si meritano Sc. 420. della prima partita pagata avanti per mesi 9  $\frac{1}{2}$ . il merito è di Sc. 16. 18. 4. da sottrarsi; si meritano Scudi 160. per mesi 5.  $\frac{1}{2}$ . Sc. 340. per mesi 9.  $\frac{1}{2}$ . e Sc. 360. per anno 1. mese 1.  $\frac{1}{2}$ . di meriti Sc. 3. 7. 6.  $\frac{1}{2}$ . Sc. 23. 6. 4. Sc. 14. 7. 5  $\frac{1}{2}$ . sommati fanno Sc. 31. 1. 4. da i quali si sottrano Sc. 16. 18. 4. restano Sc. 14.  $\frac{1}{2}$ . Si meritano finalmente Sc. 680. da pagarsi per un' anno, vengono Sc. 34. di merito; per il che si dice: Se Scudi 34. di merito ricercano un' anno, che tempo ricercheranno Scudi 14.  $\frac{1}{2}$ . di merito? Si openato verranno mesi 5. pigliando il sotto di giorno, per un giorno intiero, li quali si sottrano dal termine dato di tempo, e resta il dì 8. Gennaro 1710. &c.

58. D. Come si opera per via di recare ad una di?

R. Per la 25. e seguenti, si riducono le quattro partite ad un pagamento, trovando quanto tempo ci è dalla prima all'altre tre, e primieramente alla seconda ci sono giorni 442. che si moltiplicano via Sc. 160. fanno 70720. dalla prima alla terza ci sono gior. 572. che si moltiplicano via Sc. 340. fanno 194480. e dalla prima alla quarta ci sono giorni 688. che si moltiplicano via Scudi 260. fanno 178880. li quali prodotti si sommano, la somma 444080. si parte per 1180. somma delli Scudi, e vengono giorni 376. cioè ann. 1. —. 16. che al dì 18. Agosto 1709. si aggiungono, viene un solo pagamento di Sc. 1180. il dì 4. Settembre 1710. Adesso Antonio dove pagare a Carlo il dì 8. Giugno 1710. Sc. 1860. e ne paga Sc. 180. il dì 4. Settembre 1710. Si domanda in che giorno sarà fatto debitore di Scudi 680. che restano? Sc. 1180. sono stati pagati mesi 3. giorni 26. cioè giorni 86. li quali si moltiplicano per scudi 1180. pagati, il prodotto numero 101480. si parte per Sc. 680. da pagarsi, e verranno giorni 150. pigliando il sotto per un giorno, cioè mesi 5. li quali si sottrano dal dì 8. Giugno

1710.

1710. e resta fidi R. Gennaro 1710. per il pagamento di sc. 680.  
 59 D. Domenico è debitore dell'infrastrate partite da pagarsi in  
 diverse tempo à Giovanni, cioè:

Il dì 20. Ottobre 1706. Sc. 420	Giorni .	
Il dì 8. Luglio 1707. Sc. 550	— 258 —	90300
Il dì 24. Dicem. 1707. Sc. 280	— 424 —	113720
Il dì 10. Maggio 1708. Sc. 170	— 366 —	72800

Per 1180 — 281820

Mà ha pagato altre diverse partite in altre tempo, cioè:

Il dì 15. Marzo 1706. Sc. 290	Giorni	
Il dì 6. Giug. 1707. Sc. 340	— 441 —	149940
Il dì 18. Ottob. 1707. Sc. 150	— 573 —	85950
Il dì 4. Agos. 1708. Sc. 220	— 859 —	188980

Per 1000 — 224870

Si domanda in che giorno sarà fatto debitore Domenico della restati sc. 180 ?

R. Si riducono le partite da pagarsi ad un solo pagamento per le regole date, verrà il dì 19. Giugno 1707. e le pagate pure ad un giorno, e verrà il dì 20. Maggio 1707. sicchè sc. 1000. sono stati pagati prima giorni 29. li quali si moltiplicano fanno 29000. che si partono per scu. 180. restati à pagarsi, e vengono giorni 161. che sono mesi 5. giorni 11. che aggiunti al dì 19. Giugno 1707. verrà il dì ultimo Novembre 1707. nel quale doverà essere fatto debitore Domenico di Giovanni di sc. 180. Altri modi ci sono, ma questo è più spedito.



H h h

TRAT.

# TRATTATO OTTAVO

## Delle Compagnie Mercantili.

### DISTINZIONE PRIMA.

1. D.  
R



He cosa è compagnia Mercantile?

E' un Contratto di convenzione di due, ò più persone, le quali pongono denari, ò robbe, cioè Mercanzie, ò l' industria della persona, & alle volte l' une, e l' altre cose, per determinato tempo, à fine di guadagno da dividersi frà loro proporzionalmente, ò secondo i patti,

stando pure soggetti i Compagni alla perdita nel medesimo modo.

2. D. Per qual regola si fanno i conti delle Compagnie?

R. Ordinariamente per regola del Trè dritta tante volte replicata, quanti sono i Compagni; imperochè si sommano i Capitali di denaro posti dagl' Interessati, la somma è il primo numero della regola del Trè; il guadagno, ò perdita è il secondo numero, il Capitale di ciascuno da sè è il terzo successivamente; Allora si opera come si è insegnato nel Trattato terzo della Regola del Trè, e si troverà il guadagno, ò perdita che à ciascun Compagno appartiene.

3. D. Se alcuno avesse messo mercanzia in cambio di denaro, come si fa?

R. Si riduce la mercanzia in denaro, secondo il prezzo convenuto, e si opera come si è detto.

4. D. E se ciascuno avesse tenuto il suo denaro diverso tempo nella compagnia, in questo caso, che bisognerebbe fare?

R. Allora si moltiplica il Denaro di ciascuno per il suo tempo, il prodotto si pigli come Capitale, e si operi secondo che si è detto nella seconda, e si dirà à suo luogo, apportando esempi, che levino questa, & ogn' altra difficoltà.

5. D. Due fecero compagnia; il primo avendo messo in essa Scudi 1760. il secondo Sc. 1240. trovarono al fine Sc. 480. di guadagno, i quali si devono partire per rata del Capitale. Si domanda quanti ne doverà avere ciascuno?

R. Si sommano Sc. 1760. del primo, e Sc. 1240. del secondo, e

ven-



scudi 600. del secondo? e verranno sc. 216 che ne daranno scudi 440. del Terzo. e verranno sc. 158  $\frac{2}{3}$ . di guadagno a ciascuno. Le quali partite si sommano, e verranno scudi 720. per Bova.

Se sc. 2000 — sc. 720	Sc. 960 — Sc. 345 $\frac{1}{3}$
	Sc. 600 — Sc. 216
	Sc. 440 — Sc. 158 $\frac{2}{3}$

Scudi 720

10. D. Trè avendo posto in un traffico scu. 2000. Il primo guadagnò sc. 345  $\frac{1}{3}$ . Il secondo sc. 216. Il terzo sc. 158  $\frac{2}{3}$ . Si domanda quanto aveva posto ciascuno?

R. Sommati gli scudi di guadagno fanno sc. 720. Onde se questi vengono da sc. 2000. da quanti verranno sc. 347  $\frac{1}{3}$ ? sc. 216, e sc. 158  $\frac{2}{3}$ ? e verranno da sc. 960. da sc. 600. e da sc. 440. Capitali passati. Dunque l'una, ed'altra soluzione è buona.

345 $\frac{1}{3}$	— 345 $\frac{1}{3}$ — Sc. 960
216	— 216 — Sc. 600
158 $\frac{2}{3}$	— 158 $\frac{2}{3}$ — Sc. 440

720

11. D. Trè si composero in un Negozio. Il primo ci mise sc. 1400. Il secondo sc. 860. ed il terzo sc. 740. Avvenne che finito il negozio si trovarono sc. 2100. solamente. Si domanda quanti scudi perse ciascuno del suo Capitale, e quanti ne ricevè?

R. Si sommino sc. 1400. del primo. Sc. 860. del secondo, e sc. 740. del terzo, fanno sc. 3000. da i quali si sottrano sc. 2100. trovati, restano scudi 900. di perdita. Per trovare quante perse ciascuno si dica: Se sc. 3000 danno di perdita scu. 900. quanti ne daranno di perdita sc. 1400. del primo? sc. 860. del secondo? e scudi 740. del terzo? e verranno sc. 420. di perdita del primo, li quali sottratti da sc. 1400. restano scudi 980. che ricevè, e sc. 258. di perdita del secondo, i quali sottratti da sc. 860. restano sc. 602. che ricevè: e sc. 222. di perdita del terzo, li quali sottratti da sc. 740. restano sc. 518. che riceve. Potevasi per regola del Trè trovare li scudi, che dovevano ricevere, dicendo: Se sc. 3000. scemano a sc. 2100. che scemeranno li sc. 1400. del primo, sc. 860. del secondo e sc. 740. del terzo? e verranno gli scudi, che riceverono, come sopra, che sottratti dalli scudi di Capitale resteranno gli scudi di perdita.

12. D. Trè si divisero fra loro sc. 234. lir. 6. 13. 4. Il primo ebbe sc. 93. 6. 17. 4. Il secondo n'ebbe 5. quando il terzo 4. Si domanda quanti

quanti Scudi ebbe il secondo, e a che ragione gli ebbe il primo?  
 R. Si sottrano Sc. 93. 6. 17. 4. del primo da Sc. 234. lir. 6. 13. 4. restano Sc. 140. 6. 16. —. Adesso si somma 5. del secondo, con 4. del terzo fa 9. onde si dica: Se 9. ricerca Sc. 140. 6. 16. che ricercherà 5? e verranno Sc. 78. 2. 4. 5  $\frac{1}{2}$  dovuti al secondo, li quali sottratti da Sc. 140. 6. 16. restano Sc. 62. 4. 11. 6  $\frac{1}{2}$ . per il terzo. Per sapere a che ragione gli ebbe il primo, si dica: Se Sc. 78. 2. 4. 5  $\frac{1}{2}$ . vengono da 5. da qual numero verranno Sc. 93. 6. 17. 4. del primo? e verranno da 6. da tal ragione gli ebbe il primo.  
 La prova si faccia con dire: Il primo tira per 6. il secondo per 5. ed il terzo per 4. quanto tirerà ciascuno di Sc. 234. 6. 13. 4? e ne verranno i sopradetti Scudi, operandosi bene per via di Compagnia.

6	15 — 234. 6. 13. 4 — 6?	15 — 234. 6. 13. 4 — 5
5		
4	1409. 5	1174. 5. 6. 8
15		
Del primo	Scudi 93. 6. 17. 4	Scudi 78. 2. 4. 5 $\frac{1}{2}$
Del secondo	Scudi 78. 2. 4. 5 $\frac{1}{2}$	
Del Terzo	Scudi 62. 4. 11. 9 $\frac{1}{2}$	15 — 234. 6. 13. 3 — 4?
Prova	Scudi 234. 6. 13. 4.	939. 5. 13. 4.
		Scudi 62. 4. 11. 6 $\frac{1}{2}$

23. D. Tre avendo fatto Compagnia, il primo pose libbre di Seta 160. il secondo Scudi 350. il terzo Scudi 200. e del guadagno di lir. 412. il primo ebbe lire 192. Si domanda quante lire di guadagno avesse ciascuno degli altri due, e quanti Scudi fu apprezzata la libbra della Seta?

R. Si sommano Sc. 550. del secondo, e Scudi 200. del terzo, la somma è di Scudi 750. si sottrano lir. 192. da lire 412. restano lire 220. per il che si dica: Se Sc. 550. guadagnano lire 220. quante ne guadagneranno Sc. 200. del terzo? & operato per regola del Tre, verranno lir. 80. per il terzo, li quali si sottrano da lir. 220. restano lir. 140. per il secondo.

Ora per trovare il prezzo della libbra della Seta, si dica: Se lir. 80. di guadagno, vengono da Sc. 200. da quanti Scudi verranno lire 192. di guadagno? ed operato troverassi da Sc. 480. per 200 di libb. 160. onde per 160. si parte 480. verrà 3. e tanti Sc. fu apprezzata la libbra della Seta del primo.

24. D. Tre avendo fatto Compagnia, il primo del guadagno ebbe lir. 192. il secondo 140. il terzo lir. 80. il secondo, e terzo avevano

vano posto di loro parte scudi 550. ed il primo, una quantità di libbre di Seta, che s' apprezò la libbra sc. 3. Si domanda quanti scudi messe il secondo, e quanti il terzo, e quante libbre di Seta pose il primo?

R. Questa serve di prova alla passata. Si sommano lire 140. e lire 80. fanno lir. 220. Per regola del Trè: Se lire 220. si hanno da sc. 550. da quanti Scudi si averanno lire 140? e verranno scu. 350. per il secondo, e da quanti scudi s'averanno lir. 80? e verranno sc. 200. per il terzo.

Per trovare le libbre della Seta, di nuovo si dica. Se lire 220. si hanno da sc. 550. da quanti scudi s'averanno lir. 192. di guadagno del primo? e verranno da scudi 480. prezzo delle libbre di Seta, li quali si partono per scudi 3. prezzo d'una libbra, ne verranno lib. 160. e tante ne pose il primo, e sono quante si proposero nell' antecedente Domanda.

15. D. Trè Compagni hanno guadagnato sc. 600. de' quali secondo i patti al primo si deve la metà, al secondo il terzo, ed al terzo il quarto. Si vuole sapere quanti Scudi si doveranno a ciascuno?

R. Queste parti cioè  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$ . unite fanno più del tutto, che però è impossibile farsi la divisione secondo quelle, ma in simili casi deve si fare proporzionalmente a quelle, anche quando sono meno del tutto; ed allora sono più del tutto, quando sommate fanno più dell'unità, e meno, quando fanno meno dell'unità, e perchè  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$ . fanno  $1\frac{1}{4}$ . sono più del tutto. Per soddisfare alla Domanda a proporzione delle dette parti; Si moltiplicano i Denominatori di quelle per trovare un numero che abbia quelle parti integrali; il numero prodotto sarà 24. ma perchè 12. numero minore ha le medesime parti, si adopera esso, per farsi il conto più facile. Come si trovi il minimo numero, che abbia le date parti, s'insegnò nel ridurre più rotti ad un medesimo Denominatore.

Adeffo di 12. la metà è 6. un terzo 4. ed un quarto 3. Si sommino 6. 4. 3. fanno 13. e per regola del Trè si dica: Se à 13. si devono scudi 600. quanti se ne devono à 6? a 4? ed à 3? e verranno dall' operazione sc. 276  $\frac{2}{3}$ . per il primo, scudi 184  $\frac{1}{3}$ . per il secondo, e sc. 138  $\frac{1}{4}$ . per il terzo. Quali scudi sommati fanno scudi 600. per prova, &c.

16. D. Flavio, e Lelio si compromettono di pagare tutto un debito di scudi 120. con questo però, che Flavio paghi il terzo, e Lello il quarto. Si domanda pagando a questa ragione, quanti Scudi sbonterà ciascuno?

R. Essen-



R. Essendo la somma di  $\frac{5}{7}$ . e di  $\frac{5}{7}$  meno dell' unità, ancora la somma di  $\frac{5}{7}$ . e di  $\frac{5}{7}$ . di 120, farà meno di 120. Onde se Flavio pagasse il terzo, pagherebbe Sc. 40. e se Lelio pagasse il quarto, pagherebbe Sc. 30. che fanno Scudi 70, e ne mancherebbero Sc. 50. fino in 120. E perchè devono pagare tutto il debito, s' intende che devano pagare à quella proporzione; e perciò fare si somma  $\frac{5}{7}$ . ed  $\frac{5}{7}$  fa  $\frac{10}{7}$ . Ora per regola del Trè: Se  $\frac{10}{7}$ . fossero Sc. 120. che farebbe  $\frac{5}{7}$ ? e verranno Sc. 68  $\frac{4}{7}$  da pagarsi da Flavio; e che  $\frac{5}{7}$ ? e verranno Sc. 51  $\frac{4}{7}$  da pagarsi da Lelio. Per più facilità però, come nella passata, si trovi 12. con moltiplicare 3. via 4. Denominatori delle parti, e di 12. si pigli  $\frac{5}{7}$ . cioè 4. e si pigli  $\frac{5}{7}$ . cioè 3. si sommi 4. con 3. fa 7. si dica: Se 7. fosse 120. che faria 4? che faria 3? ed operando per il modo della Dom. 4. del Tratt. 3. della regola del Trè, partendo 120. per 7. il quoziente 17  $\frac{5}{7}$ . si moltiplica per 4. poi per 3. e torneranno come sopra Sc. 68  $\frac{4}{7}$ . e Sc. 51  $\frac{4}{7}$ . da pagarsi, e sommati fanno Sc. 120. per prova.

17. D. Quattro Compagni hanno guadagnato Sc. 1420. de' quali si domanda, che averà ciascuno? Sapendosi, che il primo, secondo, e terzo posero Sc. 1460. di Capitale. Il primo, terzo, e quarto Sc. 1630. il primo, secondo, e quarto Sc. 1370. e finalmente. Il secondo, terzo, e quarto Sc. 1510.

R. Si deve trovare il Capitale di ciascuno prima, per trovare il guadagno: Si sommano quelle quantità di Scudi posse, e farà la somma di Sc. 5970. li quali sono il triplicato Capitale di tutti, per esser ciascuno nominato trè volte, e si partiranno per 3. e verranno Sc. 1990. Capitale di tutti; da' quali si sottrarranno Scudi 1510. del secondo, terzo, e quarto, e resteranno Sc. 480. Capitale del primo da per se, e se si sottranno Sc. 1630. del primo, terzo, e quarto, resteranno Sc. 360. del secondo da per se, e se si sottrarranno Sc. 1370. del primo, secondo, e quarto, resteranno Scudi 620. del terzo da per se, e finalmente se si sottrarranno Sc. 1460. del primo, secondo, e terzo resteranno Sc. 530. del quarto. Ora per regola del Trè; Se Sc. 1990. guadagnano Sc. 1420. Che guadagneranno Sc. 480. del primo? Sc. 360. del secondo? Sc. 620. del terzo? e Sc. 530. del quarto? ed operando, si troveranno i guadagni di ciascuno, come appresso; li quali si sommano, e rifaranno Sc. 1420. per prova.

Capit. di tutti. Guadag. Sc. 480? — Sc. 342. 10. 3.  $\frac{1}{11}$  del Primo.  
Se Sc. 1990 — Sc. 1420 Sc. 360? — Sc. 256. 17. 8.  $\frac{1}{11}$  del Second.  
Sc. 620? — Sc. 442. 8. 2.  $\frac{1}{11}$  del Terzo.  
Sc. 530? — Sc. 378. 3. 9.  $\frac{1}{11}$  del Quarto

Somma Sc. 1420. e Prova.

18. D. Quattro fecero compagnia: Il primo melle di sua parte Scudi 420. Il secondo Sc. 630. il terzo Sc. 350. ed il quarto l'impiego di sua persona; & avendo guadagnato Sc. 480. il quarto ne ebbe Sc. 72. Si domanda quanti Scudi di guadagno ebbe ciascuno degli altri, e che fu stimato l'impiego del quarto?

R. Si levino Sc. 72. del quarto, da Sc. 480. restano Sc. 408. da distribuirsi a i tre compagni per rata del Capitale di ciascuno si sommino i Capitali, la somma 1400. terrà il primo luogo. Il guadagno 408. il secondo: Il Capitale di ciascuno il terzo luogo della regola del Tre, ed operando secondo tal regola, verranno Scudi 122  $\frac{2}{3}$  per il primo, Sc. 183  $\frac{1}{3}$  per il secondo, e Sc. 102 per il terzo. Per trovare quanti Scudi fu stimato l'impiego del quarto, si dica: Se Sc. 102. vengono dal Capitale di Sc. 350. da che Capitale verranno Sc. 72. del quarto? e troveransi Sc. 247  $\frac{1}{3}$ . E tanti Scudi fu stimato l'impiego del quarto.

19. D. Due hanno fatto compagnia: Il primo ha posto di sua parte Sc. 1400. Il secondo Sc. 900. e la persona, con questo patto, che il secondo del guadagno abbia  $\frac{1}{3}$ . ed il primo  $\frac{2}{3}$ . Si domanda quanto fu stimata la Persona del secondo, e quanti Scudi si devono a ciascuno di Sc. 270. di guadagno.

R. Si veda  $\frac{1}{3}$ . che parti sono di  $\frac{3}{3}$ . partendo  $\frac{1}{3}$ . per  $\frac{3}{3}$ . faranno  $\frac{1}{3}$ . Si pigliano  $\frac{1}{3}$  di Sc. 1400. moltiplicandoli per 3. il prodotto 4200. partendo per 4. e faranno Scudi 1050 che mette il secondo in denaro, e persona; sottratti Sc. 900. di denaro da Sc. 1050. restano Sc. 150. per la Persona. Del resto, per regola del Tre si dica: Se 7. danno di guadagno Sc. 270. che 4. del primo? Scudi 120. che 3. del secondo? Sc. 90. se quasi si sommano per prova, e tornano Sc. 270.

Per  $\frac{3}{4}$   $\frac{1}{3}$   $\frac{2}{3}$  1400

3

Per 4 / 4200

1050

900

Persona Scudi 150

20. D. Tre devono partire il guadagno in questo modo: Il primo deve avere la metà meno 40. Il secondo  $\frac{2}{3}$  più 60. Il terzo pure  $\frac{2}{3}$  meno 20. Domando avendo da partire solo Sc. 38. quanti se ne devono a ciascuno proporzionalmente?

R. Si sommano 40. 60. 60. fanno 160. de' quali la metà, cioè 80. meno

meno 40. sono 20. per il primo, de' quali  $\frac{2}{3}$ . cioè 30. più 60. sono 90. per il secondo, e 30. meno 20. sono 10. per il terzo. Per regola del Trè: Se 120. fossero 38. che farebbero 20. del primo? 90. del secondo? e 10. del terzo? ovvero per schifo: Se 12. fossero 38. che 2? che 9? che 12? verranno sc.  $6\frac{2}{3}$  dovuti al primo. sc.  $28\frac{1}{3}$  dovuti al secondo, e scu.  $3\frac{1}{3}$  dovuti al terzo. Li quali sommati fanno sc. 38. appunto.

21. D. Due avendo, partito tra loro alquante lire. Il primo con aver preso la terza parte con lir.  $9\frac{1}{2}$ . ed il secondo due quinte parti con lir.  $5\frac{1}{5}$  di più, trovarono aver preso ugual parte di lire. Si domanda quante erano?

R. Per la differenza delle parti, si parte la differenza delle lire, e verrà il numero delle lire cercato. La differenza da  $\frac{2}{3}$  a  $\frac{2}{5}$  è  $\frac{2}{15}$ . per questo si partono lire  $3\frac{2}{3}$  differenza da lir.  $5\frac{1}{5}$  a lir.  $9\frac{1}{2}$ . verranno lir. 56. e tante erano. Si prova: un terzo di lir. 56. sono lir.  $18\frac{2}{3}$ . con lire  $9\frac{1}{2}$ . fanno lire 28. medesimamente  $\frac{2}{5}$  di 56. sono lire  $22\frac{2}{5}$ . che con lir.  $5\frac{1}{5}$ . fanno pure lir. 28. &c.

22. D. Due si sono divisi fra loro alquanti Scudi ugualmente. Il primo prese il terzo, e più sc. 26. Il secondo  $\frac{1}{2}$  meno sc. 39. Domando quanti furono gli sc. divisi?

R. Per la differenza delle parti, cioè per  $\frac{2}{3}$ . si parte la somma di sc. 26. e 39. cioè 65. e verranno sc. 156. e tanti furono. Si prova:  $\frac{2}{3}$  di 156. sono 104. con 26. di più, fanno sc. 130. E pure  $\frac{1}{2}$  di 156. sono 78. e levati 39. di meno, restano scudi 78. sicchè sta bene.

23. D. Cinque Compagni hanno da dividere sc. 1405. di guadagno in questo modo: che avendone il primo sc. 4. Il secondo abbia sc. 5. ed avendo il secondo sc. 6. Il terzo abbia sc. 7. ed avendo il terzo sc. 8. Il quarto abbia sc. 9. ed avendo il quarto scu. 10. il quinto abbia sc. 12. Si domanda, secondo questo tenore, quanti scudi dovrà avere ciascuno?

R. S'accomodano questi numeri per regole del Trè, dicendo: Se quando il secondo ha 5, il primo ha 4, quando il secondo ha 6. che avrà il primo? ed avrà  $4\frac{2}{5}$ . Il primo  $4\frac{2}{5}$ . il secondo 6. il terzo 7. Di nuovo: Se quando il terzo ha 8, il quarto ha 9. quando il terzo ha 7. che avrà il quarto? ed avrà  $7\frac{1}{7}$ . Di nuovo: Se quando il quarto ha 10, il quinto ha 12. quando il quarto ha  $7\frac{1}{7}$ . che avrà il quinto? ed avrà  $9\frac{1}{7}$ . Dunque il primo deve avere per  $4\frac{2}{5}$  il secondo per 6. il terzo per 7. il quarto per  $7\frac{1}{7}$ . ed il quinto per  $9\frac{1}{7}$ . Si sommano, la somma  $35\frac{2}{7}$ . si dica: Se  $35\frac{2}{7}$  fossero son. 1405. che  $4\frac{2}{5}$  del primo? 6. del secondo? 7. del terzo?  $7\frac{1}{7}$  del quarto? e  $9\frac{1}{7}$  del quinto? ed operato, verranno sc. 192. del pri-

del primo; Sc. 240. del secondo; Sc. 280. del terzo; Sc. 315. del quarto, e Sc. 378. del quinto, e tanti scudi doverà aver ciascuno, che sommati rendano sc. 1405. per prova.

24. D. Quattro avendo fatto compagnia; al fine il primo ebbe Capitali, e guadagno sc. 1213  $\frac{1}{4}$ . Il secondo sc. 828  $\frac{1}{2}$ . Il terzo sc. 725  $\frac{3}{4}$ . ed il quarto sc. 932  $\frac{1}{2}$ . ed il guadagno fu di sc. 1200. Si cercano i Capitali, ed i guadagni di ciascuno separatamente?

R. Si sommano le partite di scudi di Capitale, e guadagno di ciascuno, cioè sc. 1213  $\frac{1}{4}$ . sc. 828  $\frac{1}{2}$ . sc. 725  $\frac{3}{4}$ . e sc. 932  $\frac{1}{2}$ . la somma è di sc. 3700. da quali si sottrano sc. 1200. di guadagno, e restano sc. 2500. di Capitale di tutti; Ora per regola del Trè si dica: Se sc. 3700. composto di Capitale, e guadagno di tutti, proviene sc. 2500. Capitale di tutti, che proverrà da scudi 1213  $\frac{1}{4}$  composto di Capitale, e guadagno del primo? e proverà il puro Capitale di sc. 820. e così si opererà per trovare il Capitale di sc. 560. del secondo, il Capitale di sc. 490. del terzo, e il Capitale di sc. 630. del quarto, il quali Capitali sottratti da numeri composti, resteranno i guadagni distinti di ciascuno; cioè sc. 393  $\frac{1}{4}$  del primo; sc. 268  $\frac{1}{2}$  del secondo; sc. 235  $\frac{3}{4}$  del terzo; e sc. 302  $\frac{1}{2}$  del quarto.

Scudi 1213  $\frac{1}{4}$   
828  $\frac{1}{2}$   
725  $\frac{3}{4}$   
932  $\frac{1}{2}$

3700 — 2500

Capitali.

— 1213  $\frac{1}{4}$ ? — 820 Primo.  
— 828  $\frac{1}{2}$ ? — 560 Secondo.  
— 725  $\frac{3}{4}$ ? — 490 Terzo.  
— 932  $\frac{1}{2}$ ? — 630 Quarto.

Scudi 3700  
Guad. 1200

Somma 2500

Capi. 2500

1213  $\frac{1}{4}$   
820

828  $\frac{1}{2}$   
560

725  $\frac{3}{4}$   
490

932  $\frac{1}{2}$   
630

Guad. 393  $\frac{1}{4}$  268  $\frac{1}{2}$  235  $\frac{3}{4}$  302  $\frac{1}{2}$

25. D. Trè hanno fatto compagnia. Il primo pose lire 2424. Il secondo sc. d'oro 320. Il terzo libbre di Lana 2800. ed alla fine trovarono di guadagno lir. 1800. delle quali il primo ebbe lir. 727  $\frac{1}{2}$ . Il secondo lir. 720. Il terzo lir. 352  $\frac{1}{2}$ . Si domanda quante lire costò lo sc. d'oro, ed il 100. della lana?

R. Per regola del Trè si dica: Se lir. 727  $\frac{1}{2}$ . di guadagno del primo, vengono dal Capitale di lir. 2424. da qual Capitale verranno lir. 720. di guadagno del secondo? e verranno dal Capitale di lir. 2400. che partite per scu. d'oro 320. verranno lir. 7  $\frac{1}{2}$ . per prezzo d'uno scudo d'oro; per trovare il prezzo del cento della lana.

ana, si dica: Se. lir. 725. di guadagno veggli entò lir. 2400. di Capitale, lir. 352  $\frac{2}{3}$  di guadagno del terzo, quante lire vorranno, ed operato risulteranno lir. 1176. Di nuovo, per regola del Trè: Se libbre 2820. di lana costano lir. 1176. che costeranno libbre 100? e costeranno lir. 41. fol. 13. den. 4. ed è sciolto il quesito.

26. D. Trè devono partirsi lir. 99. in questo modo: Il primo ha d'aver il doppio del secondo più lir. 7. Il secondo il doppio del terzo, più lire 10. Domando la debita porzione di ciascuno?  
R. Si raddoppiano lir. 10. più del secondo, con aggiungere lir. 6. diù del primo, fanno 26. le quali si sottrano da lire 99. restano lir. 73. dalle quali si sottrano lir. 10. del secondo, restano lir. 63. Adesso si pigliano trè numeri, che il primo sia doppio del secondo, ed il secondo doppio del terzo, e saranno i minimi 4. 2. ed 1. sommati fanno 7, per regola del Trè: Se 7. fusse 63. che farebbe 4. del primo? e farebbe 36. che sono lire, alle quali s'aggiungono lire 26. fanno lire 62. per il primo. Di nuovo: Se 7. fusse 63. che 2. del secondo? farebbero lir. 18: alle quali s'aggiungono 10. fanno lire 28. del secondo, e finalmente: Se 7. fusse 63. che farebbe 1. del terzo? e farebbe 9. e tanto lire sono del terzo: le quali sommate fanno lire 99. e sono state distribuite con le condizioni dette.

Lire 10	Lire 99	4	2	Lir. 36 con 26. Lir. 62.
2	26	2	2	Se 7 — Lir. 63; 2? Lir. 18 con 10. Lir. 28.
20	73	1	1	1? Lir. 9 — Lir. 9.
6	10	7		Prova Lir. 99.
26	63			

27. D. Trè hanno da dividerli trà se feudi 232. in questo modo: Il primo ne deve avere il doppio del secondo, meno feudi 8. il secondo ne deve avere 3. volte più del terzo, meno 20. si cerca la parte de' Scudi di ciascuno?

R. Si raddoppiano feu. 20. di meno, e si aggiungono fe. 82. di meno, fanno fe. 48. li quali s'aggiungono a feudi 232. fanno feudi 280. a i quali s'aggiungono un'altra volta feu. 20. fanno fe. 300. Adesso si pigliano trè numeri che il secondo sia trè volte più del terzo, e la metà del primo, e saranno i minimi 6. 3. ed 1. che sommati fanno 10. Ora per regola del Trè: Se 10. fusse 300. e per schifo: Se 1. fusse 30. che farebbe 6. del primo? e farebbe 180. dal quale si sottra 48. resta 132. che sono gli feudi del primo. Di nuovo: Se 1. fusse 30. che farebbe 3. del secondo? e farebbe 90. del quale

quale si sottra 20. resta 90. per li scudi del secondo, finalmente: Se 1. fusse 90. che faria 1? pur sarebbe 90. per li Scudi del terzo. Onde sommandosi scudi 122. del primo Sc. 70. del secondo, e scudi 90. del terzo, ritengono gli scudi 232. e gli scudi di ciascuna hanno le condizioni ricercate, come si può osservare.

Sc. 40	Sc. 132	16	62 Sc. 180	48 Sc. 132.
Sc. 40	48	3	Se 100 = 200	3 <sup>a</sup> Sc. 90 = 20 Sc. 70.
Sc. 8		1	3 <sup>a</sup> Sc. 30	Sc. 30.
	180			
Sc. 48	20	10		Somma Sc. 232.

28. D. Tre si sono divise lire 1790. in questo modo. Il primo ha avuto quattro volte più del secondo, meno lire 40. il secondo tre volte più del terzo con lire 30. d'avvantaggio. Si domanda quanto lire abbia avuto ciascuno?

R. Si raddoppiano lire 40. fanno 80. alle quali aggiunte lire 30. fanno lire 110. che sottratte da lire 1790. restano lire 1680. Adesso si vogliono tre numeri, che il primo sia quattro volte il secondo, e il secondo tre volte il terzo, i minimi sono 12. 3. ed 1. che sommati fanno 16. si dica dunque: Se 16. fusse 1680. che faria 12. del primo? verranno 1260. alle quali aggiunte lire 80. che si levarono, faranno lire 1340. per il primo; Di nuovo: Se 16 fusse 1680. che faria 3. del secondo? verranno 315. alle quali aggiunte lire 30. faranno lire 345. per il secondo; e finalmente: Se 16. fusse 1680. che faria 1. del terzo? e verranno lire 105. le quali sommate con quelle degli altri torneranno lire 1790.

Lir. 40	Lir. 1790	12
40	110	3
		1
80	Lir. 1680	
30		16
110	Se 16 = 1680	1 <sup>a</sup> Lir. 1260. più 80. Lir. 1340
		3 <sup>a</sup> Lir. 315. più 30. Lir. 345
		1 <sup>a</sup> Lir. 105. Lir. 105

Somma Lir. 1790

La ragione dell'operare così in tali divisioni, si ha dall'Algebra, della quale è suo luogo.

29. D. Due hanno fatto Compagnia con patto, che duri mesi 20. il primo

Il primo ha tenuto Sc. 650. mesi 8. ed il secondo Sc. 400. mesi 12. ed al fine hanno trovato di guadagno Sc. 150. Si domanda quanti ne doverà avere il primo, ed il secondo?

R. Si moltiplicano Scudi 650. del primo, per il suo tempo di mesi 8. fanno 5200. e Sc. 400. del secondo, per mesi 12. e fanno 4800. i prodotti sommati sono 10000. però si dica : Sc. 10000. fùssero Sc. 150. che sarebbero 3200. del primo e verrebbero Sc. 78. che 4800. del secondo e verrebbero Scudi 72. appartenenti a questo, e se si sommitanno Sc. 78. del primo, e Sc. 72. del secondo, faranno appunto Sc. 150. di guadagno.

30. D. Due altri avendo fatto Compagnia, il primo mette Scudi 500. e ce li tiene mesi 9. giorni 18. il secondo stoffa Sc. 300. e ce li tiene un' Anno. Si domanda che parte doverà ricevere ciascuno del guadagno?

R. I Capitoli hanno correlazione a i guadagni; che però si moltiplicano Scudi 500. del primo, via mesi  $9\frac{1}{2}$ . fanno 4800. Si moltiplicano Sc. 300. del secondo via mesi 12. fanno 3600. si sommano 4800. e 3600. la somma 8400. si pone sotto una linea con sopra 4800. del primo così:  $\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2}$ . che schisato dice  $\frac{1}{3}$  di guadagno per il primo; medesimamente sotto una linea 8400. sopra 3600. del secondo così:  $\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2}$ . che schisato dice  $\frac{1}{3}$  di guadagno per il secondo. Ora di qualsivoglia guadagno, tali parti deve avere ciascuno.

31. D. Tre hanno fatto Compagnia, nella quale il primo ha messo Sc. 600. per mesi 19. il secondo Sc. 400. per mesi 12. ed il terzo Sc. 840. per mesi 10. ed al fine il secondo, ha avuto di guadagno Sc. 120. Domando quanti Scudi di guadagno averà avuto ciascuno degli altri due?

R. Si moltiplicano li Scudi di Capitale con il suo tempo, il prodotto del primo sarà 9900. del secondo 4800. del terzo 8400. Però si dica per regola del tre: Sc. 4800. con posto di Scudi, e di tempo del secondo, gli dà di guadagno Sc. 120. più da 9900. composto del primo 9900. composto del terzo. e darà per il primo Sc. 198. 19. 7.  $\frac{1}{2}$ . e per il secondo Sc. 170. Soldi 8.  $\frac{1}{2}$ . e tanti Scudi averà ciascuno di guadagno; e facendosi prova si troverà la soluzione essere giusta.

32. D. Tre Compagnia alla fine di due anni trovano di guadagno Sc. 350. Il primo aveva messo Scudi 100. da principio, e dopo mesi 6. aveva levato Scudi 20. il secondo Sc. 205. e dopo mesi 9. aveva levato Scudi 30. il terzo Scudi 200. e dopo un' Anno aveva levato Scudi 90. Si domanda quanto averà ciascuno del guadagno?

R. Si

R. Si moltiplicano Sc. 180. del primo, per mesi 6. fanno 1080. da 180. si levano Sc. 40. li Sc. 140. restati si moltiplicano per mesi 18. fino ad anni 2. e fanno 2520. che si somma con 1080. viene 3600. per il composto del primo. Ora si moltiplicano Scu. 205. del secondo per mesi 9. fanno 1845; da Sc. 205. si sottrano Scudi 30. e Scudi 175. restati si moltiplicano per mesi 15. fino ad anni 2. fanno 2625. che si somma con 1845. viene 4470. per il composto del secondo; finalmente si moltiplicano Sc. 290. per mesi 12. fanno 3480. da Sc. 290. si levano Sc. 90. li Scudi 200. restati si moltiplicano per 12. mesi fino ad anni 2. fanno 2400. che si somma con 3480. viene 5880. per il Composto del terzo; si sommano i composti, la somma 13950. guadagna Sc. 350. che guadagnerà 3600. 4470. e 5880. e verranno Sc. 90. Soldi 6.  $5\frac{1}{2}$ . per il primo, Sc. 112. Sol. 3. —  $7\frac{1}{2}$  per il secondo, e Sc. 147. 10.  $6\frac{1}{2}$ . per il terzo, la somma de' quali rende Sc. 350. appunto, e così si opera in simili Compagnie.

33. D. Due fecero compagnia, e ciascuno pose Sc. 1000. il primo dopo un'anno mesi 4. levò Sc. 400. e il secondo levò Sc. 500. dopo anni 2. ed allora il primo rimette Sc. 200. e dopo anni 2. mesi 4. il secondo rimette Sc. 300. Domandasi essendosi alla fine di anni 3. trovati Sc. 942. di guadagno, quanto si devono al primo, ed al secondo?

R. Li Sc. 1000. del primo si moltiplicano per mesi 16. fanno 16000. da Sc. 1000. si sottrano Sc. 400. e Sc. 600. restati si moltiplicano per mesi 8. fanno 4800. ed aggiunti a Sc. 600. Sc. 200. sono Scu. di 800. li quali si moltiplicano per mesi 12. fanno 9600. e questi tre prodotti 16000. 4800. e 9600. si sommano, e viene 30400. composto di Scudi, e tempo per il primo. Pure li Sc. 1000. del secondo si moltiplicano per mesi 24. e levati Sc. 500. da Sc. 1000. si Sc. 500. restati si moltiplicano per mesi 4. ed a Sc. 500. aggiunti Sc. 300. sono Sc. 800. che si moltiplicano per mesi 8. ed i prodotti di queste moltiplicazioni, cioè 2400. 2000. e 6400. si sommano fanno 32400. composto di Scudi, e tempo del secondo. Si sommano i composti 30400. del primo, e 32400. del secondo; la somma 62800. tiene il primo luogo della regola del Trè; Il guadagno di Scudi 942. tiene il secondo, e tiene il terzo 30400. composto del primo; e poi 32400. composto del secondo; ed operato verranno per il primo Sc. 436. e per il secondo Sc. 486. la somma de' quali è Sc. 942. &c.



Del primo	1000	— 16 —	16000	Del secon.	1000	— 24 —	24000	441
	400				500			
	600	— 8 —	4800		500	— 4 —	2000	
	200				300			
	800	— 12 —	9600		800	— 8 —	6400	

Composto del primo 30400  
32400

Composto del secondo 32400

Sc 62800 — Sc 942 ( 30400? Sc. 456.  
32400? Sc. 486.

34. D. Trè fecero compagnia con patto d'avere del guadagno à ragione del denaro, e del tempo. Il primo mese sc. 400. per un' anno. Il secondo alquanti scudi per mesi 8. ed il terzo sc. 540. e finita la compagnia parteciparono ugualmente del guadagno. Si domanda quanti scudi mese il secondo, ed il terzo, per quanto tempo?

R. Si moltiplicano sc. 400. del primo per mesi 12. fanno 4800. che partito per mesi 8. del secondo, vengono sc. 600. e tanti ne mese il secondo; e partito 4800. per sc. 540. del terzo, vengono mesi 8. gior. 26  $\frac{2}{3}$ . per il tempo che tenne i suoi scudi il terzo; Perchè essendo i guadagni uguali, anche i composti di scudi, e tempo devono essere uguali.

Scudi 400 — 12

Per Sc. 540 | 4800  
48 — 30

per 8 / 4800

Scudi 600 del secondo.

Mesi 8. 26  $\frac{2}{3}$  1440

360

36

sch.  $\frac{2}{3}$

54

35. D. Prova della passata. Trè fecero compagnia il primo pose scudi 400. il secondo scudi 600. per mesi 8. ed il terzo alquanti scudi, che li tenne mesi 8. gior. 26  $\frac{2}{3}$ . e finita la compagnia, ciascuno ebbe ugual parte del guadagno. Si cerca quanto tempo tenne sc. 400: il primo, e quanti scudi mese il terzo?

R. Si moltiplicano sc. 600. del secondo per mesi 8. fanno 4800. il quale partito per 400. del primo, vengono mesi 12. e tanto tempo tenne i suoi scudi nella compagnia il primo. Si parte pure 4800. per mesi 8. giorni 26  $\frac{2}{3}$ . e vengono sc. 540. che mese il terzo, come si disse nella passata, sicchè torna.

K k k

Scu-

Scudi 600 — 8.

8. 26  $\frac{2}{3}$  / 4800 — 30

per 4 00 / 48.00

30

144000 — 3

266

Mesi 12 del primo

4320.00

8.00 Sc. 540 del-Terzo.

36. D. Due fanno compagnia, ponendo il primo sc. 1200. il secondo sc. 840. con patto, che il primo abbia del guadagno à ragione di 8. per 100. il secondo, per essere più esperto, à ragione di 10. per 100. Si domanda quanti scudi averà ciascuno di scudi 240. di guadagno?

R. Sc. 1200. del primo si moltiplicano per 8. fanno 9600. e li scudi 840. del secondo per 10. fanno 8400. si sommano, la somma 18000. è il primo numero della regola del Trè; sc. 240. di guadagno il secondo, e 9600. composto del primo il terzo; e la seconda volta 8400. del secondo, e verranno per il primo scudi 128. per il secondo scudi 112. fatta l'operazione secondo tal regola.

37. D. Trè fecero compagnia con patto, che il primo abbia da guadagnare à ragione di 5. per 100. il secondo per 6. il terzo per 7. Il primo pose sc. 360. e gli tenne mesi 14. Il secondo sc. 240. e gli tenne mesi 18. ed il terzo sc. 180. e gli tenne mesi 24. Si domanda la porzione di ciascuno di sc. 339. di guadagno?

R. Si moltiplicano li scudi di ciascuno per la ragione per 100. e per i mesi, e vengono trè composti, li quali si sommano, e la somma sarà 31360. onde dirassi: Se questa guadagna sc. 339. che 25200. composto del primo? che 25920. composto del secondo? che 30240. composto del terzo? e verranno sc. 105. del primo; Sc. 108. del secondo, e sc. 126. del terzo.

Sc. 360 — 5

Sc. 240 — 6

Scudi 180 — 7

1800 — 14

1440 — 18

1260 — 24

25200

25920

30240

25200

30240

Sc 81360

25200? Sc. 105

Sc. 339. 25920? Sc. 108

30240? Sc. 126

Somma Sc. 339

38. D. Due fanno compagnia con questa condizione, che il primo metta lir. 2000. e tiri li  $\frac{1}{4}$  del guadagno, e il secondo metta lire

lire. 800. e la persona, e tiri li  $\frac{1}{4}$ . Accade, che il primo sopra, mette lir. 500. Domando che parte doverà tirare ciascuno del guadagno?

- R. Questa è di Fr. Luca posta à car. 154. il quale avverte, che in tutte le compagnie ordinarie sempre il guadagno d'uno è parte del guadagno dell'altro, come il Capitale d'uno è parte del Capitale dell'altro; Onde da' Capitali s'arguisce à guadagni; e scioglie la proposta così. Vede che parti sono  $\frac{1}{4}$  di  $\frac{1}{4}$ . e partendo  $\frac{1}{4}$  per  $\frac{1}{4}$ . faranno  $\frac{1}{4}$ . Ora piglia  $\frac{1}{4}$  di lir. 2000. faranno lire 1500. e tante lire dice, dovrebbe porre il primo, per tirare li  $\frac{1}{4}$  del guadagno, e sottratte lir. 800. poste in denaro da lire 1500. restano lire 700. per la stima della persona del secondo; Ma perchè il primo sopra mette lire 500. dunque deve tirare altra parte del guadagno, e per trovarla fa così: somma insieme lire 2000. e lir. 500. del primo fanno 2500. per il Capitale del primo, le quali somma con lire 1500. per il Capitale del secondo fanno lir. 4000. Ora si veda che parte sono lir. 2500. di lir. 4000. e sono  $\frac{5}{8}$ . e tal parte deve tirare il primo del guadagno, e  $\frac{3}{8}$  deve avere il secondo; perchè tanto sono lir. 1500. di lir. 4000. Perchè per 4000. si partono 2500. e viene  $\frac{5}{8} \times \frac{5}{8} \times \frac{5}{8}$ . schisato per 500  $\frac{5}{8}$ . Pure si partono 1500. e viene  $\frac{3}{8} \times \frac{3}{8} \times \frac{3}{8}$ . e schisato pure per 500.  $\frac{3}{8}$ . Ma se ci fusse guadagno determinato da partire si farebbe per regola di compagnia ordinaria.

Questo modo d'operare hanno seguitato Francesco Galligai nella 39. del VII. Filippo Calandri nel suo Pittagora, Autori Fiorentini contemporanei, Giovanni Sfortunati da Siena, ed altri avanti Niccolò Tartaglia, e dopo ancora Fr. Lorenzo Forestani, in molte proposizioni del Libro terzo, e ultimamente D. Giuseppe Ciacchi Fiorentino à car. 158. nel Questo VI. e VII. Qual modo d'operare viene condannato per falso da Niccolò Tartaglia libro 12. numero 80. dicendo, che il secondo Compagno verria ad essere ingannato, perchè trafficherebbe lire 500. che sopra pose il primo senza utilità di guadagno, il che non è dovere, che cresca fatica, e fastidio senza remunerazione. Il medesimo occorrerebbe, se il primo sopramettesse trecentomila Lire, cioè che il detto secondo per tale sua regola non doveria tirare del guadagno, che per le dette lire 1500. cipè per le lire 800. e per lire 700. che fu stimata la persona; E nondimeno è manifesto, che maggiore fastidio, e fatica averia à trafficare trecentomila lire che 4000. Per risolvere rettamente, dice egli, queste, ed altre simili, bisogna vedere, che parte del guadagno delli denari del primo, nel primo patto si viene a limitare al secondo per mercede della

K k k 2

perso-

persona. E per saperlo somma le *lir. 2000.* che mette il primo con le *lir. 800.* che mette il secondo fanno *2800.* trovano li  $\frac{1}{2}$  che sono *lire 1200.* cavane le *lire 800.* che mette il secondo restano *lir. 400.* Ora vedi che parte sono queste *lir. 400.* di *lire 2000.* e troverai, che sono  $\frac{1}{5}$ . e tal parte doverà tirare il secondo del guadagno che pervenirà dalli denari, che metterà il primo siano quanti si vogliano, dico oltre il guadagno de' suoi, cioè di *lir. 800.* che egli mette; le quali *lire 800.* per essere li  $\frac{2}{5}$  di tutto il corpo, deve avere li  $\frac{2}{5}$  del guadagno, e poi  $\frac{1}{5}$  per la sua persona, e se queste due parti le vuoi ridurre insieme lo puoi fare con tutto il Capitale di *lir. 2800.* del quale pigliandone li  $\frac{2}{5}$  troverai che sono le dette *lire 800.* del resto deve avere anche  $\frac{2}{5}$  cioè di *lir. 2000.* che sono *lire 400.* le quali aggiunte con *lire 800.* fanno *lire 1200.* le quali sono gli  $\frac{1}{2}$  di tutto il Monte, come fù il primo patto. Ora perchè il primo sopramette *lir. 500.* che in tutto fariano *lir. 2500.* e tu vuoi sapere, che parte deve tirare il secondo rispetto al primo patto, fa così, trova il quinto di dette *lire 2500.* quale è *lir. 500.* e queste aggiungi con *lire 800.* fanno *lire 1300.* ora vedi che parte sono queste *lir. 1300.* di tutto il Monte; cioè di *lire 3300.* e troverai, che sono  $\frac{2}{11}$ . e tal parte di tutto il guadagno doverà avere il secondo, e il primo doverà avere il resto cioè  $\frac{9}{11}$ . Infino qui il Tartaglia, il quale ragionevolmente parla.

39. D. Nella passata compagnia si può operare in altro modo ed avere la medesima conclusione secondo l'opinione del Tartaglia?

R. Certamente; e stimo, che il seguente sia più facile, oltre ad altri modi, che insegnerò in altra simile compagnia. Si trova quante lire sia stimata la persona secondo il primo patto, che nella sopradetta compagnia fù stimata *lire 700.* rispetto a dovere trafficare *lir. 2800.* cioè *2000.* del primo, e *800.* del secondo, ma perchè il primo ha sopraggiunto *lire 500.* si sommino con *lir. 2800.* fanno *3300.* onde per regola del Trè si dica: Se *lire 2800.* da trafficarsi fanno stimare la persona *lir. 700.* quante lire faranno stimare la persona *lir. 3300.* da trafficarsi? e la faranno stimare *lire 825.* che sommate con *lir. 800.* in denaro, fanno *lir. 1625.* per il Capitale del secondo. Ora si sommano con *lir. 2500.* Capitale del primo, fanno *lir. 4125.* il quale posto sotto una linea con sopra *2500.* così  $\frac{2}{5} \frac{1}{2} \frac{0}{2} \frac{5}{2}$ . e schisato per *125.* viene  $\frac{3}{11}$ . per il guadagno del primo. Medesimamente posto sotto un'altra linea *4125.* con sopra *1625.* così  $\frac{2}{5} \frac{6}{5} \frac{2}{5} \frac{1}{5}$ . e schisato pure per *125.* viene  $\frac{4}{11}$ . guadagno del secondo. Ecco brevemente in altro modo la conclusione del Tartaglia. Ma se ci fusse stato il guadagno da partire, per esem-

per esempio lire 660. Si farebbe fatto per il modo della 5. di questo, avendo messo di Capitale il primo lir. 2500. ed il secondo lir. 1625. ed il primo averebbe avuto lir. 400. ed il secondo lir. 260. e così si opera nelle simili.

40. D. Due fanno compagnia con questa condizione, che il primo metta lir. 2000. e tiri  $\frac{2}{3}$ . del guadagno, e il secondo metta lire 800. e la persona, e tiri  $\frac{1}{3}$ . accade che il primo soprapose lire 500. ed un terzo compagno s'offerse di stare a i loro patti, e di mettere tante lire per avere il quarto del guadagno. Si domanda quante saranno queste lire, e che parte del guadagno averà ciascuno degl' altri due?

R. Alla passata compagnia si è aggiunta quest' altra difficoltà, cioè quante lire deva mettere un' altro per tirare il quarto del guadagno; ed è simile alla 57. di Frà Luca à car. 154. la quale risolta al suo modo è facile, e si risolve così brevemente. Trovato, come nella 38. di questo, che la persona del secondo viene stimata lir. 700. si sommano con lir. 800. in denaro fanno lir. 1500. per il Capitale del secondo, le quali lire si sommano con lire 2000. e con lir. 500. del primo, fanno lir. 4000. Ora perchè il terzo Compagno vuol mettere tante lire, per tirare il quarto del guadagno, si veda  $\frac{2}{3}$ . che parte è di  $\frac{2}{3}$  degl' altri, farà  $\frac{2}{3}$ . Onde pigliando  $\frac{2}{3}$  di 4000. che sono lir. 1333  $\frac{1}{3}$ . tante ne dovrà mettere il terzo Compagno, le quali sommate con lir. 4000. fanno lir. 5333  $\frac{1}{3}$ . per tutto il corpo della compagnia. Ora si veda, che parte sono lir. 2500. del primo di lir. 5333  $\frac{1}{3}$ . per queste partendo quelle, sono  $\frac{5}{8}$  per il guadagno del primo; che parte sono lir. 1500. del secondo di lir. 5333  $\frac{1}{3}$ . sono  $\frac{3}{8}$ . per il guadagno del secondo; e che parte sono lire 1333  $\frac{1}{3}$  del terzo, sono  $\frac{1}{8}$ . per il guadagno del terzo, secondo Frà Luca, &c.

41. D. Come si risolve, secondo l' opinione del Tartaglia?

R. Riesce difficile à risolverla per il suo modo: Onde esso tralasciò di fare menzione della 57. di Frà Luca à carte 154. per quanto stimò, perchè si ricerca fare ò doppia falsa posizione, ò regola d'Algebra, per trovare le lire, che si devono porre per avere una parte determinata del guadagno.

Tuttavia la posizione d' Algebra si può dare in una pratica d' operare, che ciascuno Abbachista possa farla senza cognizione di quella, e possa trovare le lire, che devono essere messe, come di presente sono per insegnare.

Si trovi per il modo dato dal Tartaglia, e posto nella 38. di questo, che parte del guadagno deve ricevere il secondo per la persona degl' altri, sommando le lire 2000. del primo,

primo, e le lire 800. del secondo fanno lire 2800. delle quali si pigliano  $\frac{1}{3}$ . sono lir. 2200. dalle quali si levano lir. 800. messe in denaro dal secondo restano lire 400. le quali si veda, che parte sono di lir. 2000. del primo, sono  $\frac{1}{5}$ . e tal parte di guadagno deve ricevere il secondo per la persona, da ciascuno de' Compagni oltre il guadagno delle lire 800. messe in denaro. Stabilito questo si sommano lire 2000. e lire 500. del primo, e lire 800. del secondo, fanno lire 3300. Ora per sapere le Lire, che deve mettere il terzo sper avere il quarto del guadagno, si deve trovare un numero che sia la terza parte appunto di lire 3300. sommate con quella quinta parte levata dal numero trovato, perchè  $\frac{1}{5}$ . che deve avere il terzo, è la terza parte di  $\frac{1}{5}$ . degl'altri Compagni, e così viene ad essere la quarta parte di tutto il Monte della compagnia, e viene ad avere  $\frac{2}{5}$  del guadagno.

Per chi intende l'Algebra si trova in questo modo: Per quel numero si pone 1. cosa, della quale  $\frac{1}{3}$  cosa si aggiunge a lir. 3300. e dice 3300. più  $\frac{1}{3}$  cosa, si parte per 3. e viene 1100. più  $\frac{1}{9}$  cosa, ed ora  $\frac{1}{3}$  cosa, sono uguali a 1100. più  $\frac{1}{9}$  cosa; si leva dalle parti  $\frac{1}{9}$  cosa resta  $\frac{2}{3}$  cosa uguali a 1100. per  $\frac{3}{2}$  si parte 1100. come vuole la regola, e viene 1500. che sono lire, che deve porre il terzo.

In pratica da 1. si levi quella parte, che si deve dare per la persona, è sia  $\frac{1}{3}$  è  $\frac{2}{3}$  è  $\frac{1}{5}$  ovvero  $\frac{2}{5}$ . &c. il resto si tenga da parte; e quella parte di parti, si pongano appresso il Capitale di tutti separate con linea, è punto. Ora si parta il Capitale di tutti, e la parte appresso secondo l'esigenza della parte, ovvero parti del guadagno che vuole tirare quello, che ha da porre il suo Capitale. Qui si parte 3300. —  $\frac{1}{3}$ . per 3. perchè  $\frac{2}{3}$ . rispetto  $\frac{1}{3}$ . degl'altri è un terzo, e viene 1100. —  $\frac{1}{9}$  e se volesse  $\frac{2}{3}$  di guadagno, si partirebbe per 2. e se volesse tirare la metà si partirebbe per 1. cioè si piglierebbe il medesimo numero, e parte, e se volesse tirare  $\frac{1}{5}$ . si piglierebbero  $\frac{1}{5}$  di tal numero, e parte, perchè  $\frac{2}{5}$  rispetto  $\frac{1}{5}$  degl'altri sono  $\frac{1}{5}$ . e se volesse tirare  $\frac{2}{5}$ . si piglierebbe doppio numero, e parte, cioè si moltiplicherebbe per 2. per essere  $\frac{2}{5}$  rispetto a  $\frac{1}{5}$  degl'altri il doppio, &c. Dipoi quella parte, che nell'esempio dato è  $\frac{1}{9}$ . si sottra dal resto messo da parte, cioè da  $\frac{2}{3}$ . e restano  $\frac{2}{3}$  e per  $\frac{3}{2}$  si parte 1100. e ne viene 1500. numero cercato di lire da mettersi dal terzo: E così si opera in altri Esempj simili praticamente.

Avendo trovato, che il terzo deve mettere lire 1500. Si trovi, che parte di guadagno devono avere gl'altri due. Si sommino lire 2000. con lire 500. sopra messe; fanno lire 2500. del primo, e queste

queste si sommano con *lir.* 800. del secondo, e con *lir.* 1500. del terzo, fanno *lir.* 4800. per tutto il monte della compagnia. Si pigli  $\frac{2}{7}$ . di *lir.* 2500. del primo; sono 500. e si pigli  $\frac{2}{7}$ . di *lir.* 1500. del terzo, sono 300. e 500. si sommino con *lir.* 800. del secondo, fanno *lir.* 1600. per suo Capitale: del primo sono restate *lir.* 2000. e del terzo 1200. Ora si veda che parte sono *lir.* 2000. di *lir.* 4800. sono  $\frac{5}{12}$  di guadagno del primo, che parte sono *lir.* 1600. del secondo di *lir.* 4800. sono  $\frac{2}{3}$  di guadagno del secondo, siccome *lir.* 1200. di *lir.* 4800. sono  $\frac{1}{4}$  di guadagno del terzo, come si voleva. Si sommino  $\frac{5}{12}$ . del primo  $\frac{2}{3}$  del secondo, ed  $\frac{1}{4}$  del terzo, la somma è uno per un sol guadagno, &c.

42. D. Due fanno compagnia con patti, che il primo metta *lire* 1600. e cavili  $\frac{2}{7}$ . e il secondo metta *lir.* 600. e la persona, e cavili  $\frac{2}{7}$ . Uno si accorda con costoro, e vuol mettere nella compagnia *lir.* 1200. Viene un'altro, e dice a questi tre: Volete che io entri con voi in compagnia, e metterò tante *lire*, che io venga a cavare il terzo del guadagno; essi dissero, che erano contenti. Domando che parte doverà tirare il primo, e che il secondo, e che il terzo, e che il quarto? e quante *lire* doverà mettere il quarto?

R. Questa è la citata 57. di Fr. Luca à car. 154. e qui pongo per maggior intelligenza di quello che si è detto. Il medesimo la risolve, come la 40. di questo, e si trova, che il quarto metterà *lire* 2000. per tirare  $\frac{2}{7}$  del guadagno, e che il primo tirerà  $\frac{1}{2}$ . il secondo  $\frac{2}{7}$ . ed il terzo pure  $\frac{2}{7}$ . In questo modo risolve la 36. del settimo il Galigai; la 45. del libro terzo il Forestani, e il quesito settimo à car. 159. di Ciacchi.

Ma volendo risolvere la sopradetta, secondo l'opinione del Tartaglia; si sommano *lir.* 1600. del primo, e 600. del secondo, fanno 2200.  $\frac{1}{7}$  sono 942  $\frac{2}{7}$ . dalle quali levate *lir.* 600. del secondo restano 342  $\frac{2}{7}$ . che sono  $\frac{1}{4}$  rispetto à 1600. del primo, e tali parti deve ricevere il secondo del guadagno di ciascuna, oltre al guadagno delle *lire* 600. Si sommino *lire* 2200. con *lir.* 1800. del terzo; la somma è 3400. Per trovare le *lire* che deve mettere il quarto, da 1. si leva  $\frac{1}{4}$ . resta  $\frac{3}{4}$ . che si tiene da parte, e  $\frac{1}{4}$  si piglia dopo 3400.  $\frac{1}{4}$ . così, e si parte per 2. perchè  $\frac{2}{7}$ . che deve tirare il secondo rispetto agli altri è la metà, e viene 1700.  $\frac{1}{7}$ . Questi  $\frac{1}{7}$  si sottrano da  $\frac{3}{4}$ . posto da parte, e resta  $\frac{5}{28}$ . per questo si parte 1700. viene 2505  $\frac{1}{7}$ . *lire* da mettersi dal quarto; Si levino da *lire* 1600. del primo  $\frac{1}{4}$ . cioè 342  $\frac{2}{7}$ . restano *lir.* 1257  $\frac{2}{7}$  per Capitale del primo; Si levino da *lir.* 1200. del terzo  $\frac{1}{4}$ . cioè 257  $\frac{2}{7}$ . restano *lir.* 942  $\frac{2}{7}$ . per Capitale del terzo, e si levino da *lire* 2505  $\frac{1}{7}$ . del quarto  $\frac{1}{4}$ . cioè 257  $\frac{2}{7}$ . ne restano *lir.* 1968  $\frac{1}{7}$ . per Capi-

Capitale del quarto; e sommate lir. 600. del secondo, con lire 342  $\frac{2}{3}$  avute dal primo, con lire 257  $\frac{2}{3}$  dal terzo, e con lire 536  $\frac{1}{3}$  dal quarto, fanno lir. 1736  $\frac{1}{3}$  per Capitale del secondo. Si sommino i Capitali di tutti quattro, la somma è di lire 5905  $\frac{1}{3}$ . rispetto alle quali le lire 1257  $\frac{2}{3}$  del primo sono  $\frac{1}{3}$  parti del primo, e le lir. 1736  $\frac{1}{3}$  del secondo, sono  $\frac{1}{3}$  parti del secondo, e le lir. 942  $\frac{2}{3}$  del terzo, sono  $\frac{1}{3}$  parti del terzo; e finalmente lir. 1968  $\frac{1}{3}$  del quarto, sono  $\frac{1}{3}$  parte del quarto, che giusto gli tocca quella parte, che voleva del guadagno, con avere messo lir. 2505  $\frac{1}{3}$  di sua parte, come si è detto.

43. D. Due fanno compagnia con patti, che il Primo metta lire 400. e tiri li  $\frac{2}{3}$  del guadagno, e il secondo metta lir. 300. e tiri  $\frac{1}{3}$  del guadagno: ma il secondo vuole sopra mettere tante lire, che tiri la metà del guadagno. Si domanda quante lire sopra giungerà alle 300?

R. Questa è la 59. di Fr. Luca à car. 155. da me in altro modo sciolta, secondo la pratica insegnata nella 41. e nella passata si sommano 400. e 300. fanno 700. rispetto à 700. lir. 400. sono  $\frac{2}{3}$ . e lire 300. sono  $\frac{1}{3}$ . e senza patti di ragione al secondo si doveriano  $\frac{1}{3}$  di guadagno, e per patti fatti riceve  $\frac{2}{3}$ . Si veda quanto è meno  $\frac{1}{3}$  di  $\frac{2}{3}$ . sottrando si troverà  $\frac{1}{3}$ . Ora si trovi che parte sono  $\frac{1}{3}$  di  $\frac{2}{3}$ . si parta  $\frac{1}{3}$ . per  $\frac{1}{3}$ . verrà  $\frac{2}{3}$ . schifato  $\frac{1}{3}$ . Dunque il secondo viene à concedere secondo i patti  $\frac{2}{3}$  del suo guadagno al primo, ò si vogli dire  $\frac{2}{3}$  del suo Capitale, stante che tal parte di guadagno corrisponde à tal parte di Capitale. Ora si deve trovare un numero, del quale levando li  $\frac{2}{3}$ . ed aggiugnendoli à 400. del primo. Il restato numero sia uguale à 400. con l'aggiunta. Si ponga, che tal numero sia 1. cosa, levati  $\frac{2}{3}$ . ed aggiunti à 400. sarà  $\frac{1}{3}$  cosa uguale à 400. più  $\frac{2}{3}$  cosa, e lavati  $\frac{2}{3}$  cosa, dalle parti, resta  $\frac{1}{3}$  cosa uguale à 400. e partito 400. per  $\frac{1}{3}$ . come vuole la regola con moltiplicare 400. per 9. il prodotto 3600. con partirlo per 5. verrà 720. per il valore di 1. cosa, e numero cercato; si che il secondo metterà in tutto lire 720. dalle quali sottratte lir. 300. resteranno lire 420. da sopraggiungerli à 300. come si cercava. Chi non intende l'Algebra lo faccia praticamente, come si è insegnato nella 41. di questo. Chi leggerà Fr. Luca, conoscerà quanto più facile sia questo mio modo, & intelligibile del suo. Si prova con levare  $\frac{2}{3}$  da 720. cioè 160. il quale s'aggiunge à 400. fa 560. siccome 560. è restato. Onde à ciascuno converrà la metà del guadagno, secondo le condizioni fatte.

44. D. Due fanno compagnia: Il primo mette Sc. 80. e deve tirare li  $\frac{2}{3}$  del guadagno; Il secondo mette Sc. 20. e deve tirare  $\frac{1}{3}$  del guadagno.



guadagno : Fatto l'accordo viene un'altro, e mette sc. 120. e dice di volere stare alla rata loro del detto guadagno, secondo le loro condizioni . Si domanda , avendo essi guadagnato in tutto scudi 500. che ne toccherà per ciascuno?

R. Questa è la compagnia 58. carte 155. di Fr. Luca, e la 13. di Pietro Borgo , e la risolvono ad un modo conchiudendo, che al primo si devono scu. 202  $\frac{2}{3}$   $\frac{1}{4}$ . al secondo 25  $\frac{1}{4}$   $\frac{1}{4}$ . ed al terzo scudi 272  $\frac{2}{3}$   $\frac{1}{4}$ . mà fallamente; e mi sono maravigliato di Frà Luca che non abbia seguitato il suo modo mostrato di sopra nella 38. di questo, e da lui usato nello sciorre la 56. e la 57. cioè di trovare quanto venga stimata la persona del secondo, la quale viene stimata 20. perchè  $\frac{2}{3}$ . del secondo è la metà del primo, che deve tirare  $\frac{2}{3}$ . Dunque mettendo il primo sc. 80. il secondo deve mettere la metà, cioè 40. mà in denaro hà messo 20. dunque la persona viene stimata 20. senza variazione, secondo Fr. Luca, e il secondo frà denaro, e persona pone 40. il primo 80. il terzo 120. ed hanno da partire sc. 500. di guadagno, onde operato per compagnia ordinaria, il primo averà 166  $\frac{2}{3}$ . il secondo 83  $\frac{2}{3}$ . ed il terzo sc. 250. che è la conclusione di Giovanni Sfortunati da Siena, nella proposizione decima à car. 49. 50. seguitato da Fr. Lorenzo Forestani nella proposizione 46. à car. 99. dove arguisce così: E' cosa manifesta, dice egli, che il primo averà il doppio del secondo; perchè  $\frac{2}{3}$  sono il doppio di  $\frac{1}{3}$ . adunque quando il secondo averà 1. il primo averà 2. ora è da vedere quanto averà il terzo compagno alla rata de' due primi; per il che dirai così: Se sc. 80. che mette il primo tirano 2. quando il secondo 1. che tireranno sc. 120. del terzo? opera, te ne verrà 3. e così abbiamo che il primo tirà 1. il secondo 2. ed il terzo 3. che giunti insieme tireranno 6. e noi volevamo che tirassero 500. loro guadagno; però si dica: Se 6. fusse 500. che sarebbe 2? 1; e 3? sarebbe 166  $\frac{2}{3}$  scudi del primo. 83  $\frac{2}{3}$ . scudi del secondo, e 250. scudi del terzo, come di sopra, per i Capitali 80. 40. 120. perchè schifati per 40. sono 2. 1. e 3. &c.

Tale soluzione non piace al Tartaglia, perchè il secondo trafficerebbe sc. 120. del terzo senza rimerito, come si è detto nella 38 di questo ancora, e però la chiama falsa, e dice che la vera è questa. Se non fosse in compagnia il terzo compagno, ed avessero guadagnato sc. 100. secondo il patto, al primo ne toccherebbero  $\frac{2}{3}$ . cioè sc. 66.  $\frac{2}{3}$ . ed al secondo  $\frac{1}{3}$  cioè 33.  $\frac{1}{3}$ . sicchè il secondo ponendo solo sc. 20. glie ne toccherebbero 13  $\frac{1}{3}$  di più datigli dal primo, che pose scu. 80. il qual 13  $\frac{1}{3}$ . è la sesta parte di 80. onde conchiude, e dice: che essendo quanto si voglia il guadagno.

gno, il primo gliene deve dare la sesta parte, e così quanti compagni entrino con la medesima condizione, e patto devono dare la sesta parte del loro guadagno, che aggiunta al guadagno di sc. 20. che in denaro pone il secondo, averà la sua giusta parte; onde perchè il terzo mette sc. 120. la sesta parte è 20. che aggiunti à scu.  $33 \frac{1}{3}$ . del secondo, fanno sc.  $53 \frac{1}{3}$ . quelli del primo sc.  $66 \frac{2}{3}$ . quelli del terzo levati sc. 20. restano sc. 100. e tanti gli si dovrebbero, se li scu. di guadagno fossero stati 220. mà perchè furono 500. si dirà: Se di sc. 200. il primo hà scudi  $66 \frac{2}{3}$ . il secondo  $53 \frac{1}{3}$ . ed il terzo sc. 100. che doveranno avere di sc. 500? ed operato come vuole la regola, si troverà, che il primo doverà avere sc. 151.  $\frac{1}{3}$ . il secondo sc. 121  $\frac{1}{3}$ . ed il terzo sc. 227  $\frac{1}{3}$ . e questa è la conclusione del Tartaglia; secondo la quale si può operare in questo mio modo: Mettendo il primo scu. di 80. il secondo sc. 20. senza altro patto di sc. 100. il primo dovrebbe aver li  $\frac{4}{5}$ . il secondo  $\frac{2}{5}$ . e perchè ne hà questo  $\frac{1}{5}$ . la differenza da  $\frac{4}{5}$  ad  $\frac{2}{5}$  è  $\frac{2}{5}$ . che è la sesta parte di  $\frac{4}{5}$ . onde levando  $\frac{1}{5}$ . da  $\frac{4}{5}$ . restano  $\frac{3}{5}$ . sicchè il primo dà la sesta parte del suo Capitale al secondo, e conseguentemente poi del guadagno: e così devono fare altri compagni, entrando con la medesima condizione.

$$\frac{1}{3} \times \frac{1}{5}$$

$$\frac{5}{8}$$

$$\frac{2}{15} \times \frac{4}{5}$$

$$\frac{1,0}{6,0} \text{ cioè } \frac{1}{6}$$

$$\frac{80}{20}$$

$$\frac{20}{120}$$

$$\frac{120}{220}$$

$$\text{Sc. } 500.$$

$$80? - \text{Sc. } 181 \frac{1}{3}$$

$$20? - \text{Sc. } 45 \frac{1}{3}$$

$$120? - \text{Sc. } 272 \frac{1}{3}$$

$$6 / 181 \frac{1}{3}$$

$$30 \frac{1}{3}$$

$$\text{Sc. } 151 \frac{1}{3}$$

$$6 / 272 \frac{1}{3}$$

$$45 \frac{1}{3}$$

$$\text{Sc. } 45 \frac{1}{3}$$

$$30 \frac{1}{3} \text{ Sesta par. del pr.}$$

$$45 \frac{1}{3} \text{ Sesta par. del sec.}$$

$$121 \frac{1}{3} \text{ Guad. del secondo.}$$

$$\text{Guadagno del terzo } 227 \frac{1}{3}$$

$$\text{del primo } 151 \frac{1}{3}$$

$$\text{del secon. } 121 \frac{1}{3}$$

$$\text{Sc. } 500$$

(Avvertasi però, che non intendo, che il primo, e terzo diano parte del loro Capitale al secondo effettivamente, quale stimo si ripigliano tutto il primo di sc. 80. il terzo di sc. 120. finita la compagnia; mà solo in ordine à trovare la parte del guadagno del secondo, del qual guadagno si ricerca la ripartizione nella Domanda.) Ora si faccia la compagnia secondo il Capitale, che ciascuno hà posto di sc. 80. del primo, di sc. 20. del secondo, e di sc. 120. del terzo, e si dividano sc. 500. al primo ne

tocche.

451

toccheranno Sc. 181  $\frac{1}{2}$ . al secondo Sc. 45  $\frac{1}{2}$ . ed al terzo Scudi 272  $\frac{1}{2}$ . da Sc. 181  $\frac{1}{2}$ . si levi la sesta parte cioè Sc. 30.  $\frac{1}{3}$  resteranno Sc. 151  $\frac{2}{3}$  del primo. Si levi la sesta parte da Sc. 272  $\frac{1}{2}$  del terzo, cioè 45  $\frac{1}{2}$ . restano Sc. 227  $\frac{1}{2}$  per il terzo. Aggiunte quelle sette parti 30  $\frac{1}{3}$ . e 45  $\frac{1}{2}$  a Sc. 45  $\frac{1}{2}$ . guadagno del secondo, faranno in tutti Sc. 121.  $\frac{1}{2}$ . del secondo, come prima, per il modo del Tartaglia.

Il secondo mio modo di risolvere simili quesiti senza avere a trovare, che parte si deva dare di guadagno per la persona, e senza alterare i Capitali del primo, e terzo, si dica per regola del Trè: Se  $\frac{1}{3}$  di guadagno vogliono Sc. 80. di Capitale, che vorrà  $\frac{2}{3}$ ? ed operato vengono Sc. 40. da i quali levati Sc. 20. messi in denaro, restano Sc. 20. per la persona; Si dica un' altra volta per la regola del Trè: Se Sc. 100. da trafficare, che sono Sc. 80. del primo, e Sc. 20. del secondo danno Sc. 20. per la persona, Sc. 120. che pone il terzo, che ne daranno ed operato verranno Sc. 24. si sommano adesso Sc. 20. che mette il secondo con Sc. 20. per la persona rispetto al primo, e con Sc. 24. rispetto al terzo, fanno Sc. 64. per il Capitale del secondo. Il primo mette Sc. 80. Il terzo Scudi 120. Il guadagno è di Sc. 500. Se ne faccia la divisione per compagnia ordinaria, dicendo: Se Sc. 264. somma de' Capitali guadagnano Sc. 500. che Sc. 80. del primo? che Sc. 64. del secondo? che Sc. 120. del terzo? e verranno Sc. 151  $\frac{2}{3}$ . Sc. 121  $\frac{1}{2}$ . e Scudi 227  $\frac{1}{2}$ . come per l' altro modo.

$$\frac{2}{3} - 80 - \frac{1}{3} ? - 40$$

$$\underline{\hspace{1.5cm}} 20$$

$$\text{Sc } 100 - 20 = 120? \quad 24$$

$$\underline{\hspace{1.5cm}} 40$$

Capitale del secondo 64

Per la Persona 20

del Primo 80  
Capitali del Secondo 64  
del Terzo 120

$$80? - \text{Sc. } 151 \frac{2}{3} \text{ del pr.}$$

$$264 - \text{Sc. } 500 - 64? - \text{Sc. } 121 \frac{1}{2} \text{ del sec.}$$

$$120? - \text{Sc. } 227 \frac{1}{2} \text{ del ter.}$$

Sc. 500

Per altro modo si può trovare il Capitale del secondo senza alterare il Capitale del primo, e del terzo, fatta la regola del Trè; Se  $\frac{2}{3}$  vogliono Sc. 80. che  $\frac{1}{3}$ ? e trovato 40. dal quale levati 20. in denaro, restano 20, per la persona, li quali sono la quinta parte

L 11 2

di 100.

di 100. sicchè pigliando tal parte dalla somma di tutti i Capitali, che quì è 220. tal parte sarà 44. che aggiunta à Sc. 20. di denaro fanno Sc. 64. per il Capitale del secondo, come prima; e nell'istesso modo se si fussero aggiunti altri compagni alla medesima convenzione; del resto si opera come nella passata.

45. D. Due fanno compagnia, il primo ci mette per suo Capitale Sc. 900. e l'altro Sc. 450. e la persona con patto, che al fine della compaania devano partire il guadagno per metà, in questo sopraggiunge un terzo, e dice: Se mi ci volete ci entraro io ancora con li medesimi patti, e ci metterò Scudi 1800. come effettivamente ci messe, ed alla fine si trovano di guadagno Scudi 3200. e venendo alla divisione &c. Si domanda quanti Scudi averà eiafcuno?

R. Questa è la 10. Compagnia di D. Domenico Griminelli carte 202. il quale conclude; che il primo averà Sc. 800. il secondo Sc. 1120. ed il terzo Sc. 1280. rimettendosi à chi meglio l'intende. Questa compagnia è simile alla passata, per il che volendosi sciogliere secondo l'opinione del Tartaglia per il mio modo, mettendo il primo Sc. 900. ed il secondo Sc. 450. per tirare la metà, la persona viene stimata altri Sc. 450. per dover trafficare Sc. 1350. somma di Sc. 900. del primo, e Sc. 450. del secondo. Ora per trovare quanto sarà stimata la persona in ordine à gli Scudi del terzo, si dica: Se Sc. 1350. danno di stima Sc. 450. Sc. 1800. del terzo che daranno? ed operato verranno Sc. 600. che congiunti con Sc. 450. stima della persona rispetto al primo Compagno, e con Sc. 450. messi in denaro, fanno Sc. 1500. Capitale del secondo, del primo i medesimi Sc. 900. e del terzo Sc. 1800. sommati fanno 4200. si dica dunque: Sc 4200. hanno di guadagno 3200. che 900. del primo? che 1500. del secondo? che 1800. del terzo? si operi e verranno Sc. 685  $\frac{1}{2}$ . per il primo, Sc. 1142  $\frac{1}{2}$ . per il secondo e Sc. 1371  $\frac{1}{2}$ . per il terzo.

Per il modo del Tartaglia si sommano Sc. 900. del primo, e Sc. 450. del secondo, fanno Sc. 1350. li quali se fussero guadagnati secondo il patto, ne averebbe il secondo Sc. 675. che sono Sc. 225. più per la persona di Sc. 450. di suo Capitale; si veda che parte sono di Sc. 900. e sono la quarta, sicchè il primo, ed il terzo devono dare la quarta parte del loro guadagno al secondo, oltre quello che guadagna il suo Capitale, già la quarta parte di 900. sono 225. e di 1800. del terzo sono 450. levati 225. da 900. restano 675. guadagno del primo, e levati 450. da 1800. restano 1350. per il terzo; e aggiunte quelle parti cioè 225. e 450. à 450. del secondo, di suo guadagno faranno Sc. 1125. che sommati fanno Scudi

3150.

3150. e dovevano essere 3200. Però per regola del Trè si dica: Se Scudi 3150. fossero Scudi 3200. che farebbero Scudi 675. del primo? Scudi 1125. del secondo? e Scudi 1350. del terzo? e verranno come sopra Sc. 685  $\frac{1}{2}$  del primo, Sc. 1142  $\frac{1}{2}$  del secondo, e Sc. 1371  $\frac{1}{2}$  del terzo.

Più speditamente si opera per l' altro mio modo. Trovato come sopra che il primo, e terzo, devono dare la quarta parte, si sommino Sc. 900. del primo, Sc. 450. del secondo, e Scudi 1800. del terzo, fanno Sc. 3150. onde per regola del Trè: Se 3150. guadagnano 3200. che guadagneranno Sc. 900. del primo? Scudi 450. del secondo? e Sc. 1800. del terzo? Per il primo verranno Scudi 914  $\frac{1}{2}$ . da' quali levati 228  $\frac{1}{2}$ . quarta parte, restano Sc. 685  $\frac{1}{2}$ . di guadagno; Per il secondo verranno Sc. 457  $\frac{1}{2}$ . ed al terzo Scudi 1828  $\frac{1}{2}$ . da' quali levati Scudi 457  $\frac{1}{2}$ . quarta parte, restano Scudi 1371  $\frac{1}{2}$ . per il terzo, ed aggiunti a Sc. 457  $\frac{1}{2}$ . del secondo, Scudi 228  $\frac{1}{2}$ . quarta parte del guadagno del primo, e Sc. 457  $\frac{1}{2}$ . quarta parte del guadagno del terzo, verranno Per il secondo Sc. 1142  $\frac{1}{2}$ . di guadagno come sopra.

Scudi 900	Scudi 675	
Scudi 450	Scudi 450	
<hr/>		sch. $\frac{3}{4}$

Per 2	1350	Scudi 225
	<hr/>	
Scudi 675	Scudi 900	
Scudi 900		
450		
1800		
<hr/>		

900? —	914 $\frac{1}{2}$	del primo.
450? —	457 $\frac{1}{2}$	del secondo.
1800? —	1828 $\frac{1}{2}$	del terzo.

Per 4	Sc. 914 $\frac{1}{2}$	Per 4 / Sc. 1828 $\frac{1}{2}$	Scudi 457 $\frac{1}{2}$
	228 $\frac{1}{2}$	457 $\frac{1}{2}$	Scudi 228 $\frac{1}{2}$
	<hr/>	<hr/>	Scudi 457 $\frac{1}{2}$

Sc. 685  $\frac{1}{2}$  del pr. del ter. Sc. 1371  $\frac{1}{2}$   
 Del secondo Scudi 1142  $\frac{1}{2}$

Il Dottor Baffi propone una compagnia simile, che è la 21. a carte 200. e la risolve à modo di Nicolò Tartaglia, e poi immediatamente si protesta di non avere mai potuto leggere la sua Arithmetica per la lunghezza delle sue dicerie, il che non ha del verifimile; mentre nella medesima carta propone una Soccita, e riprende il medesimo Tartaglia di mala soluzione; il che non avrebbe

averebbe potuto fare, se non avesse letta la sua Arimmetica, siccome non avrebbe sciolto il quesito della Compagnia à modo dell' istesso Autore.

46. D. Due fanno compagnia, il primo pone Sc. 200. e la persona; Il secondo Sc. 360. con patto, che il primo abbia  $\frac{1}{4}$ . il secondo  $\frac{2}{3}$  del guadagno. Avviene, che si aggiungono due altri Compagni, il primo de' quali, che farà il terzo pone Sc. 450. Il secondo, che farà il quarto Sc. 630. al medesimo patto di prima; ed allora il primo, che metteva la persona, mette solo Scudi 100. Si domanda, se finita la compagnia il guadagno fusse di Sc. 924. quanti n' averia ciascuno di ragione?

R. Questa si risolve come le passate. Si sommano Sc. 200. del primo, e Sc. 360. del secondo fanno Sc. 560. del quale si pigliano  $\frac{1}{4}$ . sono 140. sicche il primo per la persona riceve Sc. 40. che è  $\frac{2}{5}$  di Sc. 200. del secondo. Gli altri ancora gli devono dare  $\frac{2}{3}$  del loro Capitale, siano quanti si vogliono: Del secondo  $\frac{2}{3}$ . sono 480. del terzo 50. del quarto 70, quali noni vanno levati ciascuno dalla sua partita, e poi quei noni si sommano con Sc. 100. che il primo mette, saranno di Capitale del primo Sc. 260. del secondo 320. del terzo Sc. 400. e del quarto Sc. 560. che sommati sono Sc. 1540. però si dica: Se Sc. 1540. di guadagno hanno Sc. 924. che Sc. 260. del primo? Sc. 320. del secondo, Sc. 400. del terzo, e Sc. 560. del quarto? e verranno per il primo Sc. 156. per il secondo Sc. 192. per il terzo Sc. 240. e per il quarto Sc. 336. di guadagno. Ovvero, senza mutare i Capitali, si sommino Sc. 100. del primo, Sc. 360. del secondo, Sc. 450. del terzo, e Sc. 630. del quarto, fanno Sc. 1540. si dica: Con Sc. 1540. si guadagnano Sc. 924. quanti si guadagneranno con Sc. 100. del primo? verranno Sc. 60. con Sc. 360. del secondo? verranno Sc. 216. con Sc. 450. del terzo? verranno Sc. 270. con Sc. 630. del quarto? e verranno Sc. 378. Si levi dalli Seudi delli tre ultimi  $\frac{2}{5}$  di essi, e s' aggiungano tali noni a Sc. 60. del primo torneranno come sopra, e qui si vede.

Sc. 100		100?	—	Sc. 60. aggiunti	Sc. 96.	Sc. 156
360		360?	—	216 levati	Sc. 24	Sc. 192
450	1540	450?	—	270 levati	Sc. 30	Sc. 240
630		630?	—	378 levati	Sc. 42	Sc. 336

1540

In altro modo. Ogni volta è trovato, che parte devono dare i Compagni per la persona, come qui  $\frac{2}{5}$ . si levi 1. dal 9. resta  $\frac{7}{9}$ . Si sommino li Seudi di tutti i Compagni, cioè Sc. 100. Sc. 360. Sc. 450. e Sc. 630. fanno Sc. 1540. de' quali  $\frac{2}{5}$ . cioè Sc. 192  $\frac{2}{5}$ . aggiunti

455

giunti à sc. 100. del primo, sono sc. 292  $\frac{2}{3}$ . per il Capitale del primo. Gli altri Capitali frasciano come sono, e si fa la Compagnia ordinaria al solito, e verrà à ciascuno la giusta porzione del guadagno.

Scudi 100	292 $\frac{2}{3}$	
360	360	
450	450	
630	630	
<hr/>		
Per 8 / 1640	1732 $\frac{2}{3}$	— 924
192 $\frac{2}{3}$		
100		
<hr/>		
	292 $\frac{2}{3}$ Sc. 156	
	360 Sc. 192	
	450 Sc. 240	
	630 Sc. 336	

Del primo 292  $\frac{2}{3}$

47. D. Compongono denari in negozio Pompeo sc. 10000. e Quilico sc. 6000., e rispetto l'occupazione di sua persona, che Quilico tiene nel negozio tra loro è patto, che dell'utile pervenga à ciascuno la metà: Avviene che dopo mesi 8. Pompeo vi aggiunge sc. 4000. e dopo mesi 18. del principio finisce il negozio con utile di libbre 1000. di Seta. Domando come si farà di ciò il partimento?

R. Questa è la Proposta settima di Gio. Battista Zuechotta, e Questo sesto delle Compagnie di Gio. Battista Pisani à pag. 187. e la risolvono ad un modo, conchiudendo, che Pompeo avrà lib. 528  $\frac{2}{3}$ , e Quilico lib. 471  $\frac{1}{3}$ .

Volendo ritolvere questa Compagnia a tenore delle passate; Si sommano scu. 10000. di Pompeo con scu. 6000. di Quilico, fanno sc. 16000. de' quali ne toccano, secondo i patti, sc. 8000. per uno; Sicchè Pompeo dà sc. 2000. à Quilico per la persona, che rispetto à sc. 10000. di Pompeo, sono la quinta parte; Onde tal parte è tenuto à dare del guadagno Pompeo à Quilico. Soprammetta poi quantificandi si vogliono, stando al patto fatto. Adesso si moltiplicano sc. 10000. per mesi 18. fanno 180000. e fondi 4000. aggiunti per mesi 10. fanno sc. 40000. che sommati con li 180000. fanno 220000. per il composto di denaro, e di tempo di Pompeo. Si moltiplicano sc. 6000. per mesi 18. fanno 108000. per il composto di Quilico; Sommati questi due composti fanno 328000. Però si dica, per regola del Trè:  $80328000$ , danno libbre 1000. che ne daranno 220000? e verranno libbre 670  $\frac{2}{3}$ . e che daranno 108000. e verranno lib. 329  $\frac{2}{3}$ . Adesso da libbre 670  $\frac{2}{3}$ . si levi la quinta parte, che è di lib. 134  $\frac{2}{3}$ . e si sommi con lib. 329  $\frac{2}{3}$ . restaranno lib. 536  $\frac{2}{3}$  per Pompeo, e verranno lib. 436  $\frac{2}{3}$  per Quilico.

Pom.

Pompeo 10000

Quilico 6000

10000 — 18 — 180000

4000 — 10 — 40000

Per 2 16000

220:000

8000

Sottra 6000

6000 — 18 — 108:000

2000

10000

schif.  $\frac{5}{7}$ 

328:000

328 — libbre 1000

220? lib. 670  $\frac{1}{4}$ 108? lib. 329  $\frac{1}{4}$ lib. 329  $\frac{1}{4}$ Per 5 / lib. 670  $\frac{1}{4}$ 134  $\frac{1}{4}$ 134  $\frac{1}{4}$ Quad. di Pompeo lib. 536  $\frac{2}{3}$ lib. 463  $\frac{1}{3}$  di Quilico

In altro modo si opera: Trovato il composto di 220000. di Pompeo, e di 108000. di Quilico, la somma 328000. della quale se ne piglia  $\frac{5}{7}$ . (perchè dovendo Pompeo dare  $\frac{5}{7}$  del guadagno a Quilico, per formarli il composto Capitale, si leva 1. dal 5. e resta  $\frac{5}{7}$ . come si è detto nel fine della 46. di questo,) che è 82000. il quale aggiunto a 108000. composto di Quilico, sono 190000. Adesso si faccia semplice compagnia: Pompeo ha di composto 220000. e Quilico 190000. e devono partire libbre 1000. quante n'averà ciascuno; ed operato verranno come sopra libbre 536  $\frac{2}{3}$ . per Pompeo, e lib. 463  $\frac{1}{3}$ . per Quilico.

20000 mesi 18 — 180000

4000 mesi 10 — 40000

Comp. di Pompeo 220000

6000 — 18 — 108000 Pomp. 220:000

Quil. 190:000

220? 536  $\frac{2}{3}$ 

Per 4 328000

Se 416:000 — lib. 1000 —

190? 463  $\frac{1}{3}$ 

82000

108000

lib. 1000

Comp. di Quilico 190000.

Qui voglio avvertire di dove nasce la differenza della soluzione del Zucchetto, e Pisani; Questi nel trovare la stima della persona per gli Sc. 4000. aggiunti da Pompeo, hanno fatto la regola del Tre: Se Sc. 10000. fanno la stima della persona di Sc. 4000. di quanti la fa-



la faranno scudi 4000. aggiunti? e la faranno di scudi 1600. e non deve essere che di scudi 1600. perchè nel primo luogo della regola del Trè ci vanno sc. 16000. e non 10000. cioè ci vanno li scudi di Pompeo, e di Quilico insi eme, rispetto a negoziare i quali; viene stimata la persona sc. 4000. ed allora operando verranno sc. 10000. che moltiplicati per mesi 10. fanno 100000. d'aggiungerli a 180000. composto di Quilico, ed allora il suo composto fara come sopra di 190000. e di Pompeo 220000. S'offervi il tutto nella disposizione de' numeri fatta dal Pisani.

Pompeo  $\left( \begin{array}{l} 10000 - \text{mesi } 18 - 180:000 \\ 4000 - \text{mesi } 10 - 40:000 \end{array} \right) 220. \text{ lib. } 528 \frac{2}{3}.$   
lib. 1000

Quilico  $\left( \begin{array}{l} 6000 \\ 4000 \end{array} \right) \text{mesi } 18 - 180:000$   
 $\left( \begin{array}{l} 1600 - \text{mesi } 10 - 16:000 \end{array} \right) 196. \text{ lib. } 471 \frac{1}{3}$

10000 — 4000 — 4000	416 — 1000 — 220? lib. 528 $\frac{2}{3}$
4000	
1600   6000	416 — 1000 — 196? lib. 471 $\frac{1}{3}$

Lib. 1000

48. D. Due fanno compagnia: Il primo pone sc. 1200. Il secondo scu. 800. e la persona con patto, che duri un' anno, & al fine si parta il guadagno per metà; Avviene, che andando bene il Negoziò, li primo dopo mesi 8. sopramette scu. 600. e finito l'anno trovarono di guadagno scudi 462. Si domanda la parte di ciascuno?

R. Non è diffimile dalla passata. Però somma sc. 1200. del primo con scudi 800. del secondo; la somma 2000. partita per metà è 1000. per ciascuno, da 1000. levati 800. restano 200. che di 1200. del primo sono la sesta parte; che dà il primo al secondo per la persona; Si moltiplicano sc. 1200. per Anuo 1. fanno 1200. e 600. per  $\frac{8}{12}$  d'anno, fanno 200. che congiunti con 1200. sono 1400. composto del primo; Dipoi sc. 800. del secondo moltiplicati per Anno 1. vengono 800. composto del secondo: Adesso per regola del Trè; Se la somma di questi due composti cioè 2200. guadagnano 462. che 1400. del primo? e vengono sc. 294. che scu. 800. del secondo? e vengono sc. 168. a questi si aggiunga la sesta parte di 294. del primo, cioè 49. faranno sc. 217. per il secondo e per il primo faranno restati sc. 245.

M m m

Del

Del pr. Sc. 1200  
 Del sec. Sc. 800

Primo Sc. 1200 — An. 1 — 1200  
 Sc. 600 —  $\frac{1}{2}$  — 200

Composto del primo 1400

Secun. Sc. 800 — An. 1 — 800

Composto del secondo 2200  
 Sc. 2200 — Sc. 462 — 1400? sc. 194  
 — 800? sc. 168  
 per 6 — Sc. 294 — Sc. 168 — 49

Guadag. del pr. Sc. 245 • Sc. 217 del secondo.

49. D. Si può in altro modo operare?  
 R. Certo; si moltiplicano come prima sc. 1200. per anno 1. fanno 1200. e sc. 600. per  $\frac{1}{2}$  d'anno  $\frac{1}{2}$  fanno 200. sommati con 1200, sono 1400. composto del primo. Adesso si moltiplicano 800. per anno 1. fanno 800. In Capitale la persona del secondo viene stimato sc. 400. perchè ponendo il primo 1200. tanti ne dovrebbe mettere il secondo per tirare la metà, e ne mette 800. in denaro;

Der primo Sc. 1200 — An. 1 — 1200 — 2640 — 462 — 1400  
 Sc. 600 —  $\frac{1}{2}$  — 200 — 64680

Composto del primo 1400 Del primo 1188  
 Sc. 245 — 1320  
 Sc. 800 — An. 1 — 800  
 Sti della pe. Sc. 400 — 1 — 400  
 Sc. 120 —  $\frac{1}{2}$  — 40 — 2640 — 462 — 1240

Composto del secondo 1240 1848  
 1400 Del secon. 5544  
 2640 Sc. 217. —  
 Se sc. 2000 — 400 — 600? — 120 57288  
 448  
 1848

Dunque la persona viene stimata 400. Ora per regola del Tre si dica : Se sc. 2000. del primo, e secondo, da trafficarsi fanno la stima di sc. 400. per la persona, di quanti feudi la faranno feudi 600. sopra messi? e la faranno di sc. 120. li quali si moltiplicano per

per  $\frac{1}{2}$  d'anno, vengono 40. che si sommano con 1200. fanno 1240. composto del secondo, e del primo sono 1400. che sommati fanno 2640. Però dicasi: Se 2640. danno di guadagno scu. 462. che ne daranno sc. 1400. del primo? che 1240. del secondo? e verranno sc. 245. e sc. 217. come per l'altro modo.

50. D. Sono otto Lavoranti, che stando in una Bottega conservano per un'anno alcuni Avanzi fatti di Mancie, ed altro: Accadde, che il primo si partì dopo 4. mesi, due stettero 6. mesi, due altri 10. mesi, e tre altri tutto il tempo, cioè mesi 12. e trovarono avere avanzato scu. 56. Si domanda la ripartizione a ciascuno?

R. Il Ciacchi a parte 169. somma mesi 4. del primo, mesi 6. del secondo, mesi 6. del terzo, 10. del quarto, 10. del quinto, e tre volte 12. per il sesto, settimo, ed ottavo; sono mesi 72. onde per regola del Trè dice: Se in mesi 72. si sono guadagnati sc. 56. quanto si guadagnerà in mesi 4. del primo? in mesi 6. del secondo &c. operando secondo la regola delle compagnie, si troverà che al primo toccheranno sc. 3. 2.  $2\frac{2}{3}$ . al secondo sc. 4. 13. 4. così al terzo, al quarto sc. 7. 15.  $6\frac{2}{3}$ . così al quinto; finalmente per ciascuno degli altri tre sc. 9. 6. 8.

Il quesito sarebbe sciolto bene se li scudi 56. fossero di Mancie di mesi 72. ma essendo li mesi 12. la soluzione è falsa. Prima dunque si deve fare la ripartizione del tempo, nel quale si fa il guadagno per ciascuno compagno secondo che ha comunicato con gli altri: E perchè il primo Lavorante stando con altri sette, mesi 4. viene a toccargli la ripartizione di sc. 56. di mesi 12. per mezzo mese, che sono sc. 2. 6. 8. Il secondo, e terzo con altri cinque stando mesi 2. e così ciascuno sta  $\frac{2}{3}$ . di mese, che col mezzo mese di prima sono  $\frac{2}{3}$  di mese, e gli si deve a ciascuno sc. 3. 13. 4. Il quarto, e quinto con gl'altri tre, stando mesi 4. sta ciascuno  $\frac{4}{6}$  di mese, che con mezzo mese, e  $\frac{2}{3}$  di mese è mese  $1\frac{2}{3}$ . per ciascuno di questi, e gli si deve sc. 7. 8. finalmente stando gl'ultimi tre mesi 2. a finire l'anno, ciascuno sta  $\frac{2}{3}$  di mese, che con l'antecedente tempo sta mesi  $2\frac{2}{3}$  e gli si deve la ripartizione di sc. 10. 10. 2  $\frac{2}{3}$ . che è più d'uno scudo, che per il modo del Ciacchi. Ora se si sommerà il tempo di tutti, si troverà essere di mesi 12. si come il denaro di tutti essere sc. 56. appunto.

Prima dunque si deve fare la ripartizione del tempo statuito per ciascun Compagno, e poi si deve procedere alla ripartizione del denaro; Per il che qui si deve dire: Se in mesi 12. sono guadagnati sc. 56. in un mezzo mese del primo, in  $\frac{2}{3}$  di mese del secondo &c. quanti faranno guadagnati? ed operando secondo la

regola, verranno quelli scudi per ciascuno, che hò detto. Nel medesimo modo si deve operare nel quesito 21. à car. 273. del medesimo Ciacehi, come mostrerò nelle Pigionì. Pure nel quesito 16. à car. 168. dovèdo partecipare il primo per mesi  $1\frac{1}{2}$ . il sec. per mesi  $3\frac{1}{2}$ . ed il terzo per mesi  $7\frac{1}{2}$  di sc. 850. guadagnati in un'anno; ed allora potrebbe partecipare il primo per mesi 4. il secondo per mesi 8. ed il terzo per mesi 12. quando fussero stati anni 2. in compagnia.

52. D. Uno si mette a far Bottega di diverse Merci adì primo Genaro 1549. e con Duc. 300. e dopo 6. mesi, che sarà al primo di Luglio venne un suo Compare, e disse: Se mi volete accettare con voi in compagnia, io pònerò Duc. 500. alla rata del guadagno e costui l' accettò; ed in capo di due anni, che fù al fine di Dècembre 1550. si trovano di guadagno Duc. 260. Si domanda, che tocca per ciascheduno?

R. Questa è la 58. à carte 142. del Tartaglia, il quale moltiplica Ducati 300. del primo via mesi 24. che stettero in Compagnia, fanno 7200. composto di Ducati, e mesi del primo, moltiplica anche Duc. 500. del secondo via mesi 18. che stettero nella compagnia, fanno 9000. composto di Ducati, e mesi del secondo, si sommano 7200. e 9000. fanno 16200. ora per regola del Trè: Se 16200. guadagna Duc. 260. che guadagnerà 7200. del primo? e 9000. del secondo? onde troverai che al primo toccheranno Duc.  $115\frac{1}{2}$ . ed al secondo Duc.  $144\frac{1}{2}$ . e se ne farai la prova, la troverai essere buona.

Il Tartaglia in questa, ed altre hà seguitato Fr. Luca, e questi sono stati seguitati da tutti gli altri, che hanno proposto simili compagnie; e frà gli altri del Celebre Forestani &c. Io però hò motivo di partirmi dalla loro opinione; Perchè mi pare, per quello che hò detto nella passata, che prima si deve fare trà Compagni la ripartizione del tempo. Si avverta dunque, che il primo stà solo mesi 6. e con un altro mesi 18. gli competono di quelli mesi 9. e altri mesi 9. al secondo; Per il che sommati mesi 6. e mesi 9. fanno mesi 15. del primo, li quali si moltiplicano per Duc. 300. viene 4500. composto del primo; Pure si moltiplicano Ducati 500. per mesi 9. spettanti al secondo, fanno 4500. composto di esso, e perchè i composti sono uguali, ancora il guadagno deve essere uguale; Per il che di Duc. 260. ne toccheranno Duc. 130. à ciascuno; e non Duc.  $115\frac{1}{2}$ . al primo, e Duc.  $144\frac{1}{2}$ . al secondo, come hà conchiuso il Tartaglia soggiungendo, che facendone prova si troverà buona; cioè stimo, che sommando  $115\frac{1}{2}$ . con  $144\frac{1}{2}$ . fanno Ducati 260. mà qui si è proposto quello, che ha detto

detto nella 45. cioè, non sempre la semplice somma, approva tutta la sostanza della ragione, ma molte fiate ti approva solamente il puro operare, come succede in questa.

52. D. Uno si mette a fare Bottega a di primo di Gennaio 1549. con Duc. 160. ed al primo Marzo vende un suo Amico, e mette Duc. 200. alla rata del guadagno. Medesimamente al primo di Giugno un altro Amico d'ambidue pose nella compagnia Duc. 380. alla rata del guadagno. Quando fu in capo dell' Anno; cioè all' ultimo di Dicembre si trovano di guadagno in tutto Duc. 200. Domando, che tocca per uno?

R. Questa è la 59. parte del Tartaglia, il quale à modo della passata moltiplica Duc. 160. via mesi 12. fanno 1920. composto, e per Capitale del primo; moltiplica ancora Duc. 220. del secondo via mesi 10. fanno 2200. composto, e per Capitale del secondo; finalmente moltiplica Ducati 380. via mesi 7. fanno 2660. composto, e per Capitale del terzo. Poi somma 1920. 2200. e 2660. fanno 6780. onde dico; Se 6780. tempo, e denari, guadagnano Duc. 200. che guadagnerà 1920. del primo? 2200. del secondo? e 2660. del terzo? e trova Duc.  $56 \frac{4}{3}$  per il primo, Duc.  $64 \frac{2}{3}$  per il secondo, e Duc.  $78 \frac{2}{3}$  per il terzo; e dice, che se si proverà si troverà buona; nella passata con le sue parole ho avvertito in che consista la prova, che dimostra giusto il puro operare &c.

Volendo rettamente risolvere la compagnia, prima si riparta à tre Compagni il tempo di mesi 12. che dura il consorzio. Il primo stà mesi 2. solo, stà mese  $\frac{1}{2}$  di sua parte col secondo, e stà mesi  $2 \frac{1}{2}$  di sua parte con gl'altri due, che sono in tutto mesi  $5 \frac{1}{2}$ . appartenenti al primo. Il secondo Compagno stà mesi  $1 \frac{1}{2}$  di sua parte col primo, e mesi  $2 \frac{1}{2}$  di sua parte con tutti due; che sono in tutto mesi  $3 \frac{1}{2}$  appartenenti al secondo. Il terzo Compagno poi stà mesi  $2 \frac{1}{2}$  di sua parte con gl'altri due. Fatta la ripartitione del tempo, si moltiplicano Duc. 160. del primo via mesi  $5 \frac{1}{2}$ . fanno 933  $\frac{1}{2}$ . composto del primo. Si moltiplicano Duc. 220. via mesi  $3 \frac{1}{2}$ . fanno 843  $\frac{1}{2}$ . composto del secondo; e finalmente si moltiplicano Duc. 380. via mesi  $2 \frac{1}{2}$ . fanno 886  $\frac{1}{2}$ . composto del terzo; Si sommano i composti 933  $\frac{1}{2}$ . 843  $\frac{1}{2}$ . e 886  $\frac{1}{2}$ . fanno 2663  $\frac{1}{2}$ . per il che si dice: Se 2663  $\frac{1}{2}$  guadagnano Duc. 200. che guadagneranno 933  $\frac{1}{2}$  del primo; 843  $\frac{1}{2}$  del secondo; e 886  $\frac{1}{2}$  del terzo? e verranno per il primo Duc.  $70 \frac{1}{2}$  per il secondo Duc.  $63 \frac{1}{2}$ . e per il terzo Duc.  $66 \frac{1}{2}$ . li quali sommati rendono Duc. 200. siccome i mesi ripartiti fanno mesi 12. che dura la Compagnia.

53. D. Due fanno compagnia per un'anno. Il Primo mette il primo di Sc. 50. ed il secondo in capo di 3. mesi Sc. 80. ed in capo del tempo hanno guadagnato Sc. 70. Domando, che toccherà per uno?

R. Questa è la 22. del lib. 7. di Francesco Galigai, il quale usa l'altro modo d'operare per via di merito; tuttavia, perchè non riparte il tempo d'un'anno, ma suppone, che il primo stia mesi 3. 15. ed il secondo mesi 9, come gl' altri Autori, conchiude, che il primo averà Sc. 31. 16. 4.  $\frac{1}{2}$  ed il secondo Sc. 38. 3. 7.  $\frac{1}{2}$ . Ma ripartendo il tempo; il primo di sua parte ha mesi 7.  $\frac{1}{2}$ . il secondo 14.  $\frac{1}{2}$ . Si moltiplichino 7.  $\frac{1}{2}$  via Sc. 50. fanno 375. composto del primo. Si moltiplichino ancora 14.  $\frac{1}{2}$  via Sc. 80. fanno 360. composto del secondo. Si sommino 375. e 360. fanno 735. e si dica: Se 735. guadagnano Scu. 70. che guadagneranno 375. del primo? 360. del secondo? e verranno per il primo Sc. 35.  $\frac{1}{2}$ . e per il secondo Sc. 34.  $\frac{1}{2}$ . Se il Galigai avesse operato per il suo modo secondo la detta divisione di tempo, avrebbe trovato questi medesimi guadagni. La 23. e 24. seguenti compagnie hanno il medesimo maneggio.

54. D. Un'altro si mette a far bottega il primo Gennaio con Sc. 800. e viene poi un suo Compare, e mette in compagnia Sc. 1200. dopo tal tempo, che precisamente in capo dell'anno li tocca la metà del guadagno. Si domanda dopo qual tempo mette Sc. 1200?

R. Questa è la 60. del Tartaglio, il quale moltiplica 800. via mesi 12. il prodotto 9600. parte per 1200. e ne viene 8. e così 8. mesi avanti il fine dell'anno dovrà mettere Sc. 1200. che farà il primo di Maggio per avere la metà del guadagno. Così agli facendo che d'un'anno appartengano mesi 12. al primo, mesi 8. al secondo; Ma per sciogliere giustamente il quesito, giusta si faccia la ripartizione del tempo. Si sommino Sc. 800. e Sc. 1200. la somma 2000. però si dica: Se 2000. richiedon mesi 12. che Scu. di 1200. che Scu. 800? e verranno mesi 7.  $\frac{1}{2}$ . e mesi 4.  $\frac{1}{2}$ . questi si sottriso da quelli, cioè 4.  $\frac{1}{2}$ . da 7.  $\frac{1}{2}$ . restano mesi 2.  $\frac{1}{2}$ . dopo i quali dal primo Gennaio dovrà il Compare mettere Sc. 1200. per tirare la metà del guadagno, che verrebbe dopo il dì 12. di Marzo. La prova è questa; Moltiplica mesi 7.  $\frac{1}{2}$ . che sta di sua parte il primo via i suoi Sc. 800. fanno di composto 5750. Ancora moltiplica mesi 4.  $\frac{1}{2}$ . che sta di sua parte il secondo via 1200. fanno composto uguale, cioè 5760. e conseguentemente uguale porzione devono avere di guadagno.

55. D. Un' altro similmente si mette a fare Bottega con lin. 800. il primo di Gennaio, e dopo 3. mesi venne un suo Amico, e messe tante

tante lire, che incapa all'anno gli si dovevula metà del guadagno. Si domanda quante lire furono?

R. Questa è 67, del medesimo Tartaglia posta più succinta; il quale moltiplica lire 800 del primo per mesi 12, il prodotto 9600, lo parte per mesi 9, e ne verranno lire 1066.  $\frac{2}{3}$ , e tante lire dovrà mettere, dovendo partire il guadagno per metà.

Per sciorire il quesito a dovere, si sottrino mesi 3. da mesi 12. restano mesi 9. li quali distribuiti in due, sono mesi 4  $\frac{1}{2}$ . Per ciascuno, e per il primo aggiunti mesi 3. che stette solo, a 4  $\frac{1}{2}$ . sono mesi 7  $\frac{1}{2}$ . li quali si moltiplicano per lire 800. fanno 6000 che si partono per mesi 4  $\frac{1}{2}$  del secondo, vengono lire 1333  $\frac{1}{3}$ . poste dal secondo dopo tre mesi 9. per dovere aver la metà del guadagno al fine dell'anno. Si provi con moltiplicare 800. per 12. si e 9600  $\frac{2}{3}$ . per 4  $\frac{1}{2}$  ne verrà 6000. composto per l'uno, e per l'altro, Onde uguale viene la ripartizione di qualsiasi guadagno.

56. D. Uno si mette a fare Bottega il primo di Gennaio con 6000. Il primo Marzo entrò un altro. Il primo Maggio un altro sed il primo Settembre un altro, con tali quantità di Scudi, che al fine dell'Anno partecipò ciascuno del guadagno ugualmente. Si domanda quanti Scudi messe ciascuno delli tre Compagni aggiunti?

R. Questa è in breve la 62. del Tartaglia, il quale moltiplica Scudi 600. per mesi 12. fanno 7200. composto del primo, quale parte per mesi 10. che sta il secondo, e vengono Sc. 720 che mette; Similmente parte 2400. per mesi 8. che sta il terzo, e vengono Sc. 300. che mette; Finalmente parte parte 400. per mesi 4. che sta il quarto in compagnia, e vengono Sc. 600. che mette il quarto. Per giustamente soddisfare alla domanda, si distribuisca il tempo d'un'anno, il primo sta mesi 20 solo mesi 10 di sua parte col secondo; mesi 10  $\frac{1}{2}$  col terzo, e secondo, e mesi 10. col quarto, ed altri in tutto mesi 50. Il secondo sta mesi 10. di sua parte col primo, mese 10  $\frac{1}{2}$  col terzo, e primo, e mesi 10. col quarto, ed altri in tutto il secondo, mesi 30  $\frac{1}{2}$ . Il terzo sta mesi 10  $\frac{1}{2}$  di sua parte col primo, e secondo, e mese 10. con tutti gli altri, in tutto il terzo mesi 20  $\frac{1}{2}$ . Finalmente il quarto sta mesi 10. di sua parte con tutti altri. Adesso si moltiplicano Sc. 2000. del primo per mesi 5  $\frac{1}{2}$  fa 1066  $\frac{1}{2}$  il quale si parte per mesi 3  $\frac{1}{2}$  del secondo, vengono Sc. 320. che mette; 1066  $\frac{1}{2}$  si parte per mesi 2  $\frac{1}{2}$  del terzo, vengono Sc. 427  $\frac{1}{2}$  che mette; ed il quarto mette Sc. 1066  $\frac{1}{2}$ . perchè a partire per mese 1. viene l'istesso numero, che si parte. Quanto queste partite siano differenti da quelle del Tartaglia chiaramente si conoscep.

Quintila

58. D.

577. D. Un' altro si mette à fare Botteggi con Ducati 30, il primo di Marzo, il primo di Giugno accettò un' altro, & un' altro il primo Settembre; al fine dell'anno questo terzo ebbe il quarto del guadagno, che toccò al primo; siccome il secondo il terzo del guadagno del primo. Si domanda quanti Scudi pose ciascuno di questi due in compagnia?

R. Questa è la 63. del Tartaglia, il quale moltiplica Duc. 30. per mesi 12. del prodotto 360. piglia il terzo cioè 120. quale parte per mesi 9. del secondo, ne vengono Duc. 13  $\frac{1}{3}$ . che messe il secondo; Pure piglia il quarto di 360. cioè 90. quale parte per mesi 6. del terzo, ne vengono Duc. 15. che messe il terzo.

Mà facendosi il ripartimento del tempo d' un' Anno si troverà che il primo stette mesi 6.  $\frac{1}{2}$ . il secondo mesi 3.  $\frac{1}{2}$ . ed il terzo mesi 2. di sua parte; Onde si moltiplica Duc. 30. per mesi 6  $\frac{1}{2}$ . viene 195. composto di denaro, e tempo del primo; del quale si piglia il terzo, cioè 65. composto del secondo, il quale si parte per mesi 3  $\frac{1}{2}$ . e vengono Duc. 18  $\frac{1}{2}$  messi dal secondo; di 195. si piglia il quarto, cioè 48  $\frac{3}{4}$  composto del terzo, il quale si parte per mesi 2. vengono Duc. 24  $\frac{1}{2}$  messi dal terzo. Ecco dunque che il secondo messe Duc. 18  $\frac{1}{2}$ . ed il terzo Duc. 24  $\frac{1}{2}$ . e se si farà prova con partirne fra essi qualche guadagno, troverassi il secondo avere il terzo, ed il terzo il quarto di quanto avrà avuto il primo.

Troppo ci vorrebbe ad emendare le Compagnie di questa sorte del Tartaglia, come la 64. la 65. la 67. e la 68. la 69. e la 73. e molto più à correggere quelle di tutti gl' altri Autori; Mà perchè ciascuno possa farlo da sè, basta saper trovare il vero tempo, che ciascun Compagno stia nella compagnia, ed operare con quello, come altri operano col tempo non giusto; Onde dicendo, che tre sono stati in compagnia un' anno, il primo mesi 12. cioè tutto il tempo, il secondo mesi 10. ed il terzo mesi 6. Per trovare quanto tempo ciascuno sia stato in vero di sua parte in un' anno; Si sottrino da mesi 12. del Primo, mesi 10. del secondo, restano mesi 2. del primo che è stato solo; Si sottrino da mesi 10. del secondo, mesi 6. del terzo, restano mesi 4. che il secondo è stato col primo; sicchè si devono mesi 2. per uno; adunque s'ha adesso il primo è stato mesi 4. il secondo mesi 2. li mesi 6. del terzo, che è stato con gl' altri due, si partono per 3. ne vengono mesi 2. per ciascuno: sicchè il primo è stato in compagnia mesi 6. il secondo mesi 4. il terzo mesi 2. di sua parte in un' anno. Si poteva cominciare dall'ultimo, partendo mesi 6. per 3. venivano mesi 2. per ciascuno de' tre, i mesi 4. sino à 10. partendo per 2. venivano mesi 2. per il secondo, e primo; e mesi 2. da 10. sino à 12. appartengono al primo



al primo, che solo negozia, e traffica. Dunque appartengono al primo mesi 6. al secondo mesi 4. ed al terzo mesi 2. come si è detto. Si avverta però, che quando nella Compagnia non si determina tempo d'un anno, o d'altro minor tempo, allora quei mesi, che si assegnano a ciascuno nella compagnia si possono verificare nella somma di quei mesi, ne quali si supponga durare la compagnia, ed operando con tal numero di mesi, la compagnia sarà bene risolta; come è la 29. di questo. Dove il primo è stato mesi 8. il secondo mesi 12. si suppone, la compagnia duri mesi 20. e che il primo stia mesi 4. solo, e mesi 16. col secondo, de' quali appartengono mesi 8. per ciascuno. Medesimamente la 30. compagnia si suppone duri mesi 21. giorni 18. e che il primo stia mesi 2. giorni 12. solo; ed il resto del tempo con il compagno. Pure la 31. Compagnia si suppone duri mesi 37. e che il primo traffichi solo mesi 3. col secondo mesi 4. col secondo, e terzo mesi 30. Avvertasi di più, che si può operare con il numero de' mesi, che si dicono nella compagnia senza dipartimento, quando i compagni stanno tutti il medesimo tempo, benchè varino capitale, come si può osservare nella 32. di questo; essendosi operato con i mesi ivi posti senza dipartimento: perchè fanno l'istesso effetto.

58. D. Uno alloga una Casa a pigione per un' anno per Duc. 240. da cominciare il dì primo Gennaio, ed il dì 1. di Maggio venne un' altro a stare in compagnia col primo in detta Casa, offerendo voler pagare per rata del tempo, che vi starà; ed adì primo di Settembre venne un' altro a stare in detta Casa in compagnia de' due primi, proponendo voler pagare per rata del tempo, che vi starà. Ora essendo finito l'anno, si domanda quanto toccherà pagare a ciascuno?

R. Questa è la proposizione 50. del lib. terzo di Fr. Lorenzo Forestani fra le compagnie, la quale qui metto, acciò evidentemente si conosca lo svario, che ne viene dal non fare lo spartimento del tempo. Tu vedi, dice il Forestani, che il primo stia nella Casa 12. mesi, il secondo 8. mesi; ed il terzo 4. mesi ed hanno a pagare Duc. 240. opera per modum societatis, averai, che il primo pagherà Ducati 120. il secondo Duc. 80. ed il terzo Ducati 40.

Perchè la pigione è d'un' anno; di questo si faccia prima lo spartimento. Il primo sta solo mesi 4. sta col secondo, mesi 4. che di sua parte sono mesi 2. sta col secondo, e terzo mesi 4. che di sua parte è mese 1.  $\frac{2}{3}$ . In tutto l'anno mesi  $7\frac{2}{3}$ . il secondo mesi  $3\frac{1}{3}$  ed il terzo mese  $1\frac{1}{3}$ . Adesso a modo di compagnia: Se di mesi 12. la pigione importa Duc. 240. quanti di mesi  $7\frac{2}{3}$   $3\frac{1}{3}$   $1\frac{1}{3}$  e ver-

N n n

ran-

ranno Ducati 146  $\frac{2}{3}$ . da pagarsi dal primo. Duc. 66  $\frac{2}{3}$  dal Secondo, e Duc. 26  $\frac{2}{3}$  dal terzo; e si prova chiaramente, perchè stando il primo mesi 4. solo deve pagare Duc. 80. terzo della pigione, stando mesi 2. di sua parte col secondo deve pagare Duc. 40. e Duc. 40. il sec. per altri due mesi di sua parte, e stando in tre mesi 4. ciascuno deve pagare per mese 1  $\frac{2}{3}$  di sua parte  $\frac{2}{3}$  di Duc. 80. cioè Duc. 26  $\frac{2}{3}$ . Sicchè sommando Duc. 80. 40. e 26  $\frac{2}{3}$ . il primo deve pagare Duc. 146  $\frac{2}{3}$ . e sommando Duc. 40. e 26  $\frac{2}{3}$ . il secondo deve pagare Duc. 66  $\frac{2}{3}$ . ed il terzo Duc. 26  $\frac{2}{3}$ . che in tutto fanno Duc. 240. pigione d'un'anno.

Offervasi qui, che il primo a non fare il partimento del tempo giusto, viene meno, aggravato nel pagamento, perchè il Forestani disse dovere pagare Duc. 120. e ne deve pagare Duc. 146  $\frac{2}{3}$ . e gl'altri meno. Al contrario poi nelle compagnie il primo, che è stato solo, partecipa meno del guadagno, non facendosi il partimento giusto del tempo, e gl'altri più: come succede nella 42. 43. 44. 45. e 49. proposizione, e poi nella 51. e 53. le quali tutte devono aggiustare con la vera distribuzione di tempo. Il che si disse ancora di quelle del Tartaglia, alcune delle quali si emendarono.

59. D. Lavinio, Ricciardo, e Savino compositero denari in negozio; Cioè Lavinio lire 5000. Ricciardo lire 7000. e Savino lire 8000. con patto di negoziargli 9. anni, e poi partire l'utile tra loro ugualmente per terzo. Avvenne, che in fine d'anni 5. finirono il negozio con utile di lire 6800. Domando come si deve fare il partimento.

R. Questa è di Gio. Battista Zucchetto 3 car. 102. la quale più brevemente, e chiaramente risolvo così: Si sommino lir. 5000. lire 7000. e lir. 8000. fanno lir. 2000. le quali partite per 3. vengono lir. 666  $\frac{2}{3}$ . da mettersi da ciascuno per partecipare ugualmente: ma Lavinio avendo posto solo lir. 5000. gl'altri due, che mennero più si contenteranno di cederli del loro Capitale, cioè Ricciardo lir. 333  $\frac{1}{3}$  e Savino lir. 1333  $\frac{1}{3}$ . che così ciascuno viene a porre lire 666  $\frac{2}{3}$ . In ordine al negozio da durare 9. anni; essendo però durato anni 5. si dice per regola del Tre: Se per anni 9. Ricciardo dà lir. 333  $\frac{1}{3}$ . quante ne darà per anni 5. ed operato verranno, lir. 185  $\frac{1}{3}$ . le quali sottratte da lir. 7000. di Ricciardo, restano di suo Capitale lir. 6814  $\frac{2}{3}$ . Medesimamente, se per an. 9. Savino dà lir. 1333  $\frac{1}{3}$ . quante per an. 5. e verranno lir. 740  $\frac{2}{3}$ . le quali sottratte da lir. 8000. restano per Capitale di Savino lir. 7259  $\frac{1}{3}$ . e aggiungano adesso lir. 185  $\frac{1}{3}$ . e lire 740  $\frac{2}{3}$ . a lir. 5000. vengono lir. 5925  $\frac{2}{3}$  di capitale per Lavinio.

Adesso

Adesso si operi per compagnia ordinaria, dicendo per regola del Tre: Se a lir. 20000. si devono lir. 6800. di utile, quante lire si doveranno a lir. 5925  $\frac{1}{2}$  di Lavinio? ed operato verranno lire 2014  $\frac{1}{2}$ . Di nuovo, se a lir. 20000. si devono lir. 6800. quante a lire 6814  $\frac{1}{2}$  Capitale di Ricciardo? e verranno lir. 2317  $\frac{1}{2}$ . e finalmente, se a lir. 20000. si devono lir. 6800. quante a lire 7259  $\frac{1}{2}$  Capitale di Savino? e verranno lir. 2468  $\frac{1}{2}$ . e così è fatta la partizione.

In altro modo lir. 333  $\frac{1}{2}$  sono  $\frac{1}{5}$  di lir. 7000. di Ricciardo, e lire 1333  $\frac{1}{2}$  sono  $\frac{2}{5}$  di lir. 8000. di Savino; sicchè in 9. anni Ricciardo deve dare  $\frac{1}{5}$  a Savino  $\frac{2}{5}$  a Lavinio del guadagno. Ora per regola del Tre: Se in an. 9. Ricciardo dà  $\frac{1}{5}$ , in an. 5. che gli deve dare? e verrà  $\frac{1}{25}$ . e se Savino in an. 9. dà  $\frac{2}{5}$ , in an. 5. darà  $\frac{2}{25}$ . Si faccia adesso la Compagnia senza alterare i Capitali, dicendo: Se lir. 20000. guadagnano lir. 6800. che lir. 5000? che lir. 7000? che lir. 8000? e verranno lir. 1700. per Lavinio. lir. 2380. per Ricciardo, e lir. 2720. per Savino. Da lir. 2380. di Ricciardo si levino li  $\frac{1}{25}$  che sono lir. 62  $\frac{1}{25}$ , resteranno per esso lir. 2317  $\frac{1}{2}$ . Da lir. 2720. di Savino si levino li  $\frac{2}{25}$  che sono 251  $\frac{2}{25}$ , resteranno per Savino lir. 2468  $\frac{1}{2}$ , ed aggiunte queste parti levate, cioè, lir. 62  $\frac{1}{25}$ . e lire 251  $\frac{2}{25}$  a lire 1700. di Lavinio, vengono per esso lire 2014  $\frac{1}{2}$ . come per l'altro modo.

60. D. Flavio, e Giulio fecero compagnia, con mettere Sc. 100. tra tutti due, ed alla fine partirono il guadagno. Flavio, che messe maggior Capitale moltiplicò il suo guadagno per il guadagno di Giulio; e trovò, che il numero prodotto era 6. volte tutto il guadagno. Si domanda con questa notizia il guadagno, e Capitale di ciascuno?

R. Per regola generale s'aggiunge 2. al 6. che sono le volte, che il prodotto è tutto il guadagno; fa 8. per li Scudi di minore guadagno di Giulio; quale 8. si moltiplica per 3. metà dell'istesso 6. pure per regola generale fa 24 per li Scudi del maggiore guadagno, appartenenti a Flavio. Si sommi 8. con 24. fa 32. E se 32. vuole di Capitale 100. che vorrà 24? che 8? e verrà 75. Capitale di Flavio e 25. Capitale di Giulio.

Se ne faccia prova con moltiplicare 24. per 8. fa 192. che è 6. volte 32. perchè partendo 192. per 6. viene 32. che è tutto il guadagno, questa è simile alla proposizione 52. del libro terzo del Forestani, e risolta secondo il suo modo.

Tuttavia può avere diverse, e innumerabili soluzioni secondo il diverso numero, che si piglia d'aggiungere: Essò Forestani piglia il 2. ma si può pigliare qualsiasi numero, anche l'unità. E così la

Non è

regola

regola sarà più universale, la quale si ha dall' Algebra, e per chi l'intende qui pongo. Sia il numero del maggiore guadagno 1. cosa; l'altro sia un numero maggiore del Denominatore della proporzione; qui del numero 6. (e certo sarà maggiore ogni qualvolta s'aggiunge 1. ò qualsiasi numero, come si è detto, al medesimo 6.) per esempio sia 10. la somma è 1. cosa più 10. ed il prodotto di 1. cosa via 10. e 10. cose; E perchè il prodotto è 6. volte la somma, come si è detto, 10. cose sono 6. volte più di 1. cosa più 10. 1. cosa più 10. si moltiplichi per 6. verranno 6. cose più 60. uguali a 10. cose si levino 6. cose dalle parti, saranno 4. cose uguali a 60. questo si parte per 4. come vuole l'Algebra, e viene 15. per il valore di 1. cosa, numero delli Scudi del guadagno di Flavio; l'altro numero è 10. che si pose, delli Scudi di guadagno di Giulio. Il prodotto di 15. via 10. è 150. 6. volte 25. somma di 15. è 10. dalla quale operazione si ha la seguente regola detta di modo dal Cardano; Al 6. si aggiunge 4. (ò qualsiasi numero anche l'unità) fa 10. per il numero minore del guadagno di Giulio, il quale 10. si moltiplica per 6. fa 60. il quale si parte per 4. numero aggiunto, viene 15. Potevassi ancora per il 4. aggiunto partire il 6. veniva  $1\frac{3}{4}$ . per il quale se si moltiplicava il 10. veniva pure 15. numero maggiore del guadagno di Flavio; e se rispetto questo guadagno si cercherà il Capitale di ciascuno di Scudi 100. quello di Giulio sarà di Sc. 40. e di Flavio sarà di Sc. 60. Dalle che si ricava, che standosi diverse risposte alla detta Domanda, ella è viziosa; e però devesi determinare ad una sola risposta con qualche condizione; ò con esprimere un numero del minore, ovvero maggiore guadagno. v. g.

61. D. Flavio, e Giulio fecero compagnia; Giulio guadagnò Scu. 25. e Flavio guadagnò tanti Scudi, che moltiplicati per 25. il prodotto è 20. volte tutto il guadagno. Si domanda avendo posto fra tutti due, Sc. 1210. di Capitale, quanti Scudi pose ciascuno, e che guadagnò Flavio di sua parte?

R. Questa Domanda è determinata ad una sola risposta, essendo alquanto mutata la proposizione 52. del Forestani nelli numeri del guadagno, li quali daranno diversi numeri di Capitale. Si moltiplichi 25. per 20. il prodotto 500. si parta per la differenza da 20. a 25. cioè per 5. verrà 100. Scudi di guadagno di Flavio. Ovvero si parte 20. per 5. differenza, viene 4. per il quale si moltiplica 25. pure viene 100. Adesso sapendosi il guadagno di ciascuno; facilmente si trova il Capitale sommando 100. e 25. fa 125. e se 125. viene da 1210. da che verrà 100. da che 25? 100. verrà da Sc. 968. di Capitale di Flavio, e 25. verrà da Sc. 242. Capitale di Giulio. E così operasi in simili.

62. D.

63. D. Due fanno compagnia con questi patti, che il primo metta lir. 3000. il secondo lir. 800. e la persona, e tiri li  $\frac{1}{4}$  del guadagno, e il primo tiri  $\frac{1}{4}$ . Accade, che il Primo sopra messe Fiorini 400. e trasse  $\frac{1}{4}$  e il secondo  $\frac{1}{4}$ . del guadagno. Si domanda quanto valse il Fiorino à lire.

R. Fr. Luca nella 53. à car. 154. vede che  $\frac{1}{4}$  sono di  $\frac{1}{4}$ . li  $\frac{1}{4}$ . però piglia li  $\frac{1}{4}$  di 3000. sono 1800. e tanto dice doveria mettere il secondo, e sà che messe 800. dunque la persona valse lir. 1000. Ora il primo sopra pose Fiorini 400. e tira li  $\frac{1}{4}$ . Il secondo senz' altro tira  $\frac{1}{4}$ . che è la metà. Il primo messe in tutto lir. 3000. e Fiorini 400. dunque il secondo la metà, cioè lire 1500. e Fior. 200. e già si sa che messe con la persona lir. 1800. dunque Fiorini 200. valgono lire 300. e Fiorino 1. lir. 1. 501. 10.

Il Tartaglia nel lib. 12. num. 82. apporta la medesima Compagnia, e diversamente la risolve, perchè ragionevolmente vuole, che la stima della persona s'accrezca à proporzione, che si accresce il Capitale da trafficarsi; Onde esso somma lir. 3000. del primo, e lir. 800. del secondo, fa lir. 3800. delle quali piglia  $\frac{1}{4}$ . che sono lir. 950. e tante ne dovrebbe mettere per tirare li  $\frac{1}{4}$  del guadagno. Si levano lir. 800. da lir. 950. restano lir. 150. che sono  $\frac{1}{4}$  di lir. 3000. e così il secondo deve avere li  $\frac{1}{4}$  de denari del primo, siano quanti si vogliono. Ora avendo sopra posto il primo Fior. 400. e deve tirare  $\frac{1}{4}$  del guadagno; il secondo  $\frac{1}{4}$ . Volendo sapere quanto vale il Fiorino à lire, bisogna trovare à quante lire siano uguali Fior. 400. il che si fa, dice il Tartaglia, per doppia falsa posizione, o per Algebra; ma procedendo per Algebra, trovo Fior. 400. esser uguali à lir. 1266  $\frac{2}{3}$  senza porre operazione. Acciò dunque non si rimanga all' oscuro, pongo l'operazione per Algebra. Li Fior. 400. siano 1. cosa di lire; dunque il primo ha posto 1. cosa più lir. 3000. Il secondo lir. 800. e la persona, che si è trovato valere  $\frac{1}{4}$  di quello che mette il primo. Si pigliano dunque li  $\frac{1}{4}$  di 1. cosa più lir. 3000. sono  $\frac{1}{4}$  cosa più 625. lire, che aggiunte à lir. 800. fanno  $\frac{1}{4}$  cosa più 1425. del secondo, e sono restate per il primo  $\frac{1}{4}$  cosa più lire 2375. e raddoppiate  $\frac{1}{4}$  co. più lir. 1425. sono  $\frac{1}{2}$  co. più lire 2850. uguali à  $\frac{1}{4}$  co. più lir. 2375. dalle parti si levino  $\frac{1}{4}$  cosa da  $\frac{1}{4}$  co. e lir. 2375. da lir. 2850. resterà  $\frac{1}{4}$  cosa, ovvero  $\frac{1}{4}$  cosa uguali à lir. 475. queste si partano per  $\frac{1}{4}$  verranno lir. 1266  $\frac{2}{3}$ . uguali à Fior. 400. per li quali si pose 1. cosa le quali lire 1266  $\frac{2}{3}$ . partite per 400. verrà à valere 1. Fiorino lir. 3  $\frac{1}{3}$ .

In altro modo più facile per via d'equazione. Trovato che il secondo per la persona deve avere  $\frac{1}{4}$  di quello, che mette il primo, oltre

oltre le lire 800. , che da se pone . Il primo. pone lir. 300. più Fior. 400. di questi si pigliano li  $\frac{3}{4}$ . sono lir. 625. più Fior. 83  $\frac{3}{4}$ . e restano per il primo lir. 2375. più Fior. 316  $\frac{3}{4}$ . ed aggiunte lire 625. più Fior. 83  $\frac{3}{4}$ . a lir. 800. del primo, sono lir. 1425. più Fior. 83  $\frac{3}{4}$ . per il secondo, e perchè questo deve tirare  $\frac{1}{2}$ . e l'altro  $\frac{1}{2}$ . che è il doppio ; dunque lir. 2375. più Fior. 316  $\frac{3}{4}$ . importano il doppio di lir. 1425. più Fior. 83  $\frac{3}{4}$ . del secondo ; queste si raddoppino : allora lir. 2375. più Fior. 316  $\frac{3}{4}$ . del primo, sono uguali a lir. 2850. più Fior. 166  $\frac{3}{4}$ . e levati Fior. 166  $\frac{3}{4}$ . da Fior. 316  $\frac{3}{4}$ . e lir. 2375. da lir. 2850. restano Fior. 150. uguali a lir. 475. queste partite per 150. vengono lir. 3  $\frac{1}{3}$ . per il valore del Fidrino .

## DISTINZIONE SECONDA.

### Delle Soccite.

1. D. **C**he cosa è Soccita ?

R. **C**'è un contratto tra il Padrone del Bestiame, ed il Guardiano di quello . in ordine a ricavare utile , il quale si distribuisce secondo i patti de' Contraenti e le leggi di ciascun paese. Per la giustizia delle Soccite tre condizioni si ricercano ; La prima , che i partecipanti conferiscano qualche cosa , cioè animali , come Pecore , Capre , Vacche , Cavalle &c. ovvero pascolo , come Prati , Monti , erboi , o custodia de' medesimi Animali . La seconda , che si offervi uguaglianza nel partecipare pro rata dell' utile , e guadagno . La terza , che morendo gl' Animali senza colpa del Custode , muojano per il Padrone : se per altro il Padrone non l'assicura con prezzo in ricompensa di tal gravezza .

2. D. Tre Pastori hanno pigliato un luogo per pascere Pecore , pagando in tutto lir. 180. il primo ha Pecore 420. Il secondo 350. Il terzo 230. Si domanda quanto doverà pagare ciascuno per il pascolo ?

R. Si sommano le pecore 420. 350. e 230. delli tre Pastori ; la somma pecore 1000. onde per regola del Trè : Se per pecore 1000. si pagano lire 180. quante si pagheranno per pec. 420. del primo ? per pec. 350. del secondo ? e per pec. 230. del terzo ? ed operato verranno lir. 75  $\frac{1}{2}$ . per il primo, lir. 63. per il secondo, e lir. 41  $\frac{1}{2}$ . per il terzo .

3. D. Tre Pastori hanno pagato in tutto lir. 180. per un luogo da pascere pecore : il primo ha pagato lir. 75  $\frac{1}{2}$ . per la quantità delle sue pecore , il secondo deve pagare per pecore 350. ed il terzo per pec.

- per pec. 230. Si domanda per quante pecore ha pagato il primo e quanto abbia pagato il secondo, e terzo Pastore?
- R. Questa serve di prova alla passata; Però si sottrino  $\text{lit. } 75 \frac{1}{2}$  da  $\text{lit. } 180$ . restano  $\text{lit. } 104 \frac{1}{2}$ . si sommino pec. 330. e 230.ieno 580. e si dica: Se  $\text{lit. } 104 \frac{1}{2}$  sono per pascolo di pec. 580.  $\text{lit. } 75 \frac{1}{2}$ . di quante saranno? ed operato verranno 420. per le pecore del primo. Adesso se per pec. 420. del primo si sono pagati  $\text{lit. } 75 \frac{1}{2}$ . quante si pagheranno per pec. 330. del secondo? e verranno  $\text{lit. } 63$ . che sottratte da  $\text{lit. } 104 \frac{1}{2}$ . resteranno  $\text{lit. } 41 \frac{1}{2}$ . per il terzo: e perchè sono tornati i numeri della passata è segno, che si è operato bene.
4. D. Due Pastori hanno preso nella Maremma di Siena un pascolo per lire 395. sol. 8. Il primo ha Vacche 46. Pecore bianche 340. bige 120. Il secondo ha vacche 30. pecore bianche 460. e bige 90. Le vacche pagano a ragione di  $\text{lit. } 25$ . per 100. le pec. bianche a ragione di  $\text{lit. } 12$ . per 100. e le bige a ragione di  $\text{lit. } 8$ . per 100. Si domanda quante lire dovrà pagare di sua parte ciascun Pastore?
- R. Si moltiplicano le Vacche per 25. le pecore bianche per 12. le bige per 8. si sommino i prodotti, la somma del primo sarà 6190. del secondo 6990. li quali Composti si sommino, fanno 13180. e si dica: Se 13180. ricerca  $\text{lit. } 395 \frac{1}{2}$ . di pagamento; 6190. del primo quante ne vorrà ed operato verranno  $\text{lit. } 185$ . sol. 4. le quali sottratte da  $\text{lit. } 395$ . sol. 8. restano  $\text{lit. } 209$ . 14. da pagarsi dal secondo: o pure si faccia un'altra volta la regola del Trè, verranno 10185  $\text{lit. } 209$ . 14.
5. D. Trè Pastori hanno preso un Pascolo per  $\text{lit. } 150$ . Il primo ci ha tenuto pecore 245. per giorni 45. il secondo 410. per giorni 36. il terzo pec. 180. per gior. 60. Si domanda che dovrà pagare ciascuno per rata delle Pecore; e del tempo?
- R. Si moltiplichino Pec. 245. per giorni 45. il prodotto 11025. è il composto del primo; Pure Pec. 410. per giorni 36. il prodotto 14760. è il composto del secondo: finalmente Pecore 180. per giorni 60. il prodotto 10800. è il composto del terzo; li quali composti sommati fanno 36585. onde si faccia la regola del Trè, con dire: Se 36585. ricercano di pagamento  $\text{lit. } 150$ . che 11025. del primo? e verranno  $\text{lit. } 45 \frac{1}{2}$ . che 14760. e verranno lire 60  $\frac{1}{2}$  per il secondo: che 10800. del terzo? e verranno lire 44  $\frac{1}{2}$ . e tante Lire pagherà ciascuno: che sommandole torneranno lire 150. prezzo del Pascolo; e così si fanno le simili.
6. D. Uno dà in Socetà ad un Pastore pecore 40. con patto, che

le deva pascere 3. anni, e poi si devano partire quelle, che si troveranno per metà. In capo di mesi 18. li diede altre Pecore 32. col medesimo patto. Si domanda volendo ridurre queste due Soccite ad un solo termine di tempo: quando si farà il partimento?

R. Il modo più facile è questo. Si trovi quanto tempo deve tenere il Pastore le pecore della prima Soccita, e sono mesi 18. li quali si pongono a canto à pec. 40. siccome a canto à pec. 32. si pongono mesi 36. dipoi si moltiplicano Pec. 40. per mesi 18. fa 720. che si pone dopo i mesi; Medesimamente si moltiplicano pec. 32. per mesi 36. fa 1152. il quale si pone sotto 720. e con esso si somma, fa 1872. il quale si parte per 72. somma delle pecore, e verrà 26. che sono mesi, che il Pastore doverà tenere le pecore dal principio della seconda Soccita, e poi partirla in cambio di mesi 18. ponendo An.  $1\frac{5}{6}$ . e di mesi 36. ponendo an. 3. ne farebbero venticinque an. 2. mesi 2. che importano pure mesi 26.

Pec. 40	18	720	Pec. 40	an. $1\frac{5}{6}$	60
32	36	1152	32	3	96
<hr/>					
Per 72	1872	72	156		
	432		12		
Mesi 26	..	An. 2. 2	12		
<hr/>					
144					

7. D. Per quale altro modo si trova il termine delle Soccite, quando si deve fare il partimento?

R. Si può trovare così: e serve per prova. Si trova il tempo, che il Pastore ha tenuto le pecore fin' à quando si vogliono ridurre le Soccite ad un termine; Qui sono mesi 18. si sommano le pecore: sono 72. ed adesso si fa la regola del Trè, dicendo: Se 72. vogliono mesi 18. che Pec. 40? e verranno mesi 10. li quali si sottrano da mesi 36. tempo maggiore della seconda Soccita, e restano mesi 26. è pure: Se 72. vogliono mesi 18. che Pecore 32? e verranno mesi 8. li quali s'aggiungono à mesi 18. tempo minore da tenerli le Pecore della prima Soccita, e risultano mesi 26. come prima.

8. D. Uno ha dato à Soccita ad un Pastore Pec. 40. da dividerli con l'utile, per la metà dopo 3. anni, e dopo alquanto tempo li diede altre Pec. 32. con i medesimi patti, con ridurre ad un termine le due Soccite, il quale venne dopo mesi 26. dal principio della seconda Soccita. Si cerca adesso dopo quanto tempo dal principio della prima Soccita diede le Pec. 32?

R. Si



R. Si sottrino mesi 26. da mesi 36. che deve tener le pec. 32. restano mesi 10. nei quali il Pastore non deve tener le pec. 32. secondo l'obbligo à ragione de i mesi, che ha tenuto à Soccita pecore 40. che però per regola del Trè si dica: Se pecore 40. danno mesi 10. di meno, quanti ne daranno pecore 72? ed operato, verranno mesi 18. dopo li quali diede le pec. 32. della seconda Soccita.

Mesi 36

Se 40 — 10 — 72?

26

Mesi 18

Mesi 10

9. D. Uno diede in Soccita ad un Pastore pecore 80. con patto che le deva tener 4. anni, e poi partire quelle, che si troveranno per metà, ed in capo à 18. mesi, gli diede 40. altre pec. con i medesimi patti. Si domanda à che tempo si doverà dividere la Soccita?

R. Questa Soccita è del Ciacchi à carte 184. il quale erra moltiplicando pec. 80. per anni 4. e pecore 40. per anni  $2\frac{2}{3}$ . e così gli vengono An.  $3\frac{2}{3}$ . mà mol tiplicando pec. 80. per anni  $2\frac{2}{3}$ . che restano a finire la prima Soccita, verrà 200. e pec. 40. per anni 4. verrà 160. che soiamato con 200. fa 360. il quale partito per 120. somma delle pecore verrà 3. che sono anni, dopo i quali si termineranno le Soccite dal principio della seconda; Ovvero operando per la settima di questo, si di ca: Se 120. somma delle pecore mesi 18. pec. 80? e verranno mesi 12. cioè an. 1. qual sottratto da an. 4. restano an. 3. Ovvero se 120. mesi 18. che 40? verranno mesi 6. che aggiunti à mesi 30. fanno mesi 36. cioè an. 3.

10. D. Un Cittadino diede pec. 150. ad un Pastore, che dopo an. 6. si dovesse partire per metà; Occorre, che dopo mesi 6. gli dà altre pec. 50. da tenere an. 5. e doverne similmente fare partimento per metà. Domando, à qual tempo questo due Soccite devono finire unitamente?

R. Questa Soccita è del Zucchetta a car. 207. il qual conchiude, che dopo anni 5. mesi 9. della prima Soccita, si finiranno le due Soccite: Il che sarebbe così, quando il Cittadino avesse dato le pec. 150. al Pastore da partirsi dopo an. 6. per metà, e nel medesimo tempo pec. 50. da partirsi dopo an. 5. pure per metà; mà avendo dato questo dopo mesi 6. onninamente bisogna, che ci sia differenza. Si moltiplicano dunque pec. 150. per mesi 66. che gli restano da tenere, e pecore 50. per mesi 60. i prodotti 9900. e 3000. si sommano, la somma 12900. si parta per 200. somma delle pecore, verranno mesi  $64\frac{2}{3}$ . cioè anni 5. mesi  $4\frac{2}{3}$ . dopo i quali della seconda Soccita si farà la partizione, ed aggiungendo mesi 6. passati, sono an. 5. mesi  $10\frac{2}{3}$ . dal principio della prima Soccita. Si poteva moltiplicare pec. 150. per an.  $5\frac{2}{3}$ .

O o o

e pec.

e pec. 30. per an. 5. i prodotti 825. e 250. sommati, fanno 1075. che partiti per 200. tornano an. 5. mesi 4  $\frac{1}{2}$ .

Pec. 150	— 66	— 9900	Pec. 150	— 5 $\frac{1}{2}$	— 825
50	— 60	— 3000	50	— 5	— 250
1000	— 129100				
	Mesi 64 $\frac{1}{2}$		200		1075
					75 — 12
			An. 5. 4		900
					100
					200 sc. $\frac{1}{2}$

Doppio errore del Zucchetto è stato il dire: Se pec. 200. vogliono mesi 12! che pec. 150? opera, dice egli, che ti viene mesi 3. certo è, che vengono mesi 9. ecco il primo errore: Il secondo è, che non dev'essere porre mesi 12. per secondo num. della regola del Trè; ma mesi 6. differenza del tempo dal cominciamento da una Soccita all'altra, come ha fatto nella preposta 20. Onde dicendo: Se 200? mesi 6. che 150? e verranno mesi 4  $\frac{1}{2}$ . da aggiungersi a mesi 60. e torneranno mesi 64  $\frac{1}{2}$ . ovvero dicendo: Se 200. mesi 6. che 50? e verrà mese 1  $\frac{1}{2}$ . da sottrarsi da mesi 66. che pure resteranno mesi 64  $\frac{1}{2}$ . &c.

11. D. Un Cittadino diede pec. 150. ad un Pastore con patto, che dopo anni 6. si dovesse partire il tutto per metà, e dopo mesi 6. li diede altre pecore a tempo d'anni 5. a partire pure per metà, e ridussero le Soccite da partirsi dopo anni 5. mesi 4  $\frac{1}{2}$ . si vorrebbe sapere quante furono le pecore della seconda Soccita?

R. Certamente essendo risolta bene la Soccita passata ne devono venire pec. 50. per trovare le quali si faceva la regola del Trè, dicendo: Se mesi 4  $\frac{1}{2}$ . aggiunti ad anni 5. termine della seconda Soccita, vengono da pec. 150. prima tenuta, da quali pecore verranno mesi 6. differenza dalla prima Soccita alla seconda verranno pec. 200. dalle quali sottratte pec. 150. restano pec. 50. date a termine di 5. anni, e così si faranno le simili non poste da altri.

12. D. Uno diede in Soccita ad un Pastore pec. 60. a dividere per metà in termine di 4. anni, e passati 16. mesi, gli ne diede altre pec. 40. e passati mesi 8. gli ne diede altre 20. tutte con le medesime condizioni, e dopo mesi 4. d'accordo riducono ad un termine dette Soccite: Si domanda quando farà il partimento?

R. Per il modo della 6. di questo, si pongano pec. 60. ed a canto mesi 20. che ci vogliono a finire anni 4. essendo passati mesi 28. dal principio fino a dopo mesi 4. Sotto poi si pongano pec. 40. ed appresso mesi 36. a finire anni 4. e sotto pec. 20. ed appresso mesi 44. e pure a finire anni 4. Si moltiplichino ciascuna partita di pec.

pec. per li suoi mesi, i prodotti 1200. 1440. e 880. si scemano fanno 3520. il quale si parte per 120. somma di tutte le pecore, e verranno mesi 29  $\frac{1}{2}$ . e tanto tempo doverà tenere il Pastore dopo i desti mesi 4. tutte le pecore, ed allora fare il partimento; a i quali mesi 29  $\frac{1}{2}$ . aggiunti mesi 28. passati, fanno mesi 57  $\frac{1}{2}$ . cioè anni 4. mesi 9  $\frac{1}{2}$ . dal principio della prima Soccita.

Pec.	60	20	1200
	40	36	1440
	20	44	880

120. 352.0  
Mesi 29  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$  Schifato  $\frac{1}{2}$

13. D. Un Signore ha dato in Soccita ad un Pastore pec. 160. da tenerle anni 4. con patto di dividere per metà tutte le pecore, ed Agnelli, che si troveranno: ma rompendosi la Soccita prima: allora il Capitale si divida per rata del tempo, e l'altre pecore, ed agnelli sempre per metà: Avviene, che dopo an. 1  $\frac{1}{2}$ . il Pastore muore, e si scioglie la Soccita. Si domanda essendosi trovate pecore, ed Agnelli in tutto 280. quanti capi ne tocchino a ciascuno?

R. Per levare ogn' ambiguità nello sciogliere questi quesiti si sono messi i patti chiari, secondo questi si opera così: Si levano pec. 160. di Capitale da 280. restano 120. di frutto, delle quali la metà, che sono 60. appartengono a gl' Eredi del Pastore, e 60. al Padrone. Adesso la metà di 160. sono 80. e tante gli si dovevano, se la Soccita durava 4. anni; ma essendosi sciolta dopo anni 1  $\frac{1}{2}$ . si dicasse anni 4. fanno avere pecore 80. quante ne farà avere an. 1  $\frac{1}{2}$ ? verranno 30. le quali aggiunte a 60. fanno 90. che appartengono a gl' Eredi del Pastore, e 190. al Signore, che le diede in Soccita.

14. D. Uno dà pec. 100. in Soccita, e colui, che le toglie non ne mette alcuna, con patto, che l'abbia a guardare anni 3  $\frac{2}{3}$ . e che in capo di detto tempo debbano partire per metà pro, e Capitale: Accadde, che le tenne anni 5. e ritrovaronsi pec. 320. Si domanda la giusta divisione?

R. Questa Soccita è la seconda del Taraglia à car. 154. il quale con gl' antecedenti, e s'esseguenti Autori d' Arimmetica li dà questa soluzione.

Divide per metà pec. 320. e sono 160. per il Pastore: l'altre 160. come rimesse à Soccita per altri an. 3  $\frac{2}{3}$ . si dividono pro rata, dicendo: Se in an. 3  $\frac{2}{3}$ . il Pastore di pecore 160. ne ha 80. quante ne deve avere in an. 1  $\frac{2}{3}$ ? e verranno pec. 34  $\frac{2}{3}$ . che aggiunte

O o o 2                      à 160.

à 160. sono per il Pastore pec. 194  $\frac{2}{3}$ . e per il Padrone pec. 125  $\frac{1}{3}$ . In tal soluzione ci è un supposto falso à mio parere, cioè che pecore 100. in an. 3  $\frac{1}{2}$ . crescano fino à pec. 320. e poi pec. 160. in an. 1  $\frac{1}{2}$ . restino sterili, dove prima erano feconde, e non crescano, ne manchino. Sò che à tal Soccita non si può dare soluzione determinatamente certa: mà si deve dare secondo la proporzione più ragionevole, acciò non ci sia danno considerabile da nessuna parte. Si faccia così, dicendo: pec. 100. in an. 5. fruttano pec. 220. che frutteranno pec. 100. in an. 3  $\frac{1}{2}$ . fine della Soccita? e verranno 154. di frutto, alle quali aggiunte 100. di Capitale fanno pec. 254. che partite per metà sono 127. per il Pastore; e l'altre 127. come rimesse à nuova Soccita fruttano pecore 66. differenza da pec. 254. fino à pec. 320. delle quali la metà, cioè 33. appartengono al Pastore, che con 127. di prima, fanno pec. 160. Adesso le pec. 127. poste à nuova Soccita apparterrebbero per metà passati an. 3  $\frac{1}{2}$ . mà perchè è passato solamente an. 1  $\frac{1}{2}$ . si dica: Se in an. 3  $\frac{1}{2}$ . appartengono al Pastore pec. 63  $\frac{1}{2}$ . quante in an. 1  $\frac{1}{2}$ ? ed operato verranno pec. 27  $\frac{1}{2}$ . che con pec. 160. fanno in tutto pec. 187  $\frac{1}{2}$ . per il Pastore; e sommate pecore 99  $\frac{1}{2}$ . con pec. 33. di prima fanno per il Padrone pec. 132  $\frac{1}{2}$ . e questa è buona divisione, per quanto si può dare in tal incertezza.

15. D. Uno ha dato in Soccita ad un Pastore pec. 240. da tenerli an. 4  $\frac{1}{2}$ . e passato tal tempo si dividano per metà quelle che si troveranno: mà sciogliendosi prima la Soccita, solo le pec. di frutto si partano per metà, e quelle di Capitale si distribuiscono per rata del tempo, che il Pastore l'averà tenute; passando però il termine di anni 4  $\frac{1}{2}$ . allora la metà s'intendano date à nuova Soccita con le medesime condizioni. Essendo dunque occorso, che il Pastore le ha tenute an. 6. Si domanda quante ne toccheranno à ciascuno di pecore 488. trovate?

R. Questa è simile alla passata; che però si dirà per regola del Trè: Se pec. 240. hanno fruttato in an. 6. pec. 248. che averanno fruttato in an. 4  $\frac{1}{2}$ ? e verranno pec. 186. alle quali aggiunte pec. 240. di Capitale, fanno pec. 426. la metà, cioè 213. aspettano al Pastore; l'altra 213. s'intendono rimesse à Soccita per an. 4  $\frac{1}{2}$ . e fruttare in an. 1  $\frac{1}{2}$ . pec. 62. rimaste, delle quali 31. sono del Pastore, l'altra metà del Padrone. Adesso si pigli la metà di pecore 213. sono 106  $\frac{1}{2}$ . le quali fariano del Pastore se l'avesse guardate an. 4  $\frac{1}{2}$ . mà avendole guardate solo an. 1  $\frac{1}{2}$ . gli si devono solo pec. 35  $\frac{1}{2}$ . che sommate con 31. e 213. fanno in tutto pecore 279  $\frac{1}{2}$ . per il Pastore, e sommate pec. 177.  $\frac{1}{2}$ . con le 31. di prima, fanno pec. 208  $\frac{1}{2}$ . per chi l'ha date à Soccita. Pec.

$$\begin{array}{r} \text{Pec. } 488 \\ 240 \\ \hline \text{An. } 6 \text{ — } 248 \text{ — An. } 4 \frac{2}{3} \\ 2 \\ \hline 12 \\ \hline 2232 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{Pec. } 186 \\ 240 \\ \hline \text{Per } 2 \text{ — } 426 \\ \hline \text{Pec. } 213 \text{ per il Past.} \\ \text{Pec. } 31 \\ \hline 35 \frac{2}{3} \end{array}$$

Pecore 279  $\frac{2}{3}$  per il Pas.

$$\begin{array}{r} \text{Da Pec. } 488 \\ 426 \\ \hline \text{per } 2. \text{ Pec. } 162 \\ \hline \text{Pec. } 31. \text{ per il Past.} \\ \hline \text{per } 2. \text{ Pec. } 213 \\ \hline \text{An. } 4 \frac{2}{3} \text{ — } 106 \frac{2}{3} \text{ — An. } 1 \frac{2}{3} \\ \hline 319 \frac{2}{3} \\ \hline 9 \qquad \qquad \qquad 3 \\ \text{Pec. } 35 \frac{2}{3} \text{ per il Past.} \\ \hline 177 \frac{2}{3} \qquad \qquad 1 \\ \hline 31 \end{array}$$

Per il Padrone Pecore 208  $\frac{2}{3}$

16. D. Uno dà in Soccita pec. 100. ad un Pastore con patto, che ne metta 20. e passati an. 3. si partano tutte per metà. Avvenne che si prolungò la Soccita fino ad anni 4. mesi 4. e si trovarono pecore 380. Si domanda quante si devono a ciascuno?

R. Si sommano pec. 100. del Padrone, e pec. 20. del Pastore, sono pec. 120. le quali si sottrano da pec. 380. restano pecore 260. di frutto; onde si dica: Se in an. 4  $\frac{2}{3}$ . pec. 120. hanno fruttato pec. 260. quante n'averanno fruttate in an. 3. e verranno pecore 180. di frutto: Si aggiungano pec. 120. di Capitale, sono pecore 300. la metà pec. 150. sono del Pastore, e pec. 150. altra metà si intendono poste a nuova Soccita dal Padrone, ed il Pastore ne deve mettere delle pec. 150. di sua parte pec. 30. a quella rata, che ne ha poste 20. quando il Padrone 100. sicchè per il Pastore restano pec. 120. levate 30. da 150. Le pec. 180. rimesse a Soccita fruttano pec. 80. in an. 1  $\frac{2}{3}$ . le quali 80. erano restate escluse fino a 3. anni; onde divise per metà 40. appartengono al Pastore, e 40. al Padrone. Delle pec. 150. rimesse a Soccita il Pastore n'averebbe 75. se l'avesse guardate an. 3. mà perchè l'ha guardate an. 1  $\frac{2}{3}$  solamente, li si devono pec. 33  $\frac{1}{3}$ . ed al Padrone l'altre 116  $\frac{2}{3}$ . sino in 150. siccom e al Padrone si dovrebbero 15. delle 30. del Pastore in an. 3. mà in an. 1  $\frac{2}{3}$ . gli si devono pec. 6  $\frac{2}{3}$ . e 23  $\frac{1}{3}$  sino in 30. al Pastore, e sommate pec. 120. 40. 33  $\frac{1}{3}$ . 23  $\frac{1}{3}$ . sono in tutto pec. 216  $\frac{2}{3}$ . per il Pastore, e sommate pec. 40. 116  $\frac{2}{3}$ . e 6  $\frac{2}{3}$  sono in tutto pec. 163  $\frac{1}{3}$ . per il Padrone.

17. D.

17. D. Uno ~~di~~ in Soccita pecore 200. con patto, che il Pastore, ne metta 30. e le tenga anni 6. ed allora abbiano a partire per metà pro danno, e Capitale. Accadde, che il Pastore le tenne anni 9. e trovaronsi pec. 1200. Si domanda quante ne toccheranno per uno?

R. Questa è la proposizione 12. del Forestani à carte 110, il quale parte pecore 1200. per metà, che sono 600. le quali sono del Pastore: dell'altre 600. del Padrone come messe a nuova Soccita ne piglia il quinto, che sono 120. spettanti alle 50. del Pastore, e se avessi custodito le pecore anni 6. n'avrebbe avute 300. che sono 180. più. Però dice: Se in anni 6. pec. 380. in anni 3. quante gli si devono? operato vengono 90. che sommate con le 120. che le 600. fanno pec. 810. per il Pastore, e le restanti 390. per il Padrone.

Nella 14. di questo dissi il supposto falso del Tartaglia, il quale conosco anche in questa, cioè che pecore 250. si accrescano fino à 1200. e poi pec. 600. in anni 3. non crescano: Di più facendosi nuova Soccita, e mettendo il Padrone pec. 600. se hà da essere con i medesimi patti, e condizioni, chi non si avvede che il Pastore ne deve mettere 150. avendone messe 50. quando il Padrone ne mette 200?

Più ragionevolmente si opera come nella passata, essendo questa simile à quella, dicendo: Se in 9. anni il frutto è di pec. 950. di quante sarà in anni 6? verranno 633  $\frac{1}{3}$ . si piglino per 634. per sfuggire parti di pecora: à pec. 634. di frutto s'aggiungano 250. di Capitale, fanno pec. 884. che verisimilmente si ritrovano dopo 6. anni, le quali si dividono per metà, ne toccheranno pec. 442. al Pastore, e pec. 442. del Padrone s'intendono rimesse à nuova Soccita, e per osservare i patti si veda quanto ne deva mettere il Pastore a quella ragione che ne messe 50. quando il Padrone 200. con dire. Pec. 200. vogliono pec. 50. quante ne vogliono 442? ed operato, verranno 110. il mezzo si lascia e tante ne metterà il pastore à nuova Soccita delle 442. e gli resteranno 332. Ora le pec. 442. e le pec. 110. probabilmente fruttano pecore 316. che restarono escluse fino a 16. anni, delle quali la metà 158. si devono al Padrone, ed al Pastore (secondo l'opinione del Zucchetto il quale vuole che le bestie di frutto sempre si dividano per metà.) resta à vedere quante se ne devono di pec. 442. del Padrone messe à nuova Soccita al Pastore in anni 6. gli si dovevano 221. quante in anni 3? e verranno pec. 110. lasciando il rotto. Finalmente si veda quante se ne devano al Padrone di pec. 110. del Pastore rimesse à Soccita: in anni 6. gli si dovevano pecore 55.

core 55. metà di 110. quanto gli si devono in 3. anni? e verranno 28. pigliando il rotto per intero, le quali sottratte da 110. restano per il Pastore pecore 82. Si sommino le pecore appartenenti al Pastore 332. 158. 110. e 82. fanno in tutto pec. 682. per il Padrone: Si sommino pure le appartenenti al Padrone 332. 438. e 288. fanno in tutto pec. 1058. per il Padrone. 2. 1158 di pec. 1058 in 18. D. Si può dare altra verisimile divisione alla Soccita' passata?

R. Ne addurrò due altre, nelle quali non si fa differenza per dividere le pec. tra quelle di Capitale, e di frutto: la prima è questa. Si sommino pec. 200. del Padrone, e 50. del Pastore, sono pec. 250. e perchè sono d' accordo, che il Pastore dopo an. 6. abbia la metà, ne seguita, che s' intende concedere al Pastore la metà del Capitale, che sono pec. 125. delle quali levate le 50. dal Pastore poste, restano pec. 75. le quali gli sono concesse per gli anni 6. che le custodisce. Si dica dunque: Se in anni 6. sono concesse pec. 75. in anni 9. quante gli faranno concesse? e verranno pec.  $112\frac{1}{2}$ . le quali si levano dalle 200. del Padrone, e gli restano pec.  $87\frac{1}{2}$ . e le medesime  $112\frac{1}{2}$  aggiunte alle 50. del Pastore, sono 162  $\frac{1}{2}$ . onde si dica: Se per pec. 250. si devono pec. 1200. che si dovranno per pec.  $87\frac{1}{2}$ . del Padrone? e per 162  $\frac{1}{2}$ . del Pastore? e verranno per quello pec. 420. e per il Pastore 780. in altro modo si può avere la medesima divisione. 2.

19. D. Come si può avere le medesime divisione in altro modo?

R. Certa cosa è, che secondo i patto si finiti gl' anni 6. di Soccita si fossero trovate pec. 250. sommate de' Capitali del Padrone, e del Pastore, ne sarebbero toccate 125. per uno: Dalle 125. del Pastore levate le 50. che di sua parte ha messo, restano 75. che ha guadagnate in 6. anni, le quali 75. sono  $\frac{1}{2}$ . di pec. 200. del Padrone: Dal che si deduce, che il Pastore oltre le pecore spettanti alle pecore 50. ne deve avere dopo 6. anni li  $\frac{1}{2}$ . di quelle, che ha il Padrone: Si dica dunque per regola del Tre: Se in anni 6. li  $\frac{1}{2}$ . in anni 9. quanto? e verranno  $\frac{3}{2}$ . sicchè il Pastore per gli 9. anni, deve avere  $\frac{3}{2}$ . di quelle del Padrone. Dicasi dunque, il Padrone mette pec. 200. il Pastore 50. che gli ne toccheranno di pec. 1200? e verranno per il Pastore pecore 240. ed al Padrone 960. delle quali presi li  $\frac{3}{2}$ . cioè pec. 540. levate da 960. restano per il Padrone 420. ed aggiunte 540. alle 240. vengono 780. per il Pastore come nella passata.

Questi due modi di divisione benchè pajano buoni, tuttavia non sono da servirsi in ogni caso: stante che se fossero passati 8. anni, allora il Padrone non solamente non averebbe pecora alcuna;

alcuna; ma ne dovrebbe rifare al Pastore, il che è inconveniente.

20. D. Ayendo dato, e mostrato la prima soluzione, quale è la seconda?

R. Questa soluzione coerente alla passata non ha il detto inconveniente, che in darla s' arguisce così: Pare cosa manifesta, che se il Padrone mette pec. 200. ed il Pastore 50. e dopo 6. anni devono partire ugualmente. L' uguaglianza della divisione ricerca uguaglianza di Capitale, sicchè ponendo il Padrone pec. 200. le pec. 50. del Pastore con la custodia di anni 6. sono uguali a pec. 200. e così la fatica, e guardia del Pastore in 6. anni viene ad essere equivalente a pec. 150. per il che si faccia la regola del Trè: Se in anni 6 la custodia del pastore è di pec. 150. di quante sarà in anni 9? e verrà di pec. 225. alle quali aggiunte le 50. sono in tutto pec. 275. per il Pastore, e per il Padrone 200. Adesso si faccia la divisione di pecore 1200. secondo tali Capitali sommando 275. e 200. fanno 475. e dicendo: Se a 475. si devono 1200. quante se ne devono a 275? e a 200? e verranno per il Pastore pec. 694.  $\frac{2}{3}$ . e per il Padrone 505  $\frac{1}{3}$ .

Pec. 200 An. 6 — pec. 150 — An. 9?

150	9
150	1350
	225
	50

Del Pastore Pec. 275  
Del Padrone Pec. 200

— 275? — 694  $\frac{2}{3}$   
Se 475 — 1200 —  
— 200? — 505  $\frac{1}{3}$

Il Quesito 9. delle Soccite del Ciacchi, è simile al passato del Forestani, e come esso lo risolve, come si può vedere a car. 187. del suo libro, il quale tralascio di mettere, per non allongarmi soverchiamente. Chi vorrà dargli differente soluzione lo potrà fare per quello che si è detto.

21. D. Uno dà in Soccità ad un Pastore pec. 120. ed il Pastore per se ne ha 30. con questo patto, che in capo d'anni 5. debbano partire per metà il guadagno, e Capitale: Accade che il Pastore non le tenne se non anni 4. e si trovarono in tutto 260. Domandasi quante n' averà ciascuno?

R. Que-



R. Questa è di Giuseppe Unicornio lib. 6. carte 363. il quale somma li Capitali insieme, cioè pec. 120. con le 30. fanno pec. 150. poi considera, che le 30. del Pastore sono  $\frac{2}{3}$ . di tutta la Soccita; dunque finiti li 5 anni, se non ci fusse patto alcuno gli dovrebbe toccare  $\frac{2}{3}$ . di 260. che son capi 52. ed il restante, che sono 208. toccheranno al Padrone; ma perchè vogliono la metà per uno in capo di 5. anni, averiano capi 130. per uno. Onde il Past. verria a guadagnare dal 52. sino alli 130. che sono 78. capi in 5. anni; Ora vedi quanti n' averebbe guadagnati in 4. anni, dicendo: Se an. 5. mi danno 78. capi, che mi daranno an. 4? opera, ne daranno  $62\frac{2}{3}$ . quali aggiunti alli 52. che gli toccarono per virtù delle sue 30. pec., faranno  $114\frac{2}{3}$ . e tante ne toccheranno al Pastore, le restate  $145\frac{1}{3}$ . al Padrone.

22. D. Si può avere la medesima divisione in altro modo?

R. Sicuro: Si sommino pec. 120. e 30. fanno 150. la metà 75. dal quale si levi 30. resta 45. si veda 45. che parti sono di 120. saranno  $\frac{3}{4}$ . che delle sue dà il Padrone all' altro passati 5. anni. Però si dica 5. anni dà  $\frac{3}{4}$ . che daranno anni 4? verranno  $1\frac{1}{2}$ . Adesso si faccia una semplice compagnia, dicendo 150. guadagnano 260. che 120. del Padrone? che 30. del Pastore? al Pastore 52. al Padrone 208. delle quali presi  $1\frac{1}{2}$ . cioè  $62\frac{2}{3}$ . e sottratti da 208. restano per il Padrone  $145\frac{1}{3}$ . e sommate 52. con  $62\frac{2}{3}$ . fanno  $114\frac{2}{3}$ . per il Pastore.

23. D. Si può avere la medesima divisione anche in altro modo?

R. Certamente: La metà di 150. è 75. dal quale levato 30. resta 45. che sono pecore, che in 5. anni il Padrone concede al Pastore, però si dica: Se in 5. anni pec. 45. quante in anni 4? vengono 36. le quali sottratte da 120. restano 84. per il Capitale del Padrone, e quelle 36. aggiunte alla 30. del Pastore fanno 66. per suo Capitale: Adesso per regola del Trè: Se 150. pec. 260. 84. del Padrone? vengono  $145\frac{1}{3}$ . che 66. del Pastore? e vengono  $114\frac{2}{3}$ . come per gl' altri modi.

24. D. La Soccita passata dell' Unicornio, come si scioglierebbe secondo l' opinione assai probabile del Zucchettà?

R. Gio: Battista Zucchetta vuole, che il frutto delle pecore fino dal primo giorno spetti per metà a ciascuno; ma il Capitale di ciascuno all' altro appartenga più, o meno secondo il maggiore, o minor tempo, che dura la Soccita: Onde secondo esso, si farà così la divisione.

Da pec. 260. si levino pec. 150. di Capitale, che sono 120. del Padrone. 30. del Pastore, restano pec. 110. di frutto pec. 55. metà di 110. sono del Padrone, e 55. del Pastore; delle pec. 120. al

P p p

Pasto-

Pastore in 5. anni ne averebbe avute 60. cioè la metà ; però si dica : Se in 5. anni pecore 60. quante in anni 4 ? vengono pec. 48. per il Pastore , che levate da 120. restano pec. 72. per il Padrone ; medesimamente delle pec. 30. del Pastore in 5. anni , ne averebbe avute il Padrone 15. cioè la metà ; però si dica : Se in 5. anni pec. 15. quante in an. 4 ? e vengono 12. per il Padrone . le quali sottratte da 30. restano 18. per il Pastore ; Si sommino dunque le pecore appartenenti al Padrone 55. 72. e 12. fanno in tutto pec. 139. del Padrone ; Si sommino ancora quelle appartenenti al Pastore 55. 48. 18. fanno in tutto pec. 121. del Pastore .

25. D. Uno da in Socità pec. 100. con patto , che il Pastore ne metta 20. e le tenga anni 2. ed alla fine si parta per metà il tutto Successe , che il Pastore non ne messe alcuna , ed alla fine di 2. anni si trovarono pec. 230. Si domanda quante ne abbia d' avere ciascuno ?

R. Si sommino le pec. 100. con le 20. sono 120. le quali se in capo di 2. anni non fossero cresciute , il Pastore ne averebbe 60. dalle quali levate 20. restano 40. che li dà il Padrone ; per il che si dica : Se 100. ne danno al Pastore 40. quante pec. 230 ? e ne daranno pec. 92. e tante ne deve avere il Pastore , e pec. 138. fino 230. il Padrone .

26. D. Uno di in Socità pec. 90. con patto , che il Pastore ne ponga 30. delle sue , e le tenga an.  $3\frac{1}{2}$  e si partano per metà quelle che si troveranno . Avvenne che il Pastore non ne pose alcuna , ed al fine di an.  $3\frac{1}{2}$  si trovarono pec. 150. Si domanda quante ne avrà ciascuno ?

R. Questa è simile alla passata , si scioglia in questo modo , dicendo : Se pec. 90. sono tornate in capo d'an.  $3\frac{1}{2}$  pec. 150. quante sarebbero tornate pec. 120. se il Pastore avesse messo le sue 30. e sarebbero tornate 200. la metà 100. sono pecore dovute al Padrone , le restano pec. 50. al Pastore ; ovvero operazione antecendente , verrà la medesima divisione .

27. D. Uno di in Socità ad un altro pec. 18. con patto che il Pastore ne metta 6. e si devono partire per metà in capo di 4. anni Accade , che il Pastore messe solo pec. 4. e trovossi dopo 3. anni pec. 66. e d'acordo vogliono dividere : Si domanda quante n' avrà il Padrone , e quante il Pastore ?

R. Questa è la Socità ultima di Giovanni Sfortunato de' Senni , il quale conclude , che il Padrone ne avrà pec.  $43\frac{1}{2}$  ed il Pastore  $22\frac{1}{2}$  , la quale divisione è finita falsa dal Taraglio riferita dall' Unicorni in cart. 363. questo sesto : e Fuso , e l'altro Autore per me medesimo modo misista , che il Padrone deve avere pec. 40.  $\frac{1}{2}$  ed il Pa-

ed il Pastore  $25 \frac{1}{2}$ , la qual conclusione si può avere per due modi. Il primo: Si sommino pec. 18. e le 6. che doveva mettere il Pastore fanno pec. 24. delle quali la metà sono 12. dopo 4. anni; sicchè il Pastore ne riceve 6. di quelle del Padrone, che sono  $\frac{2}{3}$  delle 18. si dica dunque: In an. 4. si ha  $\frac{2}{3}$ , in an. 3. quanto? viene  $\frac{2}{3}$ . e tanto gli deve il Padrone delle sue pecore: ò ne metta il Pastore molte, poche, ò nessuna, si dica dunque: Se pec. 22. somma di pec. 18. del Padrone, e di 4. del Pastore crescono fino a pec. 66. che pec. 18. che 4? per 18. vengono 54. per 4. 12. Ora di 54. si levi  $\frac{2}{3}$ . cioè  $13 \frac{1}{3}$ . restano per il Padrone pec. 40  $\frac{2}{3}$ . e sommate  $13 \frac{1}{3}$ . con le 12. fanno pec. 25  $\frac{1}{2}$ . per il Pastore. Secondo modo: trovato che il Padrone ne dà 6. in 4. an. si dica: in an. 4. pec. 6. in an. 3. quante? vengono 4.  $\frac{2}{3}$ . le quali si sottrano da pec. 18. restano  $13 \frac{1}{3}$ . e 4  $\frac{2}{3}$ . aggiunte alle 4. del Pastore sono 8  $\frac{2}{3}$ . Adesso per regola del Tre: Se 22. pec. diventano 66. che  $13 \frac{1}{3}$  del Padrone? che 8  $\frac{2}{3}$  del Pastore? e verranno pec. 40  $\frac{2}{3}$ . per quello, e pec. 25  $\frac{1}{2}$ . per questo. Acciò si conosca, che tal divisione non è certa, ma solo probabile, voglio addarre due altre divisioni differenti, che sono probabili, e ragionevoli, e solo certe, quando nel contratto della foccita vi è chiaro, e determinato patto, che coarta, e determina il Ragioniere ad operare.

28. D. Quale è questa divisione prima differente, e probabile?

R. Par manifesto, come dissi anche nella 20. di questo, che se il Padrone mette pec. 18., ed il Pastore 6. secondo il patto, e dopo 4. anni devono partire ugualmente, l'uguaglianza della divisione ricerca uguaglianza di Capitale, sicchè ponendo il Padrone pec. 18. le pec. 6. del Pastore con la custodia di an. 4. sono uguali a pec. 18. e così la guardia del Pastore in 4. an. viene ad essere equivalente a pec. 12. ma perchè non le guardò che an. 3. però si dica: In an. 4. pec. 12. quante in an. 3.? e verranno pec. 9. alle quali aggiunte pec. 4. che solo messe, fanno pec. 13. di suo Capitale; siccome il Capitale del Padrone, sono pecore 18. Onde secondo questi si faccia la divisione. Si sommino pec. 18. e 13. fanno 31. Ora si dica: Se à 31. si devono pec. 66. quante à 18? e quante à 13? e verranno pec. 38  $\frac{2}{3}$ . per il Padrone, e pecore 27  $\frac{1}{3}$ . per il Pastore.

29. D. Qual' è la seconda divisione differente probabile?

R. E' questa seguente fatta, secondo il Zucchetto lodato, e seguitato dal Figazzoli, e dal Bassi, il quale vuole che gl'Animali di frutto si devono in ogni tempo partire per metà. Da pec. 66. si levino pec. 22. di Capitale, restano pec. 44. di frutto; ora si dica: Se pec. 22. fruttano pec. 44. che avrebbero fruttato pec. 24.

lomma di pec. 18. del Padrone, e di 6. che doveva mettere il Pastore? avrebbero fruttato pec. 48. delle quali la metà, cioè pecore 24. si devono al Padrone, e pec. 20. fino a 44. al Pastore; Se il Pastore guardava le pec. 4. anni aveva pec. 9. delle 18. del Padrone, quante n'averà per an. 3? e vengono pec. 6  $\frac{1}{2}$ . ed 11  $\frac{1}{2}$ . per il Padrone; medesimamente: Se la Soccita durava 4. an. il Padrone aveva pec. 3. delle 6. che doveva mettere il Pastore, quante n'averà in an. 3? e vengono pec. 2.  $\frac{1}{2}$ . e pec. 1  $\frac{1}{2}$ . fino a pec. 4. sarà per il Pastore, si sommino le pec. appartenenti al Padrone 24. 11  $\frac{1}{2}$ . e 2  $\frac{1}{2}$ . sono pec. 37  $\frac{1}{2}$  in tutto per il Padrone; Si sommino ancora pec. 20. 6  $\frac{1}{2}$ . ed 1  $\frac{1}{2}$ . sono in tutto pec. 28  $\frac{1}{2}$ . per il Pastore.

Bene dice Giuseppe Unicornò, che in simili quesiti si comettono errori; non per difficoltà del numerare; ma perchè non si discerna qual sia il giusto, e quale l'ingiusto, per non sapere discernere i casi; perchè come dice Aristotile: *Ad paucos respicientes de facili annunciant*: E però dagl' Arimmetici sono risolti in diversi modi; secondo la diversità del giudizio loro.

30. D. Un Cittadino diede pec. 200. ad un Pastore, che dovesse governarle 4. anni; in fine de' quali fosse da partire il tutto; sicchè il Pastore ne avesse  $\frac{2}{3}$ . ed il Cittadino  $\frac{1}{3}$ . Avviene, che dopo mesi 20. rompono la Soccita, e trovano avere pec. 180. Domando, come devono fare il partimento?

R. Questa è la proposta 19. a car. 202. del Zucchetto il quale dice: che il danno di questo caso deve essere pagato da chi doveva ricevere l'utile, e nelle medesime proporzioni secondo l'accordo: Onde il mancamento delle pec. 20. deve essere pagato in questo modo: Il Pastore ne paghi  $\frac{2}{3}$ : siccome fu l'accordo, che dovesse tal proporzione aver dell'utile; ma perchè quelli  $\frac{2}{3}$  dovevano maturare in fine di 4. anni, o siano mesi 48. conviene portarli in proporzione secondo quel tempo: il che farai per regola moltiplice, dicendo: Se in mesi 48. era da pagare pec. 20. ed allora d'ogni 5. doveva il Pastore pagarne 2. quante ne pagherà in mesi 20? ed opera secondo la regola, che ti riesce pec. 3  $\frac{1}{3}$ : per il quanto deve il Pastore pagare del suddetto danno, che giuntevi le rimanenti 180. fa 183  $\frac{1}{3}$ . per il numero delle pecore, che il Pastore deve restituire al Cittadino.

Il Dottor Bassi seguita il Zucchetto nel quesito terzo a car. 204. Il Figatelli però dice a car. 133. che non si può sottoscrivere alla cieca a così grosso sbaglio; ma la risolve così: Se la Soccita fosse arrivata in capo di 4. anni, e le pec. fossero 200. certo è, che il Pastore per li  $\frac{2}{3}$  ne averia 80. sicchè per li mesi 20. bisogna dire. Se in mesi 48. si averiano pec. 80. in mesi 20. quante sene averanno?

483

operando se ne averanno  $33\frac{1}{3}$  di nuovo: Se di pec. 200. il Pastore ne averia  $33\frac{1}{3}$  di pec. 180. quante ne averia operando ne averà 30. ed il Cittadino 150. Per farne la prova dico così: La proporzione di 200. à 180. è  $1\frac{1}{3}$ . (poichè partendo il 200. per 180. ne viene  $1\frac{1}{3}$ .) e perchè à partire  $33\frac{1}{3}$  per 30. ne viene pure  $1\frac{1}{3}$ . però la ragione è ben conclusa.

Potevasi operare brevemente così, con dire: Se in an. 4. il Pastore ha  $\frac{2}{3}$  delle pecore, quanto averà in an.  $1\frac{1}{3}$  ed averà  $\frac{1}{3}$  si pigli  $\frac{1}{3}$  di pec. 180. sono 30. per il Pastore, e 150. per il Cittadino.

Avvertasi, che questa soluzione, benchè paja giusta, e sia più ragionevole di quella del Zucchetta, tuttavia non è buona in ogni caso, come dissi ancora nel fine della 19. perchè, se dopo 10. an. si sciogliesse la focca allora si dovrebbero tutte le pec. al Pastore; perchè se in 4. an. deve avere  $\frac{2}{3}$ . in an. 10. dovrebbe avere  $\frac{5}{6}$ . che è il tutto della foccata: ma per sfuggire tal'assurdo in ogni caso, nella 20. di questo si disse il seguente modo fondato in questo: che l'utile abbia corrispondenza al Capitale; onde perchè il Padrone mette pec. 200. e deve avere  $\frac{2}{3}$  ed il Pastore la custodia di 4. anni e deve avere  $\frac{1}{3}$ . Si veda la custodia di 4. anni à quante pec. sarebbe equivalente. Moltiplicando 200. per 2. fa 400 che partito per 3. vengono pec.  $133\frac{1}{3}$ . onde di nuovo si dica: Se in 4. an. pec.  $143\frac{1}{3}$ . in an.  $1\frac{1}{3}$ . quante pecore? e verranno  $55\frac{1}{3}$ . per il Capitale del Pastore. Adesso per compagnia ordinaria si sommino pec. 200. del Padrone, e pec.  $55\frac{1}{3}$ . fanno  $255\frac{1}{3}$ . e per regola del Trè: Se pec.  $255\frac{1}{3}$ . fossero 180. che sarebbero pec.  $55\frac{1}{3}$ ? e verranno pec.  $39\frac{1}{3}$ . spettanti al Pastore, e le restate  $140\frac{2}{3}$ . spettano al Cittadino Padrone, e così verisimilmente è fatta la divisione. In quanto alla prova del Figarelli dimostra l'operazione ben fatta, ed essere numeri proporzionali 200. 180.  $33\frac{1}{3}$ . e 30. ma non già, che sia la vera divisione 30. e 150.

# 436 TRATTATO NONO.

## Della Regola

### D'ALLIGAZIONE.



Questa regola è necessaria per Argentieri, Orefici, e Zecchieri, perchè possano consolare Oro, ed Argento, e maritarlo, o legarlo col Rame, per comporre Oro di varj carati, ed Argento di varia lega, à fine di fare manifatture di Vasi, ed ornamenti di coniare Moneta di diverso valore; per Fonditori ancora, acciò si possano servire di varj Metalli à gettare Campane, Cannoni d' Artiglieria, Falconetti, Petriere, Mortari per Bombe, ed altri strumenti da Guerra: ed è necessaria ancora per sapere determinare la quantità d' alcune Merci diversamente apprezzate, per averle ad un prezzo mezzano, e per cose somiglianti.

Prima si tratterà del consolare oro, ed argento: dovendosi sapere, che l'oro fino è di carati 24. quando è di meno come di carati 20. s' intende, che in un' oncia d' oro carati 4. siano rame, e 20. oro, con il qual rame per lo più si lega; L' argento fino è à lega d' once dodici, quando è à meno, come à once 9  $\frac{1}{2}$ . s' intende che ci siano once 2  $\frac{1}{2}$  di Rame; Grani 24. fanno un denaro à peso, 24. denari un' oncia, once 12. una libbra; Ancora grani 24. fanno un scrupolo, 3. scrupoli una dramma, ed 3. dramme fanno un' oncia, e once 8. fanno una marca d' oro in Fiorenza.

I. D. Sia un pezzo d' argento orato, che pesa lib. 8. once 3. den. 10. gr. 12. ed è à lega d' once 9. den. 6  $\frac{1}{2}$ . e tiene d' oro den. 3. gr. 18. per ogni libbra levato il rame. Si domanda quanto oro, argento, e rame si trova in detto pezzo?

R. La lega di detto pezzo è d' argento, e d' oro; però si dica: Se in una libbra di detto pezzo sono once 9. 6  $\frac{1}{2}$ . trà argento, ed oro, quante ne saranno in lib. 8. 3. 10. 12? e si troveranno lib. 6. once 4. 19. 17  $\frac{1}{2}$ . che sottratte da lib. 8. 3. 10. 12. resteranno di rame lib. 1. 10. 14. 18  $\frac{1}{2}$ . Dipoi si dica: Se in una libbra sono denari 3  $\frac{1}{2}$  d' oro, che ne saranno in lib. 6. 4. 19. 17  $\frac{1}{2}$ ? e ne saranno den. 24 cioè oncia 1. d' oro, che sottratte da lib. 6. 4. 19. 17  $\frac{1}{2}$ . restano lib. 6. 3. 19. 17  $\frac{1}{2}$ . d' argento puro; le quali quantità d' oro, argento, e rame, sommate fanno lib. 8. 3. 10. 12. quante si debbono avere il prezzo d' argento.

L' ope-

L'operazioni sono fatte per i partitori, come per regola breve:  
e facile.

Pezzo lib. 8. 3. 10. 12 — 9. 6  $\frac{1}{2}$  lib. 6. 4. 19. 17  $\frac{1}{2}$  — den. 3  $\frac{1}{2}$

$\begin{array}{r} 12 \\ 24 \\ \hline 2 \end{array}$	$\begin{array}{r} 8. 6. 21 \\ 8. 6 \frac{1}{2} \end{array}$	$\begin{array}{r} 12 \\ 24 \\ \hline 4 \end{array}$	$\begin{array}{r} 6. 9. 15. 7 \\ 6. 9. 19 \frac{1}{2} \end{array}$
$\begin{array}{r} 4. 3 \frac{3}{8} \\ 6. 2. 13. 21 \\ 2. 1. 17 \frac{1}{2} \end{array}$		$\begin{array}{r} 19. 5 \\ 4. 19 \end{array}$	

Sottra lib. 6. 4. 19. 17  $\frac{1}{2}$   
Rame lib. 1. 10. 14. 18  $\frac{1}{2}$   
oro onc. 1. —  
lib. 6. 3. 19. 17  $\frac{1}{2}$  Argento  
lib. 1. 10. 14. 18  $\frac{1}{2}$  Rame  
lib. 8. 3. 10. 12 Sonora.

a. D. Uno Zecchiere ha ordine di fare certa moneta a lega d'once 4  $\frac{1}{2}$ , con lib. 8. on. 10 d'argento puro, Si domanda quante lib. di moneta cenerà, e quanto rame dovrà aggiungerci?

R. Lib. 8. onc. 10. si moltiplicano per onc. 12. che è la finezza dell'argento, fanno onc. 106, e se onc. 4  $\frac{1}{2}$  di lega lib. 1. quante lib. onc. 106, queste partite per onc. 4  $\frac{1}{2}$ , vengono lib. 23. 6  $\frac{1}{2}$  di moneta, dalle quali si sottrano lib. 8. onc. 10 di puro argento, restano lib. 14. onc. 8  $\frac{1}{2}$  di rame d'aggiungerci.

3. D. Che ferro di prova alla passata. Con lib. 14. onc. 8  $\frac{1}{2}$  di rame si vuol fare moneta di lega onc. 4  $\frac{1}{2}$ . per libbra; Si domanda quanto argento finocerà  $\frac{1}{2}$  e quanta moneta si venderà?

R. Da onc. 12. si sottrano onc. 4  $\frac{1}{2}$  di lega; e restano onc. 7  $\frac{1}{2}$  di rame; e se onc. 7  $\frac{1}{2}$  di rame fanno lib. 1. di moneta, quante ne faranno lib. 14. onc. 8  $\frac{1}{2}$  e verranno lib. 23. 6  $\frac{1}{2}$ . dalle quali sottratte lib. 14. onc. 8  $\frac{1}{2}$  di rame restano lib. 8. 10. di puro argento, e tanto ce ne vorradito. Si faccia altra prova.

4. D. Uno Zecchiere ha fatto lib. 23. 6  $\frac{1}{2}$  di moneta, nelle quali ci sono lib. 8. onc. 10. d'argento fino. Si domanda a che lega sia detta moneta?

R. Per regola del Tre: Se in lib. 23. onc. 6  $\frac{1}{2}$  di moneta ci sono lib. 8. 10. d'argento; quante once faranno in una lib. di moneta? Ed operato, si troveranno essere once 4  $\frac{1}{2}$ . lega che si cercava.

5. D. Uno Zecchiere ha lib. 6. onc. 8. d'argento a lega d'once 4  $\frac{1}{2}$ . delle quali deve far moneta a lega d'once 7  $\frac{1}{2}$ . Si domanda quante libbre di moneta farà, senza che aggiunga altro argento?

- R.** Se in una libbra sono onc. 4.  $\frac{5}{8}$ . d' argento, quante ne faranno in lib. 26  $\frac{1}{2}$ ? fatta la moltiplicazione, vengono onc. 112. Ora se onc. 7.  $\frac{5}{8}$ . fanno lib. 1. di moneta, quante libbre faranno on. 112? ed operato si averanno lib. 14. onc. 11  $\frac{5}{8}$ .
- 6. D.** Uno Zecchiere ha libbre d'argento 14. onc. 11  $\frac{5}{8}$ . a lega d'once 7  $\frac{5}{8}$ . e ne fa moneta a lega d'onc. 4  $\frac{5}{8}$ . senza giunta d'argento. Si domanda quante libbre di moneta farà, e che giunta farà di rame?
- R.** Si moltiplicano lib. 14. 11  $\frac{5}{8}$ . per onc. 7  $\frac{5}{8}$ . il prodotto d'once 112. si parte per onc. 4  $\frac{5}{8}$ . e verranno lib. 26. onc. 8. di moneta, dalle quali sottratte lib. 14. 11  $\frac{5}{8}$ . restano lib. 11. 8  $\frac{1}{2}$  di rame d'aggiungerfi.
- 7. D.** Uno ha libbre 16  $\frac{1}{2}$ . d'Argento a lega d'once 6  $\frac{3}{4}$ . e libbre 28. a lega d'once 5  $\frac{1}{2}$ . e vuole ridurre detto Argento a lega d'once 8. Si domanda quante Libbre faranno senza aggiungere Argento?
- R.** Si moltiplicano lib. 16  $\frac{1}{2}$ . via la lega d'onc. 6  $\frac{3}{4}$ . e vengono onc. 111  $\frac{1}{2}$ . di puro Argento, ed ancora lib. 28. via onc. 5  $\frac{1}{2}$ . e vengono onc. 163  $\frac{1}{2}$ . di puro argento, le quali si sommano con onc. 111  $\frac{1}{2}$ . fanno once 275. ora si dica: Se onc. 8. consolerano lib. 1. onc. 275. quante libbre consoleranno? e verranno lib. 34. onc. 4  $\frac{3}{4}$ . e tante faranno a lega d'onc. 8.
- 8. D.** Prova della passata. Uno ha lib. 34. onc. 4  $\frac{5}{8}$ . a lega d'onc. 8. e far ne vuole moneta di due forti, cioè lib. 16  $\frac{1}{2}$ . a lega d'once 6  $\frac{3}{4}$ . e lib. 28. d'altra lega senza aggiungere argento, pensi il rame che bisogna. Si domanda a che lega faranno le lib. 28. e che rame aggiungerà?
- R.** Si moltiplicano lib. 34. onc. 4  $\frac{5}{8}$ . per onc. 8. di lega e vengono once 275. argento puro. Si moltiplicano lib. 16  $\frac{1}{2}$ . per onc. 6  $\frac{3}{4}$ . e vengono onc. 111  $\frac{1}{2}$ . le quali si sottrano da onc. 275. restano once 163  $\frac{1}{2}$ . le quali si partono per libbre 28. e vengono once 5  $\frac{1}{2}$ . di lega. Si sommano lib. 28. e lib. 16. onc. 9. fanno lib. 44. 9. dalle quali si sottrano libbre 34. 4  $\frac{1}{2}$ . restano lib. 10. 4  $\frac{1}{2}$ . di rame d'aggiungerfi.
- 9. D.** Uno ha lib. 34. once 4  $\frac{5}{8}$ . d'argento a lega d'onc. 8. e vuole fare moneta di due forti; cioè lib. 28. a lega d'onc. 5  $\frac{1}{2}$ . e del restante moneta a lega d'onc. 6  $\frac{3}{4}$ . Si domanda quante libbre di questa sorte ne farà?
- R.** Si moltiplicano libbre 34. 4  $\frac{5}{8}$ . per onc. 8. fanno once 275. Pure libbre 28. per once 5  $\frac{1}{2}$ . fanno once 163  $\frac{1}{2}$ . le quali si sottrano da 275. restano once 111  $\frac{1}{2}$ . che si partono per once 6  $\frac{3}{4}$ . di lega, e si averanno lib. 16  $\frac{1}{2}$ . di tal sorte di moneta.



10. D. Un' Argentiere hà trè sorti d' Argento, libbre 8. à lega d' on-  
ce  $5 \frac{1}{2}$ . libbre 6. à lega d' once  $6 \frac{1}{2}$ . e libbre 10. à lega d' once  
8. Si domanda fondendole insieme, di che lega verrà la massa?  
R. Si trovi quanto Argento netto è in ciascun pezzo, moltiplicando  
le libbre con la sua lega, si sommano i prodotti 42. 40. e 80. la  
somma 162. si parte per 24. somma delle libbre, e vengono on-  
ce  $6 \frac{1}{2}$ . lega della massa.

In altro modo: si trovi tutto il rame, con moltiplicare le libbre  
per l' once di rame, che sono in ciascuna libbra; l' once 126. si  
partono per 24. vengono once  $5 \frac{1}{2}$  di rame, che si trova in cia-  
scuna libbra della massa, le quali sottratte da 12. restano once  
 $6 \frac{1}{2}$  d' argento per la lega.

11. D. Prova della passata. Uno hà un pezzo d' argento, che pesa  
lib. 24. à lega d' once  $6 \frac{1}{2}$  e vuol fare moneta lib. 8. à lega d' once  
 $5 \frac{1}{2}$ . lib. 10. à lega d' once 8. Si domanda à che lega resteranno  
l' altre lib. 6.

R. Si trovino l' once dell' argento puro di lib. 24. moltiplicandole  
per la sua lega d' once  $6 \frac{1}{2}$  e verranno once 162. e di lib. 8. à once  
 $5 \frac{1}{2}$ . e verranno once 42. e di lib. 10. à once 8. verranno once 80.  
che sommate con once 42. fanno once 122. che sottratte da once  
162. restano once 40. le quali si partono per lib. 6. restano ven-  
gono once  $6 \frac{1}{2}$  di lega, che dovevano venire.

12. D. Uno hà lib. 8. once 6. d' argento à lega di once 10. e vuole  
aggiungere tanto rame, che venga à lega di once 7  $\frac{1}{2}$ . Si doman-  
da quanto sarà detto rame?

R. Si trovi l' argento puro di lib. 8. once 6. moltiplicandole per on-  
ce 10. sua lega, fanno once 86. che partite per once 7  $\frac{1}{2}$ . vengono  
lib. 17. once 4. dalle quali si sottrano lib. 8. once 6. restano lib. 2.  
onci 10. di rame d' aggiungerli.

13. D. Uno hà un pezzo d' argento di lib. 11. once 4. à lega d' once  
7  $\frac{1}{2}$ . e lo mette al fuoco per affinarlo, e torna lib. 8  $\frac{1}{2}$ . Si doman-  
da di che lega sarà adesso?

R. Nell' affinarlo si consuma il rame, e resta l' argento; però si mol-  
tiplicano lib. 11. once 4. per once 7  $\frac{1}{2}$  e vengono once 85. di puro ar-  
gento, le quali si partono per lib. 8  $\frac{1}{2}$ . e vengono once 10. di lega,  
e di questa faranno lib. 8  $\frac{1}{2}$ .

14. D. Uno fonde argento fino detto anche di Coppella con lib. 7.  
di rame, e la massa viene à lega d' once 6  $\frac{1}{2}$ . Si domanda quanto  
argento lega con detto rame?

R. Si sottrano once 6  $\frac{1}{2}$ . da onci 12. restano onci 5  $\frac{1}{2}$  di rame; Ora  
per regola del Trè: Se once 5  $\frac{1}{2}$  di rame si legano con once 6  $\frac{1}{2}$   
d' argento, con quanto argento si legheranno lib. 7. di rame?

Q q q

operan-

operando, si averanno lib.  $8 \frac{3}{4}$  d'argento, che con lib. 7. di rame sono lib.  $15 \frac{1}{4}$  della massa.

In altro modo: Se onco  $5 \frac{3}{4}$  di rame con l'argento si fanno onc. 12. quanti libbre faranno con l'argento lib. 7. di rame? e si faranno lib.  $15 \frac{1}{4}$  delle quali sottratte libbre 7. di rame restano lib.  $8 \frac{3}{4}$  d'argento, come per l'altra modo?

15. D. Prova della passata. In libbre  $15 \frac{1}{4}$  d'argento a lega d'onco  $6 \frac{3}{4}$  quanto argento fino, e rame si trova?

R. Si moltiplicano onc.  $6 \frac{3}{4}$  di lega via lib.  $15 \frac{1}{4}$  vengono onc. 105. d'argento, che si partono per 12. vengono lib. 8. onc. 9. d'argento. Ovvero onco  $6 \frac{3}{4}$  sono  $\frac{1}{2}$  di libbra, li quali moltiplicati via lib.  $15 \frac{1}{4}$  fanno lib.  $8 \frac{3}{4}$  d'argento, che si sottrano da lib.  $15 \frac{1}{4}$  restano lib. 7. di rame.

16. D. Un' Argentiera avendo di due sorti d'argento, la prima a lega d'onco 10. la seconda a lega d'onco 6. vuol fare di questi argenti un Vaso, che pesi libbre 14. d'onco.  $7 \frac{1}{2}$  di lega. Si domanda quanta ne piglierà di ciascuna sorte?

R. Si sottratti la differenza d'onco.  $4 \frac{1}{2}$  da onc.  $7 \frac{1}{2}$  fino ad onc. 10. e la differenza d'onco.  $4 \frac{1}{2}$  da onc.  $7 \frac{1}{2}$ , fino ad onco 6. e contraposte tali differenze cioè onc.  $4 \frac{1}{2}$  di contro ad onco 6. ed onc.  $1 \frac{1}{2}$  di contro ad onc. 10. si sommano, fanno 4. ora per modo di compagnia: Se 4. fusseno lib. 14. che farebbe  $1 \frac{1}{2}$  e verranno lib.  $5 \frac{1}{2}$  di lega d'onco 10. Dintorno a Se 4. fusseno libbre 14. che farebbe  $1 \frac{1}{2}$  e verranno lib.  $8 \frac{1}{2}$  di lega d'onco 6. e sommando per prova lib.  $5 \frac{1}{2}$  e lib.  $8 \frac{1}{2}$  si averanno libbre 14. quante doveva pesare il Vaso.

10 —  $1 \frac{1}{2}$  Se 4 — 14 libbre 5.  $\frac{1}{2}$   
6 —  $2 \frac{1}{2}$  Se 4 — 14 libbre 8.  $\frac{1}{2}$   
Somma 4 delle differenze. Somma lib. 14.

17. D. Prova della passata. Un' Argentiera fonde insieme lib.  $5 \frac{3}{4}$  d'argento a lega onco 10. e lib.  $8 \frac{1}{4}$  di lega onco 6. Si domanda di quante onco verrebbe la lega della massa?

R. Si moltiplicano lib.  $5 \frac{3}{4}$  via onco 10. di lega fanno onc.  $57 \frac{3}{4}$ . si moltiplicano pure lib.  $8 \frac{1}{4}$  via onco 6. fanno onc.  $52 \frac{1}{4}$  d'argento. si sommano fanno onc. 110. le quali si partono per lib. 14. vengono onc.  $7 \frac{1}{2}$  di lega, e torna la lezione.

Alcuno forse non intenderà perchè a moltiplicarsi onco via libbre, il prodotto si aggrava a siccome a partire onco per libbre, il quoziente siano onco quando avviene per la virtuale regola del Trè, perchè

perchè moltiplicandosi lib.  $5\frac{1}{2}$ . per once 10. è come se si dicesse in lib. 1. sono once 10. quante once sono in libbre  $5\frac{1}{2}$ ? è però il prodotto sono once  $52\frac{1}{2}$ . come sono 12. numero di mezzo: moltiplicando partendo onc. 107. per lib. 14. per regola si direbbe così: In lib. 14. ci sono onc. 107. d'argento; quante ne faranno in lib. 1? e vengono onc.  $7\frac{1}{2}$ . effatto tali once: 107. numero di mezzo: E per abbreviare parole non si mettono in regola, stante l'effetto una sola operazione di moltiplicare, e partendo per effetti l'unità, che tiene il luogo d'uno dei tre numeri della regola del Tre.

18. E. Uno ha di due forti d'argento la prima forte è a lega d'onc. 6. la seconda è a lega d'onc. 8. Si domanda volendone pigliare unguale peso di ciascuna forte, per fare un Vaso di libbre 12. a lega d'onc. 9. quanto argento dovrà aggiungere?

R. Si prelevi il rame che è in ciascuna forte per libbre e si troveranno onc. 6. ed onc. 4. che sommate son onc. 10. si dica per regola del Tre: Once 10. confolano libbre 2. che confolano onc. 36. di rame, che sono in lib. 12. a lega d'onc. 9. e verranno lib.  $7\frac{1}{2}$ . e la metà delle quali piglierà di ciascuna forte, cioè lib. 3.  $7\frac{1}{2}$ . e da lib. 7.  $2\frac{1}{2}$ . fino a lib. 12. che sono lib. 4.  $5\frac{1}{2}$ . di argento puro.

19. D. Uno ha fatto un vaso con lib. 3. onc.  $7\frac{1}{2}$ . d'argento a lega d'onc. 6. con altrettanto a lega d'once 8. e sono libbre 4. once  $9\frac{1}{2}$ . d'argento puro. Si domanda a che lega sarà l'argento del Vaso?

R. Per prova dall'opposita, deve venire a lega d'once 9. Si trovi l'argento puro, e dicasi in lib. 1. sono onc. 6. quante ne faranno in lib. 3. onc.  $17\frac{1}{2}$ . e moltiplicando faranno onc. 21.  $7\frac{1}{2}$ . Ancora in lib. 1. sono onc. 8. quante ne faranno in lib. 3. onc.  $24\frac{1}{2}$ . e faranno onc. 28.  $9\frac{1}{2}$ . le quali si sommano con onc.  $57\frac{1}{2}$ . fanno onc. 108. le quali si partono per lib. 12. e vengono onc. 9. di argento.

20. D. Uno si trova agguato di quattro forti, la prima forte imporpora lib. 3. e vale lib. 12. di oro, la seconda lib. 6. e vale la lib. lire 62. la terza lib. 5. e vale la lib. di oro  $65\frac{1}{2}$ . Si domanda mescolando tutto questo argento, quanto ne dovrà aggiungere dell'agguata forte, che vale lire 55. acciò venga argento che vaglia lire 156?

R. Si moltiplichino le libbre delle prime tre forti d'argento, per il loro prezzo, e si sommano i prezzi si fanno lire. 1479. che si partono per 24. somma delle libbre, e vengono lire 61.  $7\frac{1}{2}$  prezzo d'una libbra di argento mescolato. Ora lire. 56. sono prezzo mezzano, la differenza da 56. fino a 61.  $7\frac{1}{2}$ . sono  $5\frac{1}{2}$ . lib. da pigliarsi a prezzo

Q q q 2

di lire

Altre domande si potrebbero fare sopra la lega dell'argento, le quali si tralasciano, essendo bastanti le passate per operare in altre senza errore.

25. D. Una Comunità fa gettare una Campana di libbre 2325 di 5. metalli; de i quali il primo vale lire 16. il secondo lir. 18. il terzo lire 20. il quarto lire 27. ed il quinto lir. 31. il cento se vuole spendere ne metalli lir. 488. sol. 5. Si domanda quante libbre farà pigliare di ciascun metallo?

R. Questa è del Tartaglia libro 15. quesito 32. alle quali si possono dare diverse soluzioni secondo la diversa alligazione, che de' metalli si può fare. Io la risolvo differentemente dal Tartaglia così. Prima trovo quante lire costerà il cento de i metalli mescolati direndo: Libbre 2325. costano lir. 488. soldi 5. quante lire costeranno lib. 100? e verranno lib. 42. prezzo mezzano tra i prezzi de' metalli. Ora si legghino quello da lir. 16. con quello da lir. 27. e quello da lir. 18. con quello da lir. 31. e quello da lir. 20. con quello da lir. 27. saranno queste differenze 6. sotto lir. 16. e 10. sotto lire 18. e 6. sotto lire 20. e 6. sotto lir. 27. e 3. sotto lir. 31. Sommate dette differenze fanno 31. ora si dica: Se 31. fussino libbre 2325. che sarebbero 6. 10. 6. 6. e 3. e sarebbero lib. 450. dalle 2325 lib. 750. da lir. 16. lib. 450. da lir. 20. lib. 450. da lire 27. e libbre 225. da lire 31. le tante ne farà pigliare quella Comunità.

Lib. 2325 — lir. 488 — lib. 100 — lir. 16. 18. 20. 27. 31. — 16  
 4. 6. 10. 6. 3. — 6. 10. 6. 6. 3 — 16  
 1953 — 93 — 1953 — 93 — 1953 — 93 — 1953 — 93 — 1953 — 93  
 93:00 — 93 — 93 — 93 — 93 — 93 — 93 — 93 — 93 — 93  
 Lib. 21. — 93 — 93 — 93 — 93 — 93 — 93 — 93 — 93 — 93

Se 31 — lib. 2325 — 6? | Se 31 — 2325 — 10? | Se 31 — 2325 — 3?  
 13950 — 13950 — 13950 — 13950 — 13950 — 13950 — 13950 — 13950 — 13950 — 13950  
 lib. 450 — 155 — 23250 — 6975 — 6975 — 6975 — 6975 — 6975 — 6975 — 6975  
 155 — 155 — 155 — 155 — 155 — 155 — 155 — 155 — 155 — 155  
 lib. 225 — 155 — 155 — 155 — 155 — 155 — 155 — 155 — 155 — 155

26. D. Una gettò una Campana con metalli di diverso prezzo, e andando con lib. 450. da lir. 16. il 100. lib. 750. da lir. 18. lib. 450. da lir. 20. lib. 450. da lir. 27. e lib. 225. da lir. 31. pure il 100. Si domanda quante lire gli viene a costare detta Campana, e quante peserà?

R. Questa si trova di prova alla passata: Si approssino le lib. 450. a lir. 16. il 100. costeranno 16. e le lib. 750. a lir. 18. costeranno 135. e le lib. 450. a lir. 20. costeranno 90. e le lib. 450. a lir. 27. costeranno 121.5. e le lib. 225. a lir. 31. costeranno 70.3. e tutte insieme faranno 482.8. e la Campana peserà 2325 libbre.

no lir. 135. e lib. 450. à lir. 20. costeranno lir. 90. e lib. 450. à lire 27. costeranno lir. 121. Sol. 10. e lib. 225. à lire 31. il 100. costeranno lir. 69. Soldi 15. onde si sommano queste lire, si averanno lire 488. Soldi 5. per il prezzo si sommano le libbre, e si averanno libbre 2325. per il peso della Campana, come si disse nella passata.

### Dell' Alligazione dell' Oro.

27. D. Si vuol sapere quanto Oro fino, cioè di carati 24. sta in once 16. d' Oro di carati 19. e quanto rame?

R. Per regola del Trè: Se carati 24. scemano à carati 19. si scemeranno once 16. si moltiplicano once 16. per carati 19. il prodotto 304. si parte per 24. e vengono 12  $\frac{2}{3}$ . e tante once d' Oro fino sono in once 16. il resto, cioè onc. 3.  $\frac{1}{3}$ . è di rame.

28. D. Si mescolano insieme onc. 12  $\frac{2}{3}$ . d' oro fino con onc. 3  $\frac{1}{3}$ . di rame; di quanti carati verrà l' Oro?

R. Si moltiplicano onc. 12  $\frac{2}{3}$ . per K. 24. sua finezza, il prodotto 304. si parte per onc. 16. somma di onc. 12  $\frac{2}{3}$ . con onc. 3  $\frac{1}{3}$ . e vengono K. 19. e di tali carati sarà l' oro.

29. D. Un' Orefice pone once 34. d' oro di K. 16. nel Crociolo, e si affinano tanto, che tornano onc. 28. Domando di quanti carati faranno?

R. Per regola del Trè roversa: Si moltiplicano onc. 34. per li suoi carati 16. il prodotto 544. si parte per onc. 28. e vengono K. 19  $\frac{1}{2}$ . cercasi.

30. D. Uno ha onc. 28. d' oro di K. 19  $\frac{1}{2}$ . ed aggiunge rame, talche vengono onc. 34. Si domanda di quanti carati faranno le dette once 34?

R. Per la medesima regola si moltiplicano onc. 28. per K. 19  $\frac{1}{2}$ . il prodotto 544. si parte per onc. 34. e vengono K. 16.

onc. 28 — K. 16 — onc. 34 — Onc. 34 — 19  $\frac{1}{2}$  — onc. 28

34

Per 17

14

14

Per 4

544

272

136

K. 19  $\frac{1}{2}$ 

K. 16

31. D. Un' Orefice ha onc. 10. d' oro à K. 15. ed onc. 14. à K. 18. Si domanda quante onc. d' oro fino ci mescolerà, acciò il composto venga di carati 20?

R. Si moltiplicano onc. 10. per K. 15. ed onc. 14. per K. 18. si sommano i prodotti 150. e 252. la somma 402. si parte per 24. somma dell' once.

dell'once, e vengono K. 16  $\frac{1}{2}$  e tanti saranno onc. 24. mescolate. Adesso si faccia l'alligazione con oro di K. 16  $\frac{1}{2}$  e con oro di k. 24. acciò venga di k. 20. Da k. 16  $\frac{1}{2}$  a k. 20. ci sono 3  $\frac{1}{2}$  da pigliarsi d'oro fino. Da k. 20. a k. 24. ci sono 4. da pigliarsi di k. 16  $\frac{1}{2}$ . però si dica: Se onc. 4. di k. 16  $\frac{1}{2}$ . vogliono onc. 3  $\frac{1}{2}$  d'oro fino, quante ne vorranno onc. 24. di k. 16  $\frac{1}{2}$ ? ed operato, verranno on-  
ce 19  $\frac{1}{2}$ . e tante d'oro fino ne mescolerà, acciò il composto sia di carati 20.

onc. 10 — 15 — 150 K. 16  $\frac{1}{2}$  — 4 Se onc. 4 — onc. 3  $\frac{1}{2}$  — onc. 24?  
onc. 14 — 18 — 252 K. 24 — 3  $\frac{1}{2}$  — onc. 24?

Per 24

408

78

18

K. 16  $\frac{1}{2}$  — 4 — 19  $\frac{1}{2}$  d'oro fin.  
32. D. Prova della passata: Un' Orefice mescola insieme once 10. d'oro di k. 15. onc. 14. di k. 18. ed onc. 19  $\frac{1}{2}$  d'oro fino. Si domanda di quanti carati verrà l'oro mescolato?

R. Si moltiplicano onc. 10. per k. 15. onc. 14. per k. 18. ed onc. 19  $\frac{1}{2}$  per k. 24. i prodotti 150. 252. e 468. si sommano, la somma 870. si parte per la somma dell'once, cioè per 43  $\frac{1}{2}$ . e vengono k. 20. come si disse nella passata.

33. D. Un' Orefice deve fare una Coppa di Pisside con onc. 30. d'oro di K. 21. Si domanda avendo oro fino, ed oro di k. 15. quanto ne doverà pigliare di ciascuna sorte.

R. Si trovino le differenze, da k. 15. a k. 21. è 6. da pigliarsi d'oro fino, cioè di k. 24. e da k. 21. a k. 24. è 3. da pigliarsi di k. 15. Si sommi 6. con 3. fa 9. e si dice: Se 9. fossero onc. 30. che farebbono 3? e saranno onc. 10. di k. 15. e che farebbono 6? e saranno onc. 20. di k. 24. cioè oro fino.

Carati 15 — 3. Se 9 — onc. 30 — 3? onc. 10. di k. 15

Carati 21.

Carati 24 — 6. Se 9 — onc. 30 — 6? onc. 20. d'oro fino.

34. D. Prova della passata. Uno deve fare una Coppa di Pisside d'oro a bontà di carati 21. ed ha onc. 10. di k. 15. Si domanda quanto oro fino aggiungerà, e quante once peserà?

R. Da K. 15. a k. 21. ci sono 6. che si pigliano d'oro fino. e da k. 21. a k. 24. ci sono 3. che si pigliano d'oro di k. 15. per lo che si dica: Se 3. da k. 15. ricercano 6. d'oro fino, onc. 19. di k. 15. quante once d'oro fino ricercano? e verranno onc. 20. e tante s'aggiungeranno d'oro fino, che con le onc. 10. fanno onc. 30. di peso.  
K. 21

K. 21	Se 3 ← 6 ← on. 10?	onc. 10
K. 15	10	onc. 20
3	60	onc. 30.

once 20 d'oro fino.

35. D. Un' Orefice fonde, ed unisce insieme quattro qualità d'oro onc. 6. di k. 17. onc. 12. di k. 20. onc. 14. di k. 18. ed once 16. di k. 22. Si domanda di quanti carati sarà l'oro composto?

R. Si moltiplicano l'once per i suoi carati, i prodotti 102. 240. 252. e 352. si sommano, fanno 946. che si partono per 48. somma dell'once, e vengono carati  $19\frac{2}{3}$ . di quanti sarà l'oro composto.

36. D. Prova della passata. Un' Orefice ha unito insieme quattro qualità d'oro, cioè onc. 6. di k. 17. onc. 12. di k. 20. onc. 14. di k. 18. ed altre once d'oro d'altri carati, e ne sono risultate once 48. di carati  $19\frac{2}{3}$ . Si domanda la quantità, e la qualità del quarto oro?

R. Per trovare la quantità si sommano Once 6. onc. 12. ed onc. 14. fanno onc. 32. le quali si sottrano da onc. 48. e restano onc. 16. del quarto oro. Per trovare di quanti carati, si moltiplicano onc. 6. per k. 17. onc. 12. per k. 20. onc. 14. per k. 18. i prodotti 102. 240. e 252. si sommano, e fanno 594. si moltiplicano ancora onc. 48. per k.  $19\frac{2}{3}$ . fanno 946. da questi si sottrano 594. e resta 352. prodotto dell'onc. 16. per i suoi carati. Onde partendo 352. per 16. risultano k. 22. per la qualità dell'oro, e resta provata la passata.

37. D. Un' Orefice deve fare un Vaso d'oro, che pesi libbre 5. ed ha oro di k. 13. 14. 16. 21. 22. e 24. Si domanda quante once piglierà di ciascuna sorte, acciò il vaso sia di carati 18?

R. Diversamente si potrebbe soddisfare alla domanda, secondo la diversa allegazione. Adesso si legghi l'oro di k. 13. e di k. 24. trovando le differenze rispetto a quello di k. 18. ponendo 6. sotto k. 13. e 5. sotto k. 24. si legghi ancora l'oro di k. 14. e di k. 22. ponendo la differenza 4. fino a K. 18. sotto l'uno, e l'altro. Medesimamente si legghi l'oro di K. 16. e K. 21. rispetto a k. 18. ponendo le differenze 3. sotto K. 16. e 2. sotto K. 21. le differenze 6. 4. 3. 2. 4. e 5. si sommano, fanno 24. Per regola del Trè: Se 24. fossero onc. 60. che sarebbe alcuna differenza 6. 4. 3. 2. 4. e 5? e farebbero onc. 10. di K. 13. onc. 10. di K. 14. onc. 7  $\frac{1}{2}$ . di K. 16. onc. 5. di K. 21. onc. 10. di K. 22. e onc. 12  $\frac{1}{2}$ . di k. 24. cioè d'oro fino; e tante ne piglierà l'Orefice per fare il Vaso, che pesi lib. 5. d'oro di K. 18.

R r r

K. 18.

K. 13. 14. 16 21. 22. 24

Differenze 6. 4. 3. 2. 4. 5

38. D. Prova della passata. Un' Orefice ha fatto un vaso con queste quantità, e qualità d'oro, cioè con onc. 15. di K. 13. con on-  
ce 10. di K. 14. onc.  $7\frac{1}{2}$  di K. 16. con onc. 5. di K. 21. con onc.  
10. di K. 22. e con onc.  $12\frac{1}{2}$  di K. 24. Si vuol sapere di quanti  
carati sarà l'oro del Vaso?

R. Deve venire di K. 18. essendosi bene operato; però si moltipli-  
cano onc. 15. per li suoi carati 13. e così l'altre onze; i prodotti  
195. 140. 120. 105. 220. 300. si sommano, e la somma 1080. si  
parte per la somma dell'onze, cioè per 60. e verranno 18. per  
li carati, che si volevano per prova della passata.

39. D. Uno ha oro di K. 15. e di K. 18. e vuol pigliare la medesima  
quantità di ciascun' oro, per fare un Vaso d'onze 35. di car. 20.  
con aggiungerò oro fino. Si domanda quante onze di ciascuno  
pigherà, e quant'oro fino aggiungerà?

R. Si moltiplicano onc. 35. per K. 4. per trovare il rame, il pro-  
dotto 140. si parte per 15. somma delli car. di rame; da K. 15.  
e da K. 18. fino a K. 24. vengono onc.  $9\frac{1}{2}$ . che piglierà di ciascu-  
na sorte, e sommate onc.  $9\frac{1}{2}$  con  $9\frac{1}{2}$ . fanno onc. 18.  $\frac{1}{2}$ . che sot-  
tratte da onc. 35. restano onc.  $16\frac{1}{2}$  d'oro fino che aggiungerà.

24	24	24	onc. 35	onc. $9\frac{1}{2}$	da onc. 35
20	15	18	4	onc. $9\frac{1}{2}$	sottra 18 $\frac{1}{2}$
<hr/>			<hr/>	<hr/>	<hr/>
4	9	5	Per 15 — 140	18 $\frac{1}{2}$	Oro onc. 16 $\frac{1}{2}$

40. D. Prova della passata; Uno fa un Vaso d'oro con onc.  $9\frac{1}{2}$ . di  
K. 15. e con altre onc.  $9\frac{1}{2}$ . di K. 18. e con onc. 16  $\frac{1}{2}$ . di K. 24.  
Domandasi di quanti carati sarà l'oro del Vaso?

R. Si moltiplicano onc.  $9\frac{1}{2}$ . per K. 15. fanno 140. ed onc.  $9\frac{1}{2}$ . per  
K. 18. fanno 158. ed onc. 16  $\frac{1}{2}$ . per K. 24. fanno 396. si somma-  
no questi prodotti, fanno 700. che si partono per l'onc. 35. e  
vengono 20. carati, e di tanti è l'oro del Vaso.

41. D. Uno ha due pezzi d'oro, l'uno de quali vale Fior. 64. la  
libbra, e l'altro vale Fior. 56. la lib., e tutti due pesano insieme  
una libbra, e valgono Fior. 60. Domanda, che valerà ciascun  
pezzo da per sé solo.

R. Questa è di Nicolo Tartaglia lib. xxi. questo 55. di Comph-  
gnie, il quale dice: Fa come una Compagnia, aggiungi insieme  
56. e 64. fanno 120. poi moltiplica onc. 12. via 64. fa onc. 768.  
da partire per 120. ne viene onc. 6.4. e tanto pesa il pezzo da 64.  
Fior. e



**F**iorini per libbra: Poi per l'altro moltiplica onc. 12. via 56. ed il prodotto parti per 120. ne viene onc.  $5 \frac{1}{2}$ . e tanto pesa il pezzo da 56. Fiorini la libbra; e se tu la provi la troverai star bene; Ed io dico, che si troverà star male; perchè il pezzo d' onc.  $6 \frac{1}{2}$ . a 54. Fiorini la libbra costerà Fior. 34.  $\frac{1}{2}$ . l'altro pezzo di onc.  $5 \frac{1}{2}$ . a 56. Fior. la libbra, costerà Fior. 26  $\frac{1}{2}$ . che sommati con Fior. 34  $\frac{1}{2}$ , fanno Fiorini 60  $\frac{1}{2}$ , e dovevano esser solo Fior. 60.

**P**oi all'andandosi fodisfa per regola d' allegazione. Il prezzo mezzano è Fior. 60. il maggiore Fior. 64. il minore Fior. 56. si trovano le differenze da 56. a 60. è 4. da porsi sotto Fior. 64. e da 64. a 60. pure è 4. da porsi sotto Fior. 56. e perchè le differenze sono uguali, ugualmente pesa ciascun pezzo, cioè onc. 6. per sua regola la somma delle differenze è 8. e se 8. fossero onc. 12. che farebbero 4. on. e portaranno onc. 6. e 6. il pezzo di Fior. 64. la libbra costerà Fior. 32. ed il pezzo di Fior. 56. la libbra costerà Fior. 28. che sommati con Fior. 32. fanno Fior. 60. quanti si differo valere.

Fior. 64 — 4	Se 8 — onc. 12 — 4 <sup>o</sup> onc. 6
Fior. 56 — 4	onc. 12 — 54 — onc. 6 — Fior. 32
	onc. 12 — 56 — onc. 6 — Fior. 28

8

Fior. 60

**22. D.** Uno ha due pezzi d'argento, che pesano una libbra; l'argento del primo vale lire 60. la libbra, l'argento del secondo vale lire 44. la libbra. Si domanda valendo quei due pezzi insieme lire 50. quanto pesava il primo, ed il secondo da per se?

**R.** Si ponga il prezzo mezzano di lire 50. e di sopra quello di lire 60. e di sotto quello di lire 44. si trovino le differenze da lire 50. a lire 60. la differenza è 10. la quale si pone di rispetto a lire 44. pure da lire 50. a lire 44. la differenza è 6. che si pone di contro a lire 60. si sommano le differenze 10. e 6. fanno 16. Per regola del Tre; Se 16. fossero onc. 12. che farebbe 10<sup>o</sup> e farebbero onc.  $7 \frac{1}{2}$ . da lire 44. Di nuovo; Se 16. fossero onc. 12. che farebbero 6<sup>o</sup> e farebbero onc.  $4 \frac{1}{2}$ . da lire 60. dunque il primo pezzo pesava onc.  $4 \frac{1}{2}$ . il secondo pezzo on.  $7 \frac{1}{2}$ .

Lir. 60 — 6	Se 16 — 12 — 6 <sup>o</sup> onc. 4 $\frac{1}{2}$
Lir. 44 — 10	Se 16 — 12 — 10 <sup>o</sup> onc. 7 $\frac{1}{2}$
	onc. 12

16

R r r 2

42. D.

43. D. Prova della passata. Un pezzo d'argento pesa once 4  $\frac{1}{2}$  e vale la libbra lire 60. Un' altro pezzo pesa once 7  $\frac{1}{2}$  e vale la libbra lire 44. Si domanda, che valeranno quelli due pezzi insieme?

R. Essendosi bene risolta la passata, devono valere lire. 50. come si disse. Per regola del Frè: Se onc. 12. costano lire. 60. che costeranno onc. 4  $\frac{1}{2}$ ? e costeranno lire. 22  $\frac{1}{2}$  di nuovo: Se onc. 12. costano lire. 44. che costeranno onc. 7  $\frac{1}{2}$ ? e costeranno lire. 27  $\frac{1}{2}$ . le quali sommate con lire. 22  $\frac{1}{2}$ . fanno lire. 50. quante si disse dovete valere i due pezzi: sicchè sia bene.

Niccolò Tartaglia rispose a quello, che non aveva proposto, perchè domandando nel quesito il prezzo delli due pezzi d'argento, ne assegnò il peso, benchè falso di quelli; E per questo ha proposte queste due antecendenti domande, acciò si conosca distintamente il peso, ed il prezzo, arguendosi dalla cognizione d'uno alla cognizione dell' altro, e così tra se si provano.

### Dell' Alligazione d' altre cose.

44. D. Sono due vini, il fiasco del primo vale Sol. 6. ed il fiasco del secondo vale Sol. 9. Si domanda quanto si doverà pigliare di ciascuno, acciò un fiasco costi Soldi 7?

R. La differenza da Soldi 6. a 7. è 1. che si pone di contro al vino di Sol. 9. e la differenza da Sol. 7. a 9. è 2. che si pone di contro al vino di Sol. 6. sommate le differenze 1. e 2. fanno 3. prendi somma di due rotti, col numeratore 1. e 2. anche dicono  $\frac{1}{3}$  e  $\frac{2}{3}$ . sicchè si doverà pigliare  $\frac{1}{3}$ . del vino da Soldi 9. e  $\frac{2}{3}$ . del vino da Soldi 6.

Da Soldi 7. a Soldi 9. — 1. di Soldi 9. — 12. R.  
a Soldi 6. — 2. di Soldi 6. — 8.

45. D. Uno ha due forti di vino: il barile della prima forte vale lire 6. 13. 4. ed il barile della seconda vale lire 8. 10. Domando volendone vendere barili 24. tra tutte due le forti, che il barile venga a valere lire. 7. 16. 8. quanto vino doverà pigliare di ciascuna forte?

R. Si trovino le differenze del prezzo mezzando al minore di lire. 13. 4. al maggiore di lire. —. Sol. 13. 4. la somma lire. 1. 16. 8; Ora per regola del Frè; pigliando i Soldi, e denari in parte di lira: si dica: Se lire. 1  $\frac{1}{2}$ . desse barili 24. che darebbe lire. 1  $\frac{1}{2}$ ? e ne darebbe barili 15. frasci 5  $\frac{1}{2}$ . del vino da pigliarsi di lire. 8. 10. Di nuovo: Se lire. 1  $\frac{1}{2}$ . desse barili 24. che darebbe  $\frac{1}{2}$  di lira? e darebbe barili 9. 14  $\frac{1}{2}$ . da lire 6. 13. 4. e tanti ne doverà pigliare.

Lire

561

Lir.  $7\frac{1}{2}$     Lir.  $8\frac{2}{3}$  -  $1\frac{1}{3}$     Se  $1\frac{1}{2}$  - bar. 24 -  $1\frac{1}{2}$  - b. 15. 5  $\frac{1}{2}$ .  
               Lir.  $6\frac{1}{3}$  -  $\frac{1}{3}$     Se  $1\frac{1}{2}$  - bar. 24 -  $\frac{1}{2}$  - b. 8. 14  $\frac{1}{2}$ .

### Barili 24

46. D. Prova della passata. Uno ha venduto Barili 15. 5  $\frac{1}{2}$ . à lir.  $8\frac{2}{3}$ . e Barili 8. fiaschi  $14\frac{1}{2}$ . à lir.  $6\frac{1}{3}$ . il Barile. Si domanda quanto valerà un Barile di mescolato?

R. Si trovi il prezzo di barili 15. 5  $\frac{1}{2}$ . moltiplicandogli per lire  $8\frac{2}{3}$ . valeranno lir. 129. 16. 4. si trovi il prezzo di barili 8.  $14\frac{1}{2}$ . à lir.  $6\frac{1}{3}$ . il barile con moltiplicare, valeranno lir. 58. 3. 8. le quali si sommano con lir. 129. 16. 4. fanno lir. 188. le quali si partono per 24. somma de' barili, vengono lir. 7. 16. 8. prezzo d'un barile di mescolato che dovevano venire.

47. D. Uno ha vino in Roma da quattrini 10. che sono bajocchi 2. la foglietta, volendolo vendere a quattrini 8. la foglietta, senza scapitate, che parte d'acqua ci aggiungerà?

R. A modo d'allegazione, il prezzo mezzano sono quattrini 8. tra quattrini 10. di vino, e tra quattr. 8. acqua dall'8. al 10. la differenza è 2. per la parte dell'acqua, e dal zero all'8. ci è 8. per la parte del vino, sicchè 8. misure di vino vogliono 2. misure d'acqua; ma per sapere la parte; si somma 8. è 2. fa 10. denominatore di due rotte col numeratore 2. e 8. sono  $\frac{2}{10}$ . e  $\frac{8}{10}$ . che schifati sono  $\frac{2}{5}$  d'acqua, e  $\frac{4}{5}$  di Vino.

Vino quat. 10 — 8

Quattrini 8 — — Che sono  $\frac{4}{5}$  di Vino  $\frac{2}{5}$  d'Acqua.

Acqua quat. 0 — 2 Schifati  $\frac{2}{5}$  di Vino  $\frac{4}{5}$  d'Acqua.

48. D. Prova della passata. Uno ha vino da quattrini 10. la foglietta e ci può acqua, talmente che  $\frac{2}{5}$  è acqua, e  $\frac{3}{5}$  sono vino. Domando quanto dovrà vendere tal vino adacquato, per non perdersi, né guadagnarti?

R. Facilmente si soddisfa alla domanda, dicendo: Se una foglietta vale quattr. 10. che valeranno  $\frac{3}{5}$  di foglietta: ed operato con moltiplicare 10. per il numeratore 3. il prodotto 30. con partirlo per il denominatore 5. verranno quattrini 6. tanti dovrà vendere tal vino inacquato.

Foglietta 1 — Quattrini 10 —  $\frac{3}{5}$ ? Quattrini 6

49. D. Uno ha Vini di tre prezzi: Il primo vale a ragione di quattrini 6. la foglietta: Il secondo a ragione di quattrini 12. Il terzo a ragione di quattr. 14. Questo vorrebbe pigliare la medesima quantità di ciascuno de' tre vini, ed aggiungere tant' acqua, che

che venisse a costare la foglietta del mescolato, ed adacquato quattrini 8. appunto. Si domanda, che acqua aggiungerà, per non perderci, ne guadagnarci?

R. Si fa a modo d'allegazione; Si trovano le differenze da quattrini 8. a 10. a 12. ed a 14. sono 2. 4. 6. le quali si sommano, fanno 12. Adesso si moltiplicano quattr. 8. via 3. per li 3. vini, fanno 24. sicchè 12. misure d'acqua ricercano 8. misure di ciascun vino 8. di tutti trè. Sommato 12. con 24. viene 36. denominatore, che con 12. e 24. numeratori, sono  $\frac{2}{3}$ . e  $\frac{4}{3}$ . schifati.  $\frac{2}{3}$ . d'acqua, e  $\frac{4}{3}$ . di quei vini.

Quat. 10 — 12 — 14 a 8 24 sono  $\frac{2}{3}$  schif.  $\frac{2}{3}$  di 4. vini.  
8 — 8 — 8 4 3 12

————— 6 ————— Sono  $\frac{2}{3}$  schif.  $\frac{2}{3}$  d'Acqua.  
2 4 6 12 24 36

50. D. Come si prova che non guadagni, ne perda?

R. Si pigliano fogliette 9. che fogliette 6. sono de' vini, cioè fogliette 2. di ciascuna vino; che a quattr. 10. costano quattrini 10. a quattr. 12. costano quattr. 24. ed a quattr. 14. la foglietta costano quattr. 28. che sommati fanno quattr. 72. e fogliette 3. sono d'acqua, che fanno fogliette 9. a quattr. 3. la foglietta, importano quattr. 72. quanti si disse importare i vini a i loro prezzi, sicchè sta bene. Si prova ancora.

Fogliette 9	Fogliette 2	2	2	20
Quattrini 8	Quattrini 10	18	14	24
				28
Quattrini 72	20	24	28	Quattrini 72

51. D. Uno piglia ugual quantità di vino di trè sorti da quattrini 10. 12. e 14. la Foglietta, e mescola  $\frac{2}{3}$  d'acqua, e  $\frac{2}{3}$  di tali vini. Si domanda, vendendo il vino mescolato senza guadagno, e perdita, quanto lo venda per foglietta?

R. Si sommano quattrini 10. 12. e 14. prezzo delle trè fogliette di vino differente, fanno quattrini 36. li quali si partono per 3. vengono quattr. 12. prezzo d'una foglietta di mescolato di trè vini. Ora si dica: Se foglietta 1. vale quattrini 12. che valeranno  $\frac{2}{3}$  di foglietta di quei vini, quando ci è un terzo d'acqua? Si opera con moltiplicare 12. per il numeratore 2. il prodotto 24. si parte per il denominatore 3. e verranno quattrini 8. e tanto lo vende la foglietta, come si disse di sopra.

52. D. Uno ha comprato staja 72. di trè sorte di Grano, da sol. 48. 54. e 60. lo stajo, e gli venne a costare lo stajo l'uno per l'altro sol. 56. Si domanda quante staja comprò di ciascuna sorte?

R. Si

R. Si trovino le differenze, da fol. 48. à fol. 56. ci sono soldi 8. li quali si pongono di contro à fol. 60. e da questi à fol. 56. ci sono 4. da porsi di contro à fol. 48. Ora da fol. 54. à 56. ci sono 2. che si pone di contro à fol. 60. e da questi à fol. 56. ci sono 4. da metterli di contro à fol. 54. Si sommano le differenze fanno 18. e si dice: Se 18. fussero staja 72. che farebbero 4. da fol. 48. 4. da fol. 54. e 10. da fol. 60? e verranno no staja 16: 16. e 40.

$\begin{array}{r} 48 - 4 \\ 56 \quad 54 - 4 \\ 60 - 8. 2 \\ \hline 18 \end{array}$	$\begin{array}{r} 18 - 72 - 4^2 \quad 16 \text{ Staja da soldi } 48 \\ 18 - 72 - 4^2 \quad 16 \text{ Staja da soldi } 54 \\ 18 - 72 - 10^2 \quad 40 \text{ Staja da soldi } 60 \end{array}$	
--	---	--

53. D. Il braccio del panno rosso vale lir. 9. del verde lir. 6. e del nero lire 4. Si domanda, volendone pigliare braccia 36. di tutte le forti, quante ne doverà pigliare di cias cuna, con spendere lire 270?

R. Per braccia 36. si partono lir. 270. vengono lir. 7  $\frac{1}{2}$ . prezzo mezzano d'un braccio. Ora da lir. 4. à lir. 7  $\frac{1}{2}$ . ci sono 3  $\frac{1}{2}$ . e da lir. 6. à lir. 7  $\frac{1}{2}$ . ci sono 1  $\frac{1}{2}$ . da porsi di contro à lir. 9. e da queste à lir. 7  $\frac{1}{2}$ . ci sono 1  $\frac{1}{2}$ . da porsi di contro à lir. 4. è à lir. 6. queste differenze si sommano fanno 8. per il che, se 8. fussero 36. che farebbero 1  $\frac{1}{2}$ ? e verranno braccia 6  $\frac{1}{2}$ . da lir. 4. e da lir. 6. Di nuovo: Se 8. fussero 36. che farebbe 5? e verranno braccia 22  $\frac{1}{2}$ . da lir. 9. cioè braccia 22  $\frac{1}{2}$ . di rosso, braccia 6  $\frac{1}{2}$ . di verde, e braccia 6  $\frac{1}{2}$ . di nero.

$\begin{array}{r} \text{Lir. } 4 - 1 \frac{1}{2} \\ \text{Lir. } 7 \frac{1}{2} - 1 \frac{1}{2} \\ \text{Lir. } 9 - 3 \frac{1}{2} \quad 1 \frac{1}{2} \\ \hline 8 \end{array}$	$\begin{array}{r} \text{Se } 8 - 36 - 1 \frac{1}{2} \quad 6 \frac{1}{2} \\ \text{Se } 8 - 36 - 5^2 \quad 22 \frac{1}{2} \end{array}$	
---	--	--

54. D. Uno compra braccia 6  $\frac{1}{2}$  di Panno nero à lir. 4. e braccia pure 6  $\frac{1}{2}$ . di Panno verde à lir. 6. e braccia 22  $\frac{1}{2}$  di Panno rosso à lir. 9. il braccio. Si domanda quante lire spenda, e che gli venga à costare il braccio de i trè Panni?

R. Serve di prova alla passata: Si moltiplicano braccia 6  $\frac{1}{2}$ . per lir. 4. e braccia 6  $\frac{1}{2}$ . per lir. 6. e braccia 22  $\frac{1}{2}$ . per lir. 9. i prodotti 27. 40  $\frac{1}{2}$ . e 202  $\frac{1}{2}$ . si sommano fanno lir. 270. che spende, le quali si partono per 36. somma delle braccia, e vengono lir. 7  $\frac{1}{2}$ . prezzo del braccio de' trè Panni.

55. D. Uno si vuol provvedere di libbre 30. delle seguenti Droghe: di Pepe à giulj 3. la libbra, di Garofani à giulj 4. di Cannella à giulj 6. di Zafferano à giulj 9. di Zenzero à giulj 10. e di Nocemoscata

moscata à giulj 12. la libbra. Si domanda volendo spendere giulj 400. quante libbre piglierà di ciascuna sorte?

R. Si partono giulj 400. per lib. 50. e vengono giulj 8. per prezzo mezzano d'una libbra di dette Droghe / In molti modi si può fare l'allegazione secondo che più piace : Ora si legghì il Pepe con Noce moscata , ponendo la differenza 5. che è da 3. al 8. di contro al 12. e la differenza 4. da 12. à 8. di contro al 3. si leghino i Garofani con il Zenzero , ponendo la differenza 4. di contro al 10. e la differenza 2. di contro al 4. finalmente si legghì la Cannella col Zafferano , ponendo 1. di contro al 6. e 2. di contro al 9. Avvertasi, che una Droga si potrebbe legare più volte con l'altre differentemente , la somma delle Droghe è 18. onde à modo di regola di compagnia , si dica : Se 18. fussero lib. 50. che sarebbero 4. 2. 1. 2. 4. 5. e sarebbero lib. 11  $\frac{1}{2}$ . di Pepe , lib. 5  $\frac{1}{2}$ . di Garofani , lib. 3  $\frac{1}{2}$ . di Cannella , lib. 5  $\frac{1}{2}$ . di Zafferano , lib. 11  $\frac{1}{2}$ . di Zenzero , e libbre 13  $\frac{1}{2}$ . di Noce Moscata , e tante libbre piglierà di ciascuna sorte, che in tutto sono lib. 50. che costeranno giulj 400.

			9	
3 — 4		4 $\frac{1}{2}$ —	lib. 11. 1 —	di Pepe
4 — 2		2 $\frac{1}{2}$ —	5. 5 —	di Garofani
8 6 — 1	Se 18 — lib. 50 —	1 $\frac{1}{2}$ —	2. 7 —	di Canella
9 — 2		2 $\frac{1}{2}$ —	5. 5 —	di Zafferano
10 — 4		4 $\frac{1}{2}$ —	11. 1 —	di Zenzero
12 — 5		5 $\frac{1}{2}$ —	23. 8 —	di Noce mos.
18			lib. 50	

56. D. Avendo detto che in molti modi si possono legare i prezzi minori con i maggiori rispetto al prezzo mezzano, come si fa l'allegazione in altro modo?

R. Il prezzo del Pepe si legghì col prezzo del Zafferano, e del Zenzero il prezzo de' Garofani si legghì col prezzo pure del Zafferano , e del Zenzero , e il prezzo della Cannella con la Noce Moscata , allora la somma delle differenze è 30. ed operato come nell' antecedente dicendo: Se 30. fussero 50. ovvero 3. fussero 5. che sarebbero 3. 3. 3. 4. 9. 9. e 2  $\frac{1}{2}$  e sarebbero libbre 5. di Pepe , lib. 5. di Garofani , lib. 6  $\frac{1}{2}$ . di Cannella , lib. 15. di Zafferano , libbre 15. di Zenzero , e lib. 3  $\frac{1}{2}$ . di Noce Moscata , e così variandosi allegazione , secondo che uno voglia più d'una sorte , che d'un'altra , sempre si averanno lib. 50. con lir. 400.

57. D. Uno vende Quaglie à quattrini 6. l'una , Tordi à quattrini 4. l'uno , e Storni à quattrini 2. l' uno . Si domanda volendone uno 48. di questi uccelli per sol. 48; di quattrini 3. l'uno , quanti n'averà di ciascuna sorte ?

R. Si



i Metalli, e le Mercanzie à peso, ed à misura.

Benchè tali domande appartengano all'allegazione, tuttavia per tale regola per lo più verranno rotti, non incontrandosi a partire senza avanzo il numero degli Animali, o d'altre cose per la somma delle differenze, che però volendosi Animali, e altre cose intiere, ci bisognano alcune industrie, delle quali nella risposta della Domanda seguente.

58. D. Uno compra staja 50. trà Grano, Vecce, e Panico per lir. 50. pagando lir. 2. lo stajo del Grano lir.  $1\frac{1}{2}$ . lo stajo delle vecce, e  $\frac{1}{2}$ . di lira lo stajo del Panico. Si domanda quante staja compra di ciascuna cosa distintamente?

R. Facendo l'allegazione controvate la differenza dalle 2. à dir. 1. prezzo mezzano, sarà lir. 1. da porsi di contro à  $\frac{1}{2}$  di lira, pure da lir.  $1\frac{1}{2}$ . à lir.  $1\frac{1}{2}$ . di lira, da porsi di contro à  $\frac{1}{2}$ . ma da  $\frac{1}{2}$ . à lir. 1. sono  $\frac{1}{2}$ . di differenza da porsi di contro à lir. 2. e a lir.  $1\frac{1}{2}$ . si sommano le differenze fanno  $2\frac{1}{2}$ . per regola di compagnia. Se  $2\frac{1}{2}$ . fossero 50. che farebbero  $\frac{1}{2}$ . e farebbero staja  $8\frac{1}{4}$ . di grano, e staja  $8\frac{1}{4}$ . di vecce, E che farebbero  $1\frac{1}{2}$ ? E farebbero staja 32.  $\frac{1}{4}$ . di Panico. Che sono in tutto staja 50. e vagliono lir. 50. a i prezzi detti.

$$\begin{array}{rcl} \text{lir. 2} & \text{---} & \frac{1}{2} \\ \text{lir. } 1\frac{1}{2} & \text{---} & \frac{1}{2} \\ \hline & & 1 \end{array} \quad \begin{array}{rcl} \text{Se } 2\frac{1}{2} & \text{---} & 50 \\ & & \frac{1}{2} \end{array} \quad \begin{array}{rcl} \text{staja } 8\frac{1}{4} & & \\ \text{staja } 8\frac{1}{4} & & \\ \hline & & 17\frac{1}{2} \end{array}$$

Ma volendo staja intiere, si piglia tutto il numero di minore prezzo cioè staja 50. di Panico, che a  $\frac{1}{2}$ . di lira costano lir. 50. le quali si sottrano da lir. 50. restano lir. 20. Ora si sottrano  $\frac{1}{2}$ . di lira da lir. 2. e da lir.  $1\frac{1}{2}$ . restano lir.  $1\frac{1}{2}$ . e  $\frac{1}{2}$ . Si riduce lir.  $1\frac{1}{2}$ . in decimi sono  $\frac{15}{10}$ . e le lir. 20. restate in decimi fanno  $200\frac{10}{10}$ . li lascia il Denominatore 10. e si fa di 200. due parti, che l'una si parte per 14. e l'altro per 9. senza avanzo; Per ciò fare, si sottra 14. da 200. e tante volte, fin tanto, che il 9. parta per l'appunto il numero che resta, e qui si sottra il 14. quattro volte, e resta 14. il qual partito per 9. ne vien 16. per le staja delle vecce, e 4. sono le staja di grano, per il 14. quattro volte sottratto, che sommate con 16. fanno staja 20. sino in staja 50. sono staja 30. di Panico, le quali a  $\frac{1}{2}$ . di lira per stajo costano lir. 15. staja 16. di vecce à lir.  $1\frac{1}{2}$ . per stajo costano lir. 24. e staja 4. di grano a lir. 2. costano lir. 8. onde sommate lir. 2. 24. e 15. fanno lir. 50. quante si disse valere.

Avvertasi, che quando il numero non si potesse partire in parti che fusse-



fussero divise appunto da i numeri, allora non si potria sciogliere il quesito senza rotti :

59. D. Uno Spenditore spende grossi 60. in 60. capi, tra Galline Piccioni, Quaglie, e Tordi. La Gallina vale grossi 5. il Piccione grossi 3. la Quaglia  $\frac{7}{4}$ . di grosso, e il Tordo  $\frac{5}{2}$ . di grosso. Domando quante Galline, Piccioni, Quaglie, e Tordi averà?

R. Si pigliano Tordi 60. di minor prezzo a  $\frac{5}{2}$ . di grosso, costano grossi 15. li quali si sottrano da grossi 60. restano grossi 45. si sottri  $\frac{5}{2}$ . da grossi 5. da grossi 3. e da  $\frac{7}{4}$ . di grosso, restano  $4\frac{7}{4}$ . a  $\frac{7}{4}$ . e  $\frac{7}{4}$ . che ridotti sono 95. 55. e 3. ventesimi. Si riducano grossi 45. in ventesimi moltiplicando per 20, sono 900. di 900. si facciano 3. parti da partirsi una per 95. l'altra per 55. e la terza per 3. senza avanzo. Per far questo si moltiplichi 3. via 5. stante che 5. Quaglie costano grossi 2. e fa 15. il quale si sottri da 900. resta 885. dal quale si sottri 95. tante volte, che il restato numero si parta per 55. appunto. E così si sottra 7. volte resterà 220. che il 55. lo parte 4. volte appunto. Siechè 900. vien partito in 665. che si parte per 95. e vengono Galline 7. in 220. che si parte per 55. e vengono Piccioni 4. e in 15. che si parte per 3. e vengono Quaglie 5. che sommate con 4. Piccioni, e 7. Galline fanno 16. sino in 60. si pigliano Tordi 44. e si è soddisfatto alla domanda. Si prova; Galline 7. a grossi 5. costano grossi 35. Piccioni 4. a grossi 3. costano grossi 12. Quaglie 5. a  $\frac{7}{4}$ . di grosso, costano grossi 2. e Tordi 44. a  $\frac{5}{2}$ . di grosso l'uno costano grossi 11. che sommati fanno grossi 60. quanti si disse valere li 60. capi, e così si fanno le simili.

60. D. Uno manda un suo Fattore alla Fiera, e diedegli ducati 100. e gli ordina, che compri Pecore a mezzo ducato l'una, e le Capre ad un terzo ducato l'una, e li Porci a ducato 1. l'uno, e gli Asini a ducati 3. l'uno, e vuole, che spenda duc. 100. e compri in tutto 100. di detti animali. Si domanda quanti faranno di ciascuna sorte?

R. Questa è di F. Luca a carte 105. il quale mostra di risolverla per doppia falsa posizione; ma per tal regola, se non è impossibile, almeno è assai difficile; e conclude, che comprò Pecore 8. Capre 32. Porci 22. ed Asini 19. che a i detti prezzi costano duc. 100. Se a tal quesito, ed a i simili a questo si vogliono dare non una sola, ma più soluzioni con facilità, si cercano d'uguagliare le bestie a i ducati, che costano meno, ovvero più d'un ducato, che qui sono Pecore, Capre, ed Asini, pigliando Pecore 4. che costano duc. 2. Capre 3. che costano duc. 1. ed Asini 2. che costano duc. 6. onde saranno bestie 9. e 9. ducati, sino in 100. Si pi-

gliano Porci 91 ad un ducato l'uno. Si è sciolto il quesito. Di più raddoppiando quelle tre prime sorti di bestie saranno 18. fino in 100. si pigliano Porci 82. e triplicandole saranno 27. quadruplicandole 36. ed il resto fino in 100. si pigliano porci. Et acciò si veda che l'uguagliare le bestie a i ducati è facile, si uguagliano in altre sorte pigliando pecore 4. per duc. 2. capre 6. per duc. 2. asini 3. per duc. 9. che in tutto sono bestie 13. e duc. 13. fino in 100. si pigliano porci 87. Si può variare soluzione con duplicare, triplicare &c. le bestie aggiungendo porci fino in 100.

Pecore 4 — duc. 2	Pec. 4 — duc. 2	Pec. 8 — duc. 4
Capre 6 — duc. 2	Cap. 6 — duc. 2	Cap. 12 — duc. 4
Asini 3 — duc. 9	As. 13 — duc. 9	As. 6 — duc. 18

Porci 91 duc. 91 Porci 87 duc. 87 Porci 74 duc. 74

Bestie 100 duc. 100. 100. 100. 100. 100.  
 61. D. Uno manda un suo Fattore alla Fiera, e gli dà duc. 200. con questo patto, che compri 200 bestie. Pecore ad un terzo di ducato l'una, capre a mezzo ducato l'una, porci a duc. 1. l'uno. Asini a ducati 3. l'uno, e muli a duc. 12. l'uno. Domando quanti capi torrà di ciascuna sorte.

R. Questa pone il Tarraglia nel libro 7. al num. 44. il quale di quella di F. Luca dice, che s'ingegna di risolverla per doppia falsa posizione, ma che si solvono tali domande per vie naturali, ed a tastoni: Tuttavia si contradice, mentre ponibile figura di posizione doppia a risolvere la sua domanda, come qui.

Per 78. 68. 38. 16. 6. più 16. fa 1344;	960. 576. 224. 96.
Per 84. 60. 36. 14. 6. più 8. fa	576. 544. 304. 128. 48.
Resta 8. Resta 768. 416. 272. 96. 48.	

Che sono pec. 96. cap. 52. porci 34. As. 12. muli 6. che sono bestie 200. e costano duc. 200. che è il proposito. Ma vi vuole un'altra regola di saper formare li detti termini nella prima, e nella seconda posizione, la qual regola mi riferisce a dire un'altra fiata. Così egli dice, il qual s'ingegna di risolverla per doppia falsa posizione, per dir d'oggi quel che ha detto di F. Luca, allora sarebbe solubile la domanda per doppia falsa posizione, quando fosse determinata ad una sola soluzione, e conclusione, come se la domanda fosse proposta del tenor seguente, è simile.

62. D. Uno manda un suo Fattore alla Fiera, e gli dà Ducati 200. per comprare 200. bestie, cioè Muli, Asini, Porci, Capre, e Pecore, con questo, che pigli il doppio Asini, che Muli, tre volte più

più Porci; meno 2. che Asini; che pigli Capre, quanti Porci più 18. e pigli Pecore il doppio delle Capre meno 8. Si domanda quanti Muli piglierà &c.

R. Questa si può risolvere per doppia falsa posizione essendoci nella Domanda indirizzo di potere proseguire; onde ponendo, che la prima volta fossero Muli 4. verranno meno 54. bestie; ponendo la seconda volta Muli 8. verranno bestie 54. più di 200. e seguesi ad operare come vuole la regola moltiplicando in croce 4. via 54. fa 216. e 8. via 54. fa 432. la somma de' prodotti è 648. esse si parte per 108. somma degl'errori 54. e 54. ne verrà 6. per li Muli cercati; l'altre bestie si trovano secondo l'indirizzo della Domanda, e faranno quelle poste dal Tartaglia.

		Per 4 meno 54 — 432 Muli 8	
		Per 8 più 54 — 216 Asini 12	
Muli 4	Muli 8		Porci 34
Asini 8	As. 16		Cap. 52
Porci 22	Por. 46		Pecore 96
Capre 40	Cap. 64		
Pecore 72	Pec. 120		
146		254	

Più facilmente si opera per Algebra ponendo per i Muli 1. cosa, per gli Asini 2. cose per i Porci 6. cose meno 2. per le Capre 6. cose più 16. e per le Pecore 12. cose più 24. la somma 27. cose più 38. uguali a bestie 200. elevato 98. da ogni parte restano 27. cose uguali a 162. si parte 162. per 27. e ne viene 6. per il valore di 1. cosa, e per il numero de' Muli 2. cose importano 12. Asini 6. cose meno 2. importano Porci 34. 6. cose più 16. importano 52. Capre, e 12. cose più 24. importano 96. Pecore.

Volendo dare più soluzioni al Quesito del Tartaglia s'uguagliano le bestie a i Ducati lasciando di fuori i Porci da un Ducato l'uno; e così Pecore 12. Capre 16. Asini 8. Muli 4. sono 24. bestie, e costano Ducati 24. fino in 200. si pigliano Porci 176; e raddoppiando quelle bestie saranno 48; fino in 200. si pigliano Porci 152. e così si può triplicare, quadruplicare il numero delle bestie e pigliare il resto Porci fino in 200. e così si varierà soluzione in più modi.

Pec. 12.

Pec. 12	Sc. 4	Doppio	Sc. 8	Quintuplo	
Cap. 10	Sc. 5	24	60	20	
Al. 1	Sc. 3	20	10	50	25
Mul. 1	Sc. 22	2	6	5	15
		2	24	5	60
24	Sc. 24				
Porc. 176	Sc. 176	48	48	120	120
		152	152	80	80
Beslie 200	Sc. 200				
		200	200	200	200

**Cap. D.** Dovendosi comporre Sacchetti di quattro monete, Testoni, cavallotti, giulj, e mezzi bajocchi, che ciascun Sacchetto contenga monete 248. le quali importino giulj 248. e ciascun Sacchetto sia differente dall'altro nel numero d'alcuna delle quattro monete, si domanda quanti Sacchetti differenti si potran comporre; Valendo il testone giulj 3. il cavallotto giulj 2. e il mezzo bajocco la ventesima parte d' un giulio.

**R.** Difficilmente si soddisfarebbe a questa domanda per via di false posizioni, ma il modo più facile è uguagliare le monete nel tenor seguente. Si pigliano 20. mezzi bajocchi, che fanno un giulio, ed un Testone di giulj 3. Sicchè si hanno monete 21. e giulj 4. questi si sottrano da 21. restano 17. e tanti cavallotti si pigliano, che sono 38. monete, e giulj 38. infino a 248. si pigliano giulj 210. e così sarà composto un Sacchetto. Per comporre altri Sacchetti si pigliano li medesimi 20. mezzi bajocchi, cavallotti 15. cioè cavallotti 2. meno Testoni 2. e giulj 112. cioè Testoni 1. e giulio 1. di più per regola generale, sarà composto il secondo Sacchetto. Per il terzo pure mezzi bajocchi 20. cavallotti 13. cioè 2. meno Testoni 3. e giulj 112. che sono un più. Così si compongono gl' altri Sacchetti, che saranno 9. e per saperli, basta pigliare la maggior parte delle due maggiori fatte di cavallotti 17. la prima volta presi. Essendo composti 9. Sacchetti con pigliare 20. mezzi bajocchi, si pigliano adesso 40. mezzi bajocchi, e Testone 1. che fanno monete 41. e giulj 5. li quali si sottrano da 41. restano 36. per i cavallotti infino in 248. giulj 171. e sarà composto un Sacchetto di monete 248., e di 248. giulj. Si osservi, che si tiene il medesimo modo; Onde per comporre l'altro, pigliando mezzi bajocchi 40. si pigliano cavallotti 34. cioè 2. meno e Testoni 2. e giulj 172. cioè un Testone, e un Giulio di più, e si averà l'altro Sacchetto, così si compongono gl' altri in tutto 18. metà di 36. cavallotti la prima volta presi, che con Sacchetti 9. di prima fanno Sacchetti 27. Di nuovo si pigliano mezzi bajocchi 60. sem-

60. sempre, che facciano giullantierti e Testone riche sono monete 64. e giulj 6. li quali si sottrano da 61. restano 55. per i cavallotti. Infino in 248. si pigliano giulj 132. e sarà un Sacchetto di monete 248. e di giulj 248. per altro Sacchetto si pigliano mezzi bajocchi 60. cavallotti 33. cioè 2. meno e Testoni 2. e giulj 133. cioè ub di più, e si averà l'altro Sacchetto, e così si comporranno gl'altri infino in 28. maggior parte delle due fatte di cavallotti 55. pigliati per il primo Sacchetto, che con 57. di più fanno Sacchetti 55. Parimente si pigliano mezzi bajocchi 80. e Testone 1. che sono monete 81. e giulj 7. li quali sottratti da 81. restano 74. per i cavallotti infino in 248. si pigliano giulj 93. e sarà composto l'altro Sacchetto. B compiglier sempre mezzi bajocchi 80. se ne comporranno 37. Sacchetti metà di 74. cavallotti. Di nuovo si pigliano mezzi bajocchi 100. e Testone 1 che sono monete 101. e giulj 8. li quali si sottrano da 101. restano 93. per i Cavallotti, infino in 248. si pigliano giulj 54. e si averà un sacchetto, e pigliando mezzi bajocchi 100. cavallotti 91. cioè meno 2. e Testoni 2. e giulj 55. si averà l'altro sacchetto, e qui si comporranno sacchetti 47. maggior parte delle due maggiori fatte di cavallotti 93. Di più si pigliano mezzi bajocchi 120. e testone 1. &c. e qui si comporranno sacchetti 56. Ancora si pigliano mezzi bajocchi 140. e cavallotti 81. testoni 26. e giulj 11. Mettendo sistema per un sacchetto, per comporre gl'altri si opera come prima pigliando mezzi bajocchi 140. cavallotti 79. cioè meno 2. testoni 27. e giulj 2. e qui se ne comporranno sacchetti 41. maggior parte delle due maggiori di cavallotti 81. Finalmente si pigliano mezzi bajocchi 160. cavallotti 22. testoni 65. e giulio 1. pigliando come nell' antecedente in cambio d'un testone un giulio, e si averà un sacchetto. Per comporre gl'altri sacchetti si opera come si è detto, e s'averanno sacchetti 11. metà di 22. cavallotti. Non si possono pigliare mezzi bajocchi 180. perchè non si possono uguagliare le monete a i giulj. Si sommano tutti i sacchetti 9. 18. 28. 37. 47. 56. 41. ed 11. fanno sacchetti 247. e tanti se ne possono comporre: ed è stato soddisfatto alla domanda. Si pone l'avviamento del comporre tali sacchetti, acciò si riconosca l'ordine.

## Giulj

Mezzi bajocchi	— 20 —	1	20	20	20	20	20
Cavallotti	17 —	34	15	13	11	9	7
Testoni	1 —	3	2	3	4	5	6
Giulj	210 —	210	211	212	213	214	215
Monete	248	248	248	248	248	248	248

Mezzi

518

Mezzi bajocchi	40	40	40	60	60	60	60
Cavallotti	36	34	32	55	53	51	49
Tettoni	1	1	1	1	2	3	4
Giulj	171	172	173	132	133	134	135
	248	248	248	248	248	248	248

Mezzi bajocchi	80	80	80	100	100	100	100
Cavallotti	74	72	70	68	93	91	89
Tettoni	1	1	1	1	2	3	4
Giulj	93	94	95	96	54	55	56
	248	248	248	248	248	248	248

Mezzi bajocchi	120	120	120	120	140	140	140
Cavallotti	118	110	108	106	81	79	77
Tettoni	1	1	1	1	26	27	28
Giulj	15	16	17	18	1	2	3
	248	248	248	248	248	248	248

Mezzi bajocchi	160	160	160	160	160	160	160
Cavallotti	22	20	18	16	14	12	10
Tettoni	65	66	67	68	69	70	71
Giulj	1	2	3	4	5	6	7
	248	248	248	248	248	248	248



TRAT-

# TRATTATO DECIMO

## Del Cambio reale per lettere,

*Dove si apportano le ragioni de Cambj, che fanno molte piazze mercantili d' Italia con tutte l' altre.*



Vendo già detto nella distinzione quinta del Trattato terzo carte 174. del Cambio minuto circa il permutare monete di maggior valore in monete di minor valore: ed al contrario, in particolare della Città di Fiorenza, e di Roma, dal che si arguisce il modo da tenerfi in qualsivisia Città, e luogo di far simil cambio; Adesso tratterò del cambio reale, che è una commutazione di moneta d' un luogo in altra d' altro luogo in ordine all' operazione, e computo dell' istesso cambio.

Quattro Persone per ordinario intervengono nel fare il cambio. La prima è quella, che fa il cambio. La seconda, che tiene Banco con la quale si fa il cambio, e queste si ritrovano in un medesimo luogo. La terza, che tien banco in altro luogo, è quella, che paga il denaro cambiato. La quarta è quella, che riscuote tal denaro: E queste due sono in un' altro medesimo luogo.

E perchè il cambiare si spiega con questi termini di rimettere, e di trarre, per dichiarazione di essi pongo questo esempio. Paolo Donati di Fiorenza va al Banco A per rimettere in Roma. Scudi d'oro 100. à Francesco Rossi, e paga il denaro con la provisione: Quel del Banco A gli fa poliza di cambio dirizzata al suo corrispondente in Roma, che tiene Banco B. E Paolo Donati include la poliza in una lettera, e la manda à Francesco Rossi, il quale la porta al Banco B, e passati li dovuti termini riscuote la rimessa. Paolo Donati è la prima persona, che paga il denaro con la provisione, e si dice, che fa rimessa. La seconda persona del Banco A. si dice, che fa Tratta, e riceve il denaro rimesso. La terza persona del Banco B. si dice, che riceve la tratta, e paga à suo tempo il denaro equivalente à Francesco Rossi, il quale è la quarta persona, che riceve la rimessa.

Per il che si conosce, che la prima fa rimessa, e la quarta la riceve. La seconda fa tratta, e la terza la riceve.

T t t

Nel

Nel dar però l' esempl' de' cambi per brevità si fa solo menzione delle Piazze mercantili, che tra se cambiano, come : Uno di Fiorenza rimette a Roma Sc. d'oro 450. a Scudi delle Stampe 75. per Sc. d'oro 100. ( Cioè per ogni Sc. d'oro 100. dati in Fiorenza, si devono avere in Roma Scudi delle Stampe 75. ) Si domanda per li detti Sc. d'oro 450. quanti Scudi delle Stampe si averanno in Roma. Ecco nominate solo le Piazze, che tra loro cambiano, Fiorenza, e Roma.

Si deve avvertire, che delle due Piazze, che cambiano, una dà il denaro stabile, e fisso, e l'altra mutabile e vario; Quella Piazza dà il fisso, che dà una moneta, ovvero 100. monete, e quella si dice dare il vario, che non dà una moneta, e dà meno, ovvero più di 100. Dunque nell'esempio passato, Fiorenza che dà Scudi d'oro 100. dà lo stabile, e fisso, e Roma che dà Scudi delle Stampe 75. dà il mutabile, e vario, perchè si suole spesso variare con accrescerlo, e sminuirlo secondo la scarsezza, ed abbondanza di denaro, in quella guisa, che alle mercanzie si accresce il prezzo per carestia, e per abbondanza si sminuisce.

Devesi però sapere, che se bene da' deputati ufficiali di Fiera, o di Piazza mercantile viene assegnato a ciascuna Piazza il fisso, o il variabile da darsi all'altra per l'equivalente; tuttavia si può mutare, ed assegnare il variabile a quella, che ha il fisso con proporzione: E' così Roma, che dà Scudi delle Stampe 75. per Scudi d'oro 100. di Fiorenza, può dare Scudi delle Stampe 100. per Scudi d'oro di Fiorenza  $133\frac{1}{3}$ . ovvero Scudo delle Stampe uno per Scudo d'oro  $\frac{1}{3}$ . E' bene però servirsi de' prezzi assegnati per conformarsi con gli altri, e seguitare sempre un'ordine, e per questo pongo le Tavole delle monete, che cambia la Piazza con l'altra, che quella, che dà il variabile, dà più, o meno secondo l'occorrenza.

Di più avvertisco, che tutti i cambi si risolvono per regola di proporzione detta del Trè, ponendo in primo luogo di detta regola la moneta di quella Piazza, dall'a quale si parte il cambio, nel secondo luogo la moneta corrispondente in uguaglianza dell'altra Piazza, dove si effettua il cambio, e in terzo luogo la moneta corrispondente alla prima, che si rimette, e della quale si cerca il cambio. Nell'esempio dato Sc. d'oro 100. di Fiorenza in primo, Sc. delle Stampe 75. di Roma in secondo, e Sc. d'oro 450. di Fiorenza in terzo, e moltiplicando 450. per 75. il prodotto 33750. si parte per tronco con Sc. 100. e risultano Sc. delle Stampe  $337\frac{1}{2}$  di Roma, e tanti se ne averanno per li detti Scudi d'oro di Fiorenza.

L'ope-



L'operazione di moltiplicare, e partire si deve fare, come torna meglio più facile, e breve, e non si deve impegnato di voler seguitare sempre un modo. Come hò osservato farsi in Fiorenza, che i cambi gli risolvono ò per regola de partitori, quando il 100. è nel primo luogo, ò per regola di partire per apporre, quando il 100. è nel secondo luogo, e nel primo ci è il prezzo variabile, regole già insegnate da me nella distinzione prima, e terza del Trattato terzo, alle volte sono più brevi, alle volte però più lunghe. Onde il pratico di diversi modi da me insegnati nel Trattato secondo, si serva de più facili, e brevi; Quando ci sarà nel cambio riduzione di moneta corrente in moneta di cambio, si faccia per regola del Trè replicata, e più speditamente per regola moltiplicata da me insegnata nella distinzione quinta del secondo Trattato.

### Fiorenza.

Questa Piazza cambia à Scudi d'oro, fueri che con Livorno, Bologna, e Genova. Lo Scudo d'oro è moneta immaginata, che hà valore stabile di lire 7  $\frac{2}{3}$ . si divide in Sol. 20. e denari 12. Lo Scudo moneta pure si divide in Soldi 20. denari 12. che vale lire 7. e siccome il Soldo d'oro vale Soldi 7  $\frac{2}{3}$ . ed il denaro d'oro vale denari 7  $\frac{2}{3}$ . di piccioli; così il Soldo moneta vale Sol. 7. ed il denaro moneta vale denari 7. di piccioli.

Le monete usuali, e correnti con il lor valore si sono poste nella distinzione quinta del Trattato terzo, dove s'è insegnato il modo di traghutare l'une nell'altre, ed in ordine al cambio. è di bisogno saper ridurre li Scudi moneta in Scudi d'oro, e questi in quelli; Onde qui ricordo, che gli Scudi moneta si partono per 15. il quoziente si sottra dalli medesimi Scudi moneta, e restano Scudi d'oro, e questi si partono per 14. il quoziente si somma con gli Scudi d'oro, e risultano nella somma Scudi moneta. Per esempio Scudi moneta 976. 12. 6. si partono per 15. il quoziente 65. 2. 2. si sottra, e restano Scudi d'oro 911. 10. 4. Questi adesso si partono per 14. il quoziente come prima 65. 2. 2. si somma, e tornano Scudi moneta 976. 12. 6. la ragione di quest'operare è, perchè Scudi moneta 15. sono Sc. d'oro 14. siccome ancora lo Scudo moneta vale 14. mezze lire, e lo Scudo d'oro ne vale 15.

Scudi moneta 976. 12. 6  
Per 15. 65. 2. 2

Scudi d'oro 911. 10. 4

Scudi d'oro 911. 10. 4  
Per 14. 65. 2. 2

Scudi moneta 976. 12. 6

## Fiorenza cambia con

Roma Scudi d'oro	100	Per Scudi Stampe	74 $\frac{2}{3}$
Fiera	142 $\frac{5}{8}$	Per Scudi marche	100
Venezia	78	Per Ducati di Banco	100
Livorno di lire Soldi	114	Per Pezza da 8. reale	1
Napoli Scudi d'oro	100	Per Ducati di Carl. 10.	158
Ancona	100	Per Scudi di paoli 10.	112
Lione	62	Per Scudi del Sole	100
Milano Scudo d'oro	1	Per Soldi Imperiali	126
Pisa	100	Per Scudi di lire 7.	108 $\frac{1}{4}$
Bologna di lire 7. Scudo	1	Per Bolognini	106
Genova di lire 6. Pezza	1	Per Pezza 1. di lire	5
Palermo Scudo d'oro	1	Per Carlini	29 $\frac{2}{3}$
Anversa Amsterdam	1.	Per Grossi	126
Siviglia, Alcalá, e Medina	1.	Per Maravidis	375
Valenza, Saragoz. e Barcel.	1.	Per Soldi	24 $\frac{1}{2}$
Londra	1.	Per Sterlini	72 $\frac{1}{4}$
Lisbona	1.	Per Rais	785
Francfort. Norimberga	1.	Per Carantani	95
Augusta, e Vienna	1.		

Si propongono i cambj di Fiorenza con ciascuna Piazza sopra posta, e per prova si propongono i cambj di ciascuna Piazza con Fiorenza: perchè tornando Scudi d'oro di Fiorenza 450. in Roma Scudi delle Stampe 337  $\frac{2}{3}$ . a Scudi delle Stampe 75. per Scudi 100. d'oro; Così alla medesima rata Scudi delle Stampe 337  $\frac{2}{3}$ . devono tornare in Fiorenza Scudi d'oro 450.

### Cambio di Fiorenza con Roma.

- I.** D. Fiorenza cambia Scudi d'oro 100. per Scudi delle Stampe 74  $\frac{2}{3}$ . Si domanda per Scudi d'oro 1465. Soldi 8. denari 4. quanti Scudi delle Stampe si averanno di credito in Roma?
- R.** Per regola del Trè: Se Sc. d'oro 100. tornano Scudi delle Stam. 74  $\frac{2}{3}$ . quanti di questi torneranno Sc. d'oro 1465. Soldi 8. den. 4? operando brevemente per le terza de' Partitori, torneranno Scudi Stampe 1090. Sol. 5. den. 5. in circa. Come questi si riducono con l' Aggio in Scudi di paoli 10. si dirà nella Piazza di Roma.

Cambio

### Cambio di Roma con Fiorenza.

a. D. Roma cambia sc. stampe  $74 \frac{2}{3}$ . per sc. d'oro 100. di Fiorenza, si domanda per sc. delle stampe 1090. 5. 5. quanti sc. d'oro si avranno in Fiorenza?

R. Disposti li numeri, il primo si riduce in quinti 372. che sarà partitore, il terzo si moltiplica per 5. il prodotto per 10. e l'altro prodotto per 10. il prodotto 545135. 8. 4. si parte a danda, e vengono sc. d'oro 1465. 8. 4. che si avranno in Fiorenza. Ecco tornati li sc. d'oro, che si cambiarono con Roma.

### Cambio di Fiorenza con Fiera.

3. D. Fiorenza cambia sc. d'oro  $142 \frac{2}{3}$ . per scudi di marche 100. si domanda per sc. d'oro 1964. sol. 6. den. 8. quanti scudi di marche si avranno di credito in Fiera?

R. Per sol. 6. den. 8. si pone  $\frac{2}{3}$ . e fatta la riduzione in terzi del primo viene il partitore 427. e del terzo viene 5893. al quale s'aggiungono due zeri per la moltiplicazione di 100. e si parte a danda, e vengono sc. di marche 1380. 1. 10. che si avranno di credito in Fiera.

### Cambio di Fiera con Fiorenza.

4. D. La Fiera cambia sc. di marche 100. per sc. d'oro  $142 \frac{2}{3}$ . di Fiorenza, Si domanda per sc. marche 1380. 1. 11. quanti sc. d'oro si pagheranno in Fiorenza?

R. Si opera per la terza de partitori, partendo per 10. per 10. e per 3. li sc. marche 1380. 1. 11. le file si moltiplicano per ordine per li sc. d'oro  $142 \frac{2}{3}$ . e la somma de prodotti di sc. d'oro 1964. 6. 8. si pagherà in Fiorenza.

### Cambio di Fiorenza con Venezia.

5. D. Fiorenza cambia scudi d'oro  $71 \frac{2}{3}$ . per Duc. 100. di Banco: Domando per rimeffa di scudi d'oro 1013. 7. 4. quanti Duc. di credito siano in Venezia?

R. Il primo numero si riduce in quarti, li scudi, soldi, e denari si moltiplicano per 4. per 10. e per 10. il prodotto 405546. 13. 4. si parte a danda, e verranno Duc. 1424. e perchè il Ducato si divide in grossi 24. per questo 24. si moltiplica l'avanzo 76. e per sol. 12.

fol. 13. 4. s'aggiungono grossi 16. la somma 1842. si parte, e verranno Grossi 6. l'avanzo 130. si moltiplica per 32. che tanti piccioli fa un grosso, il prodotto 4160. si parte, e verranno piccioli 14. poco più. Si potrebbero ridurre fol. 7. den. 4. in centesimi  $36\frac{2}{3}$  con moltiplicarli per 5. ed operare come si è insegnato nella Domanda 86. della distinzione terza del Trattato secondo, e verrebbero pure Duc. 1422. grossi 6. piccioli 14. di credito in Venezia.

### Cambio di Venezia con Fiorenza.

6. D. Sono di Venezia tratti Duc. 1422. gros.  $6\frac{2}{3}$ . in Fiorenza a scudi d'oro  $71\frac{2}{3}$ . per Duc. 100. Si domanda quanti scudi d'oro saranno?

R. Si riducono gros.  $6\frac{2}{3}$ . in fol. 5. den. 5. di poi si partono Ducati 1422. 5. 5. per 10. per 10. e per 4. si moltiplica per 7. e si somma, e verranno sc. d'oro 1013. 7. 4. del Cambio passato.

$$\begin{array}{r}
 6 \quad \backslash \quad 2 \\
 24 \text{ --- } 2 \\
 \hline
 13 \text{ --- } 20 \\
 \hline
 48 \quad 20 - 12 \\
 \hline
 \text{Sol. 5. 5} \quad 240
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{r}
 100 \text{ --- } 71\frac{2}{3} \text{ --- } 1422. \quad 5. 5 \\
 10 \quad 142. \quad 4. 6\frac{2}{3} \text{ --- } 7 \\
 \hline
 10 \quad 14. \quad 4. 5\frac{2}{3} \\
 4 \quad 3. 11. 1 \\
 \hline
 995. 11. 9\frac{2}{3} *
 \end{array}$$

Scudi d'oro 1013. 7. 4

### Cambio di Fiorenza con Livorno.

7. D. Fiorenza cambia sol. 114  $\frac{2}{3}$ . per Pezza da otto Reali di Livorno; Si domanda per rimeffa di lir. 10178. fol. 15. quante Pezze da otto Reali si averanno di credito in Livorno?

R. Sol. 114  $\frac{2}{3}$ . si riducono in terzi 343. per partitore si riducono lir. 10178. fol. 15. in soldi, e terzi 610725, li quali si partono a danda con ridurre gl'avanzi in soldi, e denari, e si averanno Pezze 1780. 10. 9. poco più di credito in Livorno.

### Cambio di Livorno con Fiorenza.

8. D. Per lettera di Livorno di Pezze 1780. 10. 10. si devono pagare tante lire a soldi 114  $\frac{2}{3}$ . per Pezza. Si domanda quante saranno?

R. Sol.

R. Sol. 114  $\frac{1}{2}$  sono lire 5. 14  $\frac{1}{2}$ . Per la seconda de' Partitori, si partono Pezze 1780. 10. 10. per 20. e le venute per 3. si moltiplicano le file per 5. per 14. per 1. si sommano i prodotti, la somma sarà di lir. 10178. 15. 3. da pagarsi in-Firenza.

### Cambio di Firenze con Napoli

9. D. Firenze cambia scudi d'oro 100. per Ducati di carlini 21. l'uno 158  $\frac{1}{2}$ . Si domanda per una rimessa di scudi d'oro 834  $\frac{1}{2}$ . quanti Ducati si averanno di credito in Napoli?

R. Per regola del Trè: Se sc. d'oro 100. Duc. 158  $\frac{1}{2}$ . quanti per sc. d'oro 834  $\frac{1}{2}$ ? Si riduce il secondo in quarti, il terzo numero in terzi, si moltiplica, il prodotto 1590040. si parte per 12. fatto dal 4. via 3. il quoziente venuto 132503  $\frac{1}{2}$ . si parte per 100. à scapezzo, e si averanno Duc. 1325. grana 03  $\frac{1}{2}$ . di credito in Napoli.

### Cambio di Napoli con Firenze.

10. D. Uno è Creditore in Napoli di Duc. 1325. grana 04. e gli sono tratti in Firenze à Duc. 150. grana 75. per sc. d'oro 100. Si domanda quanti di questi saranno in Firenze?

R. Se Duc. 158. 75. danno sc. d'oro 100. quanti Duc. 1325. grana 04? si aggiungono al terzo due zeri per la moltiplicazione, per 100. e si parte à danda per 15875. tirando gl'avanzi in soldi, e denari; si avremo sc. d'oro 834. 03  $\frac{1}{2}$ . come nel cambio passato. Il denaro di più, viene per un grano messo per il rotto.

### Cambio di Firenze con Ancona.

11. D. Firenze cambia sc. d'oro 100. per sc. 112  $\frac{1}{2}$ . d'Ancona, di paoli 10. l'uno. Si domanda per sc. d'oro. 2184. sol. 7. den. 10. quanti sc. di paoli 10. faranno in Ancona?

R. Se sc. d'oro 100. tornano sc. 112  $\frac{1}{2}$ . sc. 2184. 40. centesimi poco meno, che sono per sol. 7. den. 10? si moltiplica con pigliare in parte dalla somma 24625110. si levano due figure per li centesimi, e due per il partire per 100. e sono sc. 2462. bajocchi 9. o pure paoli 9.

### Cambio di Ancona con Firenze.

12. D. Cambia Ancona sc. 112  $\frac{1}{2}$ . per sc. d'oro di Firenze 100. Si domanda per sc. 2462. paoli 9. quanti sc. d'oro si averanno in Firenze?

R. Se

R. Se 112  $\frac{1}{2}$ . tornano 100. quanti torneranno sc. 2462. 90 ? Ridotti il primo numero in quarti, ed il terzo, si parte à danda per 451. non ridurre gl'avanzi in sol. e den. e verranno sc. d'oro 2184. 7. 9. &c. d'averfi in Fiorenza.

### Cambio di Fiorenza con Lione.

13. D. Fiorenza cambia sc. d'oro 61  $\frac{1}{4}$ . per sc. del sole 100. Si domanda per sc. d'oro 486. 16. 8. quanti sc. del sole si averanno di credito in Lione di Francia ?

R. Se 61  $\frac{1}{4}$ . tornano 100. quanti 486. 16. 8 ? il primo si riduce in terzi 124. partitore, il numero terzo si moltiplica per 3. e per 10. e per 10. ripiego di 100. l'ultimo prodotto si parte à danda, e vengono sc. del sole 793. fol. 15.

### Cambio di Lione con Fiorenza.

14. D. Di Lione fanno tratta in Fiorenza per scudi del sole 793. fol. 15. col cambio di sc. d'oro 61  $\frac{1}{4}$ . per sc. del sole 100. Si domanda quanti sc. d'oro saranno pagati in Fiorenza ?

R. Per la terza de' Partitori si partono 793. 15. per 10. per 10. e per 3. il primo quoziente si moltiplica per 6. il prodotto si somma con li due ultimi quozienti, e vengono sc. d'oro 486. 16. 8. da pagarsi in Fiorenza.

### Cambio di Fiorenza con Milano.

15. D. Fiorenza cambia scudo d'oro 1. per sol. Imperiali 126  $\frac{1}{4}$ . Si domanda per una rimessa di scudi d'oro 925  $\frac{1}{4}$ . quanti scudi, lire, soldi, e denari correnti si averanno in Milano ?

R. La moneta Imperiale scudi, soldi, e denari si riduce in moneta corrente di sc. lir. sol. e den. per il Filippo, che vale sol. Imperiali 106. e sol. correnti 140. lo sc. corrente è lir. 6. la lir. sol. 20. il sol. den. 12. che però detto cambio, per regola moltiplice si ordina così: Sc. d'oro 1. uguale à sol. 126  $\frac{1}{4}$ . Impe. sol. Impe. 106. uguali à sol. correnti 140. sol. correnti 120. uguali à scudo corrente. L. Adesso sc. d'oro 925  $\frac{1}{4}$ . à quanti sc. correnti sono uguali ? operando secondo si è insegnato nella Distinzione quinta. del Trattato quarto, verranno scudi correnti 1290. lire 4. 2. 3. poco più.

Ovvero si pigliano lir. 6  $\frac{1}{4}$ . per li sol. 126  $\frac{1}{4}$ . e per regola del Tre: Se scudo d'oro 1. lir. 6  $\frac{1}{4}$ . quante sc. 925  $\frac{1}{4}$ . e vengono lir. 5863  $\frac{1}{4}$ . Ora

Ora per altra regola del Trè se 106. Imperiali sono sol. 140. correnti ; quante lire correnti faranno lir. 5863  $\frac{1}{2}$ . Imperiali 2 ed operato faranno lir. 7444. sol. 2. 3. le lire partite per 6. faranno come sopra sc. 1290. 4. 2. 3. &c.

### Cambio di Milano con Fiorenza.

16. D. Per lettera di Milano di sc. correnti 1290. lir. 4. 2. 4. si deve sborsare l'equivalente in Fiorenza in tanti sc. moneta, soldi, e den. col cambio a sc. d'oro 1. per sol. Imperiali 126  $\frac{1}{2}$ . Si domanda quanti faranno ?

R. Li sc. 1290. si convertano in lir. con moltiplicarli per 6. aggiungendo li 24. sol. 2. 4. si averanno lir. 7444. 2. 4. le quali si convertano in Imperiali, dicendo: 140. torna no. 106. che torneranno lir. 7444. 2. 4. e torneranno lir. 5863  $\frac{1}{2}$  in sc. di nuovo si dica: Se per lir. 6  $\frac{1}{2}$ . si ha sc. d'oro 1. quanti per sc. lir. 5863  $\frac{1}{2}$ ? e si averanno sc. d'oro 925. 16. come nel passato cambio. Li quali per farli scudi di moneta, si partono per 14. il quoziente si somma con li scudi d'oro, e vengono sc. moneta 991. 18. 7. di lire 7. l'uno.

### Cambio di Fiorenza con Pisa.

17. D. Fiorenza cambia scudi d'oro 100. per 107  $\frac{1}{2}$ . di lir. 7. l'uno di Pisa. Si domanda per rimessa di sc. d'oro 286. sol. 18. 4. di quanti scudi sarà il credito in Pisa?

R. Sol. 18. 4. sono  $\frac{1}{2}$  di lira: Si dica se 100. tornano 107  $\frac{1}{2}$ . che torneranno 286  $\frac{1}{2}$ . Ridotto il secondo num. in mezzi, il terzo in 12. e simi, si moltiplica a scala, e prodotta 740945. si parte per 10. per 10. per 2. e per 12. successivamente riducendo gli avanzi in sc. Sol. 2. den. e verranno sc. 308. 13. 9. 11  $\frac{1}{2}$  di credito in Pisa.

### Cambio di Pisa con Fiorenza.

18. D. Pisa cambia sc. 107  $\frac{1}{2}$ . di lir. 7. l'uno per sc. d'oro 100. di Fiorenza. Si domanda dovendosi pagare una Polizza di sc. 308. lir. 3. sol. 1. di quante Piazze, lir. &c. sarà lo sberfo in Fiorenza?

R. Si dica, per regola del Trè: Se sc. 107. lir. 3. sol. 10. vogliono sc. d'oro 100. quanti sc. 308. lir. 3. sol. 1. Si riduce il primo, e terzo in soldi; questi aggiunti due zeri, si parte a danda, riducendo l'avanzo in sol. e denari verranno scudi d'oro 286. 18. 4. li quali si partono per 14. il quoziente 20. 9. 10.  $\frac{1}{2}$ . si somma con gli sc. d'oro, e vengono sc. moneta 307. 8. 2  $\frac{1}{2}$ . ma moltiplicando per

dò per 7.11. soldi 8.  $\frac{1}{2}$ . daranno lir. 2. 17. 6. che con 305. faranno Piaſtre 307. lire 2. 17. 6. da aborſarli in Fiorenza.

109. 3. 10.  $\rightarrow$  100  $\rightarrow$  308. 3. 10. Se d'oro 286. 18. 4.

7

7. 10. 2. 8. per 14. 20. 9. 10  $\frac{1}{2}$ 

752  $\rightarrow$  2320  $\rightarrow$  1059  $\rightarrow$  2054  $\rightarrow$  307. 8. 2.  $\frac{1}{2}$

Partit. 305. 0 da partit. 431810. 0 Piaſtre 307. 2. 17. 6.

Se d'oro 286. 18. 4.

### Cambio di Fiorenza con Bologna.

110. D. Fiorenza cambia con Bologna uno ſcudo di lir. 7. per bolognini 109. Si domanda per ſc. 724.  $\frac{1}{2}$ . di quanti ſcudi ſarà il credito in Bologna a Bolognini 85. per ſcudo?

R. Per regola moltiplica ſc. per ſc. 1. ſi hanno bolog. 109. e bolognini 85. fanno uno ſondo di Bologna quanti ſi averanno di queſti per ſc. 724.  $\frac{1}{2}$ . di lir. 7. l'una? Si moltiplicano ſc. 724.  $\frac{1}{2}$ . per 109. il prodotto 77503.  $\frac{1}{2}$  ſi parte per 85. e vengono ſc. 911. bolognini 68.  $\frac{1}{2}$ . di credito.

### Cambio di Bologna con Fiorenza.

111. D. Bologna cambia bolognini 109. per ſc. 1. di lir. 7. con Fiorenza. Si domanda per ſc. 911. bolognini 68.  $\frac{1}{2}$ . quanti ſc. di lir. 7. ſi averanno in Fiorenza?

R. Per la medefima regola. Se per ſc. 1. ſi hanno bolog. 85. e per bolognini 109. ſi ha uno ſondo in Fiorenza. quanti di queſti per ſc. 911. bolognini 68.  $\frac{1}{2}$ ? Si moltiplicano ſc. 911. per 85 al prodotto ſi aggiungono bolognini 68.  $\frac{1}{2}$ . la ſomma ſi parte per 109. e torneranno ſc. 724.  $\frac{1}{2}$ .

### Cambio di Fiorenza con Genova.

112. D. Fiorenza cambia la Penza di lir. 6. per una pezza di lir. 5. e ſi rimette in Genova di doppie 512.  $\frac{1}{2}$ . di Spagna. Si domanda valendo la doppia in Fiorenza lir. 22. ed in Genova lir. 18.  $\frac{1}{2}$ . quante doppie faranno di credito in Genova?

R. Per regola moltiplice ſc. lir. 6. di Fiorenza ſono lir. 5. di Genova, e lir. 18.  $\frac{1}{2}$ . di Genova ſono lir. 22. di Fiorenza dop. 512.  $\frac{1}{2}$ . quante doppie faranno in Genova? Opera. faranno dop. 500.

Cambio



## Cambio di Genova con Fiorenza.

22. D. Genova cambia pezza 1. di lir. 5. per pezza 1. di lir. 6. e si tratta in Fior. di dop. 500. valendo la dop. in Genova lir. 18.  $\frac{4}{5}$ . e in Fiorenza lir. 22. Si domanda quante doppie faranno tratte in Fiorenza?

R. Per la medesima regola: Se 5. tornano 6. e 22. tornano 18.  $\frac{4}{5}$ . che torneranno doppie 500? Operando, torneranno doppie 512.  $\frac{4}{5}$ .

## Cambio di Fiorenza con Palermo &c.

23. D. Fiorenza cambia sc. d'oro 1. per carl. 29.  $\frac{4}{5}$ . Si domanda per sc. d'oro 382.  $\frac{4}{5}$ . quante once, Tari, e grana si avranno in Palermo?

R. Carlini 29.  $\frac{4}{5}$ . sono grana 294. che si moltiplicano per sc. 382.  $\frac{4}{5}$ . il quoziente 112406. sono Carlini 11240. e grana 6. li Carlini si partono per 60. e vengo 187. once, essendo un'oncia 60. li Carlini 20. avanzati si partono per 2. e vengono Tari in tutto saranno once 187. Tari 20. grana 6.

## Cambio di Palermo con Fiorenza.

24. D. Palermo cambia carlini 29.  $\frac{4}{5}$ . per sc. d'oro 1. di Fiorenza, Domando per once 187. carl. 20. grana 6. quanti sc. d'oro s'averanno in Fiorenza?

R. Se grana 294. sono equivalenti a sc. d'oro 1. quanti sono equivalenti once 187. carl. 20. grana 6? Si moltiplicano l'oncia per 60. si aggiungono 206. grana e si partono per 294. il quoziente 382.  $\frac{4}{5}$ . sono sc. d'oro d'averfi in Fiorenza.

## Cambio di Fiorenza con Anversa in Fiandra.

25. D. Fiorenza cambia sc. d'oro 1. per den. 125. di grossi d'Anversa. Si domanda per rimessa di sc. d'oro 1356. 18. 4. quante lit. soldi, e denari si averanno in Anversa?

R. Si risolve per la seconda de' partitori, partendo sc. 1356. 18. 4. per 20. il quoziente per 12. ed essendo den. 125. fol. 10. den. 5. il quoziente venuto per 20. si moltiplica per 10. per 5. quello, che è venuto per 12. li prodotti si sommano, la somma di lire 706. 14. 6.  $\frac{4}{5}$ . è il credito in Anversa.

### Cambio di Anversa con Fiorenza.

26. D. Anversa cambia den. 125. di grossi per sc. 1. d' oro di Fiorenza. Si domanda per lir. 706 14. 6  $\frac{1}{2}$ . d' Anversa, di quanti sc. d'oro farà il credito in Fiorenza?

R. Se per denari 125. si ha sc. d'oro 1. quanti se ne averanno per le lire dette. Queste si riducono in sol. e den. e finalmente in 12. esimi 151; e sono 2035575. moltiplicando in 12. esimi 1509. li. den. 125. nel partitore si tagliano li due zeri, e 75. nel numero da partirsi, che si pigliano per sol. 15. per essere 75. centesimi  $\frac{1}{4}$ . si parte per 15., e tornano li sc. d'oro 1356. 18. 4 di credito in Fiorenza.

### Cambio di Fiorenza con Siviglia in Spagna.

27. D. Fiorenza cambia sc. 1. d'oro per maravidis 376. di Siviglia. Si domanda per sc. d'oro 544. quante doppie di Spagna si averanno, valendo la doppia reale 32. Li reale maravidis 34.

R. Si moltiplicano sc. 544. per 376. e si hanno maravidis 204544. li quali si partono per 34. e vengono reali 6016. che si partono per 32. ovvero per 4. e 8. ripiego, e vengono doppie 188.

### Cambio di Siviglia con Fiorenza.

28. D. Siviglia cambia maravidis 376. per sc. d'oro 1. Si domanda per una rimessa di doppie di Spagna 188. a reali 32. per doppia, ed a maravidis 34. per reale, di quanti Scudi d'oro farà il credito in Fiorenza?

R. Si moltiplicano doppie 188. per 32. il prodotto 6016. si moltiplica per 34. e vengono maravidis 204544. che si partono per 376. e tornano sc. d'oro 544. di credito in Fiorenza.

### Cambio di Fiorenza con Valenza.

29. D. Fiorenza cambia sc. d'oro 1. per lir. 1. 4. 9. di Valenza. Si domanda per sc. d'oro 726. 13. 4. quante lire si averanno di credito in Valenza?

R. Den. 9. sono  $\frac{1}{4}$ . di soldo. Si partono 726. 13. 4. per 20. il quoziente per 4. le file si moltiplicano per li numeri corrispondenti. i prodotti sommati danno lir. 899. sol. 5. di credito in Valenza.

### Cambio di Valenza con Fiorenza.

30. D. Valenza cambia sol. 24  $\frac{1}{4}$  per sc. d'oro 1. Si domanda per lir. 899. sol. 5. quanti sc. d'oro si averanno in Fiorenza?

R. Si moltiplicano lir. 899. per 20. aggiungendo 5. li sol. 17985. si moltiplicano per 4. e vengono 71940. quarti, li quali si partono per 9.

per 9. ed 11. rimege d' 99. quarti., che tanti sono Sol. 24  $\frac{1}{4}$ . e vengono Scudi d' oro 726. 13. 4. come prima.

### Cambio di Fiorenza con Londra.

31. D. Fiorenza Cambia con Londra Sc. d' oro 1. per denari Sterlini 75. Si domanda per Sc. d' oro 1428. 6. 8. quante lire, Soldi, e denari si averanno in Londra.

R. Si partono 1428. 6. 8. per 20. e per 4. il quoziente per 20. si moltiplica per Sol. 6  $\frac{1}{2}$ . che tanti sono den. sterlini 75. e si avranno lire. 446. 7. 1. di Londra.

### Cambio di Londra con Fiorenza.

32. D. Londra cambia den. sterlini 75. per Sc. d' oro 1. Si domanda per rimessa di lire 446. sol. 7. den. 1. di Londra, quanti Scudi d' oro saranno di credito in Fiorenza?

R. Le lire si riducono in den. 107125. li quali si partono per 75. e verranno Sc. d' oro 1428  $\frac{1}{4}$ . come sopra.

### Cambio di Fiorenza con Lisbona.

23. D. Fioren. cambia Sc. d' oro 1. per Rais 784. Si domanda per Sc. d' oro 462  $\frac{1}{2}$ . quante Pezze da otto reali di Rais 600. Puna averà di credito in Lisbona?

R. Si moltiplicano Sc. d' oro 462  $\frac{1}{2}$ . per 784. li Rais 362600. si partono per 600. il quoziente sarà di Pezze. 604  $\frac{1}{2}$  di credito.

### Cambio di Lisbona con Fiorenza.

34. D. Lisbona cambia Rais 784. per Sc. d' oro 1. di Fiorenza, per lettera di pezzè da otto reali 604  $\frac{1}{2}$ . quanti Sc. d' oro si pagheranno in Fiorenza a Rais 600. per pezza?

R. Si moltiplicano pezzè 604  $\frac{1}{2}$ . per 600. li Rais 362600. si partono per 784. e verranno Sc. d' oro 462  $\frac{1}{2}$ . da pagarsi in Fiorenza.

### Cambio di Fiorenza con Vienna.

35. D. Fiorenza cambia per Carantani 96. Sc. d' oro 1. Si domanda per Sc. d' oro 303  $\frac{1}{4}$ . quanti Fiorini si averanno in Vienna di carantani 60. d' uno?

R. Si moltiplicano Sc. 303  $\frac{1}{4}$ . per 96. il prodotto 29160. si parte per 60. e vengono Fior. 486. d' averà in Vienna.

Cambio

## Cambio di Vienna con Firenze.

36. D. Vienna cambia Carantani 96. per Sc. d'oro 1. Si domanda quanti Scudi d'oro faranno in Firenze Fiorini 486. di carantani 60. l'uno?

R: Si moltiplicano Flor. 486. per 60. il prodotto si parte per 12. e 8. ripiego di 96. e torneranno Sc. d'oro 303  $\frac{1}{2}$ .

## Roma.

Questa Piazza ha due sorti di moneta, corrente, ed imaginaria, per comodo de' Cambj. La moneta corrente è di Scudi, Giulj, e Paoli, Bajocchi Quattrini. Quattrini 5. fanno un Bajoc. e bajoc. 10. un Giulio, Giulj 10. uno Scudo, e così Bajocchi 100. fanno uno Scudo.

La moneta imaginaria è lo Scudo Stampe, il quale si divide in Soldi 20. ed il Soldo in denari 12. Come si divide lo Scudo d'oro di Firenze, e lo Sc. marche di Fiera &c.

Lo Sc. stampe varia valore secondo l' Aggio, che cresce, e cala secondo la scarsezza, o abbondanza di denaro nella Piazza di Roma. L'avvantaggio sopra Giulj 15. che sono mezzi quatt. 1500. stima propriamente essere l'aggio di 23. mezzi quatt. più, e meno: benchè il valore dato allo Sc. stampe di 1523. mezzi quatt. si chiama comunemente aggio.

Qui si avverta, che se 1523. dell'aggio s'intendono per mezzi quattrini, sono prezzo d'un Sc. stampe, se per bajocchi, sono prezzo di Sc. 10. stampe; Se per giulj, sono prezzo di Sc. 100. Stampe, ma finalmente, se s'intendono per Sc. di giulj 10. l'uno, allora 1523. sono prezzo di Sc. 1000. stampe.

## D'alcune reduzzioni di Monete.

Volendo ridurre li Scudi stampe in moneta corrente, si moltiplicano li Sc. stampe, per il numero dell'aggio, e si tagliano dal numero prodotto tre figure; le restate sono Scudi correnti di giulj 10. due tagliate bajoc. e l'ultima mezzi quat.; per esempio: Siano da ridurre Sc. stampe 826. aggio dello Sc. Stampe 1524. si moltiplicano 826. per 1524. il prodotto è 1258.824. mostra Scudi correnti 1258. bajoc. 82. mezzi quat. 4. cioè quat. 2.

Ma volendo al contrario ridurre Sc. correnti 1258. bajoc. 82. quattrini 2. in Sc. stampe, si raddoppiano li quat. 2. e si partono per l'aggio 1524. e verranno Scudi stampe 826. Quando non ci sono quattrini per cui si pone un zero; ma non essendoci bajocchi, alli Scudi

Scudi correnti si aggiungono tre zeri, e si parte per il numero dell'aggio.

Aggioco 1524 Per 1524 — 1258824  
 Sc. Stampe 826 — 2962  
 Sc. Stampe 826 — 9144  
 12192

Scudi 1258824  
 Se con gli Scudi stampe si sono Sol. e den. si usa ridurre questi in centesimi, come Sc. stampe 255. Sol. 17. den. 4. Si moltiplicano Sol. 17. per 5. e prodotto 85. si aggiunge 2. metà di den. 4. e vengono 87. centesimi di Scudo, non per l'appunto, essendo di più  $\frac{1}{2}$  di centesimo. Li banchisti non si curano di tal minuzia. Dopo Sc. stampe 255. si pongono 87. centesimi, li quali numeri si moltiplicano per l'aggio 1524. e fanno 38994588. Da tal prodotto levano 88. per li centesimi, puntano il 5, che sono mezzi quat. puntano ancora 94. che sono bajocchi, le restate figure sono, Sc. correnti 389. bajoc. 94.

Non volendo ridurre i Soldi, e denari in centesimi, si può usare la terza de' partitori, pigliando l'aggio 1524. per Scudi correnti uguali a Sc. stampe 1000. dicendo: Se Scudi stampe 1000. tornano Sc. correnti 1524. che torneranno Sc. stampe 255. 17. 4. Questi si partono per 10. il quoziente per 10. e l'altro quoziente per 10. le file si moltiplicano per le figure 1524. per ordine, li prodotti si sommano, e danno Scudi correnti 389. Sol. 18. den. 10. li quali Sol. e den. si moltiplicano per 5. e vengono centesimi 94. poco più, che sono bajocchi, come per l'altro modo.

Sc. Stampe 255. 17. 4 — 255. 17. 4 — 1524  
 10 25. 11. 8  
 10 2. 14. 8  
 10 5. 1  
 Aggio 1524  
 253. 17. 4  
 227. 18. 8

51174  
 127935  
 25587  
 Scudi 389. 18. 10 — 5  
 Sc. correnti 389. 94. 5188 94. Bajocchi

Roma

## Roma cambia con

Firenze Scudi Stampe	74 $\frac{1}{2}$	Per Scudi d'oro	100
Napoli Scudi di Giulj x. l' uno	100	Per Ducati	142
Venezia Scudi Stampe	53 $\frac{1}{4}$	Per Ducati di Banco	100
Milano Scudi Stampe	68	Per Scudi Imperiali	100
Ancona Scudi di Giulj x.	99 $\frac{1}{4}$	Per Scudi simili	100
Fiera Scudi Stampe	106 $\frac{1}{4}$	Per Scudi Marche	100
Lione Scudi Stampe	46	Per Scudi del Sole	100
Livorno Scudi di Giulj x.	85	Per Pezza da otto	100
Bologna Scudi di Giulj x.	98	Per Scudi di Lire 5.	100
Genova Scudo di Giulj x.	1	Per Soldi costanti	117
Madrid Scudi Stampe	1	Per Maravida	668
Lisbona Scudi Stampe	1	Per Rais	1046

Molti Cambj si risolvono per regola moltiplice, che però l'operante si rimette alla distinzione quinta del Trattato Terzo, dove si è insegnata, bastando qui d'averne la disposizione de' numeri con il risultato del Cambio.

## Cambio di Roma con Firenze

I. D. Roma cambia Sc. Stampe 73  $\frac{1}{4}$ . per Sc. d'oro 100. Si domanda per un credito di Sc. correnti 1966. bajoc. 91  $\frac{1}{4}$ . di quanti Scudi d'oro sarà la tratta in Firenze, essendo l' Aggio 1524?

R. Benchè si possono ridurre li detti Scudi correnti per l' Aggio in Scudi Stampe 1290. 62  $\frac{1}{2}$ . centesimi, e facendo la regola del Trè con dire: Scudi Stampe 73  $\frac{1}{4}$ . danno Sc. d'oro 100. quanti di questi ne daranno Sc. Stampe 1290. 62  $\frac{1}{2}$ ? e verrebbero Sc. d'oro 1750. di lir. 7  $\frac{1}{2}$  per detto cambio. Tuttavia per regola moltiplice si dice: Bajoc. 1524. Aggio sono uguali a Sc. d'oro 10. e Sc. Stampe 73  $\frac{1}{4}$ . sono uguali a Scudi d'oro 100. a quanti di questi faranno uguali bajocchi 196691  $\frac{1}{4}$ ? si riducono in quarti li numeri terzo sinistro, e quinto destro; si moltiplicano li numeri destri, il prodotto ultimo farà 786765000. da partirli; si moltiplicano ancora li sinistri, il prodotto 449580. farà il numero partitore e fatto il partire risulteranno Scudi d'oro 1750. di lir. 7  $\frac{1}{2}$ . l' uno di tratta in Firenze.

1524 — 10 — 73  $\frac{1}{4}$  — 100 | 196691  $\frac{1}{4}$  Sc. d'oro 1750

Per prova si fa il cambio di Firenze per Roma, operando per regola moltiplice con dire: Sc. d'oro 100. sono uguali a Sc. Stampe 73  $\frac{1}{4}$ . e Sc. Stampe 10. e bajocchi 1524. a quanti di questi faranno uguali Sc. d'oro 1750? Si riduce in quarti il numero secondo

destro

529

destro, e si parte il quarto ~~destro~~ per 4. per uguaglianza; si schia-  
fa il primo sinistro, e quinto destro per 25. e il terzo, e quinto  
per 10. resterà 4. sinistro per partitore, o destri 295. 381. e 7. li  
quali moltiplicati fanno 786765. da partirsi; e partito per 4.  
vengono bajocchi 19669  $\frac{1}{2}$ . e si puntano 91  $\frac{1}{2}$ . sono sc. Roma-  
ni 1966. bajocchi 91  $\frac{1}{2}$ . in uguaglianza a sc. d'oro 1750.

$$\text{Sc. d'oro } 100 - 73 \frac{1}{4} \mid 10 - 1524 \mid 1750? - \text{Sc. } 1966. 91 \frac{1}{2}$$


---


$$4 - 295 \mid 1 - 381 \mid 7$$

Così si possono provare li seguenti cambj rivoltando il cambio, co-  
me è stato fatto in quelli di Fiorenza, il che per essere facile si la-  
scia di fare per non allungarsi assai, e a questo effetto si tralascie-  
ranno di stampare l'operazioni facili de medesimi cambj non esi-  
bendo la lor serie i numeri.

### Cambio di Roma con Napoli.

2. D. Roma cambia sc. 100. di giulj x. per Duc. 142  $\frac{1}{2}$ . Si doman-  
da per una rimessa di sc. 1364. bajoc. 60. di quanti Ducati sarà  
il credito in Napoli?

R. Se 100. danno 142  $\frac{1}{2}$ . che daranno sc. 1364. 60? fatto il moltip-  
licare dal prodotto 19445550. si puntano 55. per le grana, delle  
quali 100. sono un Ducato  $\frac{1}{100}$ . schif.  $\frac{1}{2}$ . Il credito sarà di  
Duc. 1944. grana 55  $\frac{1}{2}$ . in Napoli.

$$\text{Se } 100 - 142 \frac{1}{2} - 1364. 60? - \text{Duc. } 1944. 55 \frac{1}{2}.$$

### Cambio di Roma con Venezia.

3. D. Roma cambia sc. stampe 53  $\frac{1}{4}$ . per Duc. 100. di Banco. Si  
domanda per rimessa di sc. di giulj x. 1000. quanti Duc. fuor di  
Banco si sbercheranno in Venezia, essendo Ducati 5. di Banco,  
Duc. 6. fuor di Banco. Aggio di Roma 1523.

R. Per regola moltiplice pigliando l'Aggio per sc. correnti si dicar  
Sc. 1523. sono uguali a sc. stampe 1000. e sc. stampe 53  $\frac{1}{4}$ .  
uguali a Duc. 100. di Banco, e Duc. 5. di Banco uguali a Duc. 6.  
fuor di Banco. Dunque sc. 1000. di giulj x. a quanti Duc. fuor di  
Banco saranno uguali? Operando come vuole tal regola si tro-  
verà essere uguali a Duc. 1465. grossi 21  $\frac{1}{2}$ . in circa fuor di Ban-  
co, facendo grossi 24. un Ducato.

$$1523, - 1000 \mid 53 \frac{1}{4} - 100 \mid 5 - 6 \mid 1000? \text{ Duc. } 1465. 21 \frac{1}{2}.$$

X x x

Cambio

## Cambio di Roma con Milano.

4. D. Roma cambia sc. stampe  $68 \frac{2}{3}$  per sc. Imperiali 100. di sol. Imperiali 117. l'uno. Si domanda per sc. di giulj x. quanti sc. di lir. 6. si averanno di credito in Milano, valendo il Filippo in cambio sol. Imperiali 106. ed in corrente sol. 140. ovvero lir. 7.

Aggio di Roma 1523.

R. Per regola moltiplice si dice; Sc. 1523 uguali a sc. stampe 1000. sc. stampe  $68 \frac{2}{3}$  uguali a sc. Imperiali 100. sc. Imperiali 1. uguale a sol. Imperiali 117. sol. Imp. 106. uguali a lir. 7. correnti, lir. 6. correnti uguali a sc. 1. a quanti saranno uguali sc. 860. di giulj x? operando per tale regola. si troveranno essere uguali a sc. 1064. —. sol. 15.

1523-1000 |  $68 \frac{2}{3}$ -100 | 1-117 | 106-7 | 6-1 | 860? Sc. 1064. . 15.

## Cambio di Roma con Ancona.

5. D. Roma cambia sc.  $99 \frac{2}{3}$  di giulj x. per sc. 100. simili. Si domanda sc. 760. rimessi in Ancona quanti ivi torneranno?

R. Per regola del Trè; Se  $99 \frac{2}{3}$  tornano 100. che sc. 760? saranno sc. 763. 84joc. 82. in circa.

$99 \frac{2}{3}$  — 100 760? Scudi 763. 82.

## Cambio di Roma con Fiera.

6. D. Roma cambia 105. scudi stampe per sc. marche di Fiera 100. Si domanda per sc. 648. di giulj x. di quanti scudi marche farà il credito in Fiera Aggio 1523?

R. Per regola moltiplice operando saranno di credito scudi Marche 405, sol. 4. dan. 4. in circa.

1523 — 1000 | 105 — 100 | 648? Sc. 405. 4-4.

## Cambio di Roma con Lione di Francia.

7. D. Roma cambia sc. stampe  $45 \frac{1}{2}$  per sc. d'oro del sole 100. Si domanda per un credito di sc. 2400. di giulj x. quanti scudi del sole si averanno in Lione Aggio 1523.

R. Se sc. 1523. danno sc. stampe 1000. e sc. stampe  $45 \frac{1}{2}$  danno sc. del sole 100. quanti sc. 2400? Si averanno sc. del sole 3444. soldr. &c.

1523 — 1000 |  $45 \frac{1}{2}$  — 100 | 2400? Sc. 3444. 9.

Cambio



8. D. Roma cambia Sc. di giulj x. 85  $\frac{1}{2}$ . per pezz. da otto 100. Si domanda Sc. 1284. quante pezz. torneranno in Livorno?

R. Per regola del Trè i numeri stanno per ordine: si calcola in quisti li Scudi, si moltiplica per 100. e partendo a danda si avranno Pezz. da otto 1500. in Livorno.

$$85 \frac{1}{2} \text{ — } 100 \text{ — } 1284? \text{ Pezz. } 1500.$$

**• Cambio di Roma con Bologna.**

9. D. Roma cambia Sc. di giulj x. 98  $\frac{2}{3}$ . per Sc. 100. di lir. 5. Si domanda per Sc. di Roma 2460. quanti Scudi si avranno di credito in Bologna?

R. Si opera per la medesima regola dicendo: Se 98  $\frac{2}{3}$  tornano 100. che torneranno 2460? è torneranno Scudi 2500. di credito in Bologna.

$$98 \frac{2}{3} \text{ — } 100 \text{ — } 2460? \text{ Scudi } 2500.$$

**Cambio di Roma con Genova.**

10. D. Roma cambia Sc. di giulj x. 1. per Sol. correnti 117  $\frac{1}{2}$ . di Genova: Si domanda per Sc. 824. di Roma, quanti Sc. d'argento si avranno in Genova di lir. 7. Sol. 12. l' uno?

R. Si moltiplicano Sc. 824. per 117  $\frac{1}{2}$ . il prodotto di Sol. 96824. si parte per Sol. 152. che tanti importano lir. 7. Sol. 12. e vengono Sc. d'argento 636. lir. 7. Sol. 8. che si avranno in Genova.

$$\text{Sc. } 1 \text{ — } 117 \frac{1}{2} \mid 152 \text{ — } 1 \mid \text{Sc. } 824? \text{ Sc. } 636. \text{ lir. } 7. 8.$$

**Cambio di Roma con Madrid.**

11. D. Roma cambia uno Scudo stampe per Maravidis 668. Si domanda per rimessa di Sc. 2500. di giulj x. quante doppie di Spagna faranno in Madrid, valendo la doppia 32. reali, il reale 34. Maravidis, Aggio di Roma 1523.

R. Per regola moltiplice: Se Sc. 1523. danno Sc. stampe 1000. Scudi di stampe 1. Maravidis 668. e Maravidis 34. reale 1. e reali 32. doppia 1. quante doppie daranno Sc. 2500. di giulj x? Si opera con moltiplicare, e partire, e daranno doppie 1007. reali 26. Maravidis 20. Torna meglio: però a trovare quanti Maravidis faranno li detti Sc. 2500. e verranno Maravidis 1096520. li quali si partono per 34. e vengono reali 32250. Maravidis 20. ed i reali si partono per 32. e vengono doppie 1007. 26. 20. &c.

X x x . 2

Cambio

## Cambio di Roma con Lisbona.

**12. D.** Roma cambia Sc. stampe 1. per Rais 1046. Si domanda per Sc. 640 di giulj x. quante Pezze da 8. reali si averanno in Lisbona a Rais 600. per Pezza ? Aggio di Roma 1523.

**R.** Si trovano per regola moltiplice quanti Rais si averanno in Lisbona dicendo ; Sc. 1523. danno sc. stampe 1000. sc. stampe 1. dà Rais 1046. quanti Rais daranno Sc. 640? e fatta l'operazione, s'averanno Rais 439553. li quali si partono per 600. e vengono Pezze 732. Rais 353.

## Fiera di Bisenzio, di Novi, adesso di Sestri di Levante.

Sestri di Levante è un luogo del Genovesato, nel quale si fanno quattro Fiere l'anno. La prima, al principio di Gennaio detta Fiera Apparizione, così chiamata dall'apparizione della Stella à i Santi Magi che si mossero d' Oriente ad andare all' adorazione del Redentore del Mondo, celebrandosi la Pasqua dell'Epifania. La seconda al principio di Maggio detta di Pasqua per farsi doppo la Pasqua di Resurrezione.

La terza al principio d' Agosto denominata dal medesimo Mese.

La quarta al principio di Novembre, detta Fiera de' Santi.

Ciascuna Fiera dura 8. giorni, al più 10. per proroga.

La Scrittura si tiene à Scudi d'oro Marche Imaginarij, lo Scudo si divide in Soldi 20. il Soldo in denari 12.

## La Fiera cambia con l'infrastrate Piazze.

### Fiera con

Firenze	Sc. d'oro	March. 100	Per Sc. d'oro di Lir. 7 $\frac{2}{3}$	144
Roma	Sc. d'oro	March. 100	Per Sc. Stampe	105
Napoli	Sc. d'oro	March. 100	Per Duc. di Carlini x.	226
Venezia	Sc. d'oro	March. 100	Per Duc. di Banco.	196
Milano	Sc. d'oro	March. 100	Per Soldi Imperiali	175
Ancona	Sc. d'oro	March. 100	Per Scudi di Giulj x.	160
Lione	Sc. d'oro	March. 100	Per Sc. d'oro del Sole	231
Livorno	Sc. d'oro	March. 100	Per Pezze da otto	185
Bologna	Sc. d'oro	March. 100	Per Sq. di Bolognini 85	193
Genova	Sc. d'oro	March. 100	Per Sq. di argeato	123
Paler. e Messin.	Sc. oro	March. 100	Per Carlini	41
Pier. di Medina	Sc. oro	March. 100	Per Maravidis	600

Fiera

<b>Fiera con</b>			
Siviglia	Sc. d'oro March.	1	Per Maravidis 606
Cadice	Sc. d'oro March.	1	Per Maravidis 612
Anversa	Sc. d'oro March.	1	Per Denari di Grossi 188
Barcellona, e Saragozza	Sc.	1	Per Soldi 34
Valenza	Sc. d'oro March.	1	Per Soldi 34
Bergame	Sc. d'oro March.	100	Per Scudi 203
Lecce, e Bari, ed altre Città di Regno, come Napoli.			
Norimberga, e Vienna	Sc. d'oro March.	100	Per Tallari 200
Amsterdam	Sc. d'oro March.	1	Per Denari di Grossi 179

### Cambio di Fiera con Roma.

1. D. La Fiera cambia Sc. d'oro marche 100. per Sc. stampe 105. Si domanda per Sc. d'oro marche 405. sol. 4. dan. 5. di quanti Scudi di giulij x. sarà il credito in Roma? Aggio 1523.
- R. Speditamente riducendo sol. 4. dan. 5. con. moltiplicarli per 5. in 22. centesimi per regola moltiplice. Se Sc. d'oro march. 100. tornano Sc. stampe 105. e Sc. stampe 1000. tornano Sc. di giulij x. 1523. Aggio, che torneranno Sc. d'oro marche 405. 22. centesimi? Questi si moltiplicano per 1523. ed il prodotto per 105. da questo secondo prodotte si tagliano 5. figure der li 5. zeri, e due si puntano per li centesimi vengono Sc. 648. di giulij x. l' avanzo non arriva ad un bajocco, e resta provato il cambio 6. passato di Roma con la Fiera.

100 — 105 | 1000 — 1523 | 405. 22 Sc. 648.

### Cambio di Fiera con Napoli.

2. D. La Fiera cambia Sc. 100. per Duc. 226. di Napoli. Si domanda quanti Ducati, e grana faranno in Napoli Sc. d'oro marche 524. 7. 6?
- R. Per essere il 100. nel primo luogo delle regola del Trè brevemente si opera per la seconda de' Partitori, e Soldo 1. den. 9. moltiplicati per 5. fanno in circa 9. grana.

### Cambio di Fiera con Venezia.

3. D. La Fiera cambia Sc. d'oro marche 100. per Duc. 196. di Banco. Si domanda quanti Ducati, e grossi si averanno di credito in Venezia; valendo il Ducato grossi 24. per Scudi d'oro marche 426. 15. 10?

R. Anche

R. Anche questo cambio si può operare per la seconda de' Partitori per essere il 100. nel primo luogo; e verranno Duc.836. grof.12. perchè alli Soldi 10. si aggiunge il quinto, che è 2. e vengono grossi 12. den. 2. sono  $\frac{1}{5}$  di grosso. Si pongono l' operazioni del passato, e di queste.

*Con Napoli.*

524. 7. 6 — 206  
10 52. 8. 9  
10 5. 4. 10  $\frac{1}{5}$

1048. 15. —

104. 17. 6

31. 9. 3

Ducati 1185. 1. 9 — 5

9 Grana.

*Con Venezia.*

426. 15. 10. — 196

10 42. 13. 7

10 4. 5. 4  $\frac{1}{5}$

426. 15. 10

384. 2. 3

25. 12. 2

Ducati 836. 10. 3

$\frac{2}{12}$  Groffi

### Cambio di Fiera con Milano.

4. D. La Fiera cambia Sc. d'oro march. 1. per Soldi Imperiali 179. di Milano. Si domanda per Sc. d'oro march. 250  $\frac{1}{5}$ . quante lire correnti si averanno di credito in Milano. Valendo il Filippo in cambio Sol. Imperiali 106. e Soldi 140. correnti, cioè lire 7. correnti?

R. Si dice per regola moltiplice: Per Sc. d'oro march. 1. si hanno Soldi Imperiali 179. e con Sol. Imp. 106. si hanno lir. 7. correnti, quante di queste si averanno per Sc. d'oro mar. 250  $\frac{1}{5}$ ? Operando secondo tal regola si averanno lire correnti 2963. Soldo 1. denari 4. poco più.

Se, 1 — 179 | 106 — lir. 7 | 250  $\frac{1}{5}$ ? lir. 2963. 1. 4.

### Cambio di Fiera con Ancona.

5. D. La Fiera cambia Sc. d'oro march. 100. per Sc. 161. di Gialli 10. l'uno. Si domanda per Sc. d'oro march. 328. sol. 13. dan. 4. quanti Sc. e bajoc. avrà di credito in Ancona?

R. Si moltiplicano 238.  $\frac{1}{5}$  per 161. dal predotto 52915  $\frac{1}{5}$  si appunta 15. che sono bajoc. e Scudi 529. e questo per essere li 100. nel primo luogo della regola del Tre.

*Con Livorno.*

528. 7. 6 — 185  
 10 52. 16. 9  
 10 5. 5. 8  $\frac{5}{10}$

528. 7. 6  
 422. 14.  
 26. 8. 4  $\frac{5}{2}$

Pezze 977. 9. 10  $\frac{2}{2}$

*Con Bologna.*

256. 18. 4 — 193  
 10 25. 13. 10  
 10 2. 11. 4  $\frac{1}{2}$

256. 18. 4  
 231. 4. 6  
 7. 14. 2 4 — 289

Scudi 495. 17. Bologna. 72  $\frac{1}{2}$

**Cambio di Fiera con Genova.**

9. D. La Fiera cambia Sc. d'oro marche 100. per Sc. 123. d'argento. Si domanda per Sc. d'oro marche 1386. 13. 4. quanti Scudi d'argento riceverà in Genova?

R. Medefimante si partono 1386. 13. 4. per 10, ed il quoziente per 10, le file si moltiplicano per 123. li prodotti si sommano, e fanno Sc. 1705. fol. 12. che si riceveranno in Genova.

**Cambio di Fiera con Palermo, e Messina.**

10. D. La Fiera cambia Sc. d'oro marche 1. per carlini 41  $\frac{2}{3}$ . Si domanda, per Sc. d'oro marche 328  $\frac{1}{2}$ . quanti Ducati di Tarì 13. averanno in Palermo?

R. Si fa la riduzione de' numeri al suo rotto; allora si moltiplica 1643. per 83. dal prodotto 136369. si punta 9. che sono grana, per la partizione per 10. prodotto fatto da denominatori de' rotti 13636. carlini si partono per 2. e vengono Tarì 6818. li quali si partono per 13. e vengono Duc. 524. Tarì 6. grana 9.

*Con Genova.*

1386. 13. 4 — 123  
 10 138. 13. 4  
 10 13. 17. 4  
 1386. 13. 4  
 277. 6. 8  
 41. 12.

Scudi 1705. 12.

*Con Palermo.*

1 — 41  $\frac{2}{3}$  — 328  $\frac{1}{2}$   
 83  
 1643  
 83  
 4929  
 13144

2 13636. 9  
 13 6818. 9  
 Ducati 524. 6. 9

Cambio

*Con Anversa*  
 1350. 10. 10. 15. 8.  
 20 67. 10.  
 12 5. 12. 6  
 1012. 10.  
 45  
 Lire 1057. 10.

*Con Valenza*  
 483. 6. 8. Lire 1. 14  
 20 24. 3. 4.  
 483. 6. 8.  
 338. 6. 8.  
 Lire 821. 13. 4.

### Cambio di Fiera con Bergamo.

14. D. La Fiera cambia Sc. d'oro marche 100. per 202  $\frac{1}{2}$  di Bergamo. Domandasi per Sc. d'oro marche 386  $\frac{1}{2}$  di quanti Sc. sarà il credito di Fiera in Bergamo?
- R. Per regola del Tre: Se 100. danno Sc. 202  $\frac{1}{2}$ . quanti Sc. 386  $\frac{1}{2}$ ? Ciascun numero si riduce al suo rotto, si moltiplicano 1160. per 405. dal prodotto si levano due zeri per la partizione per 100. e 4698. si parte per 6. prodotto di 2. via 3. denominatore; il quoziente 783. mostra li Scudi, che averà di credito la Fiera in Bergamo.

### Cambio di Fiera con Amsterdam.

15. D. La Fiera cambia Sc. d'oro marche 1. per Grossi 179. b. vogliamo dire Sol. 14. den. 11. di Grossi. Si domanda per Sc. d'oro marche 388. 17. 6. di quante lire averà credito la Fiera in Amsterdam?
- R. Si partono 388. 17. 6. per 28. il quoziente per 12. le due cifre moltiplicano per 14. e per 11. li prodotti si sommano, danno di credito 290. — 8  $\frac{1}{2}$ .

*Con Bergamo.*  
 100 — 202  $\frac{1}{2}$  — 386  $\frac{1}{2}$

405  
 1160  
 405

5860  
 4640

6 — 4698:00

Scudi 783

*Con Amsterdam.*  
 388. 17. 6 — 14. 11

20 19. 8. 10  $\frac{1}{2}$   
 12 1. 12. 4  $\frac{1}{2}$

272. 4. 3  
 17. 16. 5  $\frac{1}{2}$

Lire 290. —. 8  $\frac{1}{2}$

Vene-

R. Benchè si potrebbe operare per li partitòri, tuttavia per regola moltiplice è più breve; Si dica dunque: Per Duc. 100. si hanno Sc. d'oro  $73 \frac{1}{2}$ . e Sc. d'oro 14. sono Piastre 15. quante Piastre faranno Duc. 1350? Ed operando come si è insegnato, faranno Piastre 1059. lir. 31. Sol. 11. den. 3. da pagarsi in Firenze.  
 $100 - 73 \frac{1}{2} \mid 14 - 15 \mid 1350? \text{ Piastre } 1059. 35 \text{ li. } 3.$

### Cambio di Venezia con Roma..

2. D. Venezia cambia Duc. 100. di Banco per Sc. stampe  $54 \frac{1}{2}$ . Si vuol sapere per Duc. 756  $\frac{1}{2}$  di Banco quanti Sc. di giulj x. averà credito in Roma, Aggio 1523?

R. Come la passata per Duc. 100. si hanno Sc.  $54 \frac{1}{2}$  stampe, e Sc. stampe 1000. sono Scudi di giulj x. 1523. quanti di questi faranno Duc. 756.  $\frac{1}{2}$ ? e faranno Sc. 624. bajoch. 22.

$$100 - 54 \frac{1}{2} \mid 1000 - 1523 \mid 756 \frac{1}{2}? \text{ Sc. } 624. 22.$$

### Cambio di Venezia con Fiera.

3. D. Venezia cambia Duc. 193  $\frac{1}{2}$ . per Sc. marche 100. Si domanda per Duc. 1356  $\frac{1}{2}$ . quanti Sc. marche si averanno?

R. Li numeri sono ordinati per regola del Trè, onde fatta la riduzione de' numeri a i suoi rotti, moltiplicando, e partendo, si avranno Sc. marche 701. Sol. 15. e 4 poco più.

### Cambio di Venezia con Livorno.

4. D. Venezia cambia Duc. 100. di Banco per Pezze 95  $\frac{1}{2}$ . Si domanda per Duc. 536. di quante Pezze da otto sarà il credito in Livorno?

Con Fiera

$$193 \frac{1}{2} - 100 - 1356 \frac{1}{2}$$

$$\begin{array}{r} 580 \\ 4 \\ \hline 232:0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5427 \\ 3 \\ \hline 162810:0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 410 \\ 278 -- 20 \\ \hline 3560 \\ 80 -- 12 \\ \hline 960 \\ 32 \\ \hline 3 \end{array}$$

$$\text{Sc. } 701. 15. 4.$$

Con Livorno

$$100 - 95 \frac{1}{2} - 536$$

$$\begin{array}{r} 95 \frac{1}{2} \\ 134 \\ \hline 2680 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4824 \\ 10 \ 51054 \\ 10 \ 5105:8 \\ \hline \text{Pezze } 510. 10. 9 \frac{1}{2} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10 \ 51054 \\ 10 \ 5105:8 \\ \hline \text{Pezze } 510. 10. 9 \frac{1}{2} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10 \ 51054 \\ 10 \ 5105:8 \\ \hline \text{Pezze } 510. 10. 9 \frac{1}{2} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10 \ 51054 \\ 10 \ 5105:8 \\ \hline \text{Pezze } 510. 10. 9 \frac{1}{2} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10 \ 51054 \\ 10 \ 5105:8 \\ \hline \text{Pezze } 510. 10. 9 \frac{1}{2} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10 \ 51054 \\ 10 \ 5105:8 \\ \hline \text{Pezze } 510. 10. 9 \frac{1}{2} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10 \ 51054 \\ 10 \ 5105:8 \\ \hline \text{Pezze } 510. 10. 9 \frac{1}{2} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10 \ 51054 \\ 10 \ 5105:8 \\ \hline \text{Pezze } 510. 10. 9 \frac{1}{2} \end{array}$$

R. Sc

R. Se Duc. 100. fanno avere Pezze  $95 \frac{1}{2}$ . quante ne far  
 Duc. 536. di Banco? 536. si moltiplica per  $95 \frac{1}{2}$  il prod  
 si parte per 10. e il quoziente per 10. e faranno Pe  
 9.  $\frac{1}{2}$  di credito in Livorno.

### Cambio di Venezia con Ancona.

5. D. Venezia cambia Duc. 100. di Banco per Sc. 82  $\frac{1}{2}$   
 l'uno. Si domanda per Duc. 720. di Banco quanti Sc.  
 chi si averanno in Ancona?

R. Si moltiplicano 720. per 82  $\frac{1}{2}$  farà il prodotto 5947  
 si puntano 72. che sono bajocchi per la divisione di  
 tiene il primo luogo della regola del Trè, e 594. sono  
 si in Ancona.

### Cambio di Venezia con Lione.

6. D. Venezia cambia Duc. 84  $\frac{1}{2}$ . di Banco per Sc. del  
 domanda per Duc. 386  $\frac{1}{2}$  di Banco, quanti Sc. del fo

R. Oparando per regola del Trè, faranno Sc. del fo  
 denari 10. poco più.

Con Ancona

100. — 82  $\frac{1}{2}$  — 7202

3

5 — 2160

432

1440

5760

84  $\frac{1}{2}$  — 100 —

169

3

507

Sc. del Sole 457. 11. 10. 2

Scudi 594: 72 bajocchi

### Cambio di Venezia con Napoli.

7. D. Venezia cambia Duc. 100. di Banco per Duc.  
 gno. Si domanda per Duc. 1350. di Banco, quanti  
 si averanno in Napoli?

R. Se 100. tornano 115  $\frac{1}{2}$  che torneranno 1350? Moltip  
 pigliare in parte torneranno Duc. 1559. 25. grana,



per essere il 100. nel primo luogo. Ovvero schifando il primo ed il terzo per 50. verranno 2. e 27. e pigliando  $\frac{1}{2}$  per grana 50. si moltiplica 11550. per 27. il prodotto 311850. si parte per 2. e si avranno li medesimi Duc. 1559. grana 25.

### Cambio di Venetia con Milano.

8. D. Venetia cambia Duc. 1. di Banco per sol. Imperiali 92. Si domanda per Duc. 860. di banco, quanti Sc. di lir. 6. correnti si avranno in Milano, stando il Filippo di sol. 106. Imperiali a sol. 140. correnti?
- R. Si moltiplicano Duc. 860. per 92. vengono sol. Imperiali 79120. poi per regola del Trè: Se sol. Imperiali 106. sono sol. 140. correnti, quanti saranno sol. Imp. 79120? E verranno soldi correnti 104498. che partiti per 20. vengono lir. 5224. sol. 18. e partendo le lir. per 6. vengono Sc. 870. lir. 4. Sol. 18. da averli in Milano.

### Cambio di Venezia con Bologna.

9. D. Venezia cambia soldi di Banco 127. per Sc. 1. di bolognini 85. Si domanda per Duc. 920. di Banco, quanti Scudi in Bologna si avranno, essendo il valore del Duc. di Banco soldi 124?
- R. Per regola moltiplice si conosce quel che si deve operare, dicendo Ducato 1. vale sol. 124. per sol. 127. si ha Sc. 1. di Bologna, quanti se ne avranno per Duc. 920? Si moltiplicano Duc. 920. per sol. 124. per essere numeri destri, il prodotto 114080. si parte per sol. 127. con tirare gli avanzi in sol., e den., e si avranno Sc. 898. sol. 5. 4.
- Duc. 1 — 124. | 127 — Sc. 1 — Duc. 920? Sc. 898. 8. 4.

### Cambio di Venezia con Genova.

10. D. Venezia cambia soldi Banco 102. per Sc. 1. di lir. 4. di Genova. Si domanda per una rimessa di Duc. 530. di Banco, quanti Sc. si avranno in Genova?
- R. Questo cambio è simile al passato: Però si moltiplicano Duc. 530. per sol. 124. il prodotto sol. 65720. si partono per sol. 102. e vengono Sc. 644. lir. 1. 5. e da averli in Genova per detta rimessa.
- Duc. 1 — 124. | 102 — Sc. 1 | Duc. 530? Sc. 644. lir. 1. 5. 1.

Cambio

## Livorno cambia con

Fior enza	Pezza	1	Per Soldi 113 $\frac{1}{2}$ .
Roma	Pezza	1	Per Sol. 114. lo Scudo è sol di 133 $\frac{1}{2}$ .
Napoli	Pezza	100	Per Ducati 123. di Carlini 10. l'uno.
Messina	Pezza	1	Per Tarì 11 $\frac{1}{2}$ . Tarì 30. fanno un'oncia.
Bologna	Pezza	1	Bolognini 88.
Venezia	Pezza	100	Per Ducati 105. di Baneo.
Lione	Pezza	1	Per sol. 78. sol. 60. fanno un Sc. del Sole.
Piera	Pezza	186	Per Scudi marche. 100.
Londra	Pezza	1	Per den. sterlini 56 $\frac{1}{2}$ .
Amsterdam	Pezza	1	Per den. grossi 96.

## Cambio di Livorno con Fiorenza .

1. D. Livorno cambia Pezza 1. per sol. 114  $\frac{1}{2}$ . di Fiorenza . Si domanda per Pezza 498  $\frac{1}{2}$ . di quante lire farà il credito in Fiorenza ?
- R. In diversi modi si potrebbe operare questo Cambio . Ora si riducono li soldi in terzi, le Pezze in mezzi, e si moltiplica , il prodotto si parte per 6. il quoziente per 20. e verranno lir. 2849. 15. 2. di credito in Fiorenza .

## Cambio di Livorno con Roma .

2. Livorno cambia Pezza 1. per avere soldi 114. Si domanda per Pezza 654. quanti Sc. e bajocchi si averanno di credito in Roma.
- R. Si moltiplicano Pezza 654. sol. 114. li prodotti sol. 74556. si partono per 4. il quoziente 18639. si sottra da sol. 74556. e resteranno Sc. 559. bajoc. 17. da averli di credito in Roma: da soldi si leva il quarto per farne bajoc. perchè soldi 4. sono bajoc. 3.

## Cambio di Livorno con Genova .

3. D. Livorno cambia Pezza. da 8. R. per Pezza 101  $\frac{1}{2}$ . di lir. 5. di Genova . Si domanda per Pezza 480. di Livorno , quante se n'averanno in Genova ?
- R. Per regola del Trè : Se 100. tornano 101.  $\frac{1}{2}$ . che 480? e torneranno Pezza 487.  $\frac{1}{2}$ . da averli in Genova.

partono per 20. e vengono lir. 1272 che partite per 3. danno scudi del sole 744. di credito in Lione per Livorno.

### Cambio di Livorno con Fiera.

9. D. Livorno cambia Pezze da otto reali 186. per sc. marche 100. Si domanda per Pezze 1354. quanti sc. marche saranno di credito in Fiera?
- R. Si aggiungono due zeri a 1354. e si parte per 186. e verranno sc. marche 727. 19. 1. poco più.

### Cambio di Livorno con Londra.

10. D. Livorno cambia Pezza 1. per denari sterlini  $56 \frac{2}{3}$ . Si domanda per Pezze 1250. quante lire sterline si averanno di credito in Londra?
- R. Si moltiplicano 1250. per  $56 \frac{2}{3}$ . e si ha denari sterlini 70625. che si partono per 12. e fol. 5885. 5. si partono per 20. e si avranno lir. 294. 5. 5. in Londra.

### Napoli.

An. Napoli si tiene la Scrittura à Ducati detti di Regno ; Carlini , e Grana . Grana 10. fanno un Carlino , Carlini 10. un Ducato di grana 100; e di Tari 5.

### Le Monete sono .

La Dop. di Spagna di Carl.	36.	Il Zecchino di Carlini	23 in circa
Il Ducato di Carlini	10	Il Tari di Carlini	2.
Il Carlino di Grana	10	Il Grano di Cavalli	12
Cavalli	1. 2. 3. e 4.	Tornese di Cavalli	6
Il Trè di cinque Grana	$9 \frac{2}{3}$	Il cinque di cinq. Grana	$12 \frac{2}{3}$
Il 15 Grana	15	Il nove di cinq. Grana	$22 \frac{2}{3}$
Il 3. Carlini Grana	30	La mezza Patacca Grana	25
La Patacca Grana	50	Il Ducato Grana	100

Per fare di Ducati Grana : Alli Ducati si aggiungono due zeri , e vengono Grana : Al contrario levati due zeri , o figure di numeri dalle Grana , restano Ducati , e così Duc. 35. sono Grana 3500. e Grana 3546. sono Duc. 35. e Grana 46. stante che le Grana sono centesimi di Ducato .

Napo-

## Napoli cambia con .

Fiorenza	Ducati	199 $\frac{1}{4}$	Per	Sc. d'Oro	100. di Lire 7 $\frac{1}{2}$
Roma	Ducati	141	Per	Sc. Moneta	100. di Giulj 10.
Fiera	Ducati	226	Per	Sc. Marche	100.
Venezia	Ducati	115	Per	Ducati	100. di Banco
Livorno	Ducati	123	Per	Pezzo	100. da 8. Reali
Genova	Ducato	1	Per	Soldi	83. correnti
Lecce, Bari	Ducati	99 $\frac{1}{2}$	Per	Ducati	100. simili
Palermo, Messina	Ducato	1	Per	Tari	9 $\frac{1}{2}$ .
Bologna	Ducato	1	Per	Bolog.	84.
Milano	Ducati	116	Per	Scudi	100. di Lire 6.

## Cambio di Napoli con Roma .

1. D. Napoli cambia Duc. 141  $\frac{1}{2}$ . per sc. 100. di giulj 10. P'uno .  
Si domanda per Duc. 724. grana 60. quanti sc. detti saranno in Roma ?

R. In primo luogo della regola del Tre 141. 50. ponendo 50. grana per mezzo Ducato , nel secondo sc. 100. in terzo 724. 60. a questo aggiunti quattro zeri, se ne appunta uno, ed uno nel partitore 14150. e si parte à danda , e verranno sc. 512. bajocch. 8. poco più .

## Cambio di Napoli con Fiera .

2. D. Napoli cambia Duc. 226. per sc. marche 100. Si domanda per Duc. 1243. quanti sc. marche si averanno in Fiera ?

R. Se 226. danno sc. 100. quanti sc. marche daranno Duc. 1243. aggiunti due zeri à 1243. per la moltiplicazione per 100. si parte per 226. e si averanno sc. marche 550.

## Cambio di Napoli con Venezia .

3. D. Napoli cambia Duc. 115  $\frac{1}{2}$  per Duc. 100. di Banco . Si domanda per Duc. 850. di Regno quanti Ducati di credito saranno in Venezia ?

R. Duc. 115  $\frac{1}{2}$  si riducono in mezzi pure 850. e si aggiungono a questo due zeri, e si parte , e verranno Duc. 735. grossi 22  $\frac{1}{2}$ . in circa .

### Cambio di Napoli con Livorno .

4. D. Napoli cambia Duc. 123. per Pèzze da otto reali 100. Si domanda per Duc. 460. grana 25. di quante Pèzze sarà il credito in Livorno .  
 R. Si partono 46025. per 123. gl' avanzi si riducono in soldi, e denari, e risultano pèzze 374. soldi 3. 8. poco più di credito in Livorno .

### Cambio di Napoli con Genova .

5. D. Napoli cambia Ducato 1. per soldi 83. Si domanda per Duc. 480. quante lire si averanno di credito in Genova ?  
 R. Si moltiplicano Duc. 480. per soldi 83. li prodotti fol. 39840. si partono per 20. e vengono lir. 1992. &c.

### Cambio di Napoli con Palermo &c.

6. D. Napoli cambia Duc. 1. per Tarì 9  $\frac{1}{2}$ . di Palermo. Si domanda quanti Scudi di Tarì 12. si averanno di credito in Palermo per Duc. 546. grana 30?  
 R. Si dice per Duc. 1. si hanno Tarì 9  $\frac{1}{2}$ . quanti se ne averanno per Duc. 546  $\frac{1}{2}$ ? e verranno Tarì 5189. soldi 17. che partiti per 12. faranno Sc. 432. Tarì 5  $\frac{1}{2}$ . di credito .

### Cambio di Napoli con Bologna .

7. D. Napoli cambia Duc. 1. per bolognini 84. Si domanda per Duc. 624. grana 80. di quanti Scudi di lir. 5. ò di bolog. 100. sarà creditore Napoli in Bologna ?  
 R. Si moltiplicano Duc. 62480. per 84. dal prodotto 5248320. si punta il 20. che per essere centesimi sono  $\frac{1}{5}$ . dipoi si punta 83. bolognini, cioè lire 4. bolog. 3. e restano Sc. 524. sicchè sono Scudi 524. lir. 4. bolognini 3  $\frac{1}{5}$ . di credito in Bologna .

### Cambio di Napoli con Milano .

8. D. Napoli cambia Duc. 116. per Sc. 100. di lir. 6. correnti l'uno. Si domanda per Duc. 1357. 20. grana di quanti Scudi sarà il credito in Milano ?  
 R. Si partono 1357. 20. per 116. vengono Scudi 1170. di credito in Milano .

Milano ¶

In Milano si tiene la scrittura à lire correnti di soldi 20. e il soldo di den. 12. e cambiasi à moneta Imperiale, che si riduce in moneta corrente mediante il Filippo, che nel cambio vale soldi Imperiali 106. ed in corrente soldi 140. più, e meno.

### Monete del cambio, ed Imperiali.

Lo Scudo di lire	6	Lo scudo Imperiale, soldi Imp.	117
La lira di soldi	20	Il Filippo in cambio soldi Imp.	106
Il soldo di denari	12		

### Monete usuali, e correnti.

Il quattrino		Lo scudo lire	6
Il Sifino quattrini	2.	La doppia di Spagna, e	
Il soldo quattrini	4.	di Genova lire	24.
La Parpajola quattrini	10.	Ughero lire	14
Il 5. soldi quattrini	20.	Il mezzo Filippo lire	3 $\frac{2}{3}$
Il mezzo quarto di Filip. sol.	17 $\frac{1}{2}$ .	Il Filippo lire	7.
Il quarto di Filippo soldi	35.	Un mezzo quarto di Ducatone	
Il Giulio Romano soldi	15.	lire	1
Il Testone soldi	45.	Il quarto di Ducatone lir.	2
Il Grosso soldi	7 $\frac{1}{2}$ .	Il mezzo Ducatone lire	4
		Il Ducatone lire	8

### Milano cambia con

Firenza soldi Imp.	126	Per sc. d' oro 1. di lire	7 $\frac{1}{2}$ .
Roma soldi correnti	148	Per sc. 1. di Giulj	10
Fiera sol. Imperiali	177	Per sc. Marche	1
Venezia sc. 1. di sol. Imp.	117.	Per soldi di Banco	159
Livorno sol. Imperiali	97.	Per Pezza da 8. reali	1
Genova soldi Imperiali	76.	Per sc. 1. di lire	4
Napoli sc. di lir. 6. corr.	100.	Per Duc. 116. di Carlini	10.
Anversa sc. 1. di sol. Imp.	117.	Per Grossi 116. che sono denari	
Lione soldi Imperiali	80.	Per scudo del Sole	1.
Bologna sc. di lir. 6. corr.	1.	Per Belognini	82.
Madrid sc. Imp. di sol.	117.	Per marayidis	378.
Lisbona sc. Imp. di sol.	117.	Per Rajas	940
Londra sc. Imp. di sol.	117	Per Sterlini	69
S. Gallo sc. Imp. di sol.	117	Per Carantani	150
		Cambio	

## Cambio di Milano con Fiorenza.

1. D. Milano cambia sol. Imperiali 126. per sc. d'oro 1. Si domanda; Per sc. 486  $\frac{7}{8}$ . di lir. 6. correnti, quanti scudi d'oro averà di credito in Fiorenza, valendo il Filippo in Cambio sol. Imperiali 106. e in correnti lire 7?

R. Per regola moltiplice si dice; Sc. 1. vale lir. 6. lir. 7. sono uguali a sol. Imperiali 106. con sol. Imp. 126. si ha sc. d'oro 1. Si domanda con sc. 486  $\frac{7}{8}$ . correnti di Milano quanti sc. d'oro si avranno? Disposti così per ordine li numeri, si opera come si è molte volte insegnato, e si averanno sc. d'oro 350. 18. 7. &c.

Sc. 1—6 | 7—106 | 126—Sc. d'oro 1 | Sc. 486  $\frac{7}{8}$ —Sc. d'oro 350. 18. 7

## Cambio di Milano con Roma.

2. D. Milano cambia sol. correnti 146. per Sc. 1. di Gialj 10. Si domanda, per una rimessa fatta in Roma di sc. 824. di lir. 6. l'uno, quanti scudi, e bajocchi averà di credito Milano in Roma?

R. Si moltiplicano sc. 824. per 6. e vengono lir. 4944. le quali si moltiplicano per 20. e vengono soldi 98880. che si partono per sol. 146. e si averanno sc. 677. bajocchi 26. di credito.

## Cambio di Milano con Napoli.

3. D. Milano cambia sc. 100. di lir. 6. per Duc. 116. Si domanda, per sc. 450. di lir. 6. quanti Duc. si averanno in Napoli?

R. Si moltiplicano sc. 450. per 116. del prodotto 52200. Si puntano li due zeri: e restano Duc. 522. d'averli in Napoli.

## Cambio di Milano con Fiera.

4. D. Milano cambia soldi Imperiali 178. per scudi marche 1. Si domanda per scudi 534. di lire 6. quanti scudi marche averà Milano di credito in Fiera, valendo il Filippo come sopra?

R. Per regola moltiplice; Scudo 1. vale lir. 6. lir. 7. sono uguali a sol. Imp. 106. e sol. Imp. 178. danno sc. marche 1. quanti ne daranno sc. 534? si moltiplicano li numeri sinistri il prodotto 1246. è partitore, ed i destri, e il prodotto 339624. si partirà, e verranno scudi marche 272. 11.  $\frac{5}{7}$ . e tanti ne averà di credito Milano in Fiera.

Sc. 1—6 | 7—106 | 178—Sc. 1 | Sc. 534—Sc. mar. 272. 11.  $\frac{5}{7}$

Cambio

## Cambio di Milano con Venezia.

331

5. D. Milano cambia Scudo imperiale 1. di Sol. 117. per Soldi 159. di Banco di Venezia. Si domanda per una rimessa di Scudi 658. di lire 6. quanti Ducati di Banco averà Milano di credito in Venezia?

R. Per regola moltiplice; Scu. 1. vale lir. 6. e lire 7. sono uguali a Soldi Imperiali 106. e con Soldi 117. si hanno Sol. 159. e Sol. 24. fanno Ducato 1. di Banco. Ora quanti di questi si averanno per Scudi 658? li numeri sinistri daranno per partitore 191556. e li destri il numero da partirsi 66539592. dal partire risulteranno Ducati di Banco 655. grossi 4. poco più; E di tanti sarà il credito.

(&c.

Sc. 1—6 | 7—106 | 117—159 | 124—Duc. 1 | Sc. 658? Duc. 655. 4.

## Cambio di Milano con Livorno.

6. D. Milano cambia Soldi Imperiali 97. per Pezze da 8. Reali 1. Si domanda di quante Pezze averà credito in Livorno per Scudi 356. di lire 6. rimessi?

R. Per regola moltiplice; Scu. 1. vale lir. 6. e lir. 7. sono uguali a Sol. Imp. 106. e con Soldi Imp. 97. si ha pezza 1. quante se ne averanno per Sc. 356. correnti di Milano? dalli numeri sinistri si averà il numero partitore 679. dalli destri il numero da partirsi 226416. onde fatto il partire con ridurre gl'avanzi in Soldi, e poi in denari, si averanno pezze 333. 9. 1. &c.

Sc. 1—6 | 7—106 | 97—Pez. 1 | Sc. 356? Pez. 333. 9. 1. &c.

## Cambio di Milano con Genova.

7. D. Milano cambia Soldi Imperiali 76. per Scudo 1. di lire 4. Si domanda quanti ne averà di credito in Genova per una tratta fatta in Milano di Scudi 520. di lire 6. valendo il Filippo come sopra?

R. Per regola moltiplice; Scudo 1. vale lir. 6. e lir. 7. sono uguali a Soldi Imperiali 106. e con Sol. Imp. 76. si ha in Genova, Scudo 1. quanti se ne averanno con Sc. 520. di Milano? si averà per numero partitore 532. dalla moltiplicazione de' numeri sinistri, e da partirsi 3307. 20. dalla moltiplicazione de' destri, e fatto il partire con ridurre gli avanzi in lire, Soldi, e denari, con moltiplicare per 4. 20. e 12. verranno Scudi 621. lire 2. 12. 3. &c.

Sc. 1—6 | 7—106 | 76—Sc. 1 | Sc. 520? Sc. 621. 2. 12. 3.

Cambio



## Cambio di Milano con Anversa, Amsterdam &c.

8. D. Milano cambia Sc. Imp. 1. di Sol. Imp. 117. per grossi 116. Si domanda, per una rimessa di Sc. 640. di lir. 6. correnti, di quante lire avrà credito Milano in Anversa.
- R. Per regola moltiplice: Sc. 1. vale lir. 6. e lir. 7. sono uguali a Sol. Imp. 106. e con Sol. Imp. 117. si hanno den. grossi 116. d' Anversa, quanti se ne avranno per Sc. 460. di Milano? Li numeri sinistri danno per partitore 819. e li destri danno per numero da partirsi 33936960. e dall'operazione del partire risulteranno den. grossi di Anversa 41437. che partiti per 12. il quoziente per 20. saranno lire 172. Sol. 13. den. 1. poco più di credito per Milano.

Sc. 1 — 6 | 7 — 106 | 117 — 116 | Sc. 460? Grossi 41437. &c.

## Cambio di Milano con Bologna.

9. D. Milano cambia sc. 1. di lir. 6. per bolognini 82. Si domanda per sc. 384. di lir. 6. di quanti scudi sarà il credito in Bologna?
- R. Si moltiplicano sc. 384. per 82. dal prodotto 31488. puntate 88. sono sc. 314. bolognini 88. di credito per Milano.

Scudo 1 — 82 — Scudi 384

768

3072

Scudi 314:88 Bolognini.

## Cambio di Milano con Lione.

10. D. Milano cambia sol. Imp. 80. per sc. del sole 1. Si domanda per sc. 468. di lire 6. il credito di Milano in Lione.
- R. Per regola moltiplice; Se 1. vale lire 6. e lire 7. sono uguali a sol. Imp. 106. e con sol. Imp. 80. si ha sc. del sole 1. quanti se ne avranno con sc. 468? partitore sarà 560. prodotto da' sinistri, numero da partirsi 297648. prodotto da' numeri destri; si parta dunque, e si avranno scudi del sole 531. 10. 3  $\frac{1}{3}$ . di credito in Lione, per Milano.

Sc. 1. — 6 | 7 — 106 | 80 — Sc. 1 | Sc. 468? sc. del sole 531. 10. 3  $\frac{1}{3}$ .

Cambio

## Cambio di Milano con Madrid .

11. D. Milano cambia scudo 1. di lir. 6. per Maravidis 378. Si domanda per tratta fatta in Milano di Sc. 825. di lir. 6. di quante doppie di Spagna sarà in credito Milano a reali 32. per doppia , e a Maravidis 34. per reale ?
- R. Sc. 825. si moltiplica per Maravidis 378. e vengono Maravidis 211850. che si partono per 34. vengono reali 6230. Maravidis 30. che si partono per 32. e vengono doppie 194. reali 22. Maravidis 30. &c.

## Cambio di Milano per Lisbona .

12. D. Milano cambia Scudo Imp. 1. per Rais 940. Si domanda per rimessa fatta di Sc. 520. di lir. 6. di quante Pezze da 8. reali averà credito Milano in Lisbona a Rais 600. per Pezza.
- R. Per regola moltiplice : Sc. 1. vale lir. 6. lir. 7. sono uguali a soldi Imperiali 106. e con sol. Imp. 117. si hanno Rais 940. quanti Rais si averanno per Sc. 520. da lire 6? Il partitore sarà 819. è numero da partirsi 310876800. dal partire vengono Rais 379581. poco meno, li quali si partono per 600. e vengono Pezze 632. Rais 381.
- Sc. 1 — 6 | 7 — 106 | 117 — 940 | Sc. 520? Rais 379581.  
 Per 600 — 379581  
 Pezze 632. 381 Rais

## Cambio di Milano con Londra .

13. D. Milano cambia Sc. Imperiale 1. per den. sterlini 67. Domandasi per Sc. Imperiali 1350. di quante lire sterline sarà creditore Milano in Londra ?
- R. Si moltiplicane Sc. Imp. 1350. per den. 67. il prodotto 90450. si parte per 12. e vengono sol. 7537. den. 6. li quali soldi , si partono per 20. e vengono lire sterline 376. 17. 6. di credito in Londra per Milano .

## Cambio di Milano con S. Gallo , Vienna &c.

14. D. Milano cambia per S. Gallo Sc. Imperiale 1. per carantani 150. Si domanda di quanti Fiorini sarà creditore Milano , per rimessa di Sc. 645. di lire 6. valendo il Fiorino carantani 60?
- R. Per regola moltiplice : Sc. 1. vale lir. 6. e lir. 7. sono uguali a sol. A a a Imp. 106.

Imp. 106. e con sol. Imp. 117. si hanno carantani 150. con Sc. 645. quanti carantani si averanno? si moltiplicano li numeri sinistri che danno per partitore 819, e li destri, che danno per numero da partirsi 61533000. e fatto il partire vengono carantani 75132. poco meno, li quali si partono per 60. e vengono Fiorini 1252. carantani 12.

Sc. 1 — 6 | 7 — 106 | 117 — 150 | Sc. 645 carantani 75132

Carantani

Per 6.0 — 7513.2

Fiorini 1252. 12 Carantani

Bologna.

Si tengono in Bologna le scritture per lo più à Lire, Soldi, e Denari.

Monete di cambio.

Lo Scudo immaginario di Bolognini 85. Lo Scudo di Lire 5. La Lira Bolognini 20.

Monete ufuali.

Il Quattrino	Il Petronio Bolognini	24
Il Bugareno Quattrini	Il Testone Bolognini	30
Il Bolognino Quattrini	Il mezzo Scudo Bolognini	40
La Crazia Fiorentina Quattrini	Lo Scudo Bolognini	80
La Cavalletta Quattrini	Il Ducato Bolognini	100
La Moratella Quattrini	Il Calamino, o sia Veneziano Bolognini	11
La Barberina Quattrini	La Lira Fiorentina Bolognini	15
La Madonnina Bolognini	Le due Gazzette Bolognini	14
Il Paolo Bolognini		

Bologna cambia con

Firenze	Bolognini	106	Per Scudo 1 di Lire	7
Roma	Bolognini	101	Per Scudo 1 di Giulj	10
Fiera Sc. 192. di Bolognini		85	Per Scudi Marche	100
Venezia Sc. 1. di Bolognini		85	Per Soldi di Banco	127
Livorno	Bolognini	88	Per Pezza da otto Reali	1
Napoli	Bolognini	84	Per Ducato	1
Milano	Bolognini	82	Per Scudo 1 di Lire	6
Antona	Bolognini	100 $\frac{1}{2}$	Per Scudo 1 di Giulj	10
Genova	Bolognini	80	Per Pezza 1 di Lire	4
Ferrara	Bolognini	101	Per Scudo 1 di Giulj	10

Cambio

556  
 R. Si moltiplicano lire 8496 2. 6. per 28. costando tanti Bolognini la lira, il prodotto 169922. 10. si parte per 8. il quoziente 21240. 6. 3. si parte per 11. e vengono Pezze 1930. 18. 9. di credito per Bologna in Livorno. 8. ed 11. sono numeri di ripiego del 88.

### Cambio di Bologna con Napoli.

6. D. Bologna cambia Bolognini 84. per Ducato 1. di Regno. Si domanda per lire 2486. 13. 4. correnti di Bologna, quanti Ducati saranno di credito in Napoli?  
 R. Come nel passato, si moltiplicano lir. 2486. 13. 4. per 20. il prodotto 49733. 6. 8. si parte per 12. e il quoziente per 7. numeri di ripiego di 84. vengono Duc. 592. fol. 1. 3.  $\frac{1}{4}$ . il qual fol. 1. &c. Si moltiplica per 5. e vengono grana 6. poco più.

### Cambio di Bologna con Milano.

7. D. Bologna cambia bolog. 82. per Sc. 1. di lire 6. correnti. Si domanda per Sc. 410. di bolog. 85. l' uno, quanti Sc. di lire 6. si averanno?  
 R. Si moltiplicano li Sc. 410. per 85. il prodotto 34850. si parte per 82. e si averanno Sc. 425. di lir. 6.

### Cambio di Bologna con Genova.

8. D. Bologna cambia bolog. 80. per Pezza 1. di lir. 4. Si domanda per Sc. 384. di lire 5. ovvero bolog. 100. l' uno, quante Pezze si averanno in Genova?  
 R. Si aggiungono due zeri à 384. per farne bolog. si parte per 80. a scapezzo, e si averanno Pezze 480.

### Genova.

Le scritture si tengono in Genova per lo più lire, soldi, e denari.

### Monete usuali.

Il denaro, il quattrino denari 4. il Duetto den. 8. il fol. den. 12. il 5. fol., il 6. fol., il 10. fol., la lira fol. 20. il mezzo Scudo lir. 2. lo Scudo lire 4. la Pezza lire 5. mezzo Sc. d'argento lire 3. fol. 16. lo Sc. detto lire 7. fol. 12. la doppia lire 18. fol. 16. il giulio Romano fol. 12. il Testone fol. 36. la mezza Piastra fol. 63. la Piastra fol. 126. &c.

Monete

La Doppia di Spagna lire 16. la Pezza da 8. reali lire 5. il  
 cato contente lire 11. lo scudo d'argento lir. 7. 12.

### Monete di Cartulario.

La lira vale sol. 30, la Pezza di lir. 3. 6. 8. lo sc. d'argento lir. 5.

**Di Soldi correnti far Soldi di Cartulario, e di  
 Cartulario fare Soldi correnti.**

Dalli sol. correnti si leva il terzo partendoli per 3. e sottrando,  
 stano soldi di Cartulario. Si aggiunge la metà a i soldi di C  
 lario, e vengono soldi correnti.

Soldi correnti		Soldi di Cartulario	
per 3	— 150	per 2	— 100
	50		50
<hr/>		<hr/>	
Soldi di Cartulario	100	Soldi correnti	150

### Genova cambia con

Fiorenza Soldi 105. più, e meno	Per Pezza 1. di lir.
Roma Soldi 116.	Per Scudo 1. di Giulj
Piera Scudi 123. di Sol. 152	Per Scudi marche 1
Venezia Scudo 1. di lire 4.	Per Sol. 102. di Banco
Livorno Pezze 100 $\frac{1}{2}$ .	Per Pezze 1
Napoli Soldi 83. correnti	Per Ducato 1. di Regno
Milano Scudo 1. di lire 4.	Per Soldi Imperiali
Bologna Pezza 1.	Per Bolognini
Messina, e Palermo Pezza 1.	Per Tari
Amsterdam Pezza 1.	Per Grossi
Londra Pezza 1.	Per Denari Sterlini
Parigi Pezza 1.	Per Soldi 78. del Sufe

### Cambio di Genova con Fiorenza.

- A. D. Genova cambia soldi 105. correnti per pezza di lire 6.  
 Tollerò 1. Si domanda per lire 3480. soldi 15. di Genova  
 Tollerò si pagheranno in Fiorenza?
- B. Le lire 3480. 15. si riducono in soldi moltiplicando per  
 si partono per 105. e si averanno Tollerò 663. da pagarli  
 renza.

**Car**

## Cambio di Genova con Roma .

2. D. Genova cambia sol. correnti  $116 \frac{2}{3}$ . per sc. 1. di giulj 10. Si domanda per lire 4728. sol.  $14 \frac{2}{3}$ . di quanti scudi, e bajocchi farà il credito in Roma ?
- R. Le lir. 4728. sol.  $14 \frac{2}{3}$ . si riducono in terzi di sol. 383724. medefinamente si riducono sol.  $116 \frac{2}{3}$ . in terzi 350. de' quali si punta il zero, per il ripiego di 35. cioè per 5. si partono li 3837240. aggiunto un zero per avere li bajocchi, il quoziente 567448. si parte per 7. e vengono sc. 810. bajocchi 64.

## Cambio di Genova con Fiera .

3. D. Genova cambia scudi d'argento 123. di lir. 7. sol. 12. per scu. march. 100. Si domanda per scudi correnti 824  $\frac{1}{2}$ . di lir. 4. l'uno, di quanti scudi marche farà il credito in Fiera ?
- R. Per regola moltiplice, si dice; Sc. 1. vale lir. 4. e lir.  $7 \frac{1}{2}$ . fanno uno scudo d'argento, e sc. d'argento 123. si cambiano con scudi marche 100. con quanti di questi si cambieranno sc. 824  $\frac{1}{2}$ . di lir. 4. Fatta la riduzione dell'intieri ne' suoi rotti, con uguagliare la parte contraria, si moltiplicano li numeri sinistri, che danno per Partitore 4674. e li destri per numero da partirsi 1649500. onde facendo il partire risulteranno scu. marche 352. 18. 2. poco più.
- Sc. 1—4 |  $7 \frac{1}{2}$ —Sc. 1 | Sc. 123—Sc. 100 | Sc. 824  $\frac{1}{2}$ ? Sc. 352. 18. 2.

## Cambio di Genova con Venezia .

4. D. Genova cambia sc. 1. di lir. 4. per sol. 103. di Banco. Si domanda per sc. 5966. 2. 6. di lir. 4. quante lire correnti s'averanno in Venezia ?
- R. Se sc. 1. dà soldi 103, quanti soldi daranno sc. 5966. 2. 6. e verranno 614510. 17. 6. che si partono per 5. il quoziente 122902. 3. 6. con essi si somma, e vengono soldi correnti 737413. che partiti per 20. si averanno lire correnti 36870. soldi 13. in Venezia di credito.

## Cambio di Genova con Livorno .

5. D. Genova cambia 100  $\frac{2}{3}$ . Pezze di lir. 5. per Pezze 100. di Livorno. Si domanda per rimessa di Pezze di Genova 3820. quante se ne averanno in Livorno ?
- R. Se 100  $\frac{2}{3}$  tornano 100. che torneranno 3820. e riducendo il primo, e terzo in mezzi con aggiungere a questo due zeri, si parte per 291. e si averanno pezze 3800. 19. 10. in Livorno, poco più.

Cambio

560  
 R. Si moltiplicano Pezze 486. per 11  $\frac{1}{2}$ . Vengono Tarì 5710  $\frac{1}{2}$ .  
 li quali si partono per 30. che tanti Tarì fanno un'oncia, e ven-  
 gono onçe 190. Tarì 10  $\frac{1}{2}$ . di credito in Palermo per Genova.

### Cambio di Genova con Amsterdam.

10. D. Genova cambia Pezza 1. di lir. 5. per den. grossi 103. Si do-  
 manda per Pezze 486. quante lire, soldi, e denari di grossi si  
 averanno di credito in Amsterdam?

R. Si moltiplicano Pezze 486. per den. 103: il prodotto 50058. si  
 parte per 12: e vengono soldi 4171. den. 6. Il Soldo si partono  
 per 20. e vengono lir. 208. 11. 6. di credito in Amsterdam  
 per Genova.

### Cambio di Genova con Londra.

11. D. Genova cambia con Londra Pezza 1. di lir. 5. per denari  
 sterlini 56. Si domanda per lir. 4596. di Genova quante lire,  
 soldi, e denari sterlini si averanno di credito in Londra?

R. Se lir. 5. den. 56. quanti ne daranno lir. 4596? moltiplicando  
 4596. per 56. e partendo il prodotto 257376. per 5. daranno  
 den. 51475.  $\frac{1}{2}$ . che partiti per 12. vengono soldi 4289. 7  $\frac{1}{2}$ . e  
 questi per 20. vengono lire 214. sol. 9. den. 7  $\frac{1}{2}$ . sterlini di  
 credito in Londra per Genova.

### Cambio di Genova con Parigi.

12. D. Genova cambia Pezza 1. di lire 5. per soldi 78. Si doman-  
 da per Pezze 4320. quanti sc. del sole si averanno in Pari-  
 gi, a lire 3. per scudo?

R. Si moltiplicano Pezze 4320. per 78. vengono soldi 336960.  
 li quali si partono per 20. vengono lire 16848. che si par-  
 tono per 3. e vengono sc. 5616. del sole da averci di credi-  
 to in Parigi per Genova.

Pez. 1 — 78 — 4320

78

Prova

Sol. 78 — Pez. 1 — Sol. 336960

249

156

Pezze 4320

0

34569

36920

20

336960

Per 3

16848

del Sole Scudi 5616

TRAT.

# TRATTATO UNDECIMO.

## De' Ragguagli di Piazze Mercantili,

*In ordine alli Cambj, e Commissioni.*



Osa assai necessaria è a' Banchisti, a' Sensali de' Cambj, ed a' Mercanti di Fiera il sapere ragguagliare una Piazza mercantile con l'altra, e trovare il prezzo variabile, che darà una per il prezzo stabile dell'altra, e con la sola nota de' prezzi, de' Cambj, che manda stampata ogni trè mesi la Fiera si può trovare, come devono cambiare tutte l'altre

Piazze trà di loro alla pari, come cambiassero con Fiera. Per esempio si trova nella Nota: Fiorenza 142  $\frac{2}{3}$ . Venezia 196. vuol dire, che Fiorenza dà, o cambia sc. d'oro 142  $\frac{2}{3}$ . e Venezia Duc. di Banco 196. per sc. d'oro marche 100. Perchè la Fiera dà sempre il prezzo stabile di sc. uno, ovvero 100. Per trovare, come resta il cambio di Fiorenza con Venezia si fa il ragguaglio per regola del trè, dicendo: Ducati di Banco 196. son uguali a sc. d'oro 142  $\frac{2}{3}$ . à quanti di questi saranno uguali Ducati 100. di Banco? prezzo stabile, che suol dare Venezia per Fiorenza. Operando si troveranno uguali a sc. d'oro 72. fol. 14. den. 1. poco meno, ed à tanti resta il cambio trà Fiorenza, e Venezia alla pari, come per Fiera. Ovvero facendo, che Fiorenza dia prezzo stabile di sc. d'oro 100. si dice, se sc. 142  $\frac{2}{3}$ . sono uguali à Duc. di Banco 196. à quanti di questi saranno uguali sc. d'oro 100. di Fiorenza? e verranno dall'operazione Duc. 137. fol. 10. den. 10. che doveria dare Venezia per sc. d'oro 100. di Fiorenza.

Medesimamente si trova nella Nota: Fiorenza 142  $\frac{2}{3}$ . e Amsterdam 180. cioè Amsterdam dà Grossi 180. per sc. d'oro marche 1. si cerca quanti Grossi darà per scudo d'oro 1. di Fiorenza. Per regola moltiplice, sc. d'oro 142  $\frac{2}{3}$ . uguali à sc. d'oro marche 100., sc. d'oro marche 1. uguale à Grossi 180. à quanti di questi sarà uguale sc. d'oro 1. di Fiorenza? Operando si troverà à Grossi 126  $\frac{2}{3}$ . poco meno; e tanti ne darà Amsterdam per sc. d'oro 1. di Fiorenza. E così si ragguagliano li prezzi de' cambi per l'altre Piazze.

B b b b

Ragguagli



**Ragguaglio di Piazza** è un ritrovamento di cambio, che in moneta dovrebbe fare una Piazza con l'altra, a fine di trovare per dove torni meglio trarre, o rimettere secondo la larghezza, o strettezza di denaro delle Piazze, e conseguentemente se sia meglio cambiare a dell'una, o per mezzo di qualche Piazza, con la quale ci sia corrispondenza dando ordini di Commissioni, e formando Arbitrii di cambio per riportarne guadagno.

**I Ragguagli per lo più si operano per Regola del Trè.** Quando il 100. tiene il primo luogo in tal regola, in Fiorenza usano li Banchisti la regola detta del Partitori, ovvero il moltiplicare detto ivi per Apporre, siccome usano il partire per apporre, quando il 100. è nel secondo luogo, le quali operazioni si sono insegnate a suo luogo; Ma il pratico Computista non stia attaccato a tali regole operando secondo l'esigenza de numeri per quel modo, che conosce più breve, e facile. Chi vuol andare in diver si luoghi con pigliare la medesima strada allunga viaggio.

**I Ragguagli si proporranno chiatamente, acciò da Giovanetti sieno bene intesi, ponendo sempre come cambia l'una, e l'altra Piazza, e non solo il prezzo variabile, mà anco il prezzo stabile si porrà in uguaglianza corrispondente.** E dove il Banchista direbbe, Roma cambia per Fiorenza a sc. stampe  $74 \frac{2}{3}$ . e Fiorenza per Venezia a sc. d' oro 73. si domanda come resterà il cambio trà Roma, e Venezia? Si dirà Roma cambia sc. stampe  $74 \frac{2}{3}$ . per sc. d' oro 100. di Fiorenza, e Fiorenza sc. d'oro 73. per Duc. di Banco 100. di Venezia; Si domanda come resterà il cambio trà Roma, e Venezia, dando questa stabilmente Duc. di Banco 100. per Roma.

**Qualche difficoltà è in sapere intavolare li numeri della regola del Trè, che si cercherà di levare avvertendo, che delle due Piazze, trà le quali si cerca il Ragguaglio, uno dà prezzo stabile, come sc. 1. ovvero 100. l'altra dà prezzo variabile, che è più di sc. 1. ovvero più di sc. 100. la moneta dunque nominata nel Ragguaglio di quella Piazza, che dà prezzo variabile s' intavola nel secondo luogo, e nel primo la moneta equivalente dell' altra Piazza, con la quale non si fa Ragguaglio, e nel terzo la moneta simile alla prima.**

### Ragguaglio di Fiorenza con Venezia, per via di Roma.

1. D. Fiorenza cambia, e dà per Roma scudi d'oro 100. di lir.  $7 \frac{2}{3}$ . l'uno, per sc. stampe  $74 \frac{2}{3}$ . e Roma dà a Venezia sc. stampe 54. per Ducati di Banco 100. Si domanda come resterà il cambio di Fiorenza con Venezia per via di Roma? R. Fio-

ti à scudi d'oro 100. nel terzo della regola del Trè scudi stampe  
 54. simili in natura à quelli del primo luogo, ed equivalenti à Du-  
 cati di Banco 100. li quali dà Venezia per Fiorenza per gli scudi  
 d'oro, che verranno dall'operazione della regola del Trè. E que-  
 sto modo d'intavolare i numeri si usi negl'altri Ragguagli; perchè  
 volendo usare la regola moltiplice, con dire: Ducati di Banco  
 100. di Venezia uguali sono à sc. stampe 54. e sc. stampe  $74 \frac{2}{5}$ .  
 sono uguali à scudi d'oro di Fiorenza, à quanti di questi saranno  
 uguali Ducati di Banco 100? per essere Ducati 100. una volta nu-  
 mero sinistro, e l'altro destro, s'annullano, e restano solo da  
 moltiplicarsi 54. e 100. e  $74 \frac{2}{5}$ . per partitore, come per regola  
 semplice del Trè.

<u>74 <math>\frac{2}{5}</math></u>	<u>100</u>	<u>54<sup>2</sup></u>		<u>100</u>	<u>54</u>	<u>74 <math>\frac{2}{5}</math></u>	<u>100</u>	<u>100</u>
		10						
741								
Sc. d'oro 72. 17. 6		54000						
Provisione 4. 10		2130						
		<u>648</u>	- 20					
Sc. d'oro 73. 2. 4								
		12960						
		5550						
		363						
		651						

Ecco dunque, che operato, sono venuti sc. d'oro 72. 17. 6. da pagar-  
 si in Fiorenza per Duc. 100. di Banco, e di più si devono pagare  
 soldi 4. den. 10. di provisione à  $\frac{2}{5}$ . per 100. per li corrispondenti  
 di Roma, che in tutto sono sc. d'oro 73. sol. 2. den. 4.

Questo Ragguaglio dunque consiste, che se cambiando Fiorenza à  
 dirittura desse meno di sc. d'oro 73. 2. 4. per Ducati 100. di Ban-  
 co di Fiorenza, non dovrebbe passare il Cambio per Roma se non  
 in caso forzoso. Mà se à dirittura desse più, allora sarebbe utile  
 passare il Cambio per Roma.

Nel proporre gl'altri Ragguagli si metterà come cambia à dirittura  
 una Piazza con l'altra, supponendo il prezzo, sì perchè si cono-  
 sca qual Piazza dia prezzo variabile, e perchè si conosca, se utile,  
 d'danno sia passare il Cambio per l'altra Piazza.

## Ragguaglio di Roma con Venezia, per via di Fiorenza .

2. D. Roma rimette in Fiorenza sc. stampe  $74 \frac{1}{8}$ . per sc. d'oro 100. e Fiorenza rimette in Venezia scudi d'oro 72. 17. 6. per Duc. 100. di Banco . Si domanda come refterà in Roma la difpoſizione da Fiorenza per Venezia cambiando Roma à dirittura à sc. stampe  $53 \frac{1}{2}$ . per Duc. 100. di Banco di Venezia ?
- R. Roma dà il prezzo variabile, però ſcudi ſtampe  $74 \frac{1}{8}$ . in mezzo ; in primo luogo ſcudi d'oro 100. equivalenti , in terzo ſcudi d'oro 72. 17. 6. uguali à Duc. 100. di Banco . In Fiorenza ſi opera per la terza de' Partitori, e vengono ſc. ſtampe 54. da pagarſi in Roma , e più proviſione à ragione di  $\frac{1}{8}$ . per 100. per gl'Amici di Fiorenza , che è di ſol. 3. den. 7. per Duc. 100. di Banco , mà à dirittura paga meno, cioè ſc. ſtampe  $53 \frac{1}{2}$ . ſicchè non torna conto à paſſare il Cambio per Fiorenza .

## Ragguaglio di Fiorenza con Roma per via di Venezia .

3. D. Fiorenza rimette in Venezia ſcudi d'oro 72. 17. 5. per Duc. 100. di Banco , e Venezia dà Duc. 100. di Banco per avere in Roma ſc. ſtampe 54. Si domanda , come refterà in Fiorenza la diſpoſizione da Venezia per Roma , cambiando Fiorenza a dirittura ſc. d'oro 100. per ſc. ſtampe 74?
- R. Roma dà il variabile in ſc. ſtampe : Però ſc. ſtampe 54. in mezzo ſc. d'oro 72. 17. 5. equivalente, perchè per l'una, ò per l'altra moneta ſi hanno Duc. 100. in Venezia , e in terzo luogo della regola del Trè ſc. d'oro 100. ſimili alli poſti in primo luogo , e fatta la riduzione con moltiplicare, e partire, vengono ſc. ſtampe 74. ſol. 2. 2. dalle quali ſi ſottra la proviſione di  $\frac{1}{8}$  per 100. che ſono ſol. 5. reſtano ſc. ſtampe 73. 17. 2. e tanti ne averà Fiorenza da Roma per ſc. d'oro 100. per via di Venezia: Onde ci averebbe danno mentre à dirittura ne hà ſc. ſtampe 74.
- Avvertaſi, che qui ſi è levata la proviſione ; perchè Fior enza la deve pagare con ricever meno, ma nel primo Ragguaglio ſi aggiunge la proviſione à ſc. d'oro , acciò Fiorenza faceſſe rimette di quel di più .
- Avvertaſi ancora, che concorrendo trè Piazze al Ragguaglio, in trè modi ſi può variare facendoli ciaſcuna Piazza mezzana , ed un modo può ſervire di prova all'altro , come ſi può oſſervare .

Rag-

## Ragguaglio di Fiorenza con Roma per via di Fiera .

4. D. Fiorenza cambia per Fiera Sc. d'oro 142. per Sc. m. e Fiera rimette in Roma Sc. Marche 100. per Sc. f. Domandasi come refterà in Fiorenza la disposizione per Roma ? Pongasi che Fiorenza cambi Scudi d'oro 10 di stampe  $74 \frac{1}{2}$ .

R. Per regola del Trè : Se Sc. d'oro 142. sono uguali a Sc. pe 105. a quanti di questi faranno uguali Scudi d'oro Fiorenza ? e risulteranno Sc. stampe 73. 18. 10. &c. d'oro 100. pagati in Fiorenza si averanno in Roma Sc. 73. 18. 10. meno provizione a  $\frac{1}{2}$  per 100. per gl' Amici dal the si conosce , che non torna conto avendosi a driti di stampe  $74 \frac{1}{2}$ .

## Ragguaglio di Fiera con Roma per via di Fiorenza .

5. D. La Fiera rimette in Fiorenza Scudi marche 100. d'oro 142. e Fiorenza rimette in Roma Sc. d'oro 100. pe  $74 \frac{1}{2}$ . come refterà il cambio trà Fiera , e Roma in Fiorenza ?

R. Perchè Roma per Fiera dà il variabile, si pongono Sc.  $74 \frac{1}{2}$  in mezzo dicendo : Se Sc. d'oro 100. sono uguali a stampe  $74 \frac{1}{2}$ . a quanti di questi faranno uguali Sc. d'oro che sono uguali a Sc. marche 100. si operi , che refterà a Sc. stampe 105. fol. 4. den. 4. in circa meno la prov. per 100. per gl' Amici di Fiorenza .

## Ragguaglio di Fiorenza con Fiera per via di Roma .

6. D. Fiorenza rimette in Roma Sc. d'oro 100. per Sc. f. m. e Roma rimette in Fiera Sc. stampe 105. fol. 4. den. 4. marche 100. Si domanda a quanto refterà la rimessa in Fiorenza da Roma per Fiera ?

R. Fiorenza dà il variabile , però Sc. d'oro 100. in mezzo Sc. stampe  $74 \frac{1}{2}$ . equivalenti a Sc. d'oro 100. a quanti

300  
 faranno equivalenti Sc. stampe 105. 4. 4? Et operando verranno  
 Sc. d'oro 142. sicchè la rimessa resterà a Sc. d'oro 142. è più  $\frac{2}{3}$ .  
 per 100. di provisione per quei di Roma.

### Ragguaglio di Fiorenza con Milano per via di Roma.

7. D. Fiorenza rimette in Roma Scudi d'oro 100. per Scudi stampe 74  $\frac{1}{2}$ . e Roma rimette in Milano Sc. stampe 68  $\frac{1}{2}$ . per Scudi Imperiali 100. di fol. 117. Imperiali l'uno. Si domanda a quanti fol. Imperiali resterà il cambio per Scudo d'oro 1. trà Fiorenza, e Milano?

R. Per regola multiplite : Se Sc. d'oro 100. sono uguali a Sc. stampe 74  $\frac{1}{2}$ . e Sc. stampe 68  $\frac{1}{2}$  sono uguali a Sc. Imperiali 100. e Sc. Imp. 1. è uguale a fol. Imp. 117. a quanti di questi sarà uguale Sc. d'oro 1. di Fiorenza? come si è insegnato 100. e 180. e 1. ed 1. si annullano; sicchè resta da moltiplicarsi 74  $\frac{1}{2}$ . via 117. ed il prodotto da partirsi per 68  $\frac{1}{2}$ . onde è come si dicesse per regola del Trè; Se Sc. Stampe 68  $\frac{1}{2}$  tornano Sc. Stampe 74  $\frac{1}{2}$ . che torneranno fol. Imp. 117? ed operando torneranno fol. Imp. 126. in circa, e tanti ne riceverà Fiorenza cambiando Scudo d'oro 1. per via di Roma meno la provisione di  $\frac{2}{3}$  per 100. &c.

### Ragguaglio di Milano con Roma per via di Fiorenza :

8. D. Milano rimette in Fiorenza fol. Imp. 126. per Scudo d'oro 1. e Fiorenza rimette Sc. d'oro 100. per Sc. stampe 74  $\frac{1}{2}$ . Si domanda quanti Sc. stampe averà Milano per Sc. Imp. 100. da Roma per via di Fiorenza?

R. Lasciata la regola multiplice si dice : Se fol. Imp. 126. tornano fol. Imp. 117. che torneranno Sc. stampe 74  $\frac{1}{2}$ ? e torneranno Sc. stampe 68. fol. 116  $\frac{2}{3}$ . e tanti ne averà Milano per Sc. Imp. 100. meno la provisione di  $\frac{2}{3}$  per 100. per li corrispondenti di Fiorenza, ma à dirittura come si è detto nel passato hà Sc. stampe 68. 16. 8. sicche non gli torna conto passare per Fiorenza.

### Ragguaglio di Fiorenza con Roma per via di Milano.

9. D. Fiorenza rimette in Milano Sc. d'oro 1. per fol. Imp. 126. e Milano rimette in Roma Sc. Imp. 100. per Sc. stampe 68  $\frac{1}{2}$ . si cerca come cambierà Fiorenza con Roma per via di Milano?

R. Si

R. Si dice: Soldi Imp. 117. tornano 126. che torneranno Sc. stampe 68  $\frac{1}{2}$  e torneranno Sc. stampe 74. folia. 7. incirca, e tanti averà Fiorenza in Roma meno  $\frac{1}{2}$  Sc. .

### Ragguaglio di Fiorenza con Ancona per via di Roma .

10. D. Fiorenza rimette in Roma sc. d'oro 100. per se. stam. 74 e Roma rimette in Ancona sc. 99. di Giulj 10. l'uno per sc. 100 simili . Si domanda à quanto resterà il cambio in Fiorenza e Roma per Ancona? Aggio 1523.

R. Per regola moltiplica si dice ; Sc. d'oro 100, sono uguali a sc. di stam. 74  $\frac{1}{2}$ . Sc. stam. 1000. uguali à sc. 1523. di Giulj 10. l'un Sc. 99. sono uguali à sc. 100. d' Ancona . Adesso sc. d' oro 100. Fiorenza à quanti sc. d' Ancona saranno uguali ? Annullati quattro zeri ne' numeri destri , e sinistri, e ridotto in quinti un dest ed un sinistro ; Si moltiplica 1523. destro via 372. destro, ver 566556. da partirsi ; dipoi si moltiplica 99. via 50. num. sinistri e ne verrà 4950. partitore ; e dal partire risultano sc. 114. bajocchi 45. Dunque Fiorenza per sc. 100. d'oro averà sc. 114. bajocchi 45. in Ancona , meo  $\frac{1}{2}$  per 100. di provisione .

100 — 74.  $\frac{1}{2}$  | 1000 — 1513 | 99 — 100 | 100?

---

372 | 50 — 1523 | 99 — Sc. stam. 114. 45  
38 Provi

Senza la provisione 114. 07

### Ragguaglio d' Ancona con Roma per via di Fiorenza .

11. D. Ancona rimette sc. 113.  $\frac{1}{2}$ . in Fiorenza , e questa riceve stampe 74.  $\frac{1}{2}$ . da Roma , la quale rimette sc. 99. di Giulj x. Ancona. Si domanda come tornerà meglio cambiare ad Ancona cioè a dirittura, o per via di Fiorenza? Aggio 1523.

R. In questo Ragguaglio si sono messi i prezzi variabili solamente supponendo , che i prezzi stabili si sappiano. Operasi per regola moltiplice , e verranno sc. 99. bajocchi 56. da quali levati bajocchi di Provisione restano sc. 99. 23. Sicchè tornerà conto ad Ancona passare il cambio per Fiorenza ; Mentre a dirittura non ha , e soldi 99. 113  $\frac{1}{2}$

568	143 $\frac{2}{3}$ — 100		100 — 74 $\frac{2}{3}$		1000 — 1523		100 ?
127	— 2		5 — 371		10 — 1523		0
	Sc. 99.		56				
			33.		Provisione di $\frac{2}{3}$ per 100		
	Sc. 99.		23				

### Ragguaglio di Fiorenza con Lione per via di Roma.

12. D. Fiorenza rimette in Roma sc. d'oro 100. per sc. stampe 74  $\frac{2}{3}$ . e Roma rimette in Lione sc. stampe 47  $\frac{2}{3}$ . per sc. 100. del sole. Si domanda essendo il cambio à dirittura da Fiorenza à Lione à sc. d'oro 64  $\frac{2}{3}$ . per sc. 100. del sole, se farà meglio passare il cambio per Roma?
- R. Se sc. stampe 74  $\frac{2}{3}$ . ricercano sc. d'oro 100. quanti ne ricercheranno sc. stampe 47  $\frac{2}{3}$ ? ne ricercheranno sc. d'oro 63. 51 centesimi, che moltiplicati per 2. sono sol. 10. den. 2. ed aggiunta la provisione à  $\frac{2}{3}$ . per 100. di sol. 4. den. 2. fanno sc. d'oro 63. 14. 4. e tanti si pagheranno in Fiorenza per sc. 100. del sole passando per Roma: Ma à dirittura si pagano sc. d'oro 64  $\frac{2}{3}$ . dunque gli è di assai utilità passare il cambio per Roma.

### Ragguaglio di Fiorenza con Roma per via di Lione.

13. D. Fiorenza rimette sc. d'oro 64  $\frac{2}{3}$ . per sc. 100. del sole in Lione, e Lione rimette in Roma sc. 100. del sole per sc. stampe 47  $\frac{2}{3}$ . Si domanda essendo il cambio à dirittura da Fiorenza à Roma à sc. stampe 74  $\frac{2}{3}$ . per sc. d'oro 100. se sia utile passar per Lione?
- R. Se con sc. d'oro 64  $\frac{2}{3}$ . si hanno sc. stampe 47  $\frac{2}{3}$ . con sc. d'oro 100. quanti se ne averanno? se ne averanno sc. stampe 72. e 77. centesimi, che moltiplicati per 2. danno sol. 15. den. 4. sicchè è dannoso passare per Lione avendo Fiorenza per sc. d'oro 101. scudi stampe 74  $\frac{2}{3}$ . à dirittura, dove per Lione ne hà meno di 73.

### Ragguaglio di Livorno con Roma per via di Fiorenza.

14. D. Livorno rimette in Fiorenza Pezza 1. da 8. reali per sol. 115. e Fiorenza rimette in Roma sc. d'oro 100. per sc. stampe 74  $\frac{2}{3}$ . Si domanda cambiando Livorno Pezze 100. per sc. 86.  $\frac{1}{2}$ . di giulj 10. Puno à dirittura, se gli sarà utile passare il cambio per Fiorenza?

R. Per

R. Per regola moltiplice, si dice pezza 1. è uguale a sol. 115., e sol. 150. vale lo sc. d'oro. Se d'oro 100. uguali a sc. stam. 74  $\frac{1}{2}$ . sc. stam. 1000. uguali a sc. 1523. di giulj 10 l' uno, si cerca pezze 100. di Livorno a quanti sc. di giulj 10. faranno uguali? ed operando si averanno sc. 86. bajoc. 63. in circa, da quali levati bajoc. 29. di provvisione a  $\frac{1}{2}$ . per 100. restano sc. 86. bajoc. 34. Onde sarà più utile fare il cambio a dirittura, avendo sc. 86. bajoc. 60.

1 — 115 | 150 — 1 | 100 — 74  $\frac{1}{2}$  | 1000 — 1523 | 100 sc. 86:63

### Ragguaglio di Fiorenza con Napoli per via di Roma.

15. D. Roma per Fiorenza cambia sc. stampe 74. per sc. d'oro 100. e per Napoli dà sc. 100. di giulj 10. l'uno per Duc. 141  $\frac{1}{2}$  di Regno; ordinandosi da Fiorenza in Roma di trarre a loro, e rimettere a Napoli, come resterà in Fiorenza la disposizione da Roma per Napoli? Aggio 1523.

R. Per regola moltiplice; Se d'oro 100. sono uguali a sc. stampe 74. sc. stampe 1000. uguali a sc. 1523. di giulj 10. sc. 100. di questi uguali a Duc. 141  $\frac{1}{2}$ . Si domanda sc. d'oro 100. a quanti Ducati faranno uguali? e dall' operazione risulteranno Ducati 159. grana 47. da quali si devono levare  $\frac{1}{2}$ . per 100. di provvisione per gl'Amici di Roma, che fanno tratta, e rimessa; Onde si partono 159. per 5. il quoziente si raddoppia, e viene la provvisione di 63. grana in circa; che sottratte da Duc. 159. grana 47. restano Duc. 158. grana 84. per sc. d'oro 100. di Fiorenza.

100 — 74 | 1000 — 1523 | 100 — 141  $\frac{1}{2}$  | 100 Duc. 159.47.

### Ragguaglio di Roma con Napoli per via di Fiorenza.

16 D. Fiorenza per Roma dà sc. d'oro 100. per sc. stampe 74. e per Napoli pure sc. d'oro 100. per Duc. 159. grana 48. ordinandosi da Roma in Fiorenza di trarre a loro, e rimettere a Napoli, come resterà in Roma la disposizione da Fiorenza per Napoli? Aggio 1523.

R. Per regola moltiplice sc. 1523. Aggio sono uguali a sc. stampe 1000. e scudi stampe 74. a sc. d'oro 100. e sc. d'oro 100. a Ducati 159.48. a quanti di questi faranno uguali sc. 100. di giulj 10. di Roma? Si moltiplica 1523. per 74. viene Partitore 112702. e

C c c c

Duc,



Duc. 159. 48. aggiunti cinque zeri in fine per ordine, e partendo risulteranno Duc. 141. 51. che si averanno in Napoli da Roma meno la provvisione  $\frac{7}{100}$ . per 100. per quei di Fiorenza.  
 1523 — 1000 | 74 — 100 | 100 — 159. 48 | 100? Duc. 141. 51.

### Ragguaglio di Fiorenza con Bologna per via di Roma.

17. D. Roma con Fiorenza da sc. stampe 74  $\frac{1}{2}$ . per sc. d'oro 100. e per Bologna sc. 98. di giulj x. l' uno per sc. 100. di lir. 5. ordinandosi da Fiorenza in Roma di trarre a loro, e rimettere a Bologna. Come resterà in Fiorenza la disposizione da Roma per Bologna? Aggio 1523.

R. Comandamente si risolvono questi Ragguagli per regola moltiplicare perche stabilimento Fiorenza da una Piastra di lir. 7. per avere una quantità di bolognini, però si comincia dal prezzo dello scudo d'oro dicendo: lir. 7  $\frac{1}{2}$  vale sc. d'oro 1. e sc. d'oro 100. sono uguali a sc. stampe 74  $\frac{1}{2}$ . e sc. stampe 1000. sono uguali a sc. 1523. di giulj x. l' uno, e sc. 98. hanno bolog. 10000. quanti sc. ne averanno per lir. 7? Si opera, che si averanno bolog. 108. in circa, meno la provvisione a  $\frac{7}{100}$ . per 100.

7  $\frac{1}{2}$  — 1 | 100 — 74  $\frac{1}{2}$  | 1000 — 1523 | 98 — 1 0000 | lire 7? — bol. 108.

### Ragguaglio di Roma con Genova per via di Fiorenza.

18. D. Fiorenza per Roma da sc. d'oro 100. per sc. 74. delle stampe, e per Genova pezza 3. di lir. 6. per soldi 105. ordinandosi di Roma in Fiorenza di trarre a loro, e rimettere a Genova, come resterà in Roma la disposizione da Fiorenza per Genova? Aggio 1523.

R. Perche Roma da sc. 1. di giulj x. per Genova, però si cominci la regola dall' Aggio: Sc. 1523. di giulj x. l' uno, sono uguali a sc. stampe 1000. e sc. stampe 74. sono uguali a sc. d'oro 100. di Fiorenza, e sc. d'oro 1. vale lire 7  $\frac{1}{2}$ . e lire 6. sono uguali a sol. 105. a quanti di questi sarà uguale sc. 1. di Roma di giulj x? Operasi al solito, e troverassi essere uguale a sol. 116  $\frac{1}{2}$ . in circa. Sicchè resterà la disposizione in Roma a sol. 116  $\frac{1}{2}$ . meno  $\frac{7}{100}$ . per 100. di provvisione dovuti alli corrispondenti di Fiorenza.

1523 — 1000 | 74 — 100 | 1 — 7  $\frac{1}{2}$  | 6 — 105 | Sc. 1. sol. 116  $\frac{1}{2}$ . in circa

Rag-

## Ragguaglio di Fiorenza con Madrid per via di Roma.

19. D. Roma per Fiorenza da sc. stam. 74  $\frac{1}{4}$ . per scudi d'oro e per Madrid sc. stam. 1. per Maravidis 676. ordinandosi di Fiorenza in Roma di trarre à loro, e rimettere in Madrid; così resterà in Fiorenza la disposizione da Roma per Madrid.

R. Si dice: Se sc. d'oro 100. sono uguali à sc. stam. 74  $\frac{1}{4}$ . Sc. stam. è uguale à Maravidis 676. à quanti sarà uguale sc. d'oro Fiorenza? sarà uguale à Maravidis 502. in circa, sicchè per scudo d'oro Fiorenza haverà credito Maravidis 502. met provisione di  $\frac{2}{3}$ . per 100. per gl'Amici di Roma.

Sc. 100 — 74  $\frac{1}{4}$  | 1 — 676 | Scudo 1? Maravidis 502.

## Ragguaglio di Fiorenza con Fiera per via di Genova.

20. D. Genova per Fiorenza da sol. 105  $\frac{3}{4}$ . per pezza di lir. 6. Fiera da sc. 123. di sol. 152. per sc. 100. marche. Ordina di Fiorenza in Genova di trarre à loro, e rimettere in Fiera; come resterà in Fiorenza la disposizione da Genova per Fiera.

R. Perchè si vuol sapere quanti sc. d'oro saranno uguali à sc. che 100. si comincerà dicendo: Sc. marche 100. sono uguali sc. 123. di Genova, sc. 1. vale sol. 152. e sol. 105  $\frac{3}{4}$  sono uguali à lir. 6. di Fiorenza, e lir. 7  $\frac{1}{2}$ . vale lo sc. d'oro quanti di sc. s'averanno con sc. marche 100? le due centinara s'annullano, fa la riduzione de' rotti con uguagliare le parti destre, e fin con la moltiplicazione de' denominatori diversi. Si moltiplicano li numeri sinistri, e destri, e fatto il partire risultano sc. 141. 99. centesimi che moltiplicati per 2. danno sol. 19. nari 8. Sicchè resterà la disposizione à sc. d'oro 141. sol. 19. 100 = 123 | 1 - 152 | 105  $\frac{3}{4}$  - 6 | 7  $\frac{1}{2}$  - 1 | Sc. 100? sc. d'oro 141.

## Ragguaglio di Fiorenza con Livorno per via di Venezia.

21. D. Venezia per Fiorenza da Ducati 100. di Banco per d'oro 72  $\frac{1}{4}$ . e per Livorno da Duc. 100. per Pezze 95  $\frac{1}{4}$ . ordinandosi di Fiorenza in Venezia di trarre à loro, e rimettere in Livorno, come resterà la disposizione in Fiorenza da Venezia.

Cccc 2

R.

R. Si dice: Rizzo 95  $\frac{1}{4}$  uguali a sc. d'oro 72  $\frac{1}{2}$ . uno sc. d'oro uguale a sol. 150. a quanti soldi farà uguale una Pezza? e si troverà uguale a sol. 114  $\frac{1}{2}$ . e tanti ne vuole tal disposizione oltre la Provvisione di  $\frac{1}{2}$ . per 100. dovuta a quei di Venezia.

### Ragguaglio di Fiorenza con Lione per via di Venezia.

22. D. Venezia per Fiorenza dà Duc. 100. per sc. d'oro 72  $\frac{1}{2}$ . e per Lione Duc. 84  $\frac{1}{2}$ . per sc. del sole 100. ordinandosi di Fiorenza in Venezia di trarre a loro, e rimettere in Lione, come resterà in Fiorenza la disposizione da Venezia per Lione?

R. Per regola del Trè si dice: Se Duc. 100. sono equivalenti a scudi d'oro 72  $\frac{1}{2}$ . a quanti di questi saranno equivalenti Duc. 84  $\frac{1}{2}$ ? fatta la moltiplicazione, e partizione, risulteranno sc. d'oro 61.9.6. e più Provvisione di  $\frac{1}{2}$ . per 100. a gl'Amici di Venezia per sc. 100. del sole.

### Delle Commissioni de' Cambj.

La Commissione è un'ordine, che da un Cambista ad un suo corrispondente d'altra Piazza mercantile di rimettere, e trarre da altra Piazza a suo conto.

Chi dà l'ordine della Commissione chiamasi committente.

Chi riceve l'ordine ed eseguisce la Commissione dicesi Commissionario.

Le Commissioni sono di due forti; per bisogno forzoso, quando di necessità del committente devesi rimettere denaro in una Piazza, con la quale non ha corrispondenza per mezzo d'altra Piazza ciò eseguisce, o per arbitrio, cioè allettato dalla speranza di guadagno. Ed in questa sorte di commissioni si limita il prezzo del cambio, il tempo, e la quantità del denaro.

Il limitare il prezzo di rimessa, e tratta succede in quattro modi per ordinario.

Il primo modo è, quando il committente limita il prezzo della moneta del Commissionario tanto di rimessa, come di tratta, ed è prezzo variabile.

Il secondo modo è, quando il committente limita il prezzo della moneta delle Piazze, nelle quali il Commissionario deve rimettere, e trarre, ed è prezzo variabile, siccome quello del Commissionario è stabile, e fermo.

Il terzo modo, è limitare il prezzo della rimessa, e tratta al Commissionario.

... missionario in modo, che un prezzo variabile di rimessa, o  
... ta fa del Commissionario, e l'altro prezzo variabile fa della  
za, dove si eseguisce la rimessa, o tratta.

Per raggugliare questa sorte di Commissione si opera per regola  
del Trè roverscia, come s' insegnerà a suo luogo.

Il quarto modo è, quando il committente limita il prezzo della  
rimessa solamente, e della tratta di moneta di quel luogo, do  
Commissionario deve rimettere, o trarre.

Il tempo si limita con ordinare, che la commissione si eseguisca  
il termine di 15. più, o meno giorni.

La quantità si limita, assegnando una determinata quantità di  
naro da rimetterli, o trarli.

### Prima Commissione di primo modo.

1. D. Di Fiorenza ordinano in Roma, che potendo rimettere  
oro a scudi stampe 74  $\frac{1}{2}$ , e provvedersi di Venezia a sc. stampe  
o con ragguglio, cioè che si possa eseguire con prezzi differ  
ti senza danno, si faccia per Duc. di Bancordi Venezia 250  
trovano lettere per Fiorenza a sc. stampe 74  $\frac{1}{2}$ . Si vuol sapere  
quanto si potrà trarre in Venezia, accio la Commissione si  
eseguire secondo l'ordine dato.

R. Si faccia il ragguglio per regola del Trè dritta dicendo: se 7  
prezzo di rimessa ricerca 53.  $\frac{1}{4}$ . prezzo di tratta, che ricerca  
74  $\frac{1}{2}$ . prezzo di rimessa trovato in Roma 2 e verrà 53. 19. 10  
circa prezzo di tratta, e con questo si potrà eseguire la com  
missione; e con maggior prezzo farà più utile per il Committente.  
Per conoscere se li prezzi venuti da raggugli sono utili, si di  
quattro avvertenze.

Prima. Se il prezzo venuto dal ragguglio è di rimessa, ed è  
moneta del Commissionario, quanto sarà minore il prezzo tra  
to in Piazza del prezzo del ragguglio, tanto sarà più utile  
il Committente.

Seconda. Se il prezzo venuto da ragguglio è di rimessa, ma  
è della moneta del Commissionario, quanto sarà maggiore  
prezzo trovato in Piazza del prezzo del ragguglio, tanto  
più utile per il Committente.

Terza. Se il prezzo venuto dal ragguglio sarà di tratta, e sarà  
la moneta del Commissionario, quanto sarà maggiore il pre  
trovato in Piazza dal Commissionario del prezzo del raggua  
tanto sarà più utile per il Committente.

Quarta. Se il prezzo venuto dal ragguglio sarà di tratta, ma  
fa

larà della moneta del Commissionario, quanto sarà minore il prezzo trovato in Piazza del prezzo venuto dal ragguglio tanto sarà più utile per il Committente.

Ora per tornare alla proposta Commissione; Se in Roma si trovasse à trarre per Venezia à più di sc. stampe 53. 19. 10. sarebbe maggiore utile per il Committente, secondo l'avvertenza terza. Ma trovando à meno, non si deve effugiare per essere di danno al Committente.

Acciò s'intenda questo utile, e danno si conosca che cosa ricerca il Committente nel suo ordine; e certa vuole, che il Commissionario di Roma dandogli debito di scudi stampe 74  $\frac{2}{3}$ . li faccia avere sc. d'oro 100. di lir. 7  $\frac{2}{3}$ . l'uno di rimessa; e vuole, che per Duc. 100. di Banco di debito in Venezia, li sia dato credito di sc. stampe 53  $\frac{1}{4}$ . Ora il Commissionario per sc. d'oro 100. di rimessa dando debito al Committente di sc. stam. 74  $\frac{2}{3}$ . più di quello che ha ordinato, deve beneficiarlo nella tratta, dandogli credito per Duc. 100. di Banco di tratta sc. stampe 53. 19. 10. e non meno, secondo, che viene dal ragguglio.

Rimessa	Tratta	Rimessa	Tratta
74 $\frac{2}{3}$	53 $\frac{1}{4}$	74 $\frac{2}{3}$	53. 19. 10.

Essendosi trovato, che si deve trarre per Venezia à sc. stampe 53. 19. 10. quando si rimette à sc. stam. 74  $\frac{2}{3}$ . se ne faccia prova con eleguirsi la Commissione per parte del Committente a' prezzi dati, e per parte del Commissionario a' prezzi trovati, che se sarà la medesima quantità di rimessa di denaro starà bene.

E prima per parte del Committente: Se per Duc. 100. di Banco di tratta si hanno scudi stampe 53  $\frac{1}{4}$ . quanti per Duc. di Banco 2500? e verranno sc. stampe 1343. sol. 15. da' quali si sottrano sc. stam. 5. 7. 6. di Provisione à  $\frac{1}{4}$ . per 100. restano sc. stampe 1338. 7. 6. Onde di nuovo. Se scudi 74  $\frac{2}{3}$ . danno di rimessa scudi d'oro 100. quanti ne daranno sc. stampe 1338. 7. 6? e ne daranno sc. d'oro 1796. 9. 6.

Ora per parte del Commissionario: Se Duc. 100. di Banco danno sc. stam. 53. 19. 10. Duc. di Banco 2500. quanti ne daranno? e vengono sc. stam. 1349. 15. 10. dalli quali sottratti sc. 5. soldi 8. di provisione à  $\frac{1}{4}$ . per 100. restano 1344. 7. 10. Di nuovo: Se 74  $\frac{2}{3}$ . danno sc. d'oro 100. di rimessa, quanti ne daranno sc. 1344. 7. 10? e ne daranno sc. d'oro 1796. 10. 2.

Voleva il Committente di rimessa sc. d'oro 1796. 9. 6. e tanti ne à ricevuti con i prezzi del Commissionario, anzi ha ricevuto den. 9. di più. Sicchè la commissione è seguita giustamente.

Per esercizio alli Scrolari, in cambio di due regole del Trò, si può operare

operaro per regola moltiplicar l'esecuzione della Commissione; Per esempio per parte del Committente, dicendo Ducati di Banco 100. sono uguali a sc. Stam.  $53\frac{1}{2}$ . e sc. Stam.  $74\frac{1}{2}$ . sono uguali a sc. d'oro 100. a quanti di questi saranno uguali Duc. di Banco 2500. di Venezia? e verranno sc. d'oro 1803. 13. 10. dalli quali levata la provisione di  $\frac{1}{2}$ . per 100. cioè sc. 7. 4. 4. restano di rimessa sc. d'oro 1798. sol. 9. 6. come per l'altro modo. E così si possono eseguire tutte.

Per rendersi pratica delle quattro avvertenze, si osservino queste Commissioni.

A. D. Di Venezia si ordina in Roma di trarre in Fiera a sc. Stampe 106  $\frac{1}{2}$ . e rimettere a loro a sc. Stam.  $53\frac{1}{2}$ . trovati a trarre a scudi Stam. 106.  $\frac{1}{2}$ . ed a rimettere a sc. Stam.  $53\frac{1}{2}$ . Si domanda se la Commissione si potrà eseguire?

R. Si fa il Raguaglio, per regola del Trè, ponendo in primo luogo sc. Stam. 106  $\frac{1}{2}$ . di tratta, in secondo sc. Stampe  $53\frac{1}{2}$ . di rimessa ordinati; Ora in terzo luogo ponendo sc. Stam. 106  $\frac{1}{2}$ . di tratta, corrispondenti al primo; si opera moltiplicando, e partendo, e si averanno di rimessa sc.  $53\frac{1}{2}$ .

Per conoscere se detta rimessa è utile al Committente s'offervi, che la rimessa è della moneta del Commissionario, e d. è maggiore la venuta dal raguaglio, che la trovata in Piazza; dunque per la prima avvertenza è utile al Committente; dunque si può eseguire. La rimessa di sc.  $53\frac{1}{2}$ . ridotta  $\frac{1}{2}$ . in centesimi vengono 83.  $\frac{1}{2}$ . meno di 88. venuti dal raguaglio.

Tratta 106  $\frac{1}{2}$ . — Rimessa  $53\frac{1}{2}$ . — Tratta 106  $\frac{1}{2}$ . Rimessa 53. 88.

Essendosi conosciuto per il raguaglio di rimessa, che la commissione si può eseguire, si conosca ancora per il raguaglio di tratta. Benchè, quando è utile per un raguaglio, è utile al committente anche per l'altro. Per regola del Trè si dica: Se sc. Stampe  $53\frac{1}{2}$ . di rimessa vogliono sc. Stampe 106  $\frac{1}{2}$ . di tratta, prezzi ordinati, quanti ne vorranno di tratta sc. Stampe  $53\frac{1}{2}$ . di rimessa trovati in Piazza? ed operato, verranno sc. Stampe 106  $\frac{1}{2}$ . di tratta di moneta del Commissionario, che per essere minore quella del raguaglio, della tratta di sc. 106  $\frac{1}{2}$ . (di  $\frac{1}{2}$ . importano centesimi 88  $\frac{1}{2}$ ) trovata in Piazza per la terza avvertenza sarà utile al committente, e si potrà eseguire.

Rimessa  $53\frac{1}{2}$ . — Tratta 106.  $\frac{1}{2}$ . — Rimessa  $53\frac{1}{2}$ . Tratta 106. 56

B. D. Di Venezia si ordina in Roma di trarre in Fiera a sc. Stampe 106  $\frac{1}{2}$ . e rimettere a loro a sc. Stampe  $53\frac{1}{2}$ . trovati a trarre a sc. Stampe 106  $\frac{1}{2}$ . ed a rimettere a sc. Stampe  $53\frac{1}{2}$ . Si domanda se si potrà eseguire. l'ordine.

R. Si

R. Si fa il ragguglio dicendo: Sc. stampe 106  $\frac{1}{2}$  di tratta vogliono sc. stampe 53  $\frac{1}{4}$  di rimessa, quanti ne vorranno di rimessa sc. stampe 105  $\frac{1}{2}$  di tratta? e ne vorranno sc. stampe 53  $\frac{1}{4}$  di rimessa numero minore di sc. stampe 53  $\frac{1}{4}$  trovato in Piazza, dunque per la prima avvertenza è dannoso al Committente, e non si può eseguire.

Tratta 106  $\frac{1}{2}$  — Rimessa 53  $\frac{1}{4}$  Tratta 105  $\frac{1}{2}$ ? Rimessa 53  $\frac{1}{4}$   
 Si fa il secondo ragguglio per trovare la tratta dicendo: Sc. stampe 53  $\frac{1}{4}$  di rimessa vogliono sc. stampe 106  $\frac{1}{2}$  di tratta, quanti ne vorranno di tratta sc. stampe 53  $\frac{1}{4}$ ? e ne vorranno sc. stampe 105. 90: di tratta num. maggiore di sc. stampe 105.  $\frac{1}{2}$  trovata in Piazza. Dunque per la terza avvertenza è dannoso al Committente, e però la commissione non si può eseguire.

Rim. 53  $\frac{1}{4}$  — Trat. 106  $\frac{1}{2}$  — Rim. 53  $\frac{1}{4}$ ? Trat. 105  $\frac{1}{2}$   
 Per le medesime avvertenze si conosceranno, se le commissioni saranno eseguibili per i prezzi di rimessa, e di tratta con la moneta, che non sia del commissionario.

### Delle Provisioni ne' Raggugli delle Commissioni

Il Commissionario deve avere  $\frac{1}{2}$ . per 100. di Provisione per il trarre, e rimettere il danaro, che fa, dal committente, ma per lo più questo ordina al Commissionario, che tragga, e rimetta in modo, che la sua provisione di  $\frac{1}{2}$  sia compresa ne' prezzi, che trova, e però vuole, che la commissione si eseguisca netta di spese. Onde se la prima commissione detta di sopra si fosse dovuta eseguire per detti Duc. 2500. netti di spese alla tratta trovata di sc. stampe 43. 19. 10. dovevasi aggiungere sol. 4. e denari 4. di provisione a  $\frac{1}{2}$  per 100. e veniva la tratta a sc. stampe 54. 4. 2. Onde eseguendosi per parte del committente, saria stata la rimessa di sc. d'oro 1803. 13. 9. non ammettendo il suo conto provisione, perchè si dice per la tratta: Se per Duc. 100. si hanno scudi stampe 53  $\frac{1}{4}$ . quanti se ne averanno per Duc. 2500? e verranno sc. stampe 1343  $\frac{1}{4}$ . Di nuovo per la rimessa: Se sc. stampe 74  $\frac{1}{2}$ . danno sc. d'oro 100. sc. stampe 1343  $\frac{1}{4}$ . quanti sc. d'oro daranno? e daranno di detti sc. d'oro 1803. 13. 9. di rimessa. Si veda ora per parte del Commissionario, se tornano i medesimi fondi di rimessa, dicendo: Se Duc. 100. di tratta sono sc. stampe 54. 4. 2. quanti saranno Ducati 2500? e saranno sc. stampe 1355. 4. 2. da quali si levano  $\frac{1}{2}$  di provisione per 100. che sono sc. 5. 8. 5. e restano sc. stampe 1349. 15. 9. che si rimettono in Firenze a scudi stampe 74  $\frac{1}{2}$ . per sc. d'oro 100. e daranno di rimessa scudi 12. 7. d'oro

d'oro 1303. 14. 6. e così tal commissione sarà eseguita  
spese.

Per sapere adesso se li  $\frac{2}{3}$  per 100. si devono aggiungere  
prezzo di rimessa, o di tratta.

Per le commissioni nelle quali sono limitati dal commit-  
ti di rimessa, e tratta, si osservino questi due docu-  
menti sono di primo, secondo, e terzo modo.

### Documenti per la provvisione di $\frac{2}{3}$ .

Primo. Se il prezzo trovato per il ragguglio è moneta  
commissionario, ed è di rimessa, li  $\frac{2}{3}$  si sottrano; se è di  
giungono.

Secondo. Se il prezzo trovato per il ragguglio non è  
Commissionario, ed è di rimessa li  $\frac{2}{3}$  si aggiungono;  
ta, si sottrano.

### Commissione di primo modo.

A. D. Di Venezia ordinano in Fiorenza di trarre in Fie-  
142  $\frac{2}{3}$ . e rimettere a loro a sc. d'oro 72  $\frac{2}{3}$ . Si faccia per  
netti di spesa. Si trova da trarre in Fiera a sc. d'oro  
rimettere a se. d'oro 72  $\frac{2}{3}$ . Si domanda se si può esegui-

R. Per trovare sc. d'oro 142  $\frac{2}{3}$ . di Tratta, si dice: Se  
rimessa vuole 142  $\frac{2}{3}$ . tratta. 72  $\frac{2}{3}$ . rimessa trovata in  
tratta vorrà? Vorrà sc. d'oro 142. sol. 2. tratta, la  
per il Committente, secondo la terza avvertenza di  
per eseguire la commissione netta di spesa, si aggiun-  
sione di sol. 11. den. 4. a ragione di  $\frac{2}{3}$ . per 100. per  
to primo, e si avrà la tratta di 142. 13. 4. ovvero  
ta in piazza.

Rimess. 72  $\frac{2}{3}$ . Trat. 142.  $\frac{2}{3}$ . Rim. 72.  $\frac{2}{3}$ ? Trat. 142. 2  
11. 4

Per trovare la rimessa di 72  $\frac{2}{3}$ . si dice: Se la tratta 142.  
la rimessa di 72  $\frac{2}{3}$ . la tratta di 142.  $\frac{2}{3}$ . che rimessa vo-  
rà rimessa di 73. 1. 9. che per la prima avvertenza fa  
il Committente: ma per eseguire la commissione net-  
si leva la provvisione di 5. 10. a ragione di  $\frac{2}{3}$ . per 100.  
la rimessa di 72. sol. 16. ovvero di 72  $\frac{2}{3}$ . trovata in p-  
chè si potrà eseguire la commissione per l'appanto.

D d d d



Tratta 142  $\frac{1}{2}$ . Rimessa 72  $\frac{1}{2}$ . Br. 148  $\frac{1}{2}$ . Rim. 72. 1. 3

Sottra 5. 9 Prov. 10.

100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100.

Rimessa 72. 16.

Qui avvertisco, che in cambio di operare con sol. e den. si può operare con centesimi per più facilità, e brevità, benchè non tanto esattamente, ed in fine dell' operazione si ritornano li centesimi in sol. e den. con partirli per 5.

Per prova, la commissione s'apov. per parte del Committente dicendo: Se sc. mar. 100. sono in Fiorenza sc. d'oro 142  $\frac{1}{2}$ . quanti faranno sc. mar. 360. di tratta? e faranno sc. d'oro 796. 60. centesimi. Ora perchè per parte del Committente non si conta provisione, di nuovo si dice: Se sc. d'oro 72  $\frac{1}{2}$ . sono Duc. 100. in Venezia, quanti faranno sc. d'oro 796. 60? e faranno Duc. 1093. 10. centesimi, li quali si partono per 4. e vengono grossi 2  $\frac{1}{2}$ . e tanti in circa sono 10. centesimi di Ducato; Perchè grossi 24. sono poco meno di  $\frac{1}{4}$ . di 100. e Duc. 1093. grossi 2  $\frac{1}{2}$ . vuole il Committente di Venezia. I medesimi si faranno avuti per una sola regola del Trè, dicendo: Se 72  $\frac{1}{2}$ . fussero 142.  $\frac{1}{2}$ . cioè  $\frac{1}{2}$ . quanti 560? e questa si hà per regola moltiplice, per la quale viene annullato 100. dalla parte destra, e sinistra.

Sc. mar. 100. — 142  $\frac{1}{2}$  | 72  $\frac{1}{2}$  — 100. Duc. | Se. mar. 360? Duc. 1093. 10.

Commissione eseguita per parte  
del Commissionario.

Se sc. mar. 100. sono in Fiorenza sc. d'oro 142  $\frac{1}{2}$ . quanti di questi faranno sc. mar. 560. di tratta? e faranno sc. d'oro 798. 72  $\frac{1}{2}$ . di quali il Commissionario leva sc. d'oro 3. 72  $\frac{1}{2}$ . di provisione. e per 100. restano sc. d'oro 795. 74. che di nuovo si dice: Se fondi d'oro 72  $\frac{1}{2}$ . danno di rimessa Duc. 100. quanti ne daranno 795. 74? ne daranno Duc. 1093. 10. cioè grossi 1  $\frac{1}{2}$ . del poco di meno non se ne parla.

Il Commissionario eseguita la commissione, ne fa avvisato il Committente mandandoci in lettera la seguente Nota.

Nota da darsi nella Lettera per la passata  
Commissione.

In esecuzione di vostra commissione vi allegiamo di Tratta in Firenze sc. mar. 360. cambiati a 142  $\frac{1}{2}$ . valgono sc. d'oro 798. 93. e vi rimettiamo a uso Duc. 1093. 10. da N. lettera N. 80.

Delli

Delli primi fetece la dovuta nota per dinci à tempo, à cui i  
zare la tratta, e degl'altri procuratene promessa, e paga  
à tempo, saldandone il conto, il quale con nostra provi  
di  $\frac{7}{8}$ . e cambio à 72  $\frac{1}{2}$ . troverete pareggiare.

### Commissione di primo modo.

D. Di Venezia ordinano in Fiorenza di marre à loro à sc  
72  $\frac{1}{2}$ . e rimettere in Fiera à sc. d'oro 142  $\frac{1}{2}$ . si trova à trar  
d'oro 72  $\frac{1}{2}$ . e rimettere à sc. d'oro 142  $\frac{1}{2}$ . Si domanda se si  
degnire, dovendosi fare per sc. mar. 560. netti di spese?

R. Questa è la commissione passata, rivolta al contrario.  
dunque 72  $\frac{1}{2}$  tratta? e verrà 142. 81. rimessa, dalla quale  
trano 56. centesimi di provisione. Per il primo documento  
no 142. 25. che è la rimessa trovata in piazza, sicchè si può  
re. Medesimamente per trovare la tratta si dice: Se 142  $\frac{1}{2}$ .  
sa vuole di tratta 72  $\frac{1}{2}$ . la rimessa di 142  $\frac{1}{2}$ . che vorrà? vo  
58. ed aggiunti 29. cente simi di provisione per il medesi  
eumentato, fanno 72 87. che sono quasi  $\frac{7}{8}$ . Dunque si può esi  
Per parte del Committente: Se sc. mar. 100. sono sc. d'oro  
sc. mar. 560. saranno sc. d'oro 798. 93  $\frac{1}{2}$ . Di nuovo se sc.  
72  $\frac{1}{2}$ . Ducati 100. sc. d'oro 798. 93  $\frac{1}{2}$  2. saranno Duc. 109  
cioè grossi 11. in circa di tratta, che vuole il Committo  
Venezia.

Per parte del Commissionario: Se sc. mar. 100. sono sc. d'oro  
sc. mar. 560. saranno sc. d'oro 796. 60. à i quali aggiunti  
di provisione, per fare maggior tratta, fanno 799. 78. Ora se  
sono Duc. 100. sc. d'oro 799. 78. saranno Duc. 1097. 46  
grossi 11. di tratta, che voleva il Committente per la rim  
sc. mar. 560. sicchè è eseguita giustamente.

### Nota da darsi nella Lettera, per detta

#### Commissione.

In esecuzione della vostra commissione si sono rimessi in Fiera  
di mar. 560. à vostra disposizione, cambiati à 142  $\frac{1}{2}$ . va  
sc. d'oro 796. fol. 15.

E per contro vi sono tratti à nro Duc. 1097. grossi 11. in N  
cambiati con N. delli primi, fatece nota per dirci à tempo  
indirizzargli, e degl' altri promessa, e pagamento, salda  
il conto, quale con nostra provisione di  $\frac{7}{8}$ . e cambio à 72  
verete pareggiare. Questa nota si dà à ciascuna commissione

D d d 2

sc

serva per indrizzo nell'altre per non ripetere le medesime cose.

### Commissione di primo modo.

6. D. Di Livorno ordinano in Fiorenza di trarre a loro a soldi 114. per pezza da otto reati di rimettere in Venezia a sc. d'oro  $71\frac{1}{2}$ . o con ragguglio si faccia per pezze 850. nette di spesa, si trova a trarre a soli 113  $\frac{1}{2}$ . Si domanda a quanto si potrà rimettere in Venezia per rifare il danno della tratta?

R. Si fa il ragguglio dicendo .Sol. 114. di tratta, vogliono  $71\frac{1}{2}$ . di rimessa, sol. 113  $\frac{1}{2}$ . di tratta, che rimessa vorranno? Vorranno 71. 54. da' quali si sottra la provisione 28. resterà la rimessa a 71. 26. che ricercava. Si provi.

Per parte del Committente. Pezze 850. a sol. 114. per pezza, fanno sol. 96800. che partiti per sol. 150. sono sc. d'oro 646. Ora se per  $71\frac{1}{2}$ . si rimettono Duc. 100. per 646. quanti Duc. si rimetteranno in Venezia? e faranno Duc. 900. grossi 8.

Per parte del Commissionario. Pezze 850. a sol. 113  $\frac{1}{2}$ . per pezza sono sol. 96616  $\frac{1}{2}$ . che partiti per 150. vengono sc. d'oro 644. 11. da' quali si sottra 2. 57. provisione di  $\frac{1}{2}$ . per 100. dovuta al Commissionario, restano 642. 54. de quali si fa rimessa a 71. 26. per Duc. 100. e verranno Duc. 900. 28. centesimi, che partiti per 4. sono grossi 7. sicchè mancherebbe un grosso a pareggiare la rimessa ordinata dal Committente, che per sì poca cosa non se ne parla.

### Commissione di primo modo.

7. D. Uno di Venezia è creditore in Fiorenza di sc. 480. di lir. 7. ordina, che se li devano rimettere a sc. d'oro  $71\frac{1}{2}$ . ovvero in Fiera a sc. d'oro 141  $\frac{1}{2}$ . per dove torna meglio, cioè trovando a rimettere in tutte due le Piazze con utili delli prezzi, che limita, deve il Commissionario rimettere in quella, dove l'utile sarà maggiore, e trovando a rimettere con danno, dove sarà minore, si trovano lettere per Venezia a sc. d'oro  $71\frac{1}{2}$ . e per Fiera a sc. d'oro 142  $\frac{1}{2}$ . Si domanda in qual Piazza doverà rimettere?

R. Per tutte due le Piazze si trova ad eseguire la commissione con danno. Per sapere qual rimessa delle due sarà meno dannosa, si opera per regola del Tre dritta, dicendo; Se  $71\frac{1}{2}$ . di rimessa vogliono l'altra di sc. 141  $\frac{1}{2}$ . prezzi limitati, che vorranno  $71\frac{1}{2}$ ? e vorranno 142. 37. sicchè si deve rimettere in Fiera, perchè rimettendo in Venezia a sc.  $71\frac{1}{2}$ . per andare del pari si doveria disporre per Fiera a scudi 142. 37. e si trovano lettere a scudi 142. 25. che è

che è meno. Dunque per far la rimessa è meno dannosa, rispetto a i prezzi limitati. In altro modo si conosce quale rimessa sia meno dannosa, dicendo: Se la rimessa di  $71 \frac{2}{3}$ , cresce a  $71 \frac{2}{3}$ , che crescerà 100 e crescerà fino a 100. 84. centesimi: Di nuovo: Se l'altra rimessa di  $141 \frac{2}{3}$ , cresce fino a  $141 \frac{2}{3}$ , che crescerà 100 e crescerà fino a 100. 26. che è meno dell'altra. Dunque questa rimessa è meno dannosa.

La commissione si eseguisse con ridurre sc. 480. di lir. 7. in sc. d'oro 448. di lir.  $7 \frac{2}{3}$ , partendo 480. per 15. e sottraendo 32. quoziente; dipoi: Se sc. d'oro  $142 \frac{2}{3}$ , danno di rimessa sc. marche 100. sc. d'oro 448. quanti scu. marche daranno di rimessa? e verranno sc. mar. 314. 18. 9. e tanti n'averà di credito in Fiera quello di Venezia per li sc. 480. di Fiorenza la rimessa.

### Commissione di primo modo.

8. D. Di Fiorenza viene ordinato in Napoli di rimettere in Roma, a Duc.  $141 \frac{2}{3}$ , e di provedersi da loro a Duc.  $161 \frac{2}{3}$  si trovano lettere per Roma a  $142 \frac{2}{3}$ , e denari per Fiorenza a  $162 \frac{2}{3}$ , si vuol sapere, se a detti prezzi la commissione si può eseguire?

R. Si trovi la tratta dicendo: Ducati  $141 \frac{2}{3}$ , di rimessa, vogliono Ducati  $161 \frac{2}{3}$ , di tratta, Ducati  $142 \frac{2}{3}$ , di rimessa, quanti Ducati di tratta vorranno dall'operazione risulteranno Ducati 162. grana 16. Onde per la terza avvertenza sarà utile per il Committente, stante che in piazza la tratta si trova a più, cioè a Ducati  $162 \frac{2}{3}$ , o si dica a Duc. 162. grana 20. e si potrà eseguire quella somma, che fusse assegnata per non parlarsi, che si eseguisca netta di provisione.

### Commissione di primo modo.

9. D. Di Venezia viene ordinato in Fiorenza, che potendo rimettere a loro a scudi d'oro 72  $\frac{2}{3}$ , con provedersi dalla Fiera a scudi d'oro 144  $\frac{2}{3}$ , o con ragguglio, si faccia per fondi marche 1600. Si trovano lettere per Venezia a scudi d'oro 72, e denari a scudi 143  $\frac{2}{3}$ , per Fiera: Si domanda se la Commissione è eseguibile?

R. Si trovi la tratta per le rimesse dicendo: 72  $\frac{2}{3}$ , vuole di tratta 144  $\frac{2}{3}$ , che vorrà 72 e vorrà scu. d'oro 143. 33. di tratta; per il che non è eseguibile per la terza avvertenza, stante che la tratta di moneta del Commissionario trovata per ragguglio è maggiore della tratta 143  $\frac{2}{3}$ , trovata in Piazza tornando in danno del Committente.

## Commissione di primo modo.

10. D. Di Vepetia viene ordinata in Firenze di comprare Taffetà a lir. 3. sol. 14. il braccio, e provedersi da loro a sc. d'oro 71  $\frac{1}{2}$ . si faccia per Duc. 250. di Banco. Si domanda valendo il braccio del Taffetà lir. 3. sol. 15. etrovandosi denaro per Venezia a scudi d'oro 72  $\frac{1}{2}$ . se si potrà eseguire?

R. Questa commissione si riduce a quelle di primo modo, per dare Firenze prezzo variabile di tratta, e di compra, si dice: Se lir. 3. sol. 14. vogliono di tratta sc. d'oro 71  $\frac{1}{2}$ . quanti ne vorranno lir. 3. sol. 15. vorranno sc. d'oro 72. 14. 4. e perchè si trova la tratta a sc. d'oro 72  $\frac{1}{2}$ . cioè soldi 15. in piazza, che è più; dunque per la terza avvertenza si può eseguire.

Per parte del Committente per regola moltiplice si dice: Duc. 100. di Banco uguali sono a scudi d'oro 71  $\frac{1}{2}$ . scudo d'oro 1. uguale a lire 7  $\frac{1}{2}$ . lir. 3. 14. danno libbra 1. Ducati 250. di Banco quante libbre di Taffetà daranno? daranno libbre 363. once 7. di Taffetà.

100 — 71  $\frac{1}{2}$  | 1 — 7  $\frac{1}{2}$  | 3. 14 — lib. 1 | 250? lib. 363. once 7.  
Per parte del Commissionario per Duc. 100. si hanno scudi d'oro 72  $\frac{1}{2}$ . sc. d'oro 1. vale lir. 7  $\frac{1}{2}$ . per lir. 3  $\frac{1}{2}$ . lib. 1. per Ducati 250 quante libbre di Taffetà si averanno? s'averanno lib. 363. onc. 9. e tante ne rimetterà al Committente, il quale sarà tenuto della provizione al Commissionario.

100 — 72  $\frac{1}{2}$  | 1 — 7  $\frac{1}{2}$  | 3  $\frac{1}{2}$  — lib. 1 | 250? lib. 363. onc. 9.

## Delle Commissioni di secondo modo.

Quando il Committente limita i prezzi variabili della moneta, dove il Commissionario deve trarre, e rimettere le commissioni sono di secondo modo, dando il Commissionario prezzo stabile.

I raggugli si fanno per regola del Trè dritta, ponendo in primo, e secondo luogo i prezzi limitati, e nel terzo il prezzo trovato in piazza corrispondente al primo di rimessa, o tratta. Per conoscere se le commissioni sono eseguibili, servono le quattro avvertenze date; siccome se v'è aggiunta la provizione di  $\frac{1}{2}$ . per 100. è levata dal prezzo del ragguglio, per eseguirle nette di spesa, servono le quattro documenti dati.

## Commissione di secondo modo.

**a. Di Roma viene ordinato in Firenze**, che potendo loro sc. stamp. 74  $\frac{1}{2}$ . è spedita in Napoli a Dpc. il ragguaglio si faccia per sc. stamp. 560. netto di spesa. S. denari per Roma a sc. stamp. 75  $\frac{1}{2}$ . e lettere per Napoli 162  $\frac{1}{2}$ . Si domanda se si potrà eleguire?

**R.** Si fa il Ragguaglio dicendo: 74  $\frac{1}{2}$  di tratta danno 10 rimessa, quanti ne vorranno 75  $\frac{1}{2}$ . di tratta trovata in vorranno Duc. 161. 69. di rimessa quali per essere mandati 162  $\frac{1}{2}$  trovati in piazza, per la seconda avvertenza mente è eleggibile, ma perchè il Committente ordina, guisca netta di spese; per il documento secondo s'aggi di provisione per 100. cioè 640 grana, ne fanno Duc. 16 passa al prezzo trovato in piazza di Duc. 162. 25. ma per se di poco, non ci si guarderebbe.

Medesimamente volendo fare il ragguaglio per la tratta, Duc. 160  $\frac{1}{2}$ . di rimessa vogliono di tratta 74  $\frac{1}{2}$ . quanti rando 162  $\frac{1}{2}$ . di rimessa 2 ne vorranno 75. 54. di tratta solamente è utile per il committente, ma levati 30. e per li  $\frac{1}{2}$  per 100. di provisione, per conseguire la provisi di spese restano 75. 24. mancherebbono a contesione, ma guarda se per li si eseguisca.

Per parte del Committente. Se sc. stamp. 74  $\frac{1}{2}$ . sono sc. d' stamp. 560. quanti saranno? saranno sc. d'oro 748. 6 vo, se sc. d'oro 100. danno di rimessa Duc. 160  $\frac{1}{2}$ . quanno sc. d'oro 748. 66? e ne daranno Duc. 1202. gratiati ne vuole il Committente di Roma di rimessa in Na sc. stamp. 560. di tratta.

Per parte del Commissionario, Se 75  $\frac{1}{2}$ . sono sc. d'oro 1 Stampe 560? vengono sc. d'oro 744. 18. dai quali si sottr d'oro 27. 99. di provisione per il Commissionario, resta d'oro 741. 28. li quali si rimettono con dir. Sc. d'oro no di rimessa Duc. 162  $\frac{1}{2}$ . quanti ne daranno 741. 28? ranno Duc. 1202. 74. di rimessa in Napoli. Il Commi voleva non sapete che ci è lo scario di grana 12. che in rimessa non se ne parla.

## Commissione di secondo modo.

**a. Di D. Anversa si dipano in Firenze**, che potendo tra a grossi 1331. si rimettere in Milano a sc. stamp. 124. o guaglio si faccia per lire d'Anversa 466  $\frac{1}{2}$ . netto di spe

vano denari à grossi 134  $\frac{1}{2}$ . e lettere per Milano sol. 125  $\frac{1}{2}$ . Si domanda se è eseguibile?

R. Si dica per regola del Tre: Se 133  $\frac{1}{2}$ . di tratta vogliono 124. di rimessa, quanti ne vorranno 134  $\frac{1}{2}$ . di tratta? ne vorranno 125. 08. alli quali aggiunti 50. di provisione, fanno 125. 58. ma in Piazza si trova à 125  $\frac{1}{2}$ . ò sia 60. che è più, dunque è eseguibile con qualche poco di vantaggio, per la seconda avvertenza; si faccia l'altro ragguglio per trovare la tratta, dicendo: Se 124. di rimessa, vogliono di tratta 133  $\frac{1}{2}$ . quanti 125  $\frac{1}{2}$  di rimessa? operato, vengono 135. 05. da' quali si sottrano 54. centesimi di provisione, per il documento secondo, restano 134. 51. ed in piazza si hanno 134. 50. che è meno; dunque per l'avvertenza quarta è utile per il Committente l'eseguirsi la commissione.

Si eseguisce per prova: e prima per parte del Committente.

Per grossi 133  $\frac{1}{2}$ . si ha sc. d'oro 1. per lire 466  $\frac{1}{2}$ . d'Anversa, quanti sc. d'oro si averanno? dall'operazione risulteranno sc. d'oro 840. Di nuovo: Per sc. d'oro 1. si hanno sol. Imp. 124. per sc. d'oro 840. quanti se ne averanno? e si averanno sol. Imp. 104160.

Si eseguisce per parte del Commissionario. Per grossi 134  $\frac{1}{2}$ . si ha sc. d'oro 1. per lire 466  $\frac{1}{2}$ . d'Anversa quanti e verranno sc. d'oro 832. 71. da' quali sottratti sc. d'oro 3. 32. restano da rimetterli sc. d'oro 829. 39. à sol. 125  $\frac{1}{2}$ . per sc. d'oro; verranno sol. Imp. 104170. che sono sol. 10. più di rimessa in utile del Committente.

### Commissione di secondo modo.

13. D. Di Roma si ordina in Fiera, che si tragga à loro à sc. stampe 108  $\frac{1}{2}$ . e si rimetta in Fiorenza à sc. d'oro 144  $\frac{1}{2}$ . ò con ragguglio si faccia per sc. d'oro 1083. netti di spesa. Si trova à trarre à sc. stam. 108  $\frac{1}{2}$ . ed à rimettere à sc. d'oro 144  $\frac{1}{2}$ . Si domanda se li potrà eseguire?

R. Si trovi la rimessa dicendo 108  $\frac{1}{2}$ . di tratta vogliono 144  $\frac{1}{2}$ . di rimessa, 108  $\frac{1}{2}$ . di tratta, quanti ne vorranno di rimessa? e ne vorranno 144. 17. aggiunti 58. centesimi di provisione per il secondo documento, faranno 144. 75. trovati in Piazza; onde si può eseguire appunto; ma trovando la tratta con dire: 144  $\frac{1}{2}$ . di rimessa vogliono 108  $\frac{1}{2}$ . di tratta, che 144  $\frac{1}{2}$ ? sarà di 108. 76. centesimi, da' quali sottratti 43. restano 108  $\frac{1}{2}$ . trovati in piazza: Sicchè la commissione è da eseguirsi.

Per parte del Committente: Se sc. d'oro 144  $\frac{1}{2}$ . sono uguali à scudi mar. 106. sc. d'oro 1083. à quanti saranno uguali? e verranno sc. marchi 150. Di nuovo: se scudi mar. 106. sono uguali à scudi stampe

stampe 108  $\frac{1}{2}$ . à quanti saranno uguali 750? saranno  
stam. 813  $\frac{1}{2}$ . e tanti vuole il Committente. gli siano  
rimessa in Fiorenza di sc. d'oro 1083.

Per parte del Commissionario : se sc. d'oro 144  $\frac{1}{2}$ . dai  
che 100. sc. d'oro 1083? ne daranno sc. mar. 748. 1  
aggiunti sc. 2.99. di provisione dovuti al Commissio  
re maggior tratta al Committente fanno sc. marche  
se scudi marche 100. dà di tratta sc. stampe 108  $\frac{1}{2}$ . q  
rà 751. 17? Operato , ne darà sc. stampe 813  $\frac{1}{2}$ . di t  
quanti se voleva il Committente .

Ma eseguendosi tal Commissione con le spese, il Comm  
Fiera averà credito in sc. stampe 817. per li scudi d'  
messi in Fiorenza : Perchè il Committente alli scu. r  
ginnge sc. marche 3. di provisione per eseguirli, ed  
di marche 100. s' uguagliano à scudi stampe 108  $\frac{1}{2}$ .  
753. si uguaglieranno à sc. stam. 817. e tanti verann  
do la commissione per parte del Commissionario , d  
di d'oro 144. 17  $\frac{1}{2}$ . uguali à sc. mar. 100. sc. d'oro 1  
scudi marche uguali ? e verranno scudi 751. 17. ed :  
di marche 3. di provisione per fare maggiore tratta  
tente , fanno sc. mar. 754. 17. onde se per sc. marche  
gono sc. stampe 108  $\frac{1}{2}$  per sc. marche 754. 17. si tra  
stampe 817. &c.

14. D. Di Milano ordinano in Fiorenza di trarre à lor  
per. 124. e rimettere in Bologna à bologn. 106. ò co  
netti di spese : si trova à trarre à soldi Imp. 125  $\frac{1}{2}$ . S  
quanto si doverà rimettere in Bologna ? Si eseguisce  
sione per scudi Imperiali 480.

R. Se soldi 124. di tratta , vogliono bolog. 106. di rim  
di questi ne vorranno sol. 125  $\frac{1}{2}$ . di tratta ? e verran  
razione bolognini 107. 14. a i quali aggiunti 43. cent  
visione à  $\frac{1}{2}$ . per 100. fanno bologn. 107. 57. e a tan  
messia per eseguire la commissione netta di spese .

Si eseguisce per parte del Committente , moltiplicando  
soldi Imperiali 117. fanno sol. Imperiali 56160. Ora  
riali 124. danno scudo d'oro 1. quanti ne daranno sol.  
56160? ne daranno sc. d'oro 452. 90. centesimi , li q  
plicano per lir. 7  $\frac{1}{2}$ . e vengono lir. 3396. 75. centesim  
re 7. equivagliano à bolognini 106. à quanti equiv  
3396. 75? equivarranno à bolog. 51436  $\frac{1}{2}$ . cioè à sc.  
36  $\frac{1}{2}$ . e tanti vuole di rimessa il Committente .

Si eseguisce per parte del Commissionario dicendo : S

E e e



185  $\frac{1}{2}$  danno sc. d'oro 1. quanti ne daranno sol. Imp. 56160? ne daranno sc. d'oro 448. 08. de' quali sottratti sc. 1. 78. di provisione per il Commissionario, restano sc. d'oro 446. 30. che moltiplicati per lire 7  $\frac{1}{2}$ , fanno lire 3347  $\frac{1}{2}$ . Onde le lire 7. danno di rimessa bolog. 107. 57. lir. 3347  $\frac{1}{2}$ . daranno di rimessa scu. 514. bolognini 37. che sono quelli, che voleva il Committente; Sicchè la commissione è eseguita giustamente, e resta provata.

La medesima commissione si propone da eseguirsi per il denaro di rimessa in Bologna, e doverà venire la tratta di sc. Imp. 480. il che si fa per esercizio de' principianti nelle Scuole.

15. D. Di Milano ordinano in Fiorenza di trarre à loro à sol. Imperiali 124. e rimettere à Bologna à bolog. 106. ò con ragguaglio: Si trova à trarre à sol. Imp. 125  $\frac{1}{2}$ . ed à rimettere à bolog. 107. 57. Si domanda se si può eseguire senza danno, e si faccia per sc. 514. Bolognini 37?

R. Nella passata si è visto potersi eseguire à punto, resta, che si eseguisca dal Committente, e dal Commissionario per vedere se per parte dell'uno, e dell'altro, tornano scudi Imperiali 480.

Per il Committente: Se bolog. 106. sono uguali à  $\frac{2}{3}$   $\frac{1}{2}$ . di sc. d'oro, à quanti sc. d'oro faranno uguali bolog. 51437? e faranno uguali à scudi d'oro 452. 90  $\frac{1}{2}$ . Di nuovo: Se scudo d'oro 1. mi dà di tratta sol. Imp. 124. quanti ne darà di tratta sc. d'oro 452. 90  $\frac{1}{2}$ ? e ne darà sol. Imp. 56160. 02. che partiti per 117. toraano sc. Imp. 480. quanti si volevano.

Per il Commissionario: Se Bolognini 107. 57. di rimessa, vogliono  $\frac{2}{3}$   $\frac{1}{2}$ . di scudo d'oro, quanti ne vorranno bolog. 51437? ne vorranno sc. d'oro 446. 30. alli quali aggiunti scudi d'oro 1. 80. di provisione, fanno scudi d'oro 448. 09. che moltiplicati per soldi Imperiali 125  $\frac{1}{2}$ . fanno sol. Imp. 56160. che partiti per sol. Imp. 117. vengono scudi Imper. 480. di tratta, da farli come voleva il Committente.

16. D. Di Roma ordinano in Fiorenza di rimettere à loro à sc. delle Stampe 74  $\frac{1}{2}$ . e di trarre in Ancona à sc. 114. ò con ragguaglio netti di spese; Si trova à rimettere à sc. delle Stam. 75. Si domanda à quanto si trarrà in Ancona, eseguendosi secondo l'ordine per sc. 2640. d' Ancona di giulj 10. l'uno, di quanti scudi stampe farà la rimessa?

R. Si trovi la tratta per Ancona dicendo sc. delle Stampe 74  $\frac{1}{2}$ . di rimessa richiedono sc. 114. di tratta. Ora se. delle Stam. 75. quanti scudi di tratta richiederanno? e vorranno sc. 114. bajo cchi 19. da quali si sottrano bajoc. 45. provisione à  $\frac{1}{2}$ . per 10. restano scudi 113. 74. e à tanti si trarrà in Ancona per sc. d'oro 100. di Fiorenza. Si provi.

Per il

Per il Committente si eseguisse dicendo : Sc. 114. d' Ancona equivagliano à scu. d'oro 100. à quanti di questi equivarranno scudi 2640. d' Ancona ? equivarranno à sc. d' oro 2315. soldi 15. denari 9. Adesso se con scudi d'oro 100. si fa rimessa in Roma di scudi delle stampe 74  $\frac{1}{2}$ . con scudi d'oro 2315. 15. 9. di quanti scudi delle stampe si farà rimessa ? e si farà di scudi stampa 1733. 18. 9. e tanti ne vuole il Committente secondo il suo conto.

Per il Commissionario si dice : Scudi 113. 74. d' Ancona equivagliano à sc. d'oro 100. sc. 2640. d' Ancona à quanti d'oro equivarranno ? ed equivarranno à sc. d'oro 2321. 1. 8. da' quali si sottrano sc. 9. 5. 8. di provisione dovuta al Commissionario, à ragione di  $\frac{1}{2}$ . per 100. restano sc. d' oro 2311. soldi 16. de quali si faccia rimessa con dire ; Scudi d'oro 100. danno di rimessa scudi delle stampe 75. ovvero 4. danno 3. in medesima proporzione, quanti scudi delle stampe daranno sc. d'oro 2311. 16 ? e daranno sc. delle stampe 1733. 17. di rimessa che per correrai solo soldo 1. denari 9. non se ne parla di tal differenza.

### Delle Commissioni di terzo modo.

Le commissioni di terzo modo sono, quando il Committente ordina al Commissionario di rimettere, e trarre talmente, che un prezzo sia della moneta del Commissionario, e l'altro prezzo sia della moneta del Committente, o della piazza, dove si deve far tratta, o rimessa. Questi prezzi sono variabili ; onde il Commissionario viene à cambiare con un prezzo stabile, e con l'altro variabile.

Nell'aggiustare queste commissioni, le regole del Trè de' raggugli si operano à roverscio ; cioè si fa partitore il prezzo, che si trova dal Commissionario in piazza, o sia di rimessa, o di tratta, che si porrà in primo luogo ; in secondo, e terzo i prezzi limitati dal Committente, osservando, che nel secondo si ponga il differente, onde se il primo è di rimessa, nel secondo si pone di tratta, &c.

Per conoscere se le commissioni sono eseguibili, servono le quattro avvertenze date, siccome se v'è levata, o aggiunta la Provisions di  $\frac{1}{2}$ . per 100. al prezzo di rimessa, o di tratta del ragguglio servono li due documenti dati.

17. D. Di Livorno viene ordinato in Fiorenza, che potendo rimettere loro à sol. 113  $\frac{1}{2}$ . con provedersi di Roma à sc. Stam. 74  $\frac{1}{2}$ . o con ragguglio, netti di spesa, si esaguisca per peaze da 8. reali

E e e e a

1000.

1000. si trova à rimetter à soldi 114. ed à trarre à sc. stam.  $74 \frac{1}{2}$ .  
 Si domanda se si può eseguire?  
 R. Si trovi la tratta, dicendo: Se sol.  $113 \frac{1}{2}$ . rimessa vogliono sc. stam.  $74 \frac{1}{2}$ . tratta prezzi dati, che tratta vorranno sol. 114. trovati in piazza? Per regola del Trè roverscia, si moltiplicano soldi  $113 \frac{1}{2}$ . per  $74 \frac{1}{2}$ . il prodotto si parte per 114. e si averanno scudi di stam. 74. 77. di tratta, dalli quali si sottrano sol. 5. den. 11. di provisione per il secondo documento, che dice; se il prezzo trovato per ragguaglio non è di moneta del Commissionario, ed è di tratta li  $\frac{1}{2}$ . per 100. di provisione si sottrano, e restano scudi di stam. 74. sol. 1. 8. che per uguagliarsi à sc. stam.  $74 \frac{1}{2}$ . prezzo trovato in piazza, si può per l'appunto eseguire.  
 Si trovi il prezzo della rimessa per l'altro ragguaglio, dicendo; Se  $74 \frac{1}{2}$  di tratta, vogliono di rimessa sol.  $113 \frac{1}{2}$ . quanti ne vorranno di rimessa se  $74 \frac{1}{2}$  di tratta trovati in piazza? Operandosi per regola del Trè roverscia si averanno sol. 114. 45. centes. da quali levati 45. centesimi per la provisione di  $\frac{1}{2}$  per 100. per il primo documento, restano sol. 114. trovati in piazza; sicchè per l'appunto si può eseguire. Si prova.

Si eseguisce per parte del Committente, dicendo: Pezza da otto 1. vale sol.  $113 \frac{1}{2}$ . Sol. 150. sono uguali à sc. d'oro 1. pezza da otto 1000. à quanti sc. d'oro saranno uguali? e verranno sc. d'oro 757. 15. 6.  $\frac{1}{2}$ . Per trovare la tratta sc. d'oro 100. danno di tratta sc. stam.  $74 \frac{1}{2}$ . sc. d'oro 757. 15. 6.  $\frac{1}{2}$ . quanti sc. stam. di tratta daranno? e daranno scudi stampe 565. 6. o  $7 \frac{1}{2}$ . di tratta per pezze 1000. di rimessa.

Si eseguisce per parte del Commissionario. Si moltiplicano sol. 114. per pezze 1000. li sol. 114000. si partono per 150. e vengono sc. d'oro 760. a i quali si aggiungono sc. d'oro 3. den. 9. di provisione, per fare maggior tratta, e fanno sc. d'oro 763. 0. 9. onde se sc. d'oro 100. danno di tratta sc. stam.  $74 \frac{1}{2}$ . quanti ne daranno sc. d'oro 763. 0. 9? e verranno sc. stam. 565. sol. 5. den. 8. che per non essere più di sc. stam. 565. sol. 6. si è eseguita giustamente, secondo l'ordine del Committente.

Si supponga ora, che si deva eseguire per sc. stam. 565. sol. 6. eseguendo la commissione per parte del Committente, verranno come sopra di rimessa pezze 1000. si veda se tante vengono per parte del Commissionario, dicendo: Se per sc. stam.  $74 \frac{1}{2}$ . di tratta, si hanno sc. d'oro 100. quanti se ne averanno per sc. stampe 565. 6? e si averanno sc. d'oro 763. 1. 2. da quali si sottrano scudi di d'oro 3. 1. 2. provisione à  $\frac{1}{2}$ . per 100. restano sc. d'oro 760. li quali fatti soldi con moltiplicarli per 150. sono 114000. che

rimessi

- Duc. 1716 ? e daranno sc. stam. 797. 4. 3. da i quali si sottrano sc. stam. 3. 3. 9. provisione di  $\frac{3}{4}$ . per 100. restano sc. stam. 794. —. 6. li quali rimessi in Fiera a sc. stam. 107. 52. per sc. mar. 100. si averanno di rimessa in Fiera sc. mar. 738. 9. 9. che sono den. 7. più in favore del Committente; sicchè resta provata essere la rimessa a sc. stampe 107. 52.
- no. D. In Roma viene ordinato di Napoli, che si tragga in Fiera a sc. stam. 108  $\frac{3}{4}$ . e si rimetta a loro a Duc. 214  $\frac{5}{8}$ . d' contragguglio netta di spesa, si trova a rimettere a Duc. 215  $\frac{3}{8}$ . Si domanda a quanto si trarrà in Fiera eseguendosi la commissione per scudi marche 738  $\frac{3}{4}$ ?
- R. Questa commissione è l'antecedente rivoltata ordinandosi la rimessa, dove si ordinava la tratta, e da eseguirsi con sc. marche di Fiera. Si faccia l'istessa regola del Frè roverscia, e si averanno i medesimi sc. stam. 107. 95. li quali per essere di tratte, e moneta del Commissionario, vanno accresciuti di 43. centesimi di provisione, e verrà la tratta a sc. stam. 108. 38. si eseguisce.
- Per parte del Committente dicendo sc. mar. 100. sono sc. stam. 108  $\frac{3}{4}$ . quanti di questi saranno sc. mar. 738  $\frac{3}{4}$ ? e saranno come nella passata sc. stam. 800. che rimessi a Duc. 214  $\frac{5}{8}$ . per 100. torneranno in Napoli Duc. 1716. come sopra.
- Per parte del Commissionario si dica: Sc. mar. 100. sono sc. stam. 108. 38. che saranno sc. mar. 738  $\frac{3}{4}$ ? e saranno sc. stam. 800. 38. da' quali si sottrano sc. 3. 20. di provisione a  $\frac{3}{4}$ . per 100. restano sc. stam. 797. 18. che rimessi in Napoli a Duc. 215  $\frac{3}{8}$ . per sc. stam. 100. vengono Duc. 1715. grana 92. poco più; sicchè mancano grana 8. in circa; mà in sì gran rimessa non ci si guarderebbe.

### Delle Commissioni di quarto modo.

- Le commissioni di quarto modo sono, quando dal Committente viene limitato solo il prezzo della rimessa, d' tratta della moneta della piazza, dove il Commissionario ha da rimettere, e da trarre; come se il Committente medesimo vi cambiasse.
- Per le commissioni di questa sorte si danno due documenti.
- Primo. Se il prezzo trovato per ragguglio è moneta del luogo del Committente, ed è di rimessa, li  $\frac{3}{4}$ . di provisione per cento si aggiungono, e di tratta si sottrano dal prezzo trovato.
- Secondo. Se il prezzo trovato per ragguglio non è moneta del luogo del Committente, ed è di rimessa, li  $\frac{3}{4}$ . si sottrano, e di tratta si aggiungono al prezzo trovato.
- no. D. Di Firenze ordinano in Roma, che si tragga a loro, e si rimet-

rimetta à Venezia in modo , che la rimessa gli stia con  
da loro à sc. d'oro  $72 \frac{1}{2}$  netti di spese , si faccia per Du  
Di Bancò di Venezia . Trovasi da trarre à sc. stam.  $74 \frac{2}{3}$   
mettere à sc. stam.  $53 \frac{2}{3}$ . Si domanda se si può eseguir  
danno .

R. Per regola del Trè : Se sc. stam.  $74 \frac{2}{3}$ . uguali à sc. d'or  
quanti saranno uguali sc. stam.  $53 \frac{2}{3}$ . per i quali si hann  
100. di Banco di Venezia ? e saranno uguali à sc. d'oro  
a i quali si aggiungono  $7 \frac{2}{3}$ . di provisione à  $\frac{2}{3}$ : per 10  
fere di rimessa dal Committente in Venezia , e fanno l  
 $72 \frac{1}{2}$ . e si poteva arrivare fino à  $72 \frac{6}{8}$ . cioè  $\frac{1}{2}$ . d  
può eseguir con qualche vantaggio .

Si eseguisce per parte del Committente dicendo per Duc  
hanno sc. d'oro  $72 \frac{1}{2}$ . per Duc. 600. quanti sc. d'oro si  
no ? e si averanno sc. d'oro  $435 \frac{1}{2}$ . da trarsi à Fiorenza i  
messa di Duc. 600.

Per parte del Commissionario . Se Ducati di Banco 100. d  
stam.  $53 \frac{2}{3}$ . che daranno Duc. di Banco 600? e darann  
stam. 322. a i quali si aggiungono sc. 1. 29. provisione p  
tratta maggiore à Fiorenza , e fanno sc. 323. 29. onde  
Se sc. stam.  $74 \frac{2}{3}$ . danno di tratta sc. d'oro 100. che daran  
stam. 323. 29 e daranno sc. d'oro 435. sol. 8. den. 1  
teva fare la tratta di sc. d'oro 435. sol. 12. dunque ci è q  
vantaggio per il Committente di Fiorenza .

22. D. Di Fiorenza ordinano in Roma si tragga à loro , e  
ta à Venezia in modo , che la rimessa li stia come fatta d  
sc. d'oro  $72 \frac{1}{2}$ . netti di spese , si faccia per sc. d'oro 435.  
Trovasi à trarre à sc. stam.  $74 \frac{2}{3}$ . ed a rimettere à sc. stam  
domanda , se si può eseguir , e di quanti Duc. sarà la ri  
Venezia ?

R. Questa è la medesima commissione passata ; varia solo  
verli eseguir con moneta del Committente, per lo che  
guaglio è l'istesso , e si può eseguir ; Per trovare la rim  
eseguisca per parte del Commissionario, dicendo: Se sc. d'o  
sono tratti per sc. stampe  $74 \frac{2}{3}$ . per quanti saranno tratti  
 $435 \frac{1}{2}$  e verranno tratti per sc. stam. 323. 43. da i quali si  
no sc. stam. 1. 29. di provisione per doverli far rimessa ,  
no sc. stam. 322. 14. Ora se sc. stam.  $53 \frac{2}{3}$ . danno Duc. 100.  
eb. di rimessa , che daranno sc. stam. 322. 14? e daranno D  
grosi 6. Ecco , che con avere ancora levata la provisione  
taggiosa per il Committente di grosi 6. che hà più di cre  
Venezia .

23. D. Di Fiorenza ordinano in Roma di trarre in Venezia, e rimettere à loro in modo, che la tratta per Fiorenza da Venezia, sia à sc. d'oro  $73 \frac{2}{3}$ . netti di spese, si faccia per Duc. 600. di Banco. Si trova à trarre à sc. stam.  $54 \frac{1}{3}$ . ed à rimettere à sc. stampe  $74 \frac{1}{3}$ . Si domanda, se si potrà eseguire, e di quanti scudi d'oro fara la rimessa?

R. Questa commissione è diversa dalle passate, per dovere rimettersi al Committente, e si fa il ragguaglio per trovare il dato prezzo di tratta con dire: Se sc. stam.  $74 \frac{1}{3}$ . danno sc. d'oro 100. quanti scudi stam.  $54 \frac{1}{3}$ ? e verranno sc. d'oro 73. 80. da' quali si sottrano 29. centesimi di provisione per essere moneta del Committente e prezzo di tratta per il primo documentp. restano sc. d'oro 73. 51. che per essere 1. centesimo di più del prezzo assegnato di sc. d'oro  $73 \frac{2}{3}$ . si potrà eseguire con un poco di vantagio.

Per parte del Committente si dica: Se Duc. 100. danno sc. d'oro  $73 \frac{2}{3}$ . Duc. 600? e si averanno sc. d'oro 441. di rimessa.

Per parte del Commissionario: Se Duc. di Banco 100. sono uguali à sc. stampe  $54 \frac{1}{3}$ . Duc. 600. di Banco à quanti delle stampe saranno uguali? e risultano scudi stampe 328. 80. da' quali si sottrano sc. 1. 31. di provisione per farne meno rimessa al Committente, e restano scudi stampe 327. 49. onde si dica: Se scudi stampe  $74 \frac{1}{3}$ . danno di rimessa scudi d'oro 100. quanti di questi ne daranno scudi stampe 327. 49? e verranno dall'operazione scudi d'oro 441. &c. quanti voleva di rimessa il Committente.

24. D. Di Fiorenza ordinano in Roma di trarre in Venezia, e rimettere à loro in modo, che la tratta di Venezia per Fiorenza sia à sc. d'oro  $73 \frac{2}{3}$ . netti di spese, si faccia per sc. d'oro 441. si trova à trarre à sc. stam.  $54 \frac{1}{3}$ . ed à rimettere à sc. stam.  $74 \frac{1}{3}$ . Si domanda se si può eseguire &c.

R. Questa è la passata commissione, eccetto, che si deve eseguire con moneta del Committente, che però serve il medesimo ragguaglio, e si può eseguire; Onde dal Committente eseguita vengono i medesimi Ducati di Banco 600. di tratta, e sc. d'oro 441. di rimessa, e per parte del Commissionario: Se sc. d'oro 100. danno sc. stam.  $74 \frac{1}{3}$ . sc. d'oro 441? danno sc. stampe 327. 44. a i quali aggiunti 1. 31. di provisione sono sc. stam. 328. 75. per il che; Se per sc. stampe  $54 \frac{1}{3}$ . si traggono in Venezia Duc. 100. per sc. stam. 328. 75. quanti Ducati di Banco si trarranno? Si trarranno Duc. di Banco 599. grossi 22. in circa; Sicchè sarebbe eseguita con utile di grossi 2. Avendo questi meno di debito il Committente in Venezia.

25. D. Di Roma ordinano in Fiorenza di trarre a loro, e rimettere a Venezia in modo, che la rimessa li stia come fatta da loro a sc. flam. 54  $\frac{1}{2}$ . netti di spese; Si faccia per sc. 1250. di giulj 10. Aggio 1523. trovasi a trarre a sc. flam. 74  $\frac{1}{2}$ . ed a rimettere a sc. d'oro 72  $\frac{1}{2}$ . Si domanda, se si potrà eseguire?

R. Per trovare la rimessa di se. stampe 54  $\frac{1}{2}$ . che vogliono quelli di Roma, si dice: Sc. d'oro 100. uguali a sc. 74  $\frac{1}{2}$ . scudi d'oro 72  $\frac{1}{2}$ . prezzi che si trovano, a quanti scudi stampe faranno uguali? dall' operazione risultano scudi 53. 89. a i quali s'aggiungono  $1\frac{1}{2}\frac{1}{2}$ . di provisione, per essere moneta di rimessa del Committente, e vengono sc. flam 54. 10. che per essere meno del prezzo limitato si può eseguire.

Eseguita dal Committente, Per regola del Trè, se sc. 1523. Aggio sono se. flam. 1000. quanti di questi faranno sc. 1250? e faranno sc. flam. 820. 74. Ora se sc. flam. 54  $\frac{1}{2}$ . sono uguali a Ducati di Banco 100. sc. flam. 820. 74. a quanti faranno uguali? dall' operazione faranno Duc. 1516. Grossi 18. rimessi in Venezia.

Eseguita dal Commissionario. Se sc. flam. 74  $\frac{1}{2}$ . danno sc. d'oro 100. sc. flam. 820. 74? daranno sc. d'oro 1104. 13. dalli quali il Commissionario leva sc. 4. 42. sua provisione a  $\frac{1}{2}$ . per 100. per rimettere meno, restano sc. d'oro 1099. 71. Onde se sc. d'oro 72  $\frac{1}{2}$ . tornano Duc. di Banco 100. in Venezia, che torneranno scudi d'oro 1099. 71? torneranno Duc. di Banco 1516. grossi 20. sicchè il Committente averebbe grossi 2. più di credito in Venezia. Dunque la commissione si poteva eseguire con quei prezzi, come resta provato, ed il Committente per tratta di sc. 1250. di Giulj 10. ha di rimessa Duc. di Banco 1516. grossi 20.

26. D. Di Roma ordinano in Fiorenza di trarre a Venezia, e rimettere a loro, in modo, che la tratta gli stia a sc. flam. 53  $\frac{1}{2}$ . come fatta da loro netti di spesa. Si faccia per Ducati di Banco 1516.  $\frac{1}{2}$ . Trovasi a trarre a sc. d'oro 72  $\frac{1}{2}$ . e a rimettere a sc. flam. 74  $\frac{1}{2}$ . Si domanda se si può eseguire. Aggio 1523.

R. Il medesimo ragguaglio della passata da sc. flam. 53. 89. da i quali si levano  $1\frac{1}{2}\frac{1}{2}$ . di provisione, per essere prezzo di tratta del Committente, e restano sc. flam. 53. 68. e perchè restano qualche poco più del prezzo limitato di sc. flam. 53  $\frac{1}{2}$ . ci sarà qualche poco d'avvantaggio, come si prova eseguendola per parte del Committente, dicendo: Duc. di Banco 100. sono uguali a sc. stampe 53  $\frac{1}{2}$ . Duc. 1516  $\frac{1}{2}$ . a quanti sc. stampe faranno uguali? risultano sc. flam. 814. 03  $\frac{1}{2}$ . Ora se sc. flam. 1000. sono scudi di giulj 10. 1523. quanti faranno sc. flam. 814. 03  $\frac{1}{2}$ ? e verranno scudi di giulj 1239. 77. di rimessa. Ora per parte del Commissionario.

FFF

Per

Per Duc. 100. si hanno sc. d'oro  $72 \frac{1}{2}$ . per Duc. 1516  $\frac{1}{2}$ . quanti? Sc. d'oro 1099. 70. dalli quali levati sc. 4. 39. di provisione, restano sc. d'oro 1095. 31. Di nuovo per regola del Trè: Se per sc. d'oro 100: si hanno sc. stam.  $74 \frac{1}{2}$ . quanti per sc. d'oro 1095. 31? si averanno sc. stam. 814. 18. finalmente, se sc. stam. 1000. danno di giulj x sc. 1523. quanti sc. stam. 814. 18? ed operando daranno sc. 1240. di giulj x. poco meno di rimessa, che per essere più di quegli, che voleva il Committente, si eseguisce con vantaggio.

17. D. Di Roma ordinano in Livorno di trarre à loro, e rimettere in Fiorenza in modo, che la rimessa gli sia come fatta da loro à sc. stam.  $74 \frac{1}{2}$ . netti di spesa; si faccia per sc. d'oro 840. si trova à trarre à sc. 85  $\frac{1}{2}$ . di giulj dieci; ed à rimettere à sol. 114. Aggio 1523. Si domanda se si può eseguire.

R. Per trovare il prezzo limitato di sc. stam.  $74 \frac{1}{2}$ . Si faccia il ragguaglio per regola moltiplice, dicendo: Sc. d'oro 1. uguale à soldi 150. soldi 114. uguali à pezza da otto 1. Pezze 100. uguali à Sc. 85  $\frac{1}{2}$ . di giulj x. Sc. 1523. di giulj dieci uguali à Sc. stam. 1000. Ora Sc. d'oro 100. à quanti Scudi stam. saranno uguali? Dall'operazione risulteranno Sc. stam. 74. 19. centesimi, alli quali per essere moneta del Committente, e di rimessa si aggiungono 30. centesimi di provisione, e fanno Sc. stam. 74. 49. centesimi, che per essere un centesimo meno del prezzo limitato si può eseguire con un poco di utile.

1—150 [ 114—1 [ 100—85  $\frac{1}{2}$  | 1523—1000 [ 100? Sc. stam. 74. 19  
30

Sc. Stampe 74. 49

Si trova eseguendo la commissione per parte del Committente, e dicendo, Sc. d'oro 100. vogliono di rimessa Sc. stampe  $74 \frac{1}{2}$ . quanti Sc. stam. vorranno di rimessa Sc. d'oro 840? e ne vorranno Scudi stam. 625. 80. ò siano sol. 16.

Per parte del Commissionario si moltiplicano Sc. d'oro 840. per soldi 150. e fanno sol. 126000. che si partono per sol. 114. e vengono pezze 1109. 26. ed aggiunta la provisione di pezze 4. 42. à  $\frac{1}{2}$ . per 100. per fare maggior tratta, fanno pezze 1109. 68. Ora le pezze 100. sono uguali à Sc. 85  $\frac{1}{2}$ . di giulj dieci, pezze 1109. 68. sono uguali à Sc. 9529. 37.  $\frac{1}{2}$ . che partiti per l' Aggio 1523. risultano Sc. stam. 625.  $\frac{1}{2}$  di tratta da farsi da Livorno, che sono poco meno di Sc. stam. 625. 80. che di rimessa fa Roma per Fiorenza, sicchè torna giusta la commissione.

18. D. Di Roma ordinano in Livorno di trarre à loro, e rimettere in Fiorenza in modo, che la rimessa gli sia come fatta da loro à Sc. stam.



sc. flam.  $74 \frac{2}{3}$ . netti di spesa. Si faccia per sc. d'oro 840. si trova à rimettere à soldi 114. per pezza; Si cerca à quanti scudi di giulj dieci si potrà trarre per pezza 100. Aggio di Roma 1523?

R. Questa è la commissione passata con diversa domanda, che gli servirà di prova. S'intavoli la regola multiplice, come si è insegnato à suo luogo, dicendo: Pezza una uguale à sol. 114. sol. 150. uguali à sc. d'oro 1. sc. d'oro 100. uguali à sc. flam.  $74 \frac{2}{3}$ . scudi flam. 1000. uguali à scudi di giulj dieci 1523. Ora pezza 100. à quanti scudi di giulj dieci saranno uguali? Operando secondo tal regola s'averanno sc. 86. 23. dalli quali si sottrano 34. centesimi di provisione à  $\frac{2}{3}$ . per 100. per essere prezzo di tratta, e moneta del Committente, e restano sc. 85. 89. a tanto per l'appunto si potrà trarre, e se si eseguirà per parte del Commissionario, verranno per l'appunto sc. flam. 625. 80. voluti dal Committente di rimessa in Fiorenza.

1 — 114 | 150 — 1 | 100 —  $74 \frac{2}{3}$  | 1000 — 1523 | 100 — Sc. 86. 23.  
Provisione 34.

Tratta Sc. 85. 89.

Per esercizio à gli Scolari con la medesima commissione si può domandare la rimessa de' soldi in Fiorenza per pezza, ed allora la regola multiplice si ordina come qui si vede, e dall'operazione risulteranno sol. 113. 53. a i quali aggiunti  $\frac{4}{5}$ . di provisione resterà la rimessa da Livorno in Fiorenza à sol. 113. 98. ed eseguendosi verranno sc. 625. 80. di tratta.

Pez. 100 —  $85 \frac{2}{3}$  — 1523 — 1000 |  $74 \frac{2}{3}$  — 100 | 1 — 150 | pezz. 100 — sol. 113. 53  
Provisione 45

di rimessa Soldi 113. 98

29. D. In Biorenza viene ordinato di Lione, che potendo trarre à loro, e rimettere in Fiera à prezzi tali, che per ogni cento scudi marche di credito in Fiera, non se gli faccia tratta, che di sc. 242  $\frac{2}{3}$ . del sole; si eseguisca per scudi marche 500. si trovano denari, per Lione à sc. d'oro 59  $\frac{2}{3}$ . e per Fiera à sc. d'oro 143. Si domanda se si può eseguire.

R. Si fa il ragguaglio, dicendo. Scudi del sole 100. sono uguali à sc. d'oro 59  $\frac{2}{3}$ . à quanti saranno uguali sc. del sole 242  $\frac{2}{3}$ . prezzo limitato? saranno uguali à sc. d'oro 143. 56. ma sottratti 56. provisione à  $\frac{2}{3}$ . per 100. restano scudi 143. appunto, trovati in piazza; dunque si può eseguire.

Per parte del Committente. Se sc. marche 100. ricercano di tratta sc. del sole 242  $\frac{2}{3}$ . sc. marche 500. quanti sc. del sole ricercheranno?

F f f f a

no?

no? dall' operazione verranno sc. del sole 1212.  $\frac{5}{8}$ . e tanti vuole gli siano tratti, per sc. marche 500.

Per parte del Commissionario. Se sc. marche 100. sono uguali à sc. d'oro 143 presso trovato, à quanti faranno uguali sc. marche 500? e faranno uguali à sc. d'oro 715. 2 i quali si aggiungono 2. 86. di provisione, per fare maggior tratta al Committente, fanno sc. d'oro 717. 86. onde si dica: Con sc. d'oro 59  $\frac{5}{8}$ . si traggono sc. del sole 100. quanti si trarranno con scudi d'oro 717. 86? e si trarranno scudi del sole 1212. sol. 12. che sono sol. 21 di più, che quelli del Committente, mà per si poco non si lascia di eseguire la commissione.

30. D. In Fiorenza viene ordinato di Lione, che potendo rimettere à loro; e trarre in Fiera in modo che la tratta li stia come fatta da loro à sc. del sole 242  $\frac{5}{8}$ . netti; si faccia per sc. mar. 500. Si trovano denari per Lione à sc. d'oro 59  $\frac{5}{8}$ . Si domanda à quanto si doverà fare la tratta per Fiera?

R. Trovati per ragguaglio, come nella passata sc. d'oro 143  $\frac{5}{8}$ . ci si aggiunge la provisione per il secondo documento di  $\frac{5}{8}$ . e verrà la tratta à sc. d'oro 144  $\frac{5}{8}$ . in circa, eseguita dal Committente per sc. mar. 500. di tratta averà sc. del sole 1212  $\frac{5}{8}$ . di rimessa.

Per il Commissionario si eseguisce, dicendo: Sc. mar. 100. uguali à sc. d'oro 144. 13. sc. mar. 500. à quanti faranno uguali? e risultano sc. d'oro 720. 65. da quali sottratti 2. 88. di provisione, restano sc. d'oro 717. 77. de' quali facendo rimessa à scudi d'oro 59  $\frac{5}{8}$ . per sc. del sole 100. il Committente di Lione averà scu. del sole 1212. 44. che sono 6. centesimi meno.

Si può eseguire per regola moltiplice, dicendo: Sc. mar. 100. sono uguali à sc. d'oro 144. 13. e sc. d'oro 59. 20. sono uguali à 100. del sole. Ora sc. mar. 500. à quanti del sole faranno uguali, e risulteranno sc. del sole 1217. 31. dalli quali sottratti 4. 86. restano come sopra 1212. 45. di rimessa; il 45. moltiplicato per 2. è partito per 5. dà sol. 9. sicchè è meno soldo 1.

Se la commissione si eseguisse per so. del sole 1212  $\frac{5}{8}$ . alli sc. d'oro 717. 86. si aggiungono 2. 86. di provisione, per fare maggiore tratta, e sc. d'oro 720. 66. si partono per 144. 13. e torneranno sc. marche 500. di tratta.

100 — 144. 13 | 59. 20 — 100 | 500? Sc. del sole 1217. 31

117. 31. 86. Provis.

Scudi del sole 1212. 45

31. D.

31. D. Di Venezia ordinano in Roma, che si tragga a mettere in Fiorenza, purchè per Ducati 100. di Banco abbiano Sc. d'oro  $72 \frac{2}{3}$  di rimessa netti; Si trovano lettere a Scudi stampe  $54 \frac{1}{2}$ . e denari per Fiorenza a Sc.  $74 \frac{1}{2}$ . si vuol sapere, se si eseguirà giustamente; Si fa d'oro 860.

R. Facciafi il ragguaglio dicendo Sc. stampe  $74 \frac{2}{3}$ . d'oro 100. quanti di questi ne daranno Sc. stampe 54 Duc. 100. di Banco? e ne daranno Sc. stampe 72. 54. levano 29. centesimi di Provisiione, e restano Sc. d'oro prezzo limitato. Dunque si eseguirà appunto.

Per il committente Sc. d'oro  $72 \frac{2}{3}$ . vogliono di tratta Banco, quanti ne vorranno Scudi d'oro 860? e risultano 190. Grossi 7.

Per il Commissionario Sc. d'oro 100. danno Sc. stampe 72 d'oro 860. quanti danno Sc. stampe 644. 14. alli quali 2. 57. di provisione per far maggior tratta, fanno Sc. stampe a Sc. stampe  $54 \frac{1}{2}$  per Duc. 100. di Banco, danno grossi 6. di tratta. Sicchè 86.

Avvertasi, che da altri si fanno altri ragguagli per trovare del Commissionario, ma questi sempre si averanno, e ha il prezzo limitato dal Committente, e per esercitare gli Scolari, e Principianti, stimo essere bene rivoltare la medesima commissione rimettendo nella quale si era ordinata la tratta, come si è fatto in questa con la seguente, acciò si veda, come la provisione di ora levata è formata secondo li documenti dati.

32. D. Di Venezia ordinano in Roma, che si rimetta a provedersi di Fiorenza in modo, come se essi traessero d'oro  $72 \frac{2}{3}$ . per Duc. 100. di Banco. Si trovano lettere a Sc. stampe  $54 \frac{1}{2}$ . Si domanda a quanto si potrà trattare per eseguirla giustamente per Sc. d'oro 860. ne

R. Si faccia il ragguaglio, se Sc. d'oro  $72 \frac{2}{3}$ . sono uguali a  $54 \frac{1}{2}$ . per essere gl'uni e gl'altri uguali a Duc. 100. a quanti Sc. stampe faranno uguali Sc. d'oro 100? e Sc. stampe 75. 20. alli quali aggiunti 30. centesimi di provisione per il secondo documento fanno Sc. stampe 75. 50. ed a trovarrè da Roma per Fiorenza.

Ora si faccia l'altro ragguaglio, per trovare il prezzo limitato; Se per Sc. stampe  $75 \frac{1}{2}$ . si trattano Scudi d'oro 100. quattranno per Sc. stampe  $54 \frac{1}{2}$ ? e se ne trattano Sc. d'oro alli quali aggiunti 29. centesimi per il medesimo documento faranno Sc. d'oro 72. 25. prezzo limitato,

598  
 Il Committente per Sc. d'oro 860. di tratta, averà di rimessa Duc. di Banco 1190. grossi 7. come nella passata.  
 Per il Commissionario si dica: Se Sc. d'oro 100. sono tratti con Sc. d'oro Stam. 75. 50. Sc. d'oro 860. con quanti faranno tratti? e vengono dall'operazione Sc. Stam. 649. 30. da' quali si levano 2. 59. di provisione, per fare meno rimessa, restano Sc. Stam. 646. 71. che à sc. Stam. 54  $\frac{1}{2}$ . per Duc. 100. di Banco, danno di rimessa 1190. grossi 7. voluti dal Committente.

*Ragione da darsi nella Lettera che si si rive  
 al Committente.*

In esecuzione di vostra commissione vi assegnamo sc. d'oro 860. di tratta cambiati à Sc. Stam. 75. 50. vagliono di stampe 649. 30. e per conto vi rimettiamo ad uso Duc. 1190. grossi 7. da N. lettera di N. Sc.

Delli primi fatene la debita nota per dirci à tempo à cui indirizzare la tratta in Fiorenza, e degl'altri procuratene promessa, e pagamento à tempo, saldandone il conto, il quale con nostra provisione à  $\frac{1}{2}$ . per 100. e cambio à 54  $\frac{1}{2}$ . troverete pareggiare.

Nell'altre commissioni, si è tralasciata la ragione della lettera per brevità, è perchè non appartiene al computo.

Soggiungo qui due commissioni d'Autore moderno si per essere differenti dalle sopra poste, si per dire il mio parere circa la prima per non parermi bene eseguita per parte del Committente.

33. D. Di Bari ordinano in Roma si tragga à loro, e si rimetta à Napoli à segno la rimessa li stia à 1  $\frac{1}{2}$ . per 100. di danno netti, si faccia per Duc. 2000. in Napoli: E se dicessero potendoci trarre con rimettere à Napoli con 1  $\frac{1}{2}$ . per 100. di danno saria tutt'uno.

Trovasi da trarre à 113  $\frac{1}{2}$ . e da rimettere à 170. Aggio 1523.

Per trovare il prezzo loro di 1  $\frac{1}{2}$ . di danno. Se Duc. 113  $\frac{1}{2}$ . di Bari danno Sc. 100. moneta di Roma, Duc. 100. di Bari quanti ne daranno? Ne daranno Sc. moneta 88. 30. e poi.

Se Sc. 100. d'oro Stam. à 1523. mezzi quattrini l'uno danno in Napoli Duc. 170. Sc. 88. 30. moneta quanti ne daranno? Ne daranno Duc. 98. 56. da quali sottratti 39. grana di provisione à  $\frac{1}{2}$ . per 100. restano Duc. 97. 17.

Ecto che il ragguglio 10. sta, che se li farà avere in Nap. Duc. 98  $\frac{1}{2}$ . che si può dire  $\frac{1}{2}$ . che con 1  $\frac{1}{2}$ . che si contentano avere di danno fa il conto, e così la commissione si può fare.

Qui si avverta, che per essere 1  $\frac{1}{2}$ . un poco più di  $\frac{1}{2}$ . la commissione si eseguirà con qualche poco di vantaggio del Committente.

Per trovare il prezzo nostro di 170. di rimessa. Se Duc. 113.  $\frac{1}{2}$ . di Bari

Bari danno Sc. 100. moneta, Duc.  $101 \frac{1}{2}$ . di Bari pre  
 100. di Napoli quanti ne darà? egli fa arrivare a Sc.  
 quì, con buona grazia dell'Autore, è da avvertire, ch  
 di Napoli sono un poco più di  $101 \frac{1}{2}$ . di Bari; men  
 98  $\frac{1}{2}$ . di Napoli sono Duc. 100. di Bari. Onde bisog  
 una regola del Trè, e dire: Duc. 98  $\frac{1}{2}$ . di Napoli sono  
 di Bari, quanti di questi faranno Duc. 100. di Napoli  
 no Duc.  $101 \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2}$ . Ora con questi: Se Duc.  $113 \frac{1}{2}$ . di  
 ne Sc. 100. moneta; che ne daranno  $101 \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2}$ . di Bari  
 no Sc. 89. 94.

Segue l'Autore: Se Sc. 89. 92. moneta prezzo di Duc. 10  
 dà in Napoli Duc. 100. Sc. 100. d'oro Stam. à 1523. quan  
 Duc. 169. 37. a i quali aggiunti  $7 \frac{1}{2}$ . di provisione f  
 170. 05. che per il poco s'vario non ci si guarderebbe, co  
 servendosi di Sc. 89. 94. moneta da me trovati, s'avev  
 sti Duc. 170. con la provisione.

Per trovare il prezzo nostro di  $113 \frac{1}{2}$ . di tratta.

Se Duc. 170. di Nap. dà Sc. 100. d'oro Stam. à 1523.  
 prezzo di Duc.  $101 \frac{1}{2}$ . di Bari, quanti ne darà? ne  
 89. 58. Di nuovo, se Sc. 89. 58. moneta, prezzo di D  
 Napoli dà in Bari Duc.  $101 \frac{1}{2}$ . Sc. 100. moneta, quant  
 ne darà Duc. 113. 67. da quali levata la provisione di  
 no Duc. 113. 22. e mancano 3. centesimi per servirsi  
 $101 \frac{1}{2}$ . dovendosi servire di Duc.  $101 \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2}$ . ed allora si  
 Duc. 113. 25.

Potevasi trovare la tratta di Duc.  $113 \frac{1}{2}$ . trovata in Pi  
 tuendo il ragguglio per regola moltiplice, dicendo:  
 moneta sono uguali à Sc. 1000. d'oro Stam. e Sc. 100.  
 sono uguali à Duc. 170. di Napoli, e Duc. 98  $\frac{1}{2}$ . di Na  
 uguali con il danno à Duc. 100. di Bari. Si domanda  
 di questi faranno uguali Sc. 100. moneta di Roma? e rif  
 dall'operazione Duc. 113. 70. da i quali sottratte gra  
 provisione, restano Duc. 113. 25. appunto, sicchè si  
 guire.

L'Autore l'eseguisse per la parte del Committente così; i  
 di Napoli sono Duc.  $101 \frac{1}{2}$ . di Bari, che faranno Duc.  
 Napoli? e vengono Duc. 2036. 66. di tratta in Ba  
 tavità, come ho detto di sopra, bisogna pigliare Duc. 10  
 prezzo di Duc. 100. di Napoli, e non  $101 \frac{1}{2}$ . Ovvero dir  
 98  $\frac{1}{2}$ . di Napoli, sono di Bari Duc. 100. quanti di quel  
 no Duc. 2000. di Napoli? e faranno Duc. 2037. 35. d  
 in Bari.

Si eseguisce per parte del Commissionario . Se Duc. 170. sono uguali a Sc. 100. d'oro stampe , à quanti di questi saranno uguali Ducati 2000? e saranno uguali à Sc. 1176. 47. d'oro stampe , che si moltiplicano per 1523. e si hanno Sc. 1791. 76. moneta , a i quali si aggiugono à Sc. 7. 16. provisione , e risultano Sc. 1798. 92. che a Duc. 113  $\frac{2}{3}$ . per 100. fanno Duc. 2037. 27. Dice l' Autore che lo svaro è di grana 61. in danno del Committente ; ma che non ci si guarderà ; niente di meno eseguita per parte del Committente , come hò detto , lo svaro è di grana 8. in beneficio del Committente riguardo al suo ordine .

L' Autore ragguaglia in altro modo la commissione , e la ragguaglia bene ; ci ca l' esecuzione si rimette alla passata , la quale per parte del Committente ; già hò detto non essere bene eseguita .

Il ragguagli si potevano fare per regola moltiplice più speditamente dicendo : Duc. 113. 25. di Bari , sono uguali à Sc. 100. moneta di Roma , e Sc. 1523. mon. sono uguali à Sc. 1000. oro stam. e Scudi 100. oro stam. sono uguali à Duc. 170. di Napoli . Si domanda Duc. 100. di Bari à quanti Duc. di Napoli saranno uguali ? Ed operatori si troveranno uguali à Duc. 98. 36. da' quali sottratte 39. grana di provisione , restano Duc. 98. 17. &c.

L' altro ragguaglio , per trovare Duc. 170. di Napoli , si ordina così : Sc. 1000. d'oro stam. sono uguali à Sc. 1523. moneta , e Scudi 100. mon. sono uguali à Duc. 113. 25. di Bari , e Duc. 100. di Bari sono uguali à Duc. 98  $\frac{2}{3}$ . di Napoli . Domando , Sc. 100 d'oro stampe à quanti Duc. di Napoli saranno uguali ? ed operato , saranno uguali à Duc. 169. 32. quasi , ed aggiunte grana 68. di provisione à  $\frac{2}{3}$ . per 100. fanno li Duc. 170. di Napoli , che si propofero nella commissione .

Per parte del Committente si è eseguita di sopra , e volendo eseguir la per parte del Commissionario , secondo la regola moltiplice si ordina così : Il primo ordine sarà di numeri proporzionali per la provisione di  $\frac{2}{3}$ . per 100. da aggiungere cioè 300. tornano 502. e Duc. 170. di Napoli sono Sc. 1523. mon. e Sc. 100. mon. à Duc. 113  $\frac{2}{3}$ . di Bari : Si domanda Duc. 2000. di Napoli à quanti di Bari saranno uguali ? Dall' operazione risulteranno Duc. 2037. 28. di Bari &c.

34. D. Di Napoli ordinano in Roma si tragga à loro , e si rimetta à Bari di modo che la rimessa gli stia à 1  $\frac{2}{3}$ . per 100. di beneficio netti ; si faccia per Duc. 1500. di Bari , e se dicessero traete à noi , e rimettete à Bari 1  $\frac{2}{3}$ . per 100. di beneficio , sarà tutt' uno ? Trovasi da trarre à 171. e da rimettere à 114  $\frac{2}{3}$ . Si domanda se si può eseguire .

L' Auto-

301

**Per** l'Autore fa il primo ragguaglio, e trova il beneficio tenuto la provi-  
sione di grana 40. restare à Duc. 1. 48. che sono quasi 2. grana  
meno per il rotto. Tuttavia si eseguisce. Chi volesse trovare il  
prezzo di rimessa 1147 trovato in piazza di ragguaglio per rego-  
la moltiplice si fa così, dicendo: Sc. 1523. moneta sono uguali à  
Scudi 1000. d'oro stampe, e Scudi 100. di questi sono uguali à  
Duc. 171. di Napoli, e Duc. 100. di Napoli col beneficio sono  
Duc. 101  $\frac{2}{3}$  in Bari: Domando quanti di questi saranno Sc. 100.  
moneta di Roma, che ha da far la rimessa? e saranno Duc. 113.  
96. a i quali aggiunti grana 45. di provisione, fanno Duc. 114. 41.  
che farebbe 1. centesimo più del prezzo trovato in Piazza.

Per trovare Duc. 171. prezzo di tratta trovato in piazza per regola  
moltiplice si dice: Sc. 1000. d'oro stam. sono uguali à Sc. 1523.  
moneta, e Sc. 100. di questi sono uguali à Duc. 114  $\frac{2}{3}$  di Bari,  
e Duc. 101  $\frac{2}{3}$  col beneficio sono Duc. 100. di Napoli; domandasi  
sc. 100. d'oro stampe, che dà Roma per Napoli à quanti Ducati  
saranno uguali? e saranno Duc. 171. 66. da quali sottratte gra-  
na 68. di provisione restano Duc. 170. 98. che mancano circa  
grana 2. à far Duc. 171. trovati in piazza.

Per parte del Committente si eseguisce dicendo: Duc. 101  $\frac{2}{3}$  di Ba-  
ri sono di Napoli Duc. 100. quanti di questi saranno Duc. 1500.  
di Bari? e saranno Duc. 1477. grana 83. di tratta in Napoli per  
la rimessa di Duc. 1500. in Bari.

Per parte del Commissionario per trovare la tratta. Per la provi-  
sione di  $\frac{2}{3}$  da pagarsi da quel di Roma si forma il primo ordine  
di numeri proporzionali, dicendo. 500. tornano con la provi-  
sione 502. e Duc. 114  $\frac{2}{3}$  di Bari sono uguali à Sc. 100. moneta  
di Roma, e Sc. 1523. moneta sono uguali à Sc. 1000. d'oro stam-  
pe, e Sc. 100. di questi sono uguali à Duc. 171. di Napoli, do-  
mandasi Duc. 1500. di Bari à quanti di Napoli saranno uguali?  
ed operato risultano Ducati di Napoli 1478. 07. da i quali sot-  
tratti Duc. 1477. 83. restano grana 24. di differenza.

Benchè il computo per regola moltiplice sia più breve, ed esatto,  
tuttavia ne i Banchi, è necessario farlo per regole distinte del  
Trè, per trovare il credito, e debito delle Piazze con la provi-  
sione distinta, e l'intelletto resta più capacitato.



# TRATTATO DUODECIMO.

## Delle false Posizioni.

### DISTINZIONE PRIMA.

#### *Della regola delle Posizioni semplici.*



**L**N questa regola per sciogliere il quesito si pone il numero a piacer suo, benchè alle volte bisogna usar qualche industria, il qual numero esaminato secondo il tenor del quesito si trova falso (che se fosse il vero sarebbe sciolto il quesito a caso senz' altro) per mezzo di tal numero falso s'entra in regola del Tre dritta, ponendo in primo luogo il numero di conclusione dedotto dal falso; in secondo luogo il medesimo numero falso; in terzo il numero vero di conclusione, ed operato secondo tal regola ne risulterà il numero cercato. Agli Esempj.

1. D. Un Maestro ha tanti Scolari, che di quelli  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{3}$   $\frac{1}{4}$  ed  $\frac{1}{5}$  fanno Scolari 24. più di quel, che sono. Domando quanti Scolari abbia tal Maestro?

R. Si ponga per più facilità sempre un numero, che abbia tali parti aliquote, cioè intiere per fuggire i rotti, cioè mezze, terze, quarte, e seste, moltiplicando i denominatori successivamente de' rotti, sarà il numero prodotto 144. del quale un mezzo è 72. un terzo è 48. un quarto è 36. ed un sesto è 24. sommate tali parti fanno 180. dal quale sottratto 144. resta 36. e doveva restare 24. Però per regola del Tre; Se 36. num. falso di conclusione vien dall'altro falso 144. supposto, da che numero verrà 24. num. di conclusione vero? ed operato verrà da 96. e tanti Scolari ha quel Maestro, del quale 96. le parti dette sommate fanno 120. che sono 24. più di 96. e resta provato il quesito. Più facile era l'operazione supponendo il numero 12. minimo, che ha tali parti, la somma delle quali 15. da 15. si sottra 12. resta 3. onde si dica. Se 3. vien da 12. da quale verrà 24? e verrà da 96. &c.

2. D. Uno comprò tanti barili di Vino, quante staja di grano per lir. 402.  $\frac{2}{3}$ . il barile del vino lo comprò lir. 8.  $\frac{2}{3}$ . e lo rivendè per essere deteriorato lir. 7  $\frac{2}{3}$ . e lo stajo del grano comprò lir. 3  $\frac{2}{3}$ . e lo ri-



- to sfvendè lire  $4\frac{1}{2}$ , e ritrovò haver guadagnato lire 17. Si domanda quanti barili di vino s'è staja di grano comprò?
- R. Si ponga, che comprasse barili 10. à lit. 8 $\frac{1}{2}$ . il barile vagliano lir. 83.  $\frac{1}{2}$  ed à lir. 7 $\frac{1}{2}$ . vagliano lire 76  $\frac{1}{2}$ . staja 10. à lit. 3  $\frac{1}{2}$ . lo stajo costano lire 35. ed à lir. 4  $\frac{1}{2}$ . lo stajo costano lire 46.  $\frac{1}{2}$ . ora si sommino lire 83.  $\frac{1}{2}$ . e lire 35. fanno lire 118 $\frac{1}{2}$ . di compra. Si sommino lire 76  $\frac{1}{2}$ . e lire 46  $\frac{1}{2}$ . fanno lire 123.  $\frac{1}{2}$ . di vendita, dalle quali si sottrino lir. 118  $\frac{1}{2}$ . di compra restano lir. 5. di guadagno. Onde si dica se lir. 5. vengono da 10. num. posto; lir. 17. da qual num. verranno? ed operato verranno da 34. e tanti barili di vino, e tante staja di grano comprò. Si provi se tornerà.
3. D. Un Mercante con Sc. 650. in mesi 8. ha guadagnato Sc. 4. 11. 8. più, che non guadagnò con Sc. 420. in mesi 10. Si domanda a che ragione per 100. guadagnava l'anno detto Mercante?
- R. Si ponga, che guadagnasse à Sc. 10. per 100. Sc. 650. in mesi 8. meritano Sc. 43 $\frac{1}{2}$ . e Sc. 420. in mesi 10. 18. 33 li quali sottratti da Sc. 43.  $\frac{1}{2}$ . restano Sc. 8  $\frac{1}{2}$ . e dovevano essere Sc. 411. 8. Onde per regola del Trè. Se Sc. 8  $\frac{1}{2}$ . vengono da Sc. 10. da che Sc. 4. 11. 8? ed operato verranno Sc. 5  $\frac{1}{2}$ . se ne faccia la prova à tal ragione, e troverassi star bene.
4. D. Uno diede à guadagno una quantità di scudi à sc. 5. per 100. l'anno, e passati an. 6. mesi 11. giorni 23. ricevè per saldo di capitale, e frutti sc. 6556. 5. 6. Si vuol sapere la quantità degli scudi dati à guadagno.
- R. Si supponga, che fossero sc. 100. li quali guadagnerebbero in an. 6. mesi 11. giorni 23. sc. 34. 18. 0 $\frac{1}{2}$ . li quali aggiunti à sc. 100. capitale fanno sc. 134. 18. 0 $\frac{1}{2}$ . e dovevano essere sc. 6556. 5. 6. Onde per regola del Trè se Sc. 134. 18. 0 $\frac{1}{2}$ . vengono da sc. 100. num. supposto. Da che quantità di scudi verranno Sc. 6556. 5. 6? ed operato verranno da Sc. 4850. e tanti furono dati à guadagno; e facendone prova si troverà così essere.
5. D. Un Mercante vendè braccia 43  $\frac{1}{2}$ . di panno per lin. 160. 8. 4. e trovò guadagnare in tutto l'ottavo della compra meno lit. 3. 12. 11. Si domanda quanto gli costava il braccio di detto panno?
- R. Prima s'aggiungono à lir. 160. 8. 4. le lir. 3. 12. 11. fanno lir. 164. 1. 3. ora si supponga per più facilità, che le comprasse lir. 8. l'ottavo è lira 1. che aggiunta à lir. 8. fa lire 9. e dovevano essere lir. 164. 1. 3. però si dica. Se lir. 9. viene da lire 8. da che lire 164. 1. 3. 4? ed operato verranno lire 145. 16. 8. prezzo delle braccia 43  $\frac{1}{2}$ . per 43  $\frac{1}{2}$ . partite lir. 145. 16. 8. verranno lire 3. 12. 11. prezzo del braccio. La prova si fa con aggiungere l'ottavo à lire 145. 16. 8. e dalla somma sottrarre lir. 3. 12. 11. e verranno lire 160. 8. 4.

6. D. Un Mercante vendè braccia 43  $\frac{1}{2}$  di panno à lir. 3. 13. 4. il braccio, e trovò guadagnare à ragione di sol. 1. per lira, e più lir. 7. 5. 10. domando quanto gli costava no dette braccia di panno, e che parte guadagnò del denaro della compra?

R. Si valutino braccia 43  $\frac{1}{2}$  à lir. 3. 13. 4. verranno lir. 160. 8. 4. delle quali si sottrino lir. 7. 5. 10. di più, restano lir. 153. 2. 6. Ora si supponga, che gli costassero lir. 20., e perchè trovò guadagnare sol. 1. per lira, di 20. fece 21. Onde si dica se 21. con il guadagno vien da 20. da che num. verranno lir. 153. 2. 6. ed operato verranno lir. 145. 16. 8. e tanto gli costavano dette braccia. Ora da lir. 160. 8. 4. si sottrino lir. 145. 16. 8. restano lir. 14. 11. 8. per le quali si portano lir. 145. 16. 8. verrà 10. Dunque guadagnò la decima parte.

La prova si farà con partire lir. 145. 16. 8. per 20. il quoziente si sommerà con l'istesse lire, e verranno lir. 153. 2. 6. alle quali aggiunte lir. 7. 5. 10. di più torneranno lir. 160. 8. 4. di vendita.

7. D. Uno ha quattrini, de' quali ne spende la metà, ed il terzo, i quattrini restati moltiplica in se stessi, e vengono i quattrini, che ha da principio. Si cerca quanti quattrini erano?

R. Siano quattrini 12. la metà 6. il terzo 4. sommati fanno 10. levati da 12. restano 2. li quali moltiplicati in sè, cioè via 2. fanno 4. e dovevano fare 12. però si dica per regola del Tre: Se 4. è venuto da 12. da qual numero verrà il medesimo 12? e moltiplicato 12. via 12. fa 144. il quale partito per 4. viene 36. quattrini, che aveva da principio. Si prova la metà 18. il terzo 12. sommati fanno 30. levati da 36. restano 6. li quali moltiplicati via 6. tornano 36.

8. D. Due giuocano alla Bassetta, il secondo mette alla prima tutti i suoi denari, e vince, e tira: il primo mette ancor egli i danari restati, e vince, e tira: ed allora ciascuno ebbe Scudi 25. Si domanda quanti ne haveva ciascuno da principio del giuoco? *Tartaglia lib. 16. num. 21.*

R. Il primo abbia scudi 5. il secondo sc. 3. il secondo vince sc. 3. al primo, il secondo n'averà scudi 6. al primo restano sc. 2. il primo vince sc. 2. ed il primo n'ha 4. e 4. il secondo, e si voleva, che ciascuno avesse sc. 25. in tutto sc. 50. Ora per regola del 3. si dica: Se di 8. il primo n'averà 5. che n'averà di sc. 50. ed operato n'averà 31  $\frac{1}{2}$ . Perci, se di 8. il secondo n'averà 3. che n'averà di sc. 50. n'averà sc. 18  $\frac{1}{2}$ . &c. la posizione è difficile; però più facilmente si risolve il quesito per Raziocinio: Certo è, che il primo quando la seconda volta vince, ed ha sc. 25. con la prima perdita gli erano rimasti sc. 25. ed il secondo con la vincita aveva sc. 37  $\frac{1}{2}$ . fino in sc. 50.

in Sc. 50. di Sc. 37  $\frac{1}{2}$ . levando la metà di venticita restano Sc. che aveva il secondo da principio; il resto fino in Sc. 50. cioè 12  $\frac{1}{2}$ . aveva il primo.

9. D. Uno ereditò una quantità di Scudi, de' quali il terzo, il quarto, e quinto, sommati con l'istessa quantità con 1. di più fanno la somma di Sc. 750. Si domanda quanti Sc. ereditò?

R. Si ponga Sc. 60. che a le parti aliquote nominate senza resto il terzo 20. il quarto 15. il quinto 12. sommati con 60. fanno la somma di 107. da Sc. 750. si levi 1. restano 749. perchè il più si levi meno si aggiunge. Onde per regola del Trè: Sc. 107. viene 60. da che numero 749? ed operato verrà da 440. e tanti Sc. ereditò.

Si prova il terzo 140. il quarto 105. il quinto 84. sommati con 1. di più fanno 750.

10. D. Due si peccano a sfocarsi con una quantità di giulj; ce il primo al secondo; Se io ti vincerò giulj 8. allora io n'averò quanti resteranno a te. Dice il secondo al primo: E se io ti vincerò giulj 12. allora avrò giulj tre volte più, che non resteranno a te. Si domanda quanti giulj abbia ciascuno al principio di gioco?

R. Si sommino giulj 8. e 12. fanno 20. Ora si trovi un numero quale la metà è tre quarti; e sommati insieme facciano la somma che sopravanza tal numero di 20. sia 4. la metà 2 li  $\frac{1}{2}$ . 3. sommati 2.3. la somma 5. sopravanza 4. di 1. però si dica per regola del Trè: Se 1. viene da 4. da qual numero verrà 20? ed operato verrà da 40. e tanti giulj hanno fra tutti due. Si pigli la metà 40. dal quale levino 8. restano giulj 32. per il primo, s'aggiungano a 40. li 8. faranno giulj 48. per il secondo.

Si provi, se il primo vincerà giulj 8. aveva ciascun o giulj 40. ma il secondo vincerà giulj 12. al primo resteranno giulj 20. ed il secondo averà giulj 60. tre volte più di 20. &c.

11. D. Un Mercante Romano misurò tre differenti pezze di panno e trovò la loro lunghezza essere di canne 81. palmi 2. la maggiore era larga palmi 7. la seconda palmi 3. la terza palmi 4. la maggiore quadrata, era quadrupla della seconda, siccome la seconda era quadrupla della terza. Però si cerca la lunghezza di ciascuna pezza da per se?

R. Prime canne 81. palmi 2. si riducano in palmi. 482. per canne saranno palmi 650. Ora si ponga, che la terza pezza sia palmi quadrata, la seconda sarà palmi 4. e la prima palmi 16. Ora trovare la sola lunghezza, si partano palmi 16. per palmi 7. lunghezza, verranno palmi 2.  $\frac{1}{2}$ . la lunghezza della pezza maggiore parta

partano palmi 4. per 3. verrà palmo  $1\frac{1}{3}$ . per la lunghezza della seconda pezza; finalmente si parta palmo 1. per 4. verrà di palmo  $\frac{1}{4}$ . per la lunghezza della terza pezza; Si sommino palmi di lunghezza 2  $\frac{1}{4}$ . 1  $\frac{1}{4}$ . ed  $\frac{1}{4}$ . vengono palmi 3  $\frac{1}{4}$ . e dovevano essere palmi 650. che però si dica per regola del Trè: Se 3  $\frac{1}{4}$ . fussero 650. che fariano 2  $\frac{1}{4}$ ? 1  $\frac{1}{4}$ ? ed  $\frac{1}{4}$ ? e verranno palmi 384. cioè canne 48. di lunghezza per la pezza maggiore, e verranno palmi 224. cioè canne 28. per la seconda pezza; e finalmente palmi 42. cioè canne 5. palmi 2. per la terza pezza. Si provi, si moltiplichino palmi 42. di lunghezza via palmi 4. di larghezza, verranno palmi riquadrati 168. si moltiplicano palmi 224. di lunghezza. per palmi 3. di larghezza, e verranno palmi riquadrati 672. finalmente si moltiplicano palmi 384. di lunghezza via palmi 42. di larghezza, e verranno palmi riquadrati 2688. e perchè palmi 168. riquadrati della terza, e palmi riquadrati 672. della seconda, e palmi riquadrati 2688. della maggiore stanno in proporzione quadrupla; Dunque il quesito è bene risolto.

28. D. Trè hanno una quantità di lire. Il primo n'ha il doppio del secondo. Il secondo il doppio del terzo, e ciascuno moltiplicando le sue lire in se, cioè quadrandole: la somma de' quadrati, è 525. Domanda si adesso quante lire abbia il primo, il secondo, ed il terzo?

R. Si ponga, del primo lir. 4. del secondo lir. 2. del terzo lir. 1. i loro quadrati 16. 4. ed 1. si sommino, fanno 21. per il quale si parte 525. viene 25. del quale la radice quadra è 5. con il quale si moltiplicano lir. 4. del primo fa lir. 20. e lir. 2. del secondo, fa lir. 10. e lir. 1. del terzo fa lir. 5. del terzo. Si provi con quadrare lir. 20. fa 400. lire 10. fa 100. e lir. 5. fa 25. e sommati questi prodotti, la somma sarà 525. siccome si disse nel quesito, sicchè è bene risoluto.

Si poteva operare in questo modo: Trovata la somma 21. e doveva essere 525. però per regola del Trè si dica: Se 21. fusse 525. che sapia 16? che 4? che 1? e verranno 400. 100. 25. de' quali la radice quadra 20. 10. 5. sono le lire del primo, secondo, e terzo come prima.

29. D. Trè vorrebbero comprare un Caleffo, che vale Sc. 120. Dice il primo a gl'altri due, datemi  $\frac{1}{4}$ . de' vostri Scudi con i miei comprerò il Caleffo. Dice il secondo a gl'altri due datami  $\frac{1}{4}$  del vostro Scudi con i miei comprerò il Caleffo. Dice il terzo, datami  $\frac{1}{4}$  de' vostri Scudi con i miei comprerò il Caleffo. Si domanda quanti Scudi aveva ciascuno?

R. Bisogna fare una postazione analfabica in questo modo; Si pigli un num.



vostri dedarà, io averò con i miei Duc. 20. Disse il terzo agl' altri due se voi mi date il quarto de' vostri denari, averò anch'io con i miei Duc. 20. Domando, che denari aveva ciascuno di loro? *Tert. lib. 7. quest. 41.*

R. Il primo num.  $\frac{1}{2}$ .  $\frac{1}{3}$ .  $\frac{1}{4}$ . è 24. Si trovi un numero che levata la sua metà resti 12. si raddoppi 12. farà 24. Un'altro, che levato  $\frac{1}{2}$ . resti 12. aggiunto  $\frac{1}{3}$ . di 12. è 16. farà 18. Finalmente un' altro, che levato  $\frac{1}{4}$ . resti 12. aggiunto  $\frac{1}{3}$ . di 12. è 12. farà 16. Ora si sommano 24. 18. 16. la somma 58. quale si parte per 2. cioè per 1. meno che sono le persone, viene 29. dal quale levato 24. restano Ducati 5. del primo; da 29. levato 18. restano 11. Duc. del secondo, e da 29. levato 16. restano 13. Duc. del terzo; e finalmente levato 12. numero, che ha  $\frac{1}{2}$ .  $\frac{1}{3}$ . e  $\frac{1}{4}$ . restano 17. Ducati, che ha ciascuno, quando ha ricevuto dagl' altri due la parte detta, e dovevano essere Duc. 20. Però per regola del Trè: Se 17. fusse 20. che farà 5. del primo? 11. del secondo? e 13. del terzo? ed operato verranno del primo sc.  $5 \frac{1}{2}$ . del secondo sc.  $12 \frac{1}{2}$ . del terzo di 15  $\frac{1}{2}$ . Si provi, e tornerà.

15. D. Trè vogliono comprare un Cavallo, dei quale non si sa il prezzo. Il primo dice a gl' altri due datemi  $\frac{1}{2}$ . de' vostri scudi con i miei comprerò il Cavallo. Il secondo dice a gl' altri due datemi  $\frac{1}{3}$ . de' vostri scudi con i miei comprerò il Cavallo. Dice il terzo a gl' altri due: datemi  $\frac{1}{4}$ . de' vostri scudi, e comprerò il Cavallo; Si domanda quanti scudi aveva ciascuno, e quanti ne costava il Cavallo; essendo che, la somma de' scudi di ciascuno con quei del Cavallo fussero sc. 355.  $\frac{1}{2}$ ?

R. Operato come nella penultima. Si trovano sc. 32  $\frac{1}{2}$ . del primo sc. 42  $\frac{1}{2}$ . del secondo; sc. 47  $\frac{1}{2}$ . del terzo, e sc. 62  $\frac{1}{2}$ . prezzo del Cavallo. Si sommino questi scudi saranno sc. 185. Onde per regola del Trè; Se 185. fussero sc. 355  $\frac{1}{2}$ . che sc. 32  $\frac{1}{2}$ . del primo? sc. 42  $\frac{1}{2}$ . del secondo? che sc. 47  $\frac{1}{2}$ . del terzo? che sc. 62  $\frac{1}{2}$ . del Cavallo? e verranno del primo sc. 62  $\frac{1}{2}$ . del secondo sc. 81  $\frac{1}{2}$ . del terzo sc. 91  $\frac{1}{2}$ . e del Cavallo sc. 120. come nella penultima.

16. D. Trè vorrebbero comprare un Campo, che vale sc. 91. e ciascuno di loro non ha tanti scudi, e trovano una borsa con scudi dentro, e gli contano, ed allora dice il primo: Se io avessi la metà de' scudi della borsa con i miei comprerei il Campo. Dice il secondo: Se io avessi il terzo de' scudi della borsa con i miei, comprerei il Campo. Dice il terzo, se io avessi il quarto de' scudi della borsa con i miei, comprerei il Campo. Si domanda quanti scudi abbiano ciascuno, e gli scudi della borsa?

R. Nella borsa siano sc. 24. numero che ha le partinominate senza rotti.

17. Scudi del primo ; da 20. levato 6. restano 14. Scudi del secondo da 26. levato 6. restano 20. Sc. del terzo; mà stante il Campo non costa Sc. 26. mà Sc. 91. Dunque quei Scudi non sono il vero numero; e la posizione è falsa. Per regola del Trè si troverà il numero vero , dicendo : Se 26. fusse 91. che 14. del primo ? che 18. del secondo ? che 20. del terzo ? che 24. della borsa ? ed operato, verranno Sc. 49. del primo ; Sc. 63. del secondo ; Sc. 70. del terzo , e Sc. 84. della borsa . Si provi Sc. 42. metà degli Scudi della borsa con Sc. 49. del primo fanno Sc. 91. Sc. 28. terzo degli Scudi della borsa , con Sc. 63. del secondo fanno Sc. 91. e finalmente Sc. 21. quarto degli Scudi della borsa con Sc. 70. del terzo fanno Sc. 91. quanti si disse valere il Campo ; e così s'opera nelle simili.

17. D. Richiesto uno , che ora fosse , rispose : li  $\frac{5}{2}$ . dell'ore sonate sono tante , quante li  $\frac{3}{2}$ . dell'ore da sonarsi fino ad ore 24.

O pure li  $\frac{3}{2}$ . dell'ore sonate sono tante, quante da sonarsi fino alle 24. Si domanda che ora fusse allora ?

R. Si trovino due numeri , che li  $\frac{3}{2}$ . d'uno siano  $\frac{5}{2}$ . dell' altro , per la 123. del secondo Trattato ; moltiplicando in croce i rotti , faranno 10. e 6. Adesso si sommino 10. 6. fanno 16. e doveva essere 24. dunque la posizione di 10. e 6. è falsa . Per regola del Trè si dica : Se 16. fusse 24. che sarebbe 10 ? e che 6 ? e verrà 15. ore sonate : e 9. ore da sonarsi . Si prova perchè  $\frac{3}{2}$ . di 15. sono 6. siccome sono 6. li  $\frac{3}{2}$ . di ore 9.

Nel secondo caso li  $\frac{3}{2}$ . si moltiplicano con 1. à modo di rotto in croce , e viene 5. e 3. si sommano fanno 8. e dovevano essere 24. Però per regola del Trè: Se 8. fusse 24. che sarebbe 5 ? e verrà 15. per l'ore sonate li  $\frac{3}{2}$ . di 15. sono 9. ore da sonarsi fino in 24.

18. D. Uno era debitore di Sc. 120. e fa il suo conto, e trova che  $\frac{5}{2}$ . e  $\frac{3}{2}$  de' pagati sono tanti Sc. , quanti sono  $\frac{5}{2}$ . e  $\frac{3}{2}$ . da pagarsi : Si domanda quanti Scudi aveva pagati , e quanti ne restava à pagare ?

R. Per la 124. del secondo si trovino due numeri, che  $\frac{5}{2}$ . ed  $\frac{3}{2}$  d'uno sia tanto , e quanto  $\frac{5}{2}$ . e  $\frac{3}{2}$  dell'altro . Sommando  $\frac{5}{2}$  e  $\frac{3}{2}$  fa  $\frac{8}{2}$  e sommando  $\frac{5}{2}$ . e  $\frac{3}{2}$  fa  $\frac{8}{2}$ . questi due rotti si moltiplicano in croce verranno 60. e 40. con tal condizione , ma sommati fanno 100. e si volevano 120. che però per regola del Trè due volte replicata si dica : Se 100. fusse 120. che sarebbero 60 ? e verrà 72. per li Sc. pagati , e se 100. fusse 120. che sarebbe 40 ? e verrà 48. Scudi da pagarsi .

H h h h

Si pro-

Si provi  $\frac{3}{4}$  di 72. è 24. ed  $\frac{3}{4}$  di 72. è 14  $\frac{3}{4}$ . che sommato con 24. fa 38  $\frac{3}{4}$  medesimamente  $\frac{3}{4}$  di 48. è 16.  $\frac{3}{4}$  di 48. 22  $\frac{3}{4}$ . questo sommato con 16. fa 38  $\frac{3}{4}$ . sicchè stà bene avverandosi la condizione.

19. D. Cinque avendo fatto compagnia posero frà tutti Sc. 380. gli Scudi del primo erano li  $\frac{3}{4}$  delli Scudi del secondo, ò li  $\frac{3}{4}$  di quei del terzo, o li  $\frac{3}{4}$  di quei del quarto, ovvero la metà di quei del quinto. Si domanda quanti Scudi ciascuno pose in detta compagnia di sua parte?

R. Abbia posto il primo Sc. 12. e perchè sono li  $\frac{3}{4}$  di quei del secondo si dica per regola del Trè: Se 2. numeratore del rotto fosse 3. denominatore, che farebbero Sc. 12? ed operato vengono Sc. 18. del secondo, e perchè sono li  $\frac{3}{4}$  di quei del terzo nel medesimo modo si dica: Se 3. fusse 5. che Sc. 12? e vengono Sc. 20. del terzo, è perchè sono li  $\frac{3}{4}$  del quarto, si dica pure: Se 4. fusse 7. che farebbero Sc. 12? e vengono Sc. 21. del quarto, e finalmente perchè sono la metà di quei del quinto, si dica: Se 1. fusse 2. che Sc. 12? e vengono Sc. 24. del quinto. Si sommino Sc. 12. 18. 20. 21. 24. la somma Sc. 95. e dovevano essere 380. però per regola del Trè, si dica: Se Sc. 95. vengono da Sc. 12. supposti del primo, da quanti verranno Sc. 380? ed operato verranno da Sc. 48. del primo. Per trovare gl'altri si replichi la regola del Trè dicendo: Se 95. vengono da Sc. 18. del secondo, da quali Sc. 380? e verranno Sc. 72. del secondo; ò pure si trovino come sopra dicendo. Se 2. fusse 3. che farebbero 48. del primo? e verranno Sc. 72. del secondo &c. se 3. fusse 5. che 48? e verranno Sc. 80. del terzo, se 4. fusse 7. che 48? e verranno Sc. 84. del quarto; finalmente se 1. fosse 2., che 48? e verranno Sc. 96. del quinto, quali sommati fanno Sc. 380. come si disse, ed è provata la lezione.

20. D. Un'altro interrogato quanti anni avesse, rispose, ne hò tanti, che se ne avessi altri, e tanti, la metà di tanti, ed in oltre  $\frac{3}{4}$   $\frac{3}{4}$  e  $\frac{3}{4}$ . di tanti, ed 1. di più averei anni 100. quanto tempo hà costui?

R. Questo è il quesito nuovo del Figatelli a carte 168. malamente risolto così. Perchè questi rotti si contengono in 60. Io m'immagino, che abbia 60. anni, e 60. altri, per e tanti, e 30. per la metà e 20. per  $\frac{3}{4}$ . e 15. per  $\frac{3}{4}$ . e 12. per  $\frac{3}{4}$  che uniti insieme fanno 197. Ora qui etra aggiungendo 1. fanno 198. e poi dice: Se 198. fussero 100. che fariano anni 30? mesi 3. giorni 19. hore 2  $\frac{1}{2}$ . e tanti anni hà l'Amico. Il che è falso, che però trovato 197. si leva 1 da 100. resta 99. onde per regola del Trè si dice: Se 197. fusse 99. che faria 60? faria 30  $\frac{3}{4}$  e tanti anni hà l'Amico.



co, cioè anni 30. mesi 1. giorni 24. hora 19  $\frac{4}{7}$ . Si pigliare le parti dette di 30  $\frac{4}{7}$ . e verranno appun-  
ma secondo la risposta del Figatelli verranno anni 11  
vanzerà.

197

An. 30.	30
30.	30 altri e tanti
15.	15 metà
10.	10 terzo
7.	106 quarto
6.	6 quinto
1	un di più

secondo il Figatelli A

Anni 100. — Anni  
Se il Figatelli si fusse servito della doppia falsa posizion  
incontrato nella vera conclusione di anni  $30\frac{4}{7}$ . im-  
la posizione di 60. trovò più 98. se faceva la polizion  
per più facilità di 120. trovava più 295. e sottrando  
errore da 295. restava partitore 197. e moltiplicando  
e 120. via 98. con sottrarre 11760. da 17760. restava  
partito per 197. veniva  $30\frac{4}{7}$ . per gl' anni dell' Ar-  
vero F. Luca simile quesito lo pose al numero 21. del  
falsa posizione, che è il seguente in sostanza.

21. D. Volavano alcune Grue per aria, le quali se fussero  
e tante, e la metà di tante è  $\frac{4}{7}$ . di tante con una di pi-  
state 100. Si domanda quante erano, quelle che vola-  
R. I quesiti, che importano oltre le parti proporziona-  
più, o di meno appartengono alla doppia falsa posizi-  
questa regola gli propongo, agl' Arimmetici; tuttav-  
sciorre per semplice falsa posizione, se tali numeri di p-  
del numero proposto, ovvero a questo s'aggiungono  
meno, che però qui si sciorranno alcuni quesiti messi  
più falsa posizione dagl' Autori, per la semplice posi-  
sciorre il quesito proposto di F. Luca, si ponga, che  
fero 4. numero per più facilità, che ha le parti prop-  
e quarte; altre, e tante fanno 8. con la metà, fanno  
di 4. fanno 11. e levato 1 da 100. restano 99. come h-  
si deve fare; Adesso: Se 11. fussero 99. che sarebbero 4  
fero? ed operato verranno 36. e tante Grue erano; al-  
fanno 72. con la metà di 36. fanno 90. con  $\frac{4}{7}$  di 36. fa  
aggiunta 1. di più fanno 100. appunto, e resta provato

H h h h 2

sciolto per semplice posizione, si ponga con il numero di meno.

22. D. Uno conta tante Grue per aria, che se fussero state altre, e tante e la metà, e  $\frac{2}{3}$ . di tante meno 2. sarebbero state 100. Si domanda quante ne contò?

R. Come hò detto, il numero di meno s'aggiunge al numero proposto, che però s'aggiunge 2. al 102. fa 102. Ora si faccia la posizione, che le Grue contate fussero 6. con altre, e tante sono 12. con la metà di tante sono 15. e con  $\frac{2}{3}$  sono 17. che però si dica per regola del Trè: Se 17. fussero 102. che sarebbero 6? e sarebbero 36. Grue contate: Si prova con altre, e tante sono 72. con la metà 90. e con  $\frac{2}{3}$  di 36. sono 102. dalle quali levate 2. di meno, che si disse essere, restano 100. quante si volevano. Qui si propongono varj quesiti di doppia posizione posti dagl' Autori, e sciolti per semplice posizione brevemente.

23. D. Trè Compagni hanno da partire tra se Sc. 200. con queste condizioni. Il secondo ne hà d'averè il doppio del primo più Scudi 10. e il terzo ne hà d'averè quanti il primo, e secondo più Scudi 20. Si domanda quanti Sc. averà ciascuno? Figatelli car. 170.

R. Sc. 10. più si levano raddoppiati, cioè: Sc. 20. in riguardo del terzo, che con Sc. 20. più del terzo fanno 40. che si sottrano da Sc. 200. restano Sc. 160. adesso si ponga Sc. 1. per il primo, Sc. 2. per il secondo, e Sc. 3. per il terzo, secondo le condizioni, in tutto fanno Sc. 6. onde si dica. Se Sc. 6. fussero 160. che sarebbe 1. del primo, 2. del secondo, e 3. del terzo? e sarebbero  $26\frac{2}{3}$ .  $53\frac{1}{3}$ . e 80. al  $53\frac{1}{3}$  s'aggiungono adesso 10. faranno Sc.  $63\frac{1}{3}$  per il secondo, ad 80. s'aggiungono 30. faranno 110. per il terzo. Perchè al terzo oltre à Sc. 20. di più, gli si devono Sc. 10. per il secondo; sicchè, il primo averà Sc.  $26\frac{2}{3}$ . il secondo Sc.  $63\frac{1}{3}$ . ed il terzo Scudi 110. &c.

24. D. Uno compra trè pezze di Panno per Duc. 250. la prima costò una quantità di Ducati; la seconda due tanti più Duc. 10. la terza costò due tanti, che l'altre più Duc. 1. domando, che costò ciascuna da per se? Fr. Luca carte 104. numero 4.

R. Si ponga, che la prima costasse Duc. 1. la seconda costà Duc. 2. più 10. e la terza Duc. 6. più 21. si sommano le parti proporzionali fanno 9. si sommano i numeri 10. e 21. di più fanno 31. che si sottrano da 250. resta 219. però si dice: Se 9. fussero 219. che sarebbe 1. 2. e 6? e verranno Duc.  $24\frac{2}{3}$ . per il costo della prima pezza, e Duc.  $48\frac{2}{3}$ . alli quali aggiugnonsi Duc. 10. fanno Duc.  $58\frac{2}{3}$ . per il costo della seconda, e Duc. 146. alli quali aggiunti 21. fanno Duc. 167. per il costo della terza pezza.

25. D.

25. D. Trè andati in Fiera hanno guadagnato sc. 120. hà guadagnato il doppio degli scudi del primo, più sc. 20 hà guadagnato trè tanti delli sc. del primo meno si manda quanti sc. hà guadagnato ciascuno?

R. Per il primo si ponga sc. 1. per il secondo saranno sc. 2. per il terzo saranno sc. 3. meno 17. si sommano le parziali 1. 2. e 3. fanno 6. si sommano più 23. meno 1 più 6. li quali si levano da 120. e restano 114. questo si aveva, se da 120. si levavano più 23. restavano 97. aggiunti 17. facevano 114. Ora si dice se 6. fussero 114. 1. 2. 3? e saranno 19. 38. e 57. à 38. si aggiungono sc. sc. 61. da 57. si levano 17. restano sc. 40. sicchè il primo guadagnato sc. 19. il secondo sc. 61. il terzo sc. 40. che sono sc. 120. in tutto. Et i numeri hanno le condizioni

Da queste domande si è visto, come i quesiti posti da altra gola di doppia falsa posizione, si son ridotti alla regola di doppia vera posizione; Benchè quello, che è pratico della regola, bra conoscerà, intervenirvi una regola di modo, cavata desima, la quale per essere generale è buona in simili risolverli con facilità, e brevemente. Qui ne soggiungo posto da me nella regola di doppia falsa posizione ed

26. D. Trè hanno denari: il secondo hà il doppio del primo, il terzo hà quanto il primo, ed il secondo meno sc. 4. tutti hanno sc. 100. domande quanti scudi abbia ciascuno?

R. Si ponga, che il primo abbia, che numero un vuole, facilità si ponga che abbia sc. 1. il secondo haverà sc. 2. il terzo sc. 3. meno 12. Perchè avendo quanto il primo, che hanno sc. 3. più 4. con dovere avere meno 16. da 16. resta meno 12. si sommano sc. 1. sc. 2. più 4. e meno 12. fanno sc. 6. meno 8. e perchè il numero di meno, si aggiunga 8. à 100. fa 108. Ora si dice, se sc. 108. che faria sc. 1. del primo, e fariano sc. 18. Che il secondo? fariano sc. 36. con quattro più, fariano sc. 40. del terzo? E fariano sc. 54. da i quali si levano 12. per detta, restano sc. 42. del terzo, sicchè il primo hà sc. 14. sc. 40. il terzo sc. 42. li quali numeri hanno le condizioni sicchè si è sodisfatto alla domanda. Avvertasi, che tre mo, gl'altri più facilmente si trovano senza regola di

27. D. Un Mercante hà speso  $\frac{1}{3}$  ed  $\frac{1}{4}$ . de suoi scudi più: no restati sc. 50. Si domanda quanti sc. aveva?

R. Nei quesiti passati il num. di più si levava dal num. quel si aggiunge 20. à 50. fa 70. Ora si trovi un numeri

le levato  $\frac{7}{8}$ . ed  $\frac{7}{8}$ . resti 70. sia 18. del quale  $\frac{7}{8}$ . è 4. ed  $\frac{7}{8}$ . è 3. che fanno 7. sottratto da 12. resta 5. e doveva restare 70. però si dice se 5. viene da 12. da qual numero verrà 70. d'avanzo? ed operato verrà da 168. scudi, che aveva il Mercante. Si prova  $\frac{7}{8}$ . di 168. è 56. ed  $\frac{7}{8}$ . è 42. quali si sommano con 20. fanno 118. li quali si sottrano da 168. restano 50. che si disse dover restare.

28. D. Un Padre lasciò per Testamento la metà de' suoi feudi meno 120. al figliuolo maggiore, lasciò  $\frac{1}{3}$ . de' medesimi al minore, ed il resto di sc. 1000. alla figliola da monacarsi. Si domanda quanti feudi testò il detto Padre?

R. Li sc. 120. meno, si levano da sc. 1000. restano 880. Ora si trova un numero, dal quale levata la metà, ed  $\frac{1}{3}$ . resti 880. sia 6 dal quale levato 3. metà, e 2. per  $\frac{1}{3}$ . resta 1. e doveva restare 880. Però si dica: Se 1. viene da 6. da qual numero verrà 880? questo moltiplicato per 6. farà 5280. scudi, che testò tal Padre; Si prova, la metà di scudi 5280. meno 120. sono scudi 2520. del maggiore figliuolo,  $\frac{1}{3}$ . sono scudi 1760. del minore, che sommati con scudi 1000. della figliola, fanno scudi 5280. Sicchè torna,

29. D. Un huomo liberale donò a due suoi Amici in questo modo, al primo la metà de' feudi, che aveva in borsa, al secondo la terza parte de' medesimi, meno sc. 100. e gli restarono sc. 120. Si domanda quanti feudi aveva in borsa?

R. Si levano sc. 100. da scudi 120. restano sc. 20. ora bisogna trovare un numero, che levato  $\frac{1}{2}$ . ed  $\frac{1}{3}$ . resti 20. si ponga, che sia qual uno vuole per esèmpio 12. dal quale levato 6. e 4. cioè la metà, e  $\frac{1}{3}$  resta 2. onde si dica: Se 2. viene da 12. da che verrà 20? e verrà da 120. e tanti feudi aveva in borsa, e perchè tanti gli restarono; dunque non donò alcuna cosa, perchè  $\frac{1}{2}$ . ed  $\frac{1}{3}$ . di 120. è 100. che disse donargli; meno 100.

30. D. Due Compagni si sono divisi scudi 124. ed hanno trovato, che gli  $\frac{1}{4}$ . del primo, sono quanti li  $\frac{1}{3}$ . del secondo. Si domanda quanti feudi ebbe il primo, ed il secondo Compagno?

R. Si trovano due numeri, che li  $\frac{1}{4}$ . d'uno siano  $\frac{1}{3}$ . dell' altro con moltiplicare tali rotte in croce, e verranno 16. e 15. perchè  $\frac{1}{4}$ . di 16. sono 4. siccome li  $\frac{1}{3}$ . di 15. Si sommano 16. e 15. fanno 31. e dovevano essere 124. Dunque per regola del Trè, si dice: Se 31. sono venuti da 16. e da 15. da quali numeri verranno 124? ed operato, verranno da 64. scudi del primo, e da 60. scudi del secondo: Si prova pigliando  $\frac{1}{4}$ . di 64. sono 16. siccome sono 48.  $\frac{1}{3}$ . di 60. è 20. &c.

31. D. Uno vuole comprare un Cavallo, che vale Duc. 1. Ducato cambiandolo à grossi vale grossi 15. e cambiandolo li, vale giulj 10., e cambiandolo à carlini vale carlini venditore vuole di queste trè monete, cioè due tanti grossi, e due tanti carlini, che giulj. Si domanda quante averà di ciascuna sorte?

R. Questa è la proposizione 21. à carte 238. del Forestan solve per doppia falsa posizione, ed io qui per semplice no grossi 15. che importano Duc. 1. di giulj 30. che sono grossi, che importano Duc. 3. carlini 60. che sono due li, che importano Duc. 5. si sommano i Ducati sono 9. e esser 100. però si dica per regola del Trè. Se Duc. 9. si 100. che sarebbe Duc. 1. e fariano Duc.  $11\frac{1}{9}$ . di grossi; no Duc.  $3\frac{2}{9}$  e fariano Duc.  $33\frac{2}{9}$ . di giulj; Che farebbero fariano Duc.  $55\frac{2}{9}$ . di carlini. Ora si moltiplicano Duc grossi 15. e vengono grossi  $166\frac{2}{3}$ . si moltiplicano Duc 10. giulj e vengono giulj  $333\frac{2}{3}$ . e si moltiplicano Duc carlini 12. e vengono carlini  $666\frac{2}{3}$ . sicchè averà grossi li  $333\frac{2}{3}$  e carlini  $666\frac{2}{3}$ . che hanno le condizioni dette Duc. 100. appunto.

32. D. Sono 3. huomini d'arme, che fanno correria sopra e gli rapiscono certi Ducati con patto di partirgli in tre, avendoli partiti, il primo, ed il secondo si lamentano degli radoppia i Ducati à tutti e due; poi il primo, e terzo tanto del secondo, ed egli raddoppia i Duc. à tutti due; e il secondo, e terzo si lamentano del primo, il quale i Duc. à tutti due; e quando hanno così fatto si trovano scuno tanti Duc. l'uno quanti l'altro. Domando quante va ciascuno, avanti che gli fossero raddoppiati?

R. Questa è del Tartaglia trà le compagnie 54. lib. 12. il fa così: Ponì 1. sopra 3. fa 4. Ducati del primo, poi 4. fa 8. e leva 1. resta 7. Duc. del secondo, raddoppia fa 14. e leva 1. resta 13. per li Duc. del terzo &c. Queste domande indeterminate, che hanno innumerabili risposte fa così. Ponì 2. sopra 6. fa 8. Duc. del primo, raddoppia e leva 2. si ha 14. Duc. per il secondo; raddoppia fa 28. si ha 26. per il terzo; e così con raddoppiare, triplicar meri, si possono dare diverse risposte; ma determinando ad una risposta i numeri del Tartaglia possono servire semplice posizione, come:

33. D. Trè dovendo partire Sc. 120. frà se, furono divisi rentemente, che il primo, e secondo si lamentano del

quale raddoppiò gli Sc. à tutti due; allora il primo, e terzo si lamentarono del secondo, ed egli raddoppiò gli Sc. à tutti due; Finalmente il secondo, e terzo si lamentarono del primo, il quale raddoppiò gli Sc. à tutti due, ed allora ciascuno ebbe ugual quantità di Scudi. Si domanda come furono divisi gli Sc. 120. la prima volta?

R. Ponendo i numeri del Tartaglia 4. 7. e 13. sommati fanno 24. e dovevano essere 120. però si dica: Sc 24. fossero 120. che faremo  $4^2$  7? e 13? e verranno Sc. 20. per il primo, Sc. 35. per il secondo, e Sc. 65. per il terzo. Se ne faccia prova, e verrà, e così d'ogni altro numero. Ma non volendosi servire de' numeri detti, si usi quest'altra regola generale. Si piglia la sesta parte per il primo del numero da partirsi, alla sesta parte vi si aggiungono i suoi tre quarti, e sono gli Scudi del secondo, quei tre quarti raddoppiati s'aggiungono à quei del secondo, e verranno quei del terzo presi da principio. Dunque la sesta parte di 120. sono Sc. 20. del primo; li  $\frac{1}{4}$ . di Sc. 20. sono 15. che aggiunti a 20. fanno Sc. 35. del secondo, raddoppiati 15. fanno 30. che sommati con 35. del secondo, fanno Scudi 65. del terzo. E così d'ogni altro numero.

34. D. Uno vada da un cambiatore di monete, acciò li cambi Piastre 240. di lir. 7. l'una in grossi, in giulj, lire, e testoni, e vuole il medesimo num. di ciascuna sorte di moneta; Si domanda quanti grossi &c. riceverà?

R. Si ponga per il num. 21. di grossi fanno piastra 1. di giulj piastre 2. di lir. piastre 3. di testoni piastre 6. si sommano piastre 1. 2. 3. 6. fanno piastre 12. e dovevano essere 240. Però per regola del Tre se piastre 12. si hanno da 21. da quante si averanno piastre 240? ed operato si troverà averli da 420. e tanti grossi, giulj, lire, e testoni riceverà.

35. D. Uno compra braccia 8. di Panno, e braccia 5. di raso, per Sc. 24. e spese  $\frac{2}{3}$ . di più nel Panno, che nel Raso. Domando quanto costò il braccio del Panno, e del Raso separatamente.

R. Si ponga per il Raso Sc. 1. per il Panno Sc. 1  $\frac{2}{3}$ . Si sommano, fanno Sc. 2  $\frac{2}{3}$ . e dovevano essere Sc. 24. però si dica: Sc. 2  $\frac{2}{3}$ . fossero Sc. 24. che farebbero Sc. 1? che Sc. 1  $\frac{2}{3}$ . e farebbero Sc. 10.  $\frac{2}{3}$ . per il Raso, e Sc. 13  $\frac{1}{3}$ . per il Panno. Si partono Sc. 10.  $\frac{2}{3}$ . per braccia 5. vengono Sc. 2  $\frac{2}{3}$ . per il braccio del Raso. Si partono Sc. 13  $\frac{1}{3}$ . per braccia 8. vengono Sc. 1  $\frac{1}{8}$ . per il braccio del panno. Si prova sottrando Sc. 10  $\frac{2}{3}$ . da Sc. 13  $\frac{1}{3}$ . restano Sc. 3  $\frac{1}{3}$ . terza parte di Scudi 10  $\frac{2}{3}$ . &c.

36. D. Uno vuol macinare staja 795. di Grano con tre Mole; Con la prima in un'ora si macinano staja 3. con la seconda in ore 3. si ma-

si macinano staja 10. e con la terza in ore 6. si macinano staja 15. Si domanda in quante ore macinerà le dette staja.

R. Si supponga, che le macini in ore 6. la prima Mola ne macina staja 18. la seconda staja 20. e la terza staja 15. le quali sommate fanno staja 53. e dovevano essere 795. però si dice. Se staja 53. si macinano in ore 6. staja 795. in quante ore si macineranno? ed operato verranno ore 90. nelle quali si macineranno. Si prova; la prima Mola ne macinerà staja 270. la seconda 300. e la terza 225. la somma delle quali è 795.

Nelle seguenti Domande, oltre alla semplice falsa posizione si richiede l'estrazione di radice, che sarà razionale, e discreta; benchè potrebbe essere ancora irrazionale, come dico nel principio delle doppie false posizioni, ed ivi ne apporto un'esempio di radice irrazionale contro il detto dal Forestani.

37. D. Un Mercante ha venduto cera à tanti bajocchi la libbra, quante erano la quarta parte di tutte le libbre vendute, le quali ha venduto per bajocchi 3136. Si domanda quante libbre siano state, ed il prezzo della libbra?

R. Si ponga, che siano state libbre 8. à bajocchi 2. la libbra, quarta parte di 8. valerebbero bajocchi 16. e si disse, che valevano bajocchi 3136. Dunque la posizione fù falsa. Per 16. si partono 3136. ne viene 196. del quale si cava la radice quadrata 14. che si moltiplica per lib. 8. vengono lib. 112. e si moltiplica per bajocchi 2. e vengono bajocchi 28. e tanti si pagò la lib. delle 112. Si prova moltiplicando lib. 112. per bajocc. 28. vengono bajocchi 3136. quanti si disse costare, e 28. è la quarta parte di 112. &c.

38. D. Uno ha comprato canne 48. di Panno, per tanti Scudi, quante canne averebbe comprato per Sc. 588. Domando quanti Scudi abbia speso nella Canna.

R. Si ponga, che abbia speso Sc. 2. nella Canna. Canne 48. vagliono Sc. 96. Ora si veda se con Sc. 688. si hanno oanne 96. al medesimo prezzo, dicendo: Se con Sc. 2. si ha una Canna, quante con Sc. 588? e vengono canne 294. dunque si è errato; Per il che si partono 294. per 96. dal quoziente  $3\frac{1}{3}$ . si cava la radice quadrata che è  $1\frac{1}{3}$ . che si moltiplica per Sc. 2. posti da principio, e vengono Sc.  $3\frac{2}{3}$ . e tanti ne spese nella canna. Si prova moltiplicando canne 48. per Sc.  $3\frac{2}{3}$ . vengono Sc. 168. e tante canne si hanno con Sc. 588. partendo questi per Sc.  $3\frac{2}{3}$ . come è manifesto.

In altro modo si può operare, moltiplicando 588. per 48. dal prodotto 28224. si cava la radice quadra, che è 168. per li Scudi di canne 48. e per le canne di Scudi 588. onde partendo 168. per 48. ovvero 588. per 168. verranno Sc.  $3\frac{2}{3}$ . prezzo della canna.

39. D. Trè hanno una quantità di lire; Il primo ne hà il doppio del secondo; Il secondo il doppio del terzo, e ciascuno moltiplicando le sue lire in se stesse, la somma de prodotti è 525. Si domanda quante lire aveva ciascuno?


R. Si ponga, che il primo abbia  $\text{lit. } 4$ , il secondo  $\text{lit. } 2$ , il terzo  $\text{lit. } 1$ . li loro quadrati  $16$ ,  $4$ , ed  $1$ , sommati fanno  $21$ , e dovevano essere  $525$ . queste si partono per  $21$ , e viene  $25$ , del quale la radice quadra  $5$ , è il numero, col quale si moltiplicano  $\text{lit. } 4$ , del primo;  $\text{lit. } 2$ , del secondo, e  $\text{lit. } 1$ , del terzo, e vengono lire  $20$ ,  $10$ , e  $5$ . per li veri numeri cercati, delli quali li quadrati sommati fanno  $525$ .

40. D. Un Signore hà lasciato à quattro luoghi più: al primo  $\frac{7}{12}$ , al secondo  $\frac{5}{12}$ , al terzo  $\frac{1}{12}$ , de suoi Scudi; ed al quarto il resto. Si domanda quanti Scudi ha lasciato, sapendosi che il prodotto delli Scudi del primo via gli Scudi del secondo, e via gli Scudi del terzo luogo pio essere  $1234800$ .

R. Perchè intervengono due moltiplicazioni si doverà cavare la radice cuba. Si supponga: bbia lasciato  $\text{Sc. } 60$ . numero, che hà le dette parti  $\frac{7}{12}$ ,  $20$ ,  $\frac{5}{12}$ ,  $15$ ,  $\frac{1}{12}$ ,  $12$ . Il prodotto di  $20$ , via  $15$ , fa  $300$ , e questo via  $12$ , fa  $3600$ , e dovevano essere  $1234800$ . questo si parte per  $3600$ , viene  $343$ , del quale la radice cuba, è  $7$ : col quale numero  $7$ , si moltiplica  $60$ , vengono  $\text{Sc. } 420$ . lasciati, si moltiplica  $20$ , vengono  $\text{Sc. } 140$ . del primo, si moltiplica  $15$ , vengono  $\text{Sc. } 105$ . del secondo: si moltiplica  $12$ , vengono  $\text{Sc. } 84$ . del terzo, li quali Scudi  $140$ ,  $105$ , e  $84$ , sommati fanno  $\text{Sc. } 329$ , che sottratti da  $\text{Sc. } 420$ , restano  $\text{Sc. } 91$ . del quarto luogo pio.

Se nel quesito si fusse detto, che il prodotto delli Scudi del primo via quelli del secondo, e via quelli del terzo, e via quelli del quarto fusse  $112366800$ . allora per esserci trè moltiplicazioni si caverebbe la radice quadrata quadrata dal quoziente, che viene dal partire  $112366800$ . perchè moltiplicando  $20$ , via  $15$ , fa  $300$ , e questo via  $12$ , fa  $3600$ , e questo via  $13$ , del quarto fino in  $60$ , fa  $46800$ . per il quale si parte  $112366800$ . e ne viene  $2401$ , di cui la radice quadrata quadrata  $7$ . per il quale numero si moltiplica  $60$ ,  $20$ ,  $15$ ,  $12$ , e  $13$ , e verranno li Scudi come sopra, &c.

41. D. E' un Triangolo rettangolo A B C.  $22\frac{1}{2}$   
L'ipotenusa A C è  $22\frac{1}{2}$ , e li lati continenti A  
l'angolo retto sono in ragione sesquiterza.  
Si domanda la quantità di questi lati A B. B  
e B C.




R. Sia il lato B C.  $4$ , ed A B.  $3$ , acciò fiano nella ragione detta, si quadra  $4$ , fa  $16$ , si quadra  $3$ , fa  $9$ , la somma de' quadrati  $25$ .  
dove-



doverebbe essere uguale a  $506\frac{1}{2}$ . quadrato di  $22\frac{1}{2}$ . per la penultima del primo d'Euclide; però si parte  $506\frac{1}{2}$ . per 25. viene  $20\frac{1}{5}$ . del quale si cava la radice quadrata, che è  $4\frac{1}{5}$ . con questo si moltiplicano 4. e 3. e vengono 18. per il lato B C. e  $17\frac{1}{5}$ . per il lato A B.

42. D. E' un Rettangolo A B C D. la di cui lunghezza A C. è quintupla alla larghezza A B. e la superficie è decupla alla somma de' lati A C. A B. Si domanda la quantità de' medesimi lati.



R. A C. sia 20. ed A B. 4. e così sono in proporzione quintupla; la superficie è 80. fatta dalla moltiplicazione di 20. via 4. il quale 80. si parte per 24. somma de' lati, e viene  $3\frac{1}{3}$ . e doveva venire 10. acciò la superficie fusse decupla alla somma de' lati; perciò si dice: Se  $3\frac{1}{3}$ . viene da 4. larghezza, da che verrà 10? e verrà da 12. quantità della larghezza A B. che si moltiplica per 5. fa 60. lunghezza A C. e moltiplicando 12. via 60. si averà la superficie 720. decupla a 72. somma de' lati 60. e 12.

43. D. Una figura detta Rombo è di superficie 216. braccia, li suoi diametri sono in proporzione sesquiterza. Si domanda la quantità delli diametri, e del lato?

R. Sia il minor diametro 3. il maggiore 4. e perchè moltiplicandola metà di uno, via tutto l'altro diametro viene la superficie; Si moltiplica 3. via 2. fa 6. e doveva essere 216. che si parte per 6. viene 36. per la di cui radice quadrata 6. si moltiplica 3. e 4. diametri posti, e vengono 18. e 24. diametri veri. Per trovare il lato si moltiplica 9. metà di 18. in se fa 81. e 12. metà di 24. in se fa 144. somma 144. e 81. fa 225. la radice quadra di 225. è 15. per la quantità del lato per la penultima del primo d'Euclide.



44. D. Vi è una Lavasca, che ha tre Cannelle, ed essendo vota e buttando la prima Cannelle, si empie in ora  $1\frac{1}{2}$ . essendo però chiusa l'altra; e buttando la seconda si empie in ora  $1\frac{1}{2}$ . e buttando la terza si empie in ore  $2\frac{1}{2}$ . All'incontro ha tre Condotti, per li quali va via l'acqua, onde essendo la Lavasca piena, e non buttando le Cannelle, si vota per il primo condotto in ore  $2\frac{1}{2}$ . per il secondo in ore  $4\frac{1}{2}$ . e per il terzo in ore  $5\frac{1}{2}$ . separatamente. Domando, essendo la Lavasca vota; ed essendo aperte tre Cannelle, e li tre Condotti in quanto tempo la Lavasca resterà piena?

R. Questo quesito mi fu proposto al contrario nel mese di mar. 1713. per il che risposi, che in nessun tempo si farebbe piena; ma proposto come sopra, si supponga, che si empia in ore  $5\frac{1}{2}$ . La prima cannella in ora  $1\frac{1}{2}$ . empirà Lavasche  $4\frac{1}{2}$ . La seconda in ora  $1\frac{1}{2}$ . Lavasche  $4\frac{1}{2}$ . e la terza Lavasche  $2\frac{1}{2}$ . in ore  $2\frac{1}{2}$ . In tutto Lavasche  $11\frac{1}{2}$ . Dipoi: in ore  $5\frac{1}{2}$  il primo Condotto vota Lavasche  $2\frac{1}{2}$ . Il secondo  $1\frac{1}{2}$ . e il terzo 1. In tutto Lavasche  $4\frac{1}{2}$ . si sottrino queste da Lavasche  $11\frac{1}{2}$ . restano Lavasche  $6\frac{1}{2}$ . piene, e se ne voleva 1. per questo si dica: Se in ore  $5\frac{1}{2}$ . restano piene Lavasche  $6\frac{1}{2}$ . in quanto tempo resterà piena una Lavasca? e risulterà  $\frac{2}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}$ . d'ora, ed in tal tempo si averà piena la Lavasca, perchè nel detto tempo le Cannelle empiranno Lavasca  $1\frac{2}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}$ . e li Condotti voteranno  $\frac{2}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}$ . sicchè resta una Lavasca piena.

45. D. Uno ha partito per 125. e poi per 126. una quantità di scudi, dal primo partire è avanzato 84. dal secondo 57. Si domanda il numero partito degli scudi?

R. Per trovare il numero degli Scudi, si moltiplica il primo avanzo 84. via il secondo partitore 126. il prodotto 10584. si serba. Dipoi si moltiplica il primo partitore 125. in se, cioè per 125. il quadrato 15625. si moltiplica per il secondo avanzo 57. al prodotto 890625. si aggiunge 10584. numero serbato, la somma 901209. si parte per 15750. prodotto di 125 via 126. partitori, l'avanzo 3459. è il numero partito de' Scudi.

Questo è il modo di trovare, che numero un'altro abbia scritto, o pensato pur che quello sappia partire, perchè gli fa partire per due numeri immediati, che differiscono nell'unità, li quali numeri moltiplicati devono nel prodotto superare il numero scritto, o pensato, e si fanno dire gl'avanzi, e si opera come si è detto. Alle volte ci è un'avanzo solo, come negl'esempj seguenti e l'operazione è più breve.

Uno ha scritto segretamente 84. il quale sapendosi, che è di due figure, facciasi partire per 12. l'avanzo è zero. Di nuovo per 13. l'avanzo è 6. per il quale si moltiplica 144. quadrato di 12. primo partitore, il prodotto 864. si parte per 156. prodotto di 12. via 13. e l'avanzo è 84. numero cercato.

Di nuovo si faccia partire per 11. l'avanzo è 7. il quale si moltiplica per 12. secondo partitore, fa 84. che si serba, ma facendosi partire per 12. avanza zero, che però 84. il numero sarà scritto, che si voleva sapere.

46. D. Come si trova in altro modo un numero segreto, che non passi 99.

R. Tal

R. Tal numero si fa partire per 3. con farsi dir l'avanzo, e per ogni 1. di avanzo si nota 70. Di nuovo si fa partire per 5. e si fa dire l'avanzo, e per ogni 1. di avanzo si nota 21. finalmente si fa partire per 7. e si fa dire l'avanzo, e per ogni 1. di avanzo si nota 15. si sommano i numeri notati, dalla somma, potendosi, si levano le centinaia, e di più per ogni cento si leva 5. e il numero, che resta è il cercato.

Sia il numero incognito 32. partito per 3. l'avanzo è 2. per il quale si nota 70. due volte, cioè 140. partito per 5. l'avanzo è pure 2. per il quale si nota 21. due volte, cioè 42. finalmente partito per 7. l'avanzo è 4. per il quale si nota 15. quattro volte, cioè 60. Si sommano 140. 42. e 60. dalla somma 242. si levano 200. e 10. cioè 5. per centinaio resta 32. numero cercato. Ma se la somma sarà meno di cento, essa sarà il numero che si cerca. Per esempio partito il numero per 3. avanza 1. e si nota 70. per 5. avanza 0. e per 7. avanza 1. e si nota 15. la somma di 70. e 15. è 85. num. incognito.

4. D. Come in altro modo si trova un numero per esempio di giulj, che Carlo abbia in borsa.

R. Si fanno moltiplicare a Carlo segretamente li giulj per 3. sieno 21. vengono 63. che si fanno partire per 2. e si domanda se ci è rotto dicendo di sì, gli faccia fare insieto, e faranno 32. per questo primo rotto si tiene a mente 1. di nuovo faccia moltiplicare per 3. fanno 96. e non faccia pigliare la metà, o partire per 2. vengono 48. e saputo, che non ci è rotto, il quale se ci fosse, per esso si terrebbe a mente 2. Ora con industria cerchi di sapere quante volte entrà il 9. in 48. incognito facendogli spendere diverse quantità di giulj, fin che non ne possa più spendere, e da quelle quantità arguirà entrare il 9. in detto numero 5. volte, per regola ferma si moltiplichino 5. per 4. fa 20. aggiunto 1. per il rotto tenuto a mente, risultano giulj 21. che Carlo ha in borsa.

48. D. Uno dice, ho comprato ova 18. per alquanti bajocchi, ora volendone comprare per altri e tanti giulj quante ova comprerò?

R. Si moltiplichino ova 18. per 20. perchè il giulio tanti bajocchi vale, e si hanno ova 180. che comprerà. Si prova supponendo, che abbia comprato ova 18. a che prezzo uno vuole, per esempio a bajocchi 9. comprandone per 9. giulj; si averanno ova 180. come si è detto. Ma se ne avesse voluto comprare per altri e tanti carlini, l'ova 18. si farebbero moltiplicate per  $7\frac{1}{2}$  che tanti bajocchi costa il carlino, e farebbero venute ova 135.

49. D. Uno vuole ordinare 15. grossi, e 15. quattrini sopra una Tavola, che contandogli in giro per 9. levi tutti li grossi, e lasci i quattrini: Si domanda come gl'ordinerà?

R. Sap-

R. Sappia à mente questo verso: *Populeam virgam mater Regina ferebat*; di più sappia, che le lettere vocali importano il numero secondo il loro ordine; A 1. E 2. I. 3. O. 4. V. 5. Ora per la parola *Populeam*, prima metta in fila 4. quattrini, dipoi 5. grossi, due quattrini, ed un grosso: per la parola *Virgam* metta 3. quattrini: stante che l' V. ha ragione di consonante, ed 1. grosso; e così segua con l'altre parole ponendo dette monete alternatamente, e l'avrà ordinate, che contandole à 9. à 9. in giro leverà li grossi, lasciando i quattrini in Tavola.

Mà chi gli volesse contare à 10. à 10. ordini le monete, secondo le Vocali di queste parole: *Rex Anglicus certe bona flamina dederat*. E leverà quelle d'una sorte, lasciando l'altra.

50. D. Sopra un Tavolino del ginoco della Dama ci sono Pedine 12. bianche, e 12. nere. Domando come si ordineranno in fila, che contandosi ad un medesimo numero si levino tutte le nere, lasciando le bianche?

R. Si pongono tutte le pedine in fila come vengono, e si comincia à contare da capo 1. 2. 3. &c. per qual numero uno vuole, sia per 9. ordinatamente, e la pedina nominata per 9. si contrasegna con poca carta d'altro, e si ricomincia à contare la seguente pedina con 1. &c. e la nominata per 9. si contrasegna, e nel seguitare à contare, avvertasi di lasciare le pedine contrasegnate, e si seguita à contare, fino che 12. pedine sieno contrasegnate; ed allora nelle contrasegnate bianche si ponga le nere, mettendo le contrasegnate bianche ne' medesimi luoghi delle nere, e faranno ordinate, che contandole à 9. à 9. si leveranno tutte le nere. Questo è modo generale. Le vocali si contengono in queste vocali. A me ogni arme irascita; E per contare à 7. à 7. si contengono in queste altre: *Ille amabat, & peribat restioni arma*.

51. D. Pietro, e Giovanni hanno vinto à Carlo Sc. 50. Domando quanti ne ha vinti Pietro, e quanti Giovanni?

R. Per saperlo, si fanno moltiplicare à Pietro li suoi Sc. vinti per 2. ed à Giovanni per 50. e gli si fanno sommare i prodotti, e la somma levare da 2550. prodotto di 50. via 51. il restato numero si fa dire, il quale si parte per 49. meno 1. di 50. il quoziente 14. sono li 93. Vinti da Pietro, e l'avanzo 36. li Sc. vinti da Giovanni. Se ne faccia prova, che sarà giusta. Così si opera rispettivamente con altri numeri.

52. D. Un Padre ha pigliare à tre Figliuoli in tutta Sc. 50. Domando avendo pigliato ciascuno diversa quantità di Sc, quanti ne abbia pigliati il primò, secondo, e terzo figliuolo.

R. Si

R. Si facciano moltiplicare li Sc. del primo per 49. del terzo per 2. benchè si può variare ordine facciano sommare, e la somma devari da 2500. p. 50. e sapeto il restato numero 496, si parte per risultano 10. Sc. del terzo, che moltiplicò per 2. Sc. del secondo, che moltiplicò per 49. e Sc. 24. primo. Si può proporre ancora così.

53. D. Un Maestro ha fatto moltiplicare trè numeri la somma era 120. à trè Scuolari; al primo per 119. al terzo per 120. la somma de' prodotti è f. temi li trè diversi numeri?

R. Si moltiplica 120. via 120. somma de trè num. 14400. si sottra 6692. somma de prodotti resta per 118. meno 2. di 120. il quoziente 65. è il numero, l'avanzo 38. è il numero dato al secondo, è il numero dato al terzo.

53. D. Come si trovano due carte da un altro ima

R. Si dispongono sopra una Tavola 30. carte da g. due a piacere, e se ne fanno imaginare due acco sono da qualche d'uno. Dipoi si raccolgono in u done sotto, e sopra, purchè non si discompagnin carte si pongono già ad una ad una con quell'ordine che rap-  

1	3
2	11
4	12
6	14
8	16
10	18

presentano i numeri in queste  
 quadrilatero di 5. file con 6.  
 carte per fila. Fatto questo si  
 domanda in qual fila delle cin-  
 que riconosce le carte imagnate; se dice nella  
 prima, e seconda; se dice nella seconda, è la sec  
 se dice nella terza, è la terza, e quarta; se dice n  
 quarta, e quinta; e se dice nella quinta, è la quin  
 dice, che una carta è nella prima, e l'altra nell  
 lora si muta ed è la prima della quinta, ed è la se  
 sempre 1. di più, della prima fila: Pure se dice  
 seconda, e l'altra nella quarta fila, si muta, ed è  
 la quarta, e la quinta, cioè 1. di più, della  
 dell'altre.

55. D. Un Maestro interrogato quanti siano gli suc  
 spese più di 100. e meno di 200. e numerandogli  
 za 1. numerandogli à 3. à 3. n'avanzano s.e à 4.  
 3. è à 5. à 5. n'avanzano 4. e à 6. à 6. n'avanzano  
 merandogli à 7. à 7. non ne avanza alcuno. Si  
 Scuolari erano?

R. Altri propògono simile questo in altre materie indeterminatamente, ed allora si possono dare moltissime risposte, ed il Tartaglia dice al numero 150. del libro 16. non darli regola: Tuttavia può essere questa accennata dal Galigai al numero 26. lib. 9. si pigliano numeri partiti per 2. per 3. per 4. per 5. e per 6. il primo è 60. e i suoi multipli sono 120. 180. 240. 300. 360. 420. 480. 540. &c. e di questi si trovi quello, che Partito per 7. avanzi 1. Ora de' proposti ci sono due, 120. e 540. da' quali si leva 1. e restano 119. e 539. numeri, che hanno le dette condizioni, e 119 sono gli Scolari, più di 100. e meno di 200. si possono trovare altri numeri con le medesime condizioni, con moltiplicare 120. per 8. che è 1. più di 7. dal prodotto 960. levando 1. resta 959. con le medesime condizioni, e di nuovo moltiplicando 960. per 8. fa 7680. dal quale si leva 1. resta 7679. medesimamente moltiplicando l'altro numero 540. per 8. fa 4320. dal quale levando 1. resta 4319. con le medesime condizioni. Per li quali numeri si possono proporre diversi quesiti determinati ad una sola risposta.

56. D. Sono Ova in un Cesto, che contate à 2. à 2. ne avanza 1. contate à 3. à 3. ne avanza 1. contate à 4. à 4. ne avanza 1. e contate à 5. à 5. avanza 0. Si domanda quante siano le Ova del Cesto?

R. Il Tartaglia num. 147. del lib. 16. dice che si pigliano numeri numerati da 2. da 3. e da 4. come sono 12. 24. 36. 48. 60. 72. e 84. e di questi si pigli quello, che partito per 5. avanzi 4. e di tutti questi non se ne trova salvo, che uno, dice lui, cioè 84. al quale aggiunto 1. per regola ferma fa 85. che ha le condizioni dette, e tante Ova sono nel Cesto. Tuttavia se il Tartaglia osservava bene, vedeva, e conosceva, che 24. partito per 5. aveva d'avanzo 4. onde aggiunto 1. à 24. fa 25. e tante si poteva dire fussero le Ova del Cesto. Volendo trovare altri numeri con le medesime condizioni si moltiplicano 24. e 84. per 6. più 1. di 5. e si hanno 144. e 504. e di nuovo questi prodotti per 6. si averanno altri, ed aggiunto 1. a' detti numeri fanno 145. e 505. con le medesime condizioni: così si troveranno altri con moltiplicare 12. per 7. per 17. per 27. e per altri numeri terminati in 7. aggiungendo 1. a i prodotti, e si averanno 85. 205. 325. &c.

57. D. Uno tiene in due Casse quantità di Scudi, in una di esse sono Scudi 5038. più che nell'altra, ed avendo contato li Scudi d'una à 2. à 2. trovò avanzare 1. à 3. à 3. 2. à 4. à 4. 3. à 5. à 5. 4. à 6. à 6. 5. à 7. à 7. 6. à 8. à 8. 7. à 9. à 9. 8. à 10. à 10. 9. ed à 11. à 11. avanza nulla. Medesimamente avendo contato gli Scudi dell'altra Cassa à 2. à 2. trovò avanzare 1. à 3. à 3. 1. à 4. à 4. 1. e così  
fino

## 02.5

R. Per soddisfare alla domanda, si trova un numero, che abbia queste  
intiere parti  $\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \frac{1}{6}, \frac{1}{7}, \frac{1}{8}, \frac{1}{9}, \frac{1}{10}$ . e che partito per 11, avanzi 1.  
il minimo si troverà essere 2520. e non 7560. (nel che erra il Tar-  
taglia lib. 15. cap. 248. num. 149.) che ha tali condizioni, dal  
quale si levi 1. resta 2519. Sc. della prima Cassa. Nel secondo ca-  
so si deve trovare un numero, che abbia quelle parti intiere, e  
che partito per 11, avanzi 10. perchè allora aggiunto 1. si averà  
un numero, che partito per 2. per 3. per 4. &c. sempre avanzerà 1.  
e partito per 11. avanzerà 0. Il minimo è il medesimo 2520. ma  
partito per 11. avanza 1. e doveva avanzare 10. acciò avanzi si  
moltiplica 2520. per 10. fa 25200. al quale si aggiunge 1. fa  
25201. numero degli Sc. della seconda Cassa. Tuttavia la diffe-  
renza non è di Sc. 5083. ma molto maggiore; onde bisogna ac-  
crescere il primo numero 2519. Si moltiplica 2520. per 12. cioè  
per 1. più che 11. e verrà 30240. dal quale levato 1. resta 30239.  
per li Sc. della prima Cassa; della seconda 25201. che hanno le  
condizioni dette, e differiscono in 4038. &c.

## DISTINZIONE SECONDA.

### *Della doppia falsa Posizione.*

**A** Vendo à bastanza trattato della semplice, ora tratterò della doppia falsa Posizione, che è la seconda parte della regola del Cataim, parola Araba, che significa Ipotesi falsa. Per la quale si sciolgono tutti i quesiti, che si sciolgono per la semplice, ma moltissimi, che si sciolgono per la doppia non si possono sciorre per la semplice, eccettuati alcuni, ne quali si usa alcuna industria, come hò detto nella Domanda 21. e seguenti, e nella Domanda 15. del Trattato passato si è sciolto il quesito di Pietro Borgo, posto dal Tartaglia condotto à fine di conclusione con sei false posizioni prolissamente nel lib. 17. questo 21. con una semplice posizione fatta industriosamente, ed altri simili.

» Dice il Forestani: Quelle proposizioni, che portano con loro qua-  
» drature, ovvero radici irrazionali non sono solubili per doppia  
» falsa posizione; quantunque Fra Luca da Borgo dica, che con  
» difficoltà grande si solverebbero, la qual cosa è impossibile; per-  
» ciò che se la vera soluzione della cosa deve esser: per liata irra-  
» zionale, e per questa regola non si può dar, se non per liata ra-

**K k k k**

„ zion2-

zionale ( atteso che sempre il numero di quella posizione, che si  
 fa, è razionale) ne segue, che per tale regola non si possono solve-  
 re simili proposte di quadrature, o cube irrazionali: Sino qui il  
 Forestani, del quale non trovo essere vero quello, che dice di F. Lu-  
 ca da Borgo, essendo le parole di F. Luca le seguenti nel fine di tal  
 regola à carte 106. E finalmente tutte le questioni mercantilesche  
 al traffico commune pertinenti per il Cataino sono solubili, ma-  
 fime quelle dove non s' interpone alcuna radice, ne anche altra  
 quadratura, le quali quando così fosse, con difficoltà per il Catai-  
 no si solverebbero; come per un particolar caso sopra di ciò in  
 quest'opera spero chiarire. Il perchè le quadrature con tanta dif-  
 ficoltà per il Cataino si solvano: come per la tavola lo ritroverai.  
 Ecco che F. Luca non parla di proposte, dove intervengano radi-  
 ci, e quadrature irrazionali; ma quadrature, e radici assolutamente,  
 per le quali Gemma Frisio ha trovato modo di servirsi della  
 semplice, e doppia falsa posizione nei quesiti, dove intervengono  
 estrazioni di qualsivisia radice quadra, cuba, censicensa, relata &c.  
 come si è detto nella semplice, e si dirà nella doppia falsa posizio-  
 ne con alcuni esempi à suo luogo. Ma forse il Forestani non ha  
 letto Gemma Frisio, ne Michele Stifelio, che lo cita, e F. Luca  
 non aveva trovato modo facile per condurre à fine tali quesiti, e  
 del suo particolar caso, che accenna, non hò trovato vestigio  
 nella sua Opera. In quanto all'asserire il Forestani essere impossi-  
 bile la soluzione di quelle proposizioni, che portano con loro qua-  
 drature, e radici irrazionali per doppia falsa posizione, se ciò  
 universalmente si verifichi lo giudichi il lettore; mentre, che Gem-  
 ma Frisio avendo accompagnato à tal regola, anzi alla semplice  
 posizione proposizioni, che possono ricercare qualsivisia radice ra-  
 zionale quadra, cuba, censicensa, relata &c. non sò vedere im-  
 possibilità, che tal radice non possa essere irrazionale; Anzi per  
 lo più sarà tale, se l'operante a bello studio non piglierà numeri,  
 che diano radice razionale; e così ha fatto Gemma Frisio, e lo  
 Stifelio, scassando radici irrazionali, e sforde. Qui porta la pro-  
 posizione di Gemma Frisio carte 54. risolta per semplice posi-  
 zione con l'estrazione di radice quadra razionale, e discreta ed  
 è questa. Proposto un quadrato di piedi 154. di superficie voglio  
 per regola d'Archimede far un circolo à quello uguale; Domando  
 quanti piedi deve essere il diametro di tal circolo? Pon: e sugi-  
 sta di piedi 7. dunque secondo Archimede, la circonferenza sarà  
 di piedi 22. e il circolo sarà di superficie piedi  $38\frac{1}{2}$ . e dovevano  
 essere piedi 154. questi si partono per  $38\frac{1}{2}$ . vengono 4. delli quali  
 la radice 2. si moltiplica per 7. Piedi di supposto diametro, e  
 vengono



427

vengono piedi 14: per il diametro del circolo, che si voleva. Ora se si fusse proposto un quadrato di piedi 231. di superficie, partendosi per  $38\frac{1}{2}$ . fariam venuti 6. che non ha radice quadra discreta. Onde in simil caso si riducono piedi 7. di diametro supposti a radice, sono 49. li quali si moltiplicano per 6. fanno 294. è la radice di questi è il diametro, la quale non è razionale; dunque si può dare vera soluzione per linea irrazionale e, benchè il numero della posizione, come qui di piedi 7. sia razionale; che è contro la ragione del Forestani apportata per impossibilità.

1. D. In che consiste la regola di doppia falsa posizione.

R. Consiste in questo: Proposto qualche quesito da sciogliersi per questa regola, si suppone un tal determinato numero sciorre il quesito; ma esaminato a tenore di esso, si trova essersi errato in più, ovvero in meno, il quale primo errore si nota; e si è fatta la prima posizione: Di nuovo si suppone un altro numero differente dal primo sciorre il quesito; ma esaminato a tenore del medesimo si trova essersi errato in più, ovvero in meno, il quale errore si nota, e si è fatta la seconda posizione. Le quali due false posizioni averanno errato tutte due in più, ovvero in meno del numero cercato, ovvero una averà errato in più, e l'altro in meno dal che nascono tre modi, che di sono più, e più; ovvero meno, e meno si sottra, più, e meno, ovvero meno, e più, che è l'istesso si somma.

2. D. Fatte le due posizioni, e trovati i due errori, che si deve fare?

R. Per due modi si può procedere a trovare il vero numero. Il primo più intelligibile è per regola del Trè costituita così; in primo luogo il numero differenza degli errori, se sono uniformi, cioè tutti due più, o tutti due meno, nel secondo luogo il numero differenza delle posizioni, e nel terzo luogo il numero, che dimostra il primo, o secondo errore. Si opera per secondo tal regola; e il numero, che viene, si sottra dal numero della prima, o seconda posizione conforme l'errore primo, o secondo posto nel terzo luogo della regola del Trè se gli errori sono di più; ma se sono di meno il numero, che viene si aggiunge, e verrà il vero numero cercato.

3. D. Ma se un errore sarà di più, e l'altro di meno, come si costituirà la regola del Trè?

R. Avendo detto che più, e meno, ovvero meno, e più si somma, si sommano gli errori; e la somma sarà il numero in primo luogo; adesso gli altri numeri, come si è detto, cioè nel secondo luogo il numero differenza delle posizioni, nel terzo il numero, che dimostra il primo, o secondo errore. Si opera secondo la regola, il numero, che risulta; si somma col numero della posizione.

K k k k 2

se l'errore

fe l'errore sarà di meno, ma se di più si sottra dal numero della posizione ò prima, ò seconda conforme l'errore ò primo, ò secondo, e si averà il numero vero cercato.

4. D. Quale è il secondo modo di procedere a trovare il vero numero, che scioglie il quesito?

R. Il secondo modo è questo: Quando tutte due le posizioni errano in più, ovvero tutte due in meno, si sottra il minore errore dal maggiore, la differenza è il numero partitore. Si moltiplica il numero della prima posizione via il numero del secondo errore, ed in croce si moltiplica il numero della seconda posizione via il numero del primo errore, il minore prodotto si sottra dal prodotto maggiore, il numero restato si parte per la differenza degli errori, che si è detto esser numero partitore, e il quoziente è il vero numero cercato: Ma se una posizione errerà in più, e l'altra in meno, gli errori si sommano, la somma è il numero partitore. Medesimamente i prodotti per le moltiplicazioni delle posizioni in croce via gli errori, si sommano, la somma si parte per il detto partitore, il quoziente è il vero numero cercato.

5. D. Come si dichiarano tali modi della regola di doppia falsa posizione in questo esempio facile? cioè: Uno ha speso bajocchi 36. in libbre 3. di bambagia, si vuole sapere quanti bajocchi abbia speso in una libbra?

R. Per questa domanda si hà da trovare un numero, che moltiplicato per 3. faccia 36. il quale facilmente si trova col partire 36. per 3. e sarà 12. quanti bajocchi costa la libbra della bambagia, il quale 12. moltiplicato per 3. fa 36. come si voleva. Ma volendo trovare detto 12. per regola di doppia falsa posizione per dichiarare facilmente i modi dati d'operare con sue ragioni pratiche, per la 1. D. di questo si pone, che sia un numero a beneplacito dell'operante cioè 4. A, che si segna dalla parte sinistra di sopra, d'una croce, il quale 4. si esamina con moltiplicarlo per 3. fa 12. che è meno 24. di 36. il quale 24. B primo errore si segna sotto la croce dalla medesima parte, con segnare in mezzo M, che dice meno; dunque per 4. meno 24. si pone per seconda posizione altro numero differente dal primo, sia 10. C, che moltiplicato per 3. fa 30. che è meno 6. D. secondo errore di 36. si segna 10. C. con sotto 6. D. dalla parte destra della croce, in mezzo si segna M, che dice meno. Dunque per 10. meno 6.

Fatte le due posizioni con tutti due gli errori di meno, si sottra il minore errore 6. D dal maggiore 24. B resta 18. E differenza degli errori: Ancora si sottra la minor posizione 4. A dalla maggiore 10. C. resta 6. F differenza delle posizioni.

Adesso

Adeſſo ſi procede alla regola del Trè, come ſi è detto nella ſeconda R. per trovare il numero , che di meno ſi è poſto nella prima , o ſeconda poſizione dal vero numero 12: che ſi cerca, e confequentemente per trovare il medefimo num 12. ponendo in primo luogo la differenza degl'errori 18. B, in ſecondo luogo la differenza delle poſizioni 6. F, e in terzo luogo 24. B primo errore . Si moltiplica , come vuole la regola del Trè , 6. via 24. fa 144. il quale ſi parte per 18 ne viene 8. G, che ſi pone ſopra la prima poſizione 4. A. de' quali la ſomma 12. è il numero cercato . Ma ponendo in terzo luogo della regola del Trè , 6. D ſecondo errore , e moltiplicando 6. via 6. fa 36. il quale ſi parte per 18. come prima , viene 2. H. che ſi pone ſopra 10. C ſeconda poſitione , de' quali la ſomma 12. è il numero cercato . Si veda la prima Intavolatura.

Nel medefimo modo ſi opera quando le poſizioni danno errore di più, con ſolo di vario, che il numero che riſulta da ciaſcuna regola del Trè ſi leva dal numero di ciaſcuna poſitione ; e così il 3. ſi leva dal 15. e il 2. dal 14. e reſta 12. numero cercato . Si veda la ſeconda Intavolatura .

Ma quando i numeri degl'errori non ſono uniformi , ed uno è più , e l'altro meno , i numeri degl'errori ſi ſommano

Prima Intavolatura . Seconda Intavolatura . Terza Intavolatura .

8 G F	2 H	3 G F	2 H	5 G F	1 H
4 A 6	10 C	15 A 1	14 C	7 A 6	13 C
M X M		P X P		M X P	
24 B 18	6 D	9 B 3	6 D	15 B 18	3 D
E		E		E	

Se 18 -- 6 -- 24 8 G | Se 18 -- 6 -- 6 2 H | Se 3 -- 1 -- 9 3 G  
Se 3 -- 1 -- 6 2 H | Se 18 -- 6 -- 15 5 G | Se 18 -- 6 -- 3 1 H

La ſomma farà il numero in primo luogo della Regola del Trè , la differenza delle poſitioni in ſecondo, l'errore in terzo come 3 nell'altre : avvertendo , che ſe l'errore farà di meno , il numero che viene dall'operazione ſ'aggiungerà al numero della poſitione ; ſe di più , ſi ſottra da eſſo , e ſi averà il vero numero , e così 3. ſi aggiunge al 7. ed 1. ſi ſottra di 13. e ſi averà 12. numero cercato . Si veda la terza intavolatura con ſotto le Regole del Trè .

6.D. Qual è la ragione di diſporre i numeri della Regola del Trè in detto modo per trovare il numero differenziale dal numero della poſitione al numero vero, e confequentemente per trovare il medefimo vero numero ?

R. La ragione proſſima è perche ſempre la differenza degl'errori uniformi-

formidi più, ovvero di meno, dice la medesima proporzione, che dice l'errore, o primo o secondo al numero differenziale dal numero della posizione o prima, o seconda al numero vero cercato, come si può osservare nella prima Intavolatura, dove la differenza 18. E. dice la medesima proporzione tripla a 6. F differenza delle posizioni, che dice 24. B primo errore ad 8 G numero differenziale dal numero 4. della prima posizione al numero vero 12. cercato. Ovvero che dice 6. D. secondo errore al num. 2. H numero differenziale da num. 10. della seconda posizione al medesimo num. 12. Pure il medesimo succede nella seconda Intavolatura dove 3. E. dice la medesima proporzione tripla ad 1. F, che 9. B a 3. G ovvero che 6. D a 2. H. Quando gl'errori non sono conformi, ma uno è più, l'altro meno; allora la somma de numeri di tali errori. cioè 18. E dice la medesima proporzione tripla a 6 F differenza degl'errori, che 15. B. a 5. G. ovvero che 3. D ad 1. H. come si può osservare nella terza Intavolatura passata. E' da notarsi che variandosi posizione con qualsivoglia numero sempre viene proporzione tripla tra detti numeri; così succederà in altri esempj di quesiti mantenendosi la medesima proporzione qualsiasi.

7. D. Come si opera il secondo modo per trovare il numero 12. detto?

R. Questo modo per lo più si suol' usare per sciogliere i quesiti per essere più spedito, benchè la ragione di tal' operare sia più nascosta. Fatte le posizioni, che tutte due diano errore di meno, perchè meno, e meno si sottra, si leva il minor errore 6. dal maggiore 24. primo errore, la differenza 18. è il partitore. Ora si moltiplica 10. seconda posizione via 24. primo errore, fa 240. e si moltiplica 4. prima posizione in croce via 6. secondo errore fa 24. il quale si sottra da 240. resta 216. che si parte per 18. e vien 12. numero cercato.

Pure così si opera, quando le posizioni hanno dato tutte due errore di più, come nella seconda Intavolatura; si sottra 6. minor errore da 9. maggiore resta 3. partitore. Si moltiplica 14. seconda posizione via 9. primo errore, fa 126. medesimamente si moltiplica in croce 15. prima posizione via 6. secondo errore fa 90. che si sottra da 126. resta 36. da partirsi per 3. partitore detto vien 12. numero cercato.

Ma quando gl'errori non sono conformi, uno è più, l'altro meno, perchè più, e meno si somma nella terza Intavolatura si sommano 15. e 3. errori, fanno 18. partitore. Poi si moltiplica 7. prima posizione via 3. secondo errore, fa 21. ed in croce 13. seconda po-

posizione via 15. primo errore fa 195 che si somma con 21. fa 216. da partirsi per 18. viene 12. numero cercato.

Per più commodità d'operare le Intavolature si fanno differenti dalle passate, le quali si fecero così, acciò si conoscessero meglio i numeri proporzionali; si segna il numero della prima posizione di contro il numero del suo errore primo in mezzo la lettera M. ò P. secondo l'errore di meno, ò di più. Di sotto si pone ordinatamente il numero della seconda posizione, e di contro il numero del suo errore in mezzo la lettera P. ovvero M. secondo che è l'errore; si tirano due linee rette, una dal numero della prima posizione al numero dell'errore secondo, l'altra dal numero della seconda Posizione al numero dell'errore primo formando una croce. Del resto si opera, come si è detto; e qui si vede.

Per 4	X	M 24 - 240	Per 15	X	P 9 - 126	Per 7	X	M 15 - 195
Per 18	X	M 6 - 24	Per 14	X	P 6 - 90	13	X	P 3 - 21
<hr/>			<hr/>			<hr/>		
Per 18 - 116			Per 3 - 36			Per 18 - 216		
<hr/>			<hr/>			<hr/>		
12			12			12		

8.D. Qual'è la ragione, perchè si parte la differenza de prodotti per la differenza degl'errori conformi, ed ancora perchè si parte la somma de prodotti per la somma degl'errori non conformi per trovare il numero, che sciolge il quesito?

R. La ragione prossima è, perchè il numero della differenza degl'errori conformi dice la medesima proporzione ad 1. che dice la differenza de prodotti al numero, che si cerca. Ed ancora la somma degl'errori non conformi dice la medesima proporzione ad 1. che la somma dei prodotti al numero cercato. E così per l'Intavolature sopraposte, nella prima 18. ad 1. dice la medesima proporzione, che 216. à 12. nella seconda 3. ad 1. sta come 36. à 12. nella terza si conviene con la prima stando la somma 18. ad 1. come la somma de prodotti 216. à 12. e per questo non si ricerca, che un semplice partire per trovare il quarto proporzionale, stante che 1. non moltiplica; come costa per la proporzione 19. del 7. d'Euclide.

9.D. Un Signor comprò una Carrozza, un Caleffo, ed un Cavallo: Il Caleffo costò più del Cavallo Sc. 40. e la Carrozza Sc. 30. più del Caleffo, e del Cavallo: Si domanda avendo speso Sc. 450. quanti ne abbia spesi in ciascuna cosa?

R. Si ponga, che il Cavallo costi Sc. 100. il Caleffo costerebbe Sc. 140.

Sc. 140. cioè Sc. 40. più, e la Carrozza costarebbe Sc. 290. cioè Sc. 50. più, che non valsero il Cavallo, e il Caleffo insieme. Si sommano i prezzi, Sc. 100. Sc. 140. e Sc. 290. fanno Sc. 530. e dovevano fare Sc. 450. sottratti questi da quelli restano Sc. 80. più: primo errore. Di nuovo si faccia la seconda posizione di Sc. 90. nel Cavallo, di Sc. 139. nel Caleffo, e di Sc. 270. nella Carrozza, e sommati questi prezzi fanno Sc. 490. dai quali si sottrano Sc. 450. restano Sc. 40. più secondo errore, il quale si sottra da Sc. 80. primo, e maggiore resta Sc. 40. differenza per primo numero della regola del Trè, per secondo numero la differenza delle posizioni, cioè Sc. 10. e si dice se Sc. 40. differenza degl'errori viene da 10. differenza delle posizioni, da qual numero verrà Sc. 80. primo errore? ed operato verrà da 20. il quale si sottra da 100. num. della prima posizione, resta 80. numero cercato, e tanto costò il Cavallo, e perchè il Caleffo costò Sc. 40. più dunque costò Sc. 120. e perchè la Carrozza costò quanto il Cavallo, e Caleffo più Sc. 50. dunque costò Sc. 250. si poteva trovare il prezzo del Caleffo, e della Carrozza per la differenza delle loro posizioni facendo la regola del Trè, come si è trovato il prezzo del Cavallo, ma non era necessario. Se poi nel terzo luogo della regola del Trè si fusse messo Sc. 40. secondo errore, sarebbe venuto dall'operazione Sc. 10. da sottrarsi da Sc. 90. num. della seconda posizione.

12. D. Come si farebbe operato per il secondo modo degl'incrociamenti?

R. Si farebbe sottratto il minore errore Sc. 40. dal maggiore Sc. 80.

Per 100. <del>P 80. — 7200</del>	Per 140. P 80 — 10400
Per 90. <del>P 40. — 4000</del>	Per 139. P 40 — 5600
Per 40. 320.0	Per 40. 480.0
sc. 80.	sc. 120
Per 290. — P 80 — 21600	
Per 270. — P 40 — 11600	
Per 40. — 1000.0	
sc. 250	

la differenza Sc. 40. sarebbe stato partitore, e moltiplicate le posizioni seconde del Cavallo, Caleffo, e Carrozza via il primo errore, e moltiplicate le prime posizioni via il secondo errore, i prodotti minori sottratti da maggiori, li numeri restati partiti per 40. par-

40. partitore, averebbero dato li Sc. 80. prezzo del Cavallo, Scudi 120, prezzo del Caleffo, e Sc. 250. prezzo della Carrozza; benchè come si è detto di sopra, trovato il prezzo del Cavallo, gl'altri si hanno facilmente, seguendo le date condizioni nella domanda. E tutto è manifesto per la risposta settima, e qui si vede.

11. D. Venendo gl'errori di meno, come si opera?

R. Nell'istessa maniera; ponendo per il Cavallo Sc. 50. per il Caleffo Sc. 90. e per la Carrozza Sc. 190. la somma Sc. 330. che son meno Sc. 120. fino a Sc. 450. Di nuovo, ponendo per il Cavallo Sc. 70. per il Caleffo Sc. 110. e per la Carrozza Sc. 230. la somma Sc. 410. che son meno Sc. 40. di Sc. 450. si sottra Sc. 40. secondo errore, da Sc. 120. primo errore, resta Sc. 80. per partitore. Si moltiplica 70. seconda posizione via 120. primo errore fa 8400. Si moltiplica 50. prima posizione via 40. secondo errore fa 2000. che si sottra da 8400. resta 6400. qual partito per 80. viene il quoziente 80. per li Scudi del Cavallo, e così si trovano gl'altri per le loro posizioni &c.

Per 50		M 120	—	8400	Per 90	M 120	—	13200
Per 70		M 40	—	2000	Per 110	M 40	—	3600
				<hr/>				<hr/>
Per 8. 0				640:0	Per 8:0			960.0
				Sc. 80				Sc. 120
Per 190		M 120	—	27600				
Per 230		M 40	—	7600				
				<hr/>				<hr/>
				Per 8: 0				2000:0
				Sc. 250				

12. D. Come si opera negl'errori di meno per regola del Trè?

R. Come in quelli di più. La differenza degl'errori è 80. delle posizioni del Cavallo 20. Però si dica per regola del Trè se 80. viene da 20. da che verrà 120. errore della prima posizione? e verrà da 30. il quale si aggiunge a 50. numero della prima posizione per essere stato l'errore di meno, e fa 80. ovvero servendosi dell'errore della seconda posizione, si dice, se 80. viene da 20. da che verrà 40? e verrà da 10. il quale si aggiunge a 70. numero della seconda posizione, fa 80. per li Scudi del Cavallo &c.

13. D. Se un errore sarà di più, ed uno di meno, come si opera?

R. Si ponga che il Cavallo costasse Sc. 120. conseguentemente il Caleffo Sc. 160. e la Carrozza Sc. 330. che sommati fanno Sc. 610. da i quali sottratti Sc. 450. restano Sc. 160. più. Di nuovo si ponga per il Cavallo Sc. 30. per il Caleffo Sc. 70. e per la Carrozza Sc. 150. che sommati fanno Sc. 250. li quali sottratti da Sc. 450.

LIII

resta-

restano Sc. 200. meno . E perchè più , e meno si somma , si sommano Sc. 160. più ; e Sc. 200. meno , e si avranno Sc. 360. per partitore . Si moltiplica 120. numero della prima posizione via 200. secondo errore fa 24000. Pure si moltiplica 30. numero della seconda posizione via 160. primo errore fa 4800. , che sommato con 24000. ne viene 28800. il quale si parte per 360. e viene 80. prezzo del Cavallo . Così ancora si trova il prezzo del Cavallo , e Carrozza con moltiplicare gl' altri numeri delle posizioni via gl'errori , e con partiere i prodotti per 360. come qui si vede .

Per 120	P. 160	4800	Per 160	P. 160	32000
Per 30	M. 200	24000	Per 70	M. 200	11200
<hr/>					
Per 360		28800		360	43200
96	80		Sc. 120		72
<hr/>					
Per 360	P. 160	66000			
Per 150	M. 200	24000			
<hr/>					
	360	90000			
	Sc. 250	180			
<hr/>					
		0			

14. D. Per regola del Trè in questa come si opera ?

R. Sommati gl' errori fanno 360. e la differenza delle posizioni del Cavallo è 90. si dice dunque se 360. somma degl'errori viene da 90. da che numero verrà 160. errore di più ? e verrà da 40. che si sottra da 120. numero della prima posizione , e resta 80. prezzo del Cavallo . Ovvero fondandosi nella seconda posizione si dice , se 360. viene da 90. da che numero verrà 200. di meno ? e verrà da 50. da aggiungersi a 30. numero della seconda posizione per essere errore di meno ; e sarà 80. numero cercato , e prezzo del Cavallo . Parimente si troverebbero gl' altri prezzi per le loro posizioni ; come è manifesto .

Il sopradetto quesito si poteva sciogliere per sommare sulla posizione con levare gl' Scudi di più da Sc. 450. come si è detto nella risposta vigesima seconda , benchè il modo si ha dall' Algebra come accennai nella risposta vigesima settima del passato . Perchè per Algebra si pone che il Cavallo costi 1. cosa , il Cavallo costerà 1. cosa più 40. e la Carrozza 2. cose più 90. la somma 4. cose più 130. uguali a Scudi 450. e levato 130. da ogni parte , restano 4. cose uguali a 320. il quale partito per 4. come vuole la regola , viene 80. prezzo , e valore di 1. cosa , e per conseguenza del Cavallo .

Ca-



**Carozza '21: cofe più go!**

130

15. D. Uno avendo comprato tela a lir. 4. il braccio  
lit. 3. ed avendo comprato panno a lir. 5. il braccio  
lit. 7. e con avere spese in tutto lit. 92. trovò guadagno  
16. Si domanda quante braccia di tela, e quante  
comprasse.

R. 6<sup>a</sup> ponga; che compra 11 braccia 3. di tela, che a  
cio vagliono lire 12. le quali sottratte da lire 99. resti  
la compra del panno: che a lire 5. il braccio sono  
rivendute a lire 7. il braccio vagliono lire 112. cioè lire  
la compra, delle quali levate lire 3. di perdita  
della tela, restano lire 29. di guadagno, e dovevar  
16. Sicche per braccio 13. di tela, e braccia 16.  
Lire 12.

Si faccia la seconda posizione, pensando che comprasi  
tela, che à lir. 4. il braccio vagliono lir. 24. se qua-  
92. restano lir. 68. per la compra del panno à lir. 5.  
no brac. 13.  $\frac{1}{2}$ . de quali rivendute à lir. 7. il brac. vag-  
cioè lir. 27  $\frac{1}{2}$ . più della compra, dalle quali levate  
dita nella vendita della tela, restano lir. 21  $\frac{1}{2}$ , di g-  
sono lir. 5  $\frac{1}{2}$ . più di lire 16. o perché più, o più si tol-  
no lir. 5  $\frac{1}{2}$ . secondo errore da lir. 13. primo errore  
7  $\frac{1}{2}$ . per partitore, si moltiplichino seconda po-  
sizione errore fa 78. pure si moltiplichino 3. prima po-  
sizione errore fa 15  $\frac{1}{2}$ . che si sottra da 78. resta 62  $\frac{1}{2}$ .  
7  $\frac{1}{2}$ . e fatto il partire viene 8. per la braccia della,  
e vare le braccia del panno, si moltiplichino 16. prima  
5  $\frac{1}{2}$ . secondo errore fa 83  $\frac{1}{2}$ . si moltiplichino 13  $\frac{1}{2}$ . seco-  
nda po-  
sizione errore fa 176  $\frac{1}{2}$ . dal quale sottratti 8  
che si parte per 7  $\frac{1}{2}$ . e ne viene 23. per la braccia del  
pro dunque braccia 8. di tela, e braccia 12. di pa-  
no - braccia 8. à lir. 4. il braccio, vagliono lir. 32. à  
no lir. 24. sicchè ci è di perdita lir. 8. levate lir. 32.  
stano lir. 60. per il panno, che à lir. 5. il braccio son-  
rivendute à lir. 7. costano lir. 84. che sopra lir. 60.

guadagno, dalle quali levate lir. 8. di perdita, restano lir. 16. di guadagno. Sicche torna.

<del>Per 31</del> $P\ 13 - 78$ <del>Per 61</del> $P\ 5\frac{1}{2} - 15\frac{1}{2}$ <hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> $Per\ 7\frac{1}{2} - 62\frac{1}{2}$	$Per\ 16.\ P\ 13 - 176\frac{1}{2}$ $Per\ 13\frac{1}{2}\ P\ 5\frac{1}{2} - 83\frac{1}{2}$ <hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> $Per\ 7\frac{1}{2} - 93\frac{1}{2}$
--	--

braccia 8

braccia 12

16.D. Due si pongono à giocare; il primo dice al secondo, se io vincerò la terza parte de' vostri soldi, allora averò con i miei sol.60. ed il secondo rispose, e se io vincerò la metà de' vostri con i miei ancora io averò soldi 60. Si domanda quanti soldi aveva ciascuno?

R. Pongasi, che il primo abbia soldi 20. e per averne 60. ne vinca soldi 40. e perchè 40. sono la terza parte, dunque il secondo aveva soldi 120. che con la metà de' soldi del primo fanno sol. 130. che di 60. sono 70. più. Di nuovo si ponga, che il primo abbia sol. 30. e ne vinca 30. al secondo sua terza parte, dunque aveva il secondo sol. 90. che con 15. metà di 30. fanno soldi 105. che di 60. sono soldi 45. più; Si moltiplica 30. posizione seconda via 70. primo errore fa 2100. e 20. posizione prima via 45. errore secondo fa 900. il quale si sottra da 2100. resta da partirsi 1200. Ora si sottra 45. secondo errore da 70. primo errore resta 25. partitore, per il quale si parte 1200. vengono sol. 48. che aveva il primo infino à 60. ce ne vogliono 12. terza parte di quelli del secondo, sicchè aveva soldi 36.

$Per\ 20\ P.\ 70 - 2100$	$Per\ 120\ P.\ 70 - 6300$
--------------------------	---------------------------

$Per\ 30\ P.\ 45 - 900$	$Per\ 90\ P.\ 45 - 5400$
-------------------------	--------------------------

---

 $Per\ 25 - 1200$

---

 $25 - 900$

Soldi 48 del primo

Soldi 36 del secondo

17 D. Trè hanno giulj: Dice il primo, se io avessi la metà de' giulj de. secondo con i miei averei giulj 100. dice il secondo, se io avessi la terza parte de' giulj del terzo con i miei averei giulj 100. dice il terzo, e se io avessi la quarta parte delli giulj del primo con i miei, averei giulj 100. Si vuole sapere quanti giulj abbia ciascuno da se?

R. Il primo abbia giulj 60. dunque il secondo ha giulj 80. acciò dandone la metà al primo ne abbia giulj 100. il terzo ne averà 60. acciò dandone la terza parte, il secondo abbia giulj 100. mà a 60. aggiunti 15. quarta parte del primo, fanno 75. e dovevano essere 100. dun-

dunque per 65. 85. e 60. meno 25. Di nuovo il primo abbia giulj 68. dunque il secondo ha giulj 64. acciò dandone la metà al primo, effo ne abbia 100. il terzo ne averà 108. acciò dandone la terza parte, cioè 36. al secondo, ne abbia 100. mà aggiunti à 10 giulj 17. quarta parte del primo, fanno 125. che sono 25. più 100. sicchè per 68. 64. e 108. più 25. e perchè meno, e più si somma; Si sommano gl'errori 25. e 25. fanno 50. partitore; Si moltiplicano le posizioni via gli errori in croce, le somme de i prodotti 3200. 3600. e 4200. si partono per 50. e vengono giulj 64. per il primo. 72. per il secondo, e 84. per il terzo.

Per 64  $\begin{array}{r} \times \\ M. 25 \\ \hline \end{array}$  1700 Per 84  $\begin{array}{r} \times \\ M. 25 \\ \hline \end{array}$  1600  
Per 68  $\begin{array}{r} \times \\ P. 25 \\ \hline \end{array}$  1500 Per 64  $\begin{array}{r} \times \\ P. 25 \\ \hline \end{array}$  2000

50 — 3200

50 — 3600

Del primo 64

Del secondo 72

Per 60. M. 25 — 2700.

Per 108 P. 25 — 1500

50 4200

Del terzo 84

18. D. Trè hanno quattrini; Dice il primo al secondo, dammi la metà de'tuoi quattrini, e 15. me ne dia il terzo con i miei aver quatt. 100. dice il secondo al terzo dammi la metà de'tuoi quattrini, e 15. me ne dia il primo con i miei averò quattrini 100. dice il terzo al primo dammi la quarta parte de'tuoi quattrini e 15. me ne dia il secondo con i miei ancora io averò quattrini 100. Si domanda quanti quattrini aveva ciascuno da se?

R. Si pongano per il primo 48. ed aggiunti 15. del terzo fanno 63. che infino in 100. ci vogliono 37. metà del secondo; sicchè ha quattrini 74. a i quali aggiunti 15. del primo fanno 89. che infino in 100. ci vogliono 11. metà del terzo, sicchè ha 22. a i quali aggiunti 15. del secondo, e 12. quarta parte del primo fanno 49. e dovevano essere 100. dunque per 48. del primo, per 74. del secondo, e per 22. del terzo meno 51.

Di nuovo si pongano per il primo 56. aggiunti 15. del terzo fanno 71. che infino in 100. ci vogliono quatt. 29. metà del secondo, che ha il secondo quatt. 58. alli quali aggiunti 15. del primo fanno 73. che infino in 100. ci vogliono 27. metà del terzo; sicchè ha quatt. 54. a i quali aggiunti 15. del secondo, e 14. quarta parte del primo, fanno 83. che di 100. sono meno 17. dunque per 56. del

del primo, per 58. del secondo, e per 34. del terzo meno 17. il quale errore si sottra dal primo 51. resta 34. partitore, e moltiplicando 48. del primo prima posizione via 17. secondo errore fa 816. e moltiplicando 56. del primo seconda posizione via 51. primo errore fa 2856. dal quale sottratto il prodotto 816. resta 2040. che si parte per 34. e viene 60. e tanti quattrini ha il primo. Nel medesimo modo si trovano quei del secondo 50. e del terzo 70. ovvero si trovano arguendo da quelli del primo; Come si è fatto nelle posizioni.

Per 48 $\times$ M. 51 — 2856 Per 56 $\times$ M. 17 — 816 <hr style="width: 100%;"/> <div style="text-align: right;">34 — 2040</div>	Per 74 $\times$ M. 51 — 2958 Per 58 $\times$ M. 17 — 1258 <hr style="width: 100%;"/> <div style="text-align: right;">34 — 1700</div>
---	--

Del primo 60

Del secondo 50

Per 22 $\times$ M. 51 — 2754 Per 54 $\times$ M. 17 — 374 <hr style="width: 100%;"/> <div style="text-align: right;">34 — 2380</div>	
---	--

Del terzo 70

19. D. Che è il quesito 17. di R. Luca Distinzione 7. Trattato secondo, à carte 105. errato, e da me corretto, Tre giocano; il primo vince la metà de' soldi del secondo, il secondo vince un terzo de' soldi del terzo, ed il terzo vince un quarto de' soldi del primo. È fatto il gioco, oganno si trova aver soldi 100. Domando con quanti soldi si mise ciascuno à giocare? L'Autore conclude che il primo aveva sol. 144  $\frac{2}{3}$ . qui ci è errore di stampa, dovendo dire solo 44  $\frac{2}{3}$ . il secondo 111  $\frac{1}{3}$ . ed il terzo 133  $\frac{1}{3}$ . mà questi soldi essendo 288  $\frac{2}{3}$ . al fine del gioco non possono esser 300. cioè 100. per uno de i tre. L'Abbaglio è stato in Frà Luca il non levare un quarto dal primo, che vince il terzo, che sono soldi 11  $\frac{1}{3}$ . e per questo restano 88  $\frac{2}{3}$ . e non 100. per il primo.

R. Per dargli giusta soluzione, il primo abbia sol. 40. la quarta parte vince il terzo, cioè 10. restano 30. e perchè con la vincita della metà del secondo, il primo ha sol. 100. dunque il secondo ha sol. 140. e ne perde 70. col primo, gli restano sol. 70. che infino à 100. ci vogliono 30. senza parte, che vince al terzo, dunque il terzo à sol. 90. de' quali levati 30. restano 60. che con 10. quarta parte del primo fanno 70. e dovevano esser 100. dunque per 40. del primo per 140. del secondo, e per 90. del terzo meno 30. Di nuovo il primo abbia sol. 60. levati 15. quarta parte, restano 45. che infino in 100. ci

100. ci vogliono 55. metà, che vince al secondo dunque il secondo ha Soldi 110. e gli sono rimasti 55. che a fare 100. ci vogliono 45. terza parte del terzo. Sicchè il terzo ha Soldi 135. da quali levati 45. perfino, restano 90. a i quali s'aggiungono 15. quarta parte del primo, fanno 105. e dovevano far 100. dunque per 60. del primo, per 110. del secondo, e per 135. del terzo più 5. si sommano gl'errori 30. e 5. fanno 35. partitore, si moltiplicano in croce le posizioni con gl'errori, e le somme de' prodotti si partono per 35. e ne risultano Sol. 57  $\frac{1}{2}$ , per il primo, Soldi 114  $\frac{1}{2}$ , per il secondo, e Soldi 128  $\frac{1}{2}$  per il terzo, e con tanti si mette ciascuno a giocare. Si prova; il primo di Soldi 57  $\frac{1}{2}$ . ne perde 14  $\frac{1}{2}$ . gli restano Soldi 42  $\frac{1}{2}$ . con Soldi 57  $\frac{1}{2}$ . metà che vince al secondo fanno Sol. 100. e le 4 Sol. 57  $\frac{1}{2}$ . restati al secondo, s'aggiungono Sol. 42  $\frac{1}{2}$ . terza parte vinti al terzo fanno Sol. 100. e se a Sol. 85  $\frac{1}{2}$ . del terzo restati s'aggiungono 14  $\frac{1}{2}$ . vinti al primo fanno Soldi 100. finchè torna.

Per 40 M 30 — 1800  
Per 60 P 5 — 200

Per 140 M 30 — 3300  
Per 110 P 5 — 700

35 — 2000

Sol. 57  $\frac{1}{2}$  del primo

Per 90 M 30 — 4050

Per 135 P 5 — 450

35 — 4530

Sol. 128  $\frac{1}{2}$  del terzo

35 — 4000

Sol. 114  $\frac{1}{2}$  del secondo

20. D. Una libbra di Cera con libbre 7. di Zucchero vale lire 6. e tanto valgono 9 libbre 4. di Cera meno libbre 2. di Zucchero. Si cerca il prezzo della libbra della Cera, e del Zucchero?

R. Lire 6. sono Soldi 120. si ponga per la libbra della Cera Sol. 22. li quali sottratti da 120. restano Soldi 98. per il prezzo di lib. 7. di Zucchero, e la libbra vale Sol. 14. ma valutate lib. 4. di Cera a Sol. 22. costano Sol. 88. da i quali levando Sol. 28. per lib. 2. di Zucchero meno, restano Soldi 60. e dovevano essere 120. e però per Soldi 22. e 12. meno 60. Di nuovo si ponga per la libbra della Cera Soldi 29. che sottratti da 120. restano Sol. 91. prezzo di lib. 7. di Zucchero, e la libbra vale Sol. 13. ma valutate lib. 4. di Cera a Sol. 29. la libbra costano Sol. 116. da i quali levando Soldi 26. per libbre 2. di Zucchero meno, restano Soldi 90. che di 120. fanno 30. meno. Per 29. e 13. 30. meno; il quale si sottra da 60. primo errore resta 30. partitore; si moltiplicano in croce le posizioni con gl'errori, e sottratto il prodotto 660. da 1740. il restato 1080. si par;

si parte per 30. vengono Sol. 36. prezzo della libbra di Cera. Ne l'istesso modo si troveranno Soldi 12. prezzo della libbra del Zucchero. Ovvero si sottrano Sol. 26. da 120. li Sol. 84. si parte per lib. 7. di Zucchero, e vengono i detti Sol. 12.

Per 22.  $\times$  M. 60 — 1740  
Per 29.  $\times$  M. 30 — 660

Per 14.  $\times$  M. 60 — 780  
Per 13.  $\times$  M. 30 — 420

30 — 1080

30 — 360

Sol. 36. la lib. di Cera.

Sol. 12. Zucchero.

Si scioglie il quesito per via d'equazione in questo modo. Lib. 1. di Cera, e lib. 7. di Zucchero uguali a lib. 4. di Cera meno lib. 2. di Zucchero si aggiungano alle parti lib. 2. di Zucchero, allora sono lib. 1. di Cera, e lib. 9. di Zucchero uguali a lib. 4. di Cera; si levi dalle parti lib. 1. di Cera restano lib. 3. di Cera uguali a lib. 9. di Zucchero. E partendo le parti per 3. sarà lib. 1. di Cera uguale a lib. 3. di Zucchero. Dunque se lib. 1. di Cera, e lib. 7. di Zucchero, che vagliono Sol. 120. come si dice da principio sono uguali a lib. 10. di Zucchero, stante che lib. 2. di Cera è uguale a lib. 3. di Zucchero. Onde partendo Sol. 120. per lib. 10. Vengono Sol. 12. per il prezzo della libbra, e moltiplicati Sol. 12. per lib. 7. valeranno Sol. 84. li quali sottratti da Sol. 120. restano Sol. 36. prezzo di lib. 1. di Cera.

21. D. Due Contadine hanno ova da vendere, ed uno spenditore gli domanda quante ova hanno. Dice la prima, se la mia compagnia me ne desse 5. delle sue, avrei ova uguali alle sue restategli, e la seconda dice, e se io avessi 7. ova delle sue con le mie, io ne avrei il doppio delle restategli. Fate voi il conto quante ova habbia ciascuna.

R. La prima abbia ova 13. e la seconda 23. acciò dando 5. ova alla prima, abbiano ova uguali; ma la prima dandone 7. alla seconda le restano ova 6. e la seconda ne averà 30. Dunque la prima ne ha 9. meno fino in 15. metà di 30. di nuovo la prima abbia ova 15. e la seconda 25. acciò dandone questa ova 5. alla prima, allora abbiano ova uguali, ma la prima dando ova 7. alla seconda, questa averà ova 32., ed a lei restano ova 8. che sono ova 8. meno fino in 16. metà di 32. Adunque per 13. e 23. meno 9. e per 15. e 25. meno 8. da 9. si sottri 8. resta 1. per partitore, e moltiplicato 13. prima posizione per 8. secondo errore fa 104. e moltiplicato 15. seconda posizione per 9. primo errore fa 135. dal quale sottratto 104. resta 31. che partito per 1. rende l'istesso 31. e tante ova aveva la prima donna; nell'istesso modo si trovano ova 41. della seconda. Si provi; e tornerà.

Per

Per 13. M. 9 — 135  
 Per 15. M. 8 — 104

Per 23. M. 9  
 Per 25. M. 8

1 — 31  
 22. D. Uno giocò trè giorni; il primo giorno di ogni  
 lir. 3. e ne spese lir. 6. il secondo giorno delle restate  
 fece 4. spese lire 8. il terzo giorno delle lire restate  
 ce 5. e ne spese lir. 9. ed allora trovò restargli la metà  
 con le quali si messe à giocare il primo giorno. Si do-  
 te furono le lire, con le quali si pose al gioco.

R. Si pongano lire 20. che di 2. facendo 3. fece lir. 3  
 spendendo lir. 6. restano lir. 24. delle quali di 3. fec  
 32. e spendendone lire 8. restano pure lir. 24. delle  
 di 4. 5. vengono lir. 30. e spendendone 9. restano lir.  
 no restare 10. cioè la metà di lir. 20. dunque per lir.  
 Ora si ponga che avesse lir. 16. delle quali fece di 2.  
 e spendendone lir. 6. restano lir. 18. delle quali di  
 24. con spenderne lir. 8. restano lir. 16. delle quali  
 5. fece lir. 20. e spendendone lir. 9. restano lir. 11. e  
 stare lir. 8. metà di 16. dunque per 16. più 3. il qual  
 11. primo errore, resta 8. partitore, e moltiplicato  
 via gli errori in croce, e sottratto il prodotto 60. da  
 to 116. partito per 8. ne vengono lir.  $14\frac{2}{3}$ . con le q  
 gioco. Si prova usando la regola del Trè, dicendo  
 di lir.  $14\frac{2}{3}$ . quante? lir.  $21\frac{1}{3}$ . levate lir. 6. restano  
 nuovo se di 3. fece 4. di lir.  $15\frac{1}{3}$ . quante? lir. 21. do  
 vate lir. 8. spese, restano lir. 13. finalmente se di 4.  
 13. quante? lir.  $16\frac{2}{3}$ . dalle quali si sottrano lir. 9. e re  
 metà di lir.  $14\frac{2}{3}$ . con cui si pose al gioco. Sicchè st

Se 2 — 3 —  $14\frac{2}{3}$

Per 20. P. 11. — 176  
 Per 16. P. 3. — 60

8 — 116  
 lir. —  $14\frac{2}{3}$

Se lir. 3 — 4 — lir. 1

Se lir. 4 — 5 — lir.

M m m m

23. D. Flavio ha dato a guadagno a Lelio una quantità di lire a ragione di lir. 5. per 100. l'anno : passato il primo anno gli restituì lire 120. e passato il secondo anno gli restituì altre lir. 120. e passato il terzo anno restituì lir. 88. 19. 9. per saldo di capitale, e frutti. Si domanda quante furono le lire, che Flavio diede a guadagno ?

R. Per doppia falsa posizione si possono sciogliere quasi tutte le questioni mercantili, benchè per lo più si allunga operazione; tuttavia alcuna ne proporrò, acciò si conosca il modo di procedere. La sopradetta domanda appartiene alla regola degli scoti, ma volendo soddisfare ad essa per doppia falsa posizione: Si ponga, che Flavio abbia dato a guadagno lir. 2000. le quali si meritano a lir. 5. per 100. per un' anno, e dal capitale, e frutto si levano lire 120 le restate lire si meritano per un' altro anno, e dal capitale, e frutto si levano lir. 120. e finalmente le lir. restate si meritano per il terzo anno, e dal capitale e frutto si levano lir. 88. 19. 9. restano lire 1967. 19. 3. e non dovera restare alcuna cosa. Dunque per lir. 2000. più lir. 1967. 19. 3. si ponga la seconda volta, che Flavio abbia dato a guadagno lir. 1000. ed operato come si è detto avanzano lir. 810. 6. 9. queste si sottrano da lir. 1967. 19. 3. primo errore, perchè più, e più si sottra, restano lir. 1157. 12. 6. partitore: Adesso si moltiplica lir. 2000. prima posizione via lir. 810. 6. 9. secondo errore fa 1620675. si moltiplica lir. 1000. seconda posizione via lir. 1967. 19. 3. primo errore fa 1967962. 10. da queste si sottrano 1620675. restano 347287. 10. che si partono per 1157. 12. 6. e vengono lire 300. date a guadagno da Flavio. Per Lir. 2000 P. 1967. 19. 3. — 1967962 10  
Per Lir. 1000 P. 810. 6. 9. — 1620675.

$$\begin{array}{r} 1157. 12. 6. \text{ — } 347287. 10 \\ \hline 2315. 5. \end{array}$$

29

10

Lire 300

$$\begin{array}{r} 1156. 15. \text{ — } 10. \\ \hline 11575. 10 \\ 10418. 12. 6 \end{array}$$

Si parte per Apporre con moltiplicare per 10. il numero da partirsi, come si è insegnato a suo luogo.

$$\begin{array}{r} 1146. 17. 6 \text{ — } 10 \\ \hline 11576. 5. \end{array}$$

24. D. Un Mercante è creditore di Lelio di lir. 484. da essergli pagate dopo anni 3. ma il Mercante è contento di ricevere al presente



fente lir. 400. Si domandà à quanto per 100. l'anno vengano scontate lir. 484. à sconto semplice.

R. Si ponga, che lo sconto sia à lir. 5. per 100. l'anno, e si meritano a questa regola lir. 400. per anni 3. e tornano frà capitale, e frutto lir. 460. fino à lir. 484. sono lir. 24. meno. Di nuovo si ponga, che lo sconto sia à lir. 8. per 100. l'anno, e meritando lire 400. per anni 3. tornano trà capitale, e frutto lire 496. che sono lir. 12. più di lire 484. e perchè meno, e più si somma, si sommano lire 24. e 12. errori fanno 36. partitore. Si moltiplica 5. prima posizione via 12. secondo errore fa 60. e lir. 8. seconda posizione via 24. primo errore fa 192. che sommato con 60. fa 252. il quale si parte per 36. e vengono lire 7. sconto cercato e à tante furono scontate lir. 484. per anni 3. ricevendone al presente lire 400.

Per 5. M 24 — 192

8. P 12 — 60

Si prova per regola del cinque

lir. 400 - an. 3 - lir. 84 - lir. 100 an. 1?

36 — 252

Lire 7.

Lire 7.

25. D. Come si sodisfa à tal domanda per sua regola?

R. Con facilità, e brevemente per regola dritta del cinque dicendo: Se lir. 400. in anni 3. hanno di sconto lir. 84. quante ne averanno lir. 100. in un'anno? ed operato ne averanno lir. 7. non ricercandosi, che partire 84. per 12. onde si verifica quel che hò detto nella risposta 23. che le questioni mercantili, che si sciolgono per sua regola, si allungano operando per doppia falsa posizione.

26. D. Galline 3. Pernici 4. ed Oche 5. vagliono sol. 72. ed à questo prezzo Galline 2. Pernici 5. ed Oche 7. vagliono sol. 94  $\frac{1}{2}$ . domando che valsi ogn'una da per sé?

R. P. Luca pone questa al numero 15. à parte 105. trà le doppie false posizioni, le quali facendo à caso non daranno buona soluzione, che però è necessaria questa, è simile cognizione, cioè che la Pernice costa sol. 4. più della Gallina.

Si ponga dunque per prezzo d'una Gallina soldi 6. Galline 3. vagliono sol. 18. e per la Pernice sol. 10. che sono sol. 4. più della Gallina, Pernici 4. costano sol. 40. che sommati con soldi 18. fanno sol. 58. che sottratti da soldi 72. restano sol. 14. prezzo di Oche 5. sicchè un'Oca costa sol. 2  $\frac{1}{2}$ . A questi prezzi si veda, quanto costano Galline 2. Pernici 5. ed Oche 7. e costano soldi 81  $\frac{1}{2}$ . che sono sol. 15  $\frac{1}{2}$ . meno di sol. 94  $\frac{1}{2}$ . di nuovo si ponga per il prezzo d'una Gallina sol. 3. Galline 3. costano soldi 9. per la Pernice sol. 7. cioè sol. 4. più della Gallina, Pernici 4.

M m m m a

costa-

costano sol. 28. che sommati con sol. 9. fanno sol. 37. che sottratti da 78. restano sol. 35. prezzo di 5. Oche, sicchè un'Oca costa sol. 7. à questi prezzi Galline 2. Pernici 5. ed Oche 7. costano foldi 90. che sono sol.  $4\frac{2}{3}$ . meno di  $94\frac{2}{3}$ . si sottrino sol.  $4\frac{2}{3}$ . da sol.  $13\frac{1}{3}$ . primo errore restano  $8\frac{2}{3}$ . per partitore. Si moltiplichino in croce sol. 6. prima posizione via  $4\frac{2}{3}$ . secondo errore fa 28. Pure sol. 3. seconda posizione via  $13\frac{1}{3}$ . primo errore fa  $39\frac{1}{3}$ . dal quale sottratto 28. resta  $11\frac{2}{3}$ . che partito per  $8\frac{2}{3}$ . viene soldo  $1\frac{2}{3}$ . prezzo d'una Gallina, e così si trovano foldi  $5\frac{1}{3}$ . prezzo della Pernice, è sol.  $9\frac{2}{3}$ . prezzo dell'Oca.

Per 6. M.  $13\frac{1}{3} - 39\frac{1}{3}$  Per 10. M.  $13\frac{1}{3} - 91\frac{1}{3}$   
 Per 3. M.  $4\frac{2}{3} - 28$  Per 7. M.  $4\frac{2}{3} - 46\frac{2}{3}$

$8\frac{2}{3} - 11\frac{2}{3}$	$8\frac{2}{3} - 44\frac{2}{3}$
Gallina sol. $1\frac{2}{3}$	Pernice sol. $5\frac{1}{3}$
Per 2 $\frac{2}{3}$ M. $13\frac{1}{3} - 91\frac{1}{3}$	
Per 7 M. $4\frac{2}{3} - 13\frac{1}{3}$	
	$8\frac{2}{3} - 78\frac{2}{3}$
	Oca sol. $9\frac{2}{3}$

27. D. Uno compra Galline 3. Pernici 4. ed Oche 5. per sol. 86. la Pernice costò sol. 3. più della Gallina e l'Oca sol. 7. più della Pernice. Domando, che costò la Gallina, la Pernice, e l'Oca?

R. Questa pure è di F. Luca à carte 104. Si ponga, che la Gallina costi sol. 6. la Pernice costerà 9. e l'Oca 16. e tutte costeranno foldi 134. che sono sol. 48. più di 86. Di nuovo costi la Gallina sol. 4. la Pernice sol. 7. e l'Oca sol. 14. e tutte costeranno sol. 110. che sono sol. 24. più di sol. 86. si sottrano sol. 24. da sol. 48. restano sol. 24. partitore. Si moltiplica 48. primo errore via 4. seconda posizione fa 192. Si moltiplica 24. secondo errore via 6. prima posizione fa 144. che sottratto da 192. il restato 48. si parte per 24. e vengono sol. 2. per la Gallina &c.

28. D. Uno comprò lib. 7. di Zucchero, lib. 5. di Cera, lib. 9. di Pepe, e braccia 11. di Tela per lir. 60. sol. 14. e tanto spese un'altra volta in lib. 7. once 9. di Zucchero, in lib. 11. di Cera, in lib. 6. di Pepe, e in braccia 9. di Tela, pagando queste cose al medesimo prezzo di prima, ed avendo pagato la lib. della Cera sol. 24. più, che la libbra del Zucchero, e la libbra del Pepe sol. 2. den. 4. più che la libbra della Cera: Si vuol sapere, a che prezzo comprò la libbra di ciascuna cosa, e il braccio della Tela.

R. Ridotte lir. 60. sol. 14. in foldi sono 1214. si ponga per la libbra del Zucchero soldo 1. lib. 7. sol. 7. per la lib. della Cera sol. 25. che

che sono Sol. 24. più, che la libbra del Zucchero lib. 5. sono Sol. 125. per la libbra del Pepe Sol. 27  $\frac{7}{8}$ . cioè Sol. 2  $\frac{7}{8}$ . più, che la libbra della Cera, lib. 9. importano Sol. 246. ora si sommano Sol. 7. 125. e 246. fanno 378. li quali sottratti da Sol. 1214. di tutta la spesa, restano Sol. 836. per braccia 11. di Tela, sicchè un braccio costa Sol. 76. la prima compra è accordata, si veda, se la seconda compra torna. Lib. 7. once 9. a Sol. 11. la lib. Sol. 7  $\frac{7}{8}$ . lib. 11. Cera a Sol. 25. la libbra, sono Sol. 275. lib. 6. di Pepe a Sol. 27  $\frac{7}{8}$ . la libbra sono Sol. 164. e braccia 9. Tela a Sol. 76. il braccio, sono Sol. 684. che sommati questi prezzi fanno Sol. di 1130  $\frac{1}{2}$ . li quali si sottrano da Soldi 1214. restano Sol. 83  $\frac{5}{8}$ . meno. Per la seconda posizione si ponga per la libbra del Zucchero Sol. 2. lib. 7. Sol. 14. per la libbra della Cera Sol. 26. lib. 5. sono Sol. 130. per la libbra del Pepe Sol. 28  $\frac{5}{8}$ . lib. 9. Sol. 255. li quali prezzi sommati fanno Sol. 399. che sottratti da Sol. 1214. restano Sol. 815. per braccia 11. di Tela sicchè un braccio vale Soldi 74  $\frac{5}{8}$ . si veda, se confronta la seconda compra. Lib. 7. once 9. Zucchero a Sol. 2. la lib. sono Sol. 15  $\frac{1}{2}$ . lib. 11. Cera a Sol. 26. la libbra sono Sol. 286. e lib. 6. di Pepe a Sol. 28  $\frac{5}{8}$ . la libbra sono Sol. 170. e braccia 9. di Tela a Sol. 74  $\frac{5}{8}$ . il braccio, sono Soldi 66  $\frac{1}{4}$ . li quali prezzi sommati fanno Sol. 1128  $\frac{1}{2}$ . che si sottrano da Soldi 1214. restano Sol. 75  $\frac{3}{4}$ . meno, si sottrai dunque 75  $\frac{3}{4}$ . da 83  $\frac{5}{8}$ . resta per partitore 7  $\frac{3}{4}$ . si moltiplicata la prima posizione via il secondo errore 75  $\frac{3}{4}$ . fa l'istesso, e a seconda posizione via 83  $\frac{5}{8}$ . primo errore fa 166  $\frac{5}{8}$ . dal quale sottratto 75  $\frac{3}{4}$ . resta 90  $\frac{1}{2}$ . il quale si parte per 7  $\frac{3}{4}$ . e vengono Sol. 12. prezzo d'una libbra di Zucchero, aggiungendo a Sol. 12. Sol. 24. fanno Sol. 36. per la libbra della Cera, ed a Sol. 36. aggiungendo Sol. 2. denari 4. fanno Sol. 38. den. 4. per la libbra del Pepe, ed apprezzando le libbre di queste merci, e sottraendo Soldi 609. da Sol. 1214. restano Sol. 605. li quali partiti per braccia 11. vengono Sol. 55. prezzo d'un braccio di Tela. Si provi, e si troverà valere tali merci tanto la prima che la seconda. lir. 60. Sol. 14. come qui si vede.

Zuc. lib. 5.	Sol. 125	lib. 7.	lir. 4. 4	lib. 7 $\frac{7}{8}$	lir. 4. 13
Cera lib. 9.	Sol. 36	lib. 5.	lir. 9. 4	lib. 11.	lir. 19. 16
Pepe lib. 6.	Sol. 38 $\frac{5}{8}$	lib. 9.	lir. 17. 5	lib. 6.	lir. 11. 10
Tela b. 11.	Sol. 55	b. 11.	lir. 39. 5	b. 9.	lir. 24. 15

lir. 60. 14

lir. 60. 14

29. D. Una si accorda a servire per 3. Mesi con questi patti, che il primo Mese vuole di salario una quantità di lire, ed il secondo Mese vuole

se vuole lire 2. più del primo Mese; ed il terzo Mese vuole lire 2. più, che il secondo, ed alla fine di detti 3. Mesi vuole lire 10. più in giunta. Accade, che costui non serve, se non giorni 6. (si aggiunga di ciascun Mese) e vuole esser pagato del servito, ed il Padrone gli dette la metà del primo Mese, il terzo del secondo Mese, ed il quarto del terzo Mese. Domandasi quante lire gli dette, e di quante fu d'accordo il primo Mese.

R. Questa è la Proposizione 5. di F. Luca a carte 194. la quale è posta da Giovanni Sfortunati da Siena a carte 85. nella decimalesta delle doppie false Posizioni, e dice, che l'Impressore ha errato, o pure l'Autore in porre giorni 6. in vece di 12. la qual proposizione mette ancora il Forestani a carte 295. accusando d'errore l'Autore, e concorro con lo Sfortunati in dire, che doveva mettere giorni 12. A me pare, che mettendo giorni 12 la soluzione fatta non sia vera, ma deve aggiungersi alla giorni 6. queste parole di ciascuno de' Mesi 3. perche dovendo partecipare del Salario di ciascuno di Mesi 3. è necessario, che serva giorni 6 di ciascun Mese al Padrone; per il che, se si mettesse, che servisse giorni 12. il primo Mese, allora gli si dovrebbero gli  $\frac{1}{2}$  del Salario del primo Mese, che sono lire 5  $\frac{1}{2}$  come si vedrà, o non lire 9.  $\frac{1}{2}$  come si dice toccargli per suo servizio, e che ciò sia vero, si conosce dalla soluzione data da F. Luca, e dagli altri Autori.

Si ponga per il Salario del primo lire 16. per il Salario del secondo lire 18. e del terzo Mese lire 20. si sommano fanno lire 54. aggiunte lire 10. fanno lire 64. ora di giorni 6. di ciascun Mese il Salario è  $\frac{1}{3}$ . essendo giorni 12. la quinta parte di Mesi 3. ovvero di giorni 90. ora si vede se corrisponde. La metà del Salario di lire 16. del primo Mese sono lire 8. il terzo di lire 18. del secondo Mese, sono lire 6. ed il quarto di lire 20. del terzo Mese sono lire 5. che sommate lire 8. 6. e 5. fanno lire 19. e dovevano essere lire 12. dunque si è errato in lire 6  $\frac{1}{2}$  di più. Di nuovo si ponga, che il Salario del primo Mese sia di lire 4. del secondo di lire 6. e del terzo di lire 8. che sommate tali lire con 10. fanno lire 28. la quinta parte sono lire 5  $\frac{1}{3}$ . ora la metà di lire 4. sono lire 2. la terza parte di lire 6. sono lire 2. e la quarta parte di lire 8. sono lire 2. che sommate fanno lire 6. che sono  $\frac{1}{2}$  di lira di più. Si sottra  $\frac{1}{2}$  secondo errore da lire 6  $\frac{1}{2}$ . primo errore, restano lire 5  $\frac{1}{2}$ . partitore. Si moltiplica 18. prima posizione via  $\frac{1}{2}$ . secondo errore fa 6  $\frac{1}{2}$ . si moltiplica 4. seconda posizione via 6  $\frac{1}{2}$ . primo errore fa 24  $\frac{1}{2}$ . dal quale sottratto 6  $\frac{1}{2}$ . resta 18  $\frac{1}{2}$ . che partito per 5  $\frac{1}{3}$ . vengono lire 3  $\frac{1}{3}$ . per il Salario del primo Mese, aggiunte lire 2. fanno lire 5  $\frac{1}{3}$  del secondo; ed aggiunte lire 2. fanno lire 7  $\frac{1}{3}$  del terzo Mese, la quali

lire

lire formate con  $\text{tir. } 10$ , più fanno  $\text{lit. } 25 \frac{1}{2}$ , delle quali uno  $\frac{1}{2}$  sono  $\text{tir. } 5 \frac{1}{2}$ , che riceve per suo servizio, ed il salario del primo Mese fù di  $\text{tir. } 3 \frac{1}{2}$ , ne faccia la prova: la metà di  $\text{tir. } 3 \frac{1}{2}$ , sono  $\text{tir. } 1 \frac{3}{4}$ , il terzo di  $\text{tir. } 3 \frac{1}{2}$  sono  $\text{tir. } 1 \frac{1}{4}$ , ed il quarto di  $\text{tir. } 3 \frac{1}{2}$ , li po  $\text{tir. } 1 \frac{1}{4}$ , le quali formate fanno appunto  $\text{tir. } 5 \frac{1}{2}$ , sicchè si è soddisfatto alla domanda.

### Salario

Per 16. P.	$6 \frac{1}{2}$	$24 \frac{1}{2}$	del 1. Mese $\text{tir. } 3 \frac{1}{2}$	— metà	$\text{tir. } 1 \frac{3}{4}$
Per 4. P.	$\frac{1}{2}$	$6 \frac{1}{2}$	del 2. Mese $\text{tir. } 5 \frac{1}{2}$	— terzo	$\text{tir. } 1 \frac{1}{4}$
			del 3. Mese $\text{tir. } 7 \frac{1}{2}$	— quarto	$\text{tir. } 1 \frac{3}{4}$
	$5 \frac{1}{2}$	$18 \frac{1}{2}$			
	29	82			$\text{tir. } 5 \frac{1}{2}$

$\text{tir. } 3 \frac{1}{2}$

30. D. Uno si accomoda a Padrone per anni 4. con patto d'avere il primo anno una quantità di scudi, il secondo anno sc. 4. di più il terzo anno sc. 4. di più del secondo, & il quarto anno sc. 4. di più del terzo. Accade, che serve Mesi 5. del primo Anno, Mesi 6. del secondo, Mesi 7. del terzo, e Mesi 8. del quarto; & il Padrone per osservare i patti gli dà la metà del salario del primo, del secondo, del terzo, e del quarto Anno con sc. 6. di più per suo giusto pagamento del tempo, che ha servito. Si cerca quanto fù il salario del primo Anno, e quanti scudi ebbe il servitore in tutto?

R. Si ponga per il salario del primo Anno sc. 6. dunque per Mesi 5. gli si devono sc. 2.  $\frac{1}{2}$ , del secondo Anno sc. 10. cioè sc. 4. di più, de' quali per mesi 6. gli si devono Sc. 5. del terzo Anno Sc. 14. de' quali per mesi 7. gli si devono Sc. 8  $\frac{1}{2}$ , e del quarto Anno Sc. 18. de' quali per mesi 8. gli si devono Sc. 12. si sommano Sc. 27  $\frac{1}{2}$ . Ora si veda, se corrispondono con la metà del salario di ciascuno Anno con Sc. 6. di più. La metà di Sc. 6. sono sc. 3, di Sc. 10. sono Sc. 5, di Sc. 14. sono Sc. 7, e di Sc. 18. sono Sc. 9, che sommati con Sc. 6. più fanno Sc. 30. cioè Sc. 2  $\frac{1}{2}$  di più primo errore. Di nuovo si ponga per il salario del primo Anno Sc. 2. del secondo Sc. 6. del terzo Sc. 10. e del quarto Sc. 14. che per mesi 5. del primo Anno gli si devono  $\frac{1}{2}$  di Scudo, per Mesi 6. del secondo Sc. 3, per Mesi 7. del terzo Sc. 5  $\frac{1}{2}$ , e per Mesi 8. del quarto Sc. 9  $\frac{1}{2}$ , si sommano fanno Sc. 19. si veda, se corrispondono con la metà del salario di ciascun Anno con Sc. 6. di più. La metà del primo Sc. 1. del secondo Sc. 3, del terzo Sc. 5, del quarto Sc. 7, con Sc. 6. più fanno Sc. 22. che sono Sc. 3. di più del dovere secondo errore, dal quale si sottri Sc. 2  $\frac{1}{2}$ . primo errore, resta  $\frac{1}{2}$ . partitore. Si moltiplica la prima posizione 6. via Sc. 3. secondo errore fa 18. si moltiplica 2. seconda posizione via 2  $\frac{1}{2}$ . primo errore

re-

rore fa  $4 \frac{1}{2}$ . che si sottra da 18. resta  $13 \frac{1}{2}$ . da partirsi per  $\frac{1}{2}$ . e fatto il partire vengono Sc. 20. che fù d'accordo il primo Anno, che per Mesi 5. gli si devono Sc. 8  $\frac{1}{2}$ . Il secondo Anno Sc. 24. de quali gli si devono Sc. 12. per Mesi 6. il terzo Anno Sc. 28. de quali per Mesi 7. gli si devono Sc. 16  $\frac{1}{2}$ . ed il quarto Anno Sc. 32. de quali per Mesi 8. gli si devono Sc. 21  $\frac{1}{2}$ . sommati sono Sc. 58. Si veda se corrispondono con la metà del salario di ciascuno Anno con Sc. 6. più. Del primo Anno Sc. 10. del secondo Sc. 12. del terzo Sc. 14. e del quarto Sc. 16. li quali sommati con Sc. 6. fanno Sc. 58. appunto, e tanti ne ricevè il Servitore per suo salario. E resta sciolto ed insieme provato il quesito.

$$\begin{array}{r} \text{Per. 6 P. } 2 \frac{1}{2} \text{ X } 18 \\ \text{Per. 2 P. } 3 \text{ X } 4 \frac{1}{2} \\ \hline \frac{1}{2} \text{ — } 13 \frac{1}{2} \end{array}$$

Sc. 20. Salario del primo Anno.

31. D. Si trovino trè numeri, de' quali il primo aggiunto à 73. faccia un numero doppio della somma degl' altri due; il secondo aggiunto à 73. faccia un numero triplicato alla somma degl' altri due, ed il terzo aggiunto à 73. faccia un numero quadruplicato alla somma degl' altri due.

R. Questo è il quesito di Michele Stifelio à carte 96. qui proposto acciò da esso si apprenda il modo di operare quando si fanno altre posizioni parziali, che servano alle totali.

Si ponga 1. per il primo numero, che con 73. fa 74. perchè è doppio della somma degl' altri due, dunque la somma è 37. del quale per un'altra posizione parziale si facciano due parti, che una con 73. sia numero triplicato all' altra con 1. di più. Una parte sia 2. l'altra 35. il quale 2. con 73. fa 75. del quale la terza parte è 25. l'altra, che è 35. con 1. fa 36. da 25. à 36. ci corre 11. si che, per 2. prima posizione parziale meno 11. Di nuovo si ponga, che la prima parte sia 5. l'altra 32. ora 5. con 73. fa 78. del quale la terza parte è 26. e dovea essere 33. cioè 32. con 1. di più, sicchè per 5. meno 7. secondo errore, il quale si sottra da 11. primo errore resta 4. partitore. Si moltiplica 2. prima posizione parziale via 7. secondo errore fa 14. di poi si moltiplica 5. seconda posizione via 11. primo errore fa 55. dal quale si sottra 14. resta 41. che partito per 4. viene  $10 \frac{1}{4}$ . numero secondo per la totale posizione, quale  $10 \frac{1}{4}$ . sottratto da 37. resta  $26 \frac{1}{4}$ . per il terzo numero, il quale aggiunto à 73. fa  $99 \frac{1}{4}$ . Onde perchè il primo è 1. ed il secondo  $10 \frac{1}{4}$ . la somma  $11 \frac{1}{4}$ . quadruplicata fa 45. dunque  $99 \frac{1}{4}$ . è più di 45. questo numero 54  $\frac{1}{4}$ . primo errore della posizione totale:

tale : Di nuovo il primo numero sia 3. con 73. fa 76. somma degl'altri due è la metà, sarà 38. del quale si fa che una con 73. sia numero triplicato all'altra parte numero, sia dunque 2. l'altra 36. che con 3. fa 39. fa 75. la cui terza parte è 25. che sottratto da 39. rest Di nuovo sia la prima parte 23. la seconda sarà 15 fa 18. e 23. con 73. fa 96. la di cui terza parte è 32. d tratto 18. resta 14. più. Si sommano gl'errori fanno re, si moltiplica 2. prima posizione via 14. secondo e ancora si moltiplica 23. seconda posizione via 14. pi fa 322. sommato con 28. fa 350. che si parte per 28. vi condo numero; e per il terzo  $25 \frac{2}{3}$ . fino in 38. qual to à 73. fa  $98 \frac{2}{3}$ . Onde, perchè il primo numero è 3. do  $12 \frac{2}{3}$ . fa  $15 \frac{2}{3}$ . il quale quadruplicato fa 64. e dov  $98 \frac{2}{3}$ . da questo sottratto quello resta  $36 \frac{2}{3}$ . più della do errore della posizione totale. Si sottra  $36 \frac{2}{3}$ . da errore resta  $18 \frac{2}{3}$ . partitore, si moltiplica 1. prima  $36 \frac{2}{3}$ . secondo errore fa l'istesso  $36 \frac{2}{3}$ . si moltiplica 3. fizione via  $54 \frac{2}{3}$ . primo errore fa  $164 \frac{2}{3}$ . da questo si resta  $127 \frac{2}{3}$ . il quale si parte per  $18 \frac{2}{3}$ . viene 7. primo trovare il secondo si moltiplica  $10 \frac{2}{3}$ . secondo nume ma posizione via  $36 \frac{2}{3}$ . secondo errore fa  $374 \frac{2}{3}$ . si mol  $12 \frac{2}{3}$ . secondo numero di seconda posizione via  $54 \frac{2}{3}$ . re fa  $684 \frac{2}{3}$ . dal quale si sottra  $374 \frac{2}{3}$ . resta  $310 \frac{2}{3}$ . il c per il medesimo  $18 \frac{2}{3}$ . viene 17. secondo numero ce mente per trovare il terzo numero si moltiplica  $26 \frac{1}{4}$ .  $976 \frac{1}{4}$ . e  $25 \frac{2}{3}$ . per  $54 \frac{2}{3}$ . fa  $1396 \frac{2}{3}$ . dal quale sottrat sta  $419 \frac{1}{4}$ . che si parte per l'istesso  $18 \frac{2}{3}$ . e viene 23. te cercato. Si prova; 73. con 7. primo numero fa 80. de

Posizioni totali. Posizioni parziali. Posizioni

Per 1	3	Per 2	3	2
10 $\frac{2}{3}$	12 $\frac{2}{3}$	35	X	32
26 $\frac{2}{3}$	25 $\frac{2}{3}$			36
		M	11	7. M
Più 54 $\frac{2}{3}$	36 $\frac{2}{3}$			M. 14
36 $\frac{2}{3}$		7	55	14
	127 $\frac{2}{3}$		14	
Per 18 $\frac{2}{3}$	310 $\frac{2}{3}$	Per 4		Per 28
	419 $\frac{1}{4}$	16 $\frac{2}{3}$	41	
Primo	7	26 $\frac{1}{4}$		
Secondo	17			12
Terzo	23			25
		N n n n		

somma di 17. con 23. Pure 73. non 17. fa 90. numero triplicato di 30. somma di 7. con 23. e finalmente 73. con 23. fa 96. numero quadruplicato di 24. somma di 7. con 17. sicchè stà bene.

32. D. Trè compagni discorrono del loro danaro così. Il secondo e terzo dicono al primo, dà à noi la metà de tuoi Scudi, allora noi due avremo Sc. 100. Il primo, e terzo dicono al secondo, dà à noi il terzo de tuoi Scudi, allora noi due avremo Sc. 100. e finalmente il primo, e secondo dicono al terzo, dà à noi il quarto de tuoi Scudi, allora noi due pure avremo Sc. 100. si cerca con questo quanti Scudi abbia ciascun compagno.

R. Supponendo, che il secondo, e terzo abbiano Sc. 80. il primo averà Sc. 40. acciò dando Sc. 20. che è la metà, il secondo, e terzo abbiano Sc. 100. Ora si faccia di Sc. 80. due parti, che una aggiunta à Sc. 40. del primo con il terzo dell'altra parte, che sarà la quantità de Scudi del secondo, faccia Sc. 100. Il che si eseguirà con una doppia falsa posizione parziale, come per la passata: Ma praticamente si faccia così; da Sc. 80. sino in 100. ce ne vogliono Sc. 20. la di cui metà 10. si triplica fa Sc. 30. per il secondo compagno, e Sc. 50. per il terzo. Perche allora Sc. 40. del primo con Sc. 50. del terzo, e Sc. 10. del secondo sua terza parte fanno Scudi 100. resta dunque à vedere, se Sc. 40. del primo con Sc. 30. del secondo, e con il quarto di Sc. 50. del terzo, cioè con Sc. 12  $\frac{2}{5}$ . fanno Sc. 100. ma fanno solo Sc. 82.  $\frac{2}{5}$ . che sottratti da 100. restano Sc. 17  $\frac{3}{5}$ . meno per la prima posizione.

Si faccia la seconda supponendo, che il secondo, e terzo abbiano Sc. 70. il primo averà Sc. 60. acciò con Sc. 30. metà i primi due abbiano Sc. 100; si faccia adesso di Sc. 70. due parti, che aggiunta una à Sc. 60. con il terzo dell'altra faccia Sc. 100., che si fa con una doppia falsa posizione; ma brevemente come sopra, si veda, che da Sc. 70. à Sc. 100. ci vogliono Sc. 30. la metà Sc. 15. si triplica, e vengono Sc. 45. per il secondo, e Sc. 25. sino in Sc. 70. per il terzo re così Sc. 60. del primo con Sc. 25. del terzo con il terzo di Sc. 45. del secondo, cioè con Sc. 15. fanno Sc. 100. Resta à vedere, se Sc. 60. del primo con Sc. 45. del secondo, con il quarto di Sc. 30. del terzo fanno Sc. 100. ma fanno Sc. 111  $\frac{3}{5}$ . che sono Scudi 11  $\frac{3}{5}$ . più secondo errore: Si sommano Sc. 17  $\frac{3}{5}$ . meno con Scudi 11  $\frac{3}{5}$ . più, fanno Sc. 28  $\frac{4}{5}$ . partitore. Si moltiplicano Sc. 60. del primo seconda posizione via 17  $\frac{3}{5}$ . primo errore fa 1050. si moltiplicano Sc. 40. del primo prima posizione via 11  $\frac{3}{5}$ . secondo errore, fa 450. che si somma con 1050. fa 1500. che si parte per 28  $\frac{4}{5}$ . vengono Sc. 52  $\frac{1}{5}$ . del primo. Di nuovo si moltiplicano Sc. 30. del secondo via 11  $\frac{3}{5}$ . fa 337  $\frac{3}{5}$ . e Sc. 45. via 17  $\frac{3}{5}$ . fa 787  $\frac{3}{5}$ . che



che sommato con  $337 \frac{1}{2}$ . fa  $1125$ . che si parte per  $28$  Sc.  $39 \frac{1}{2}$ . per li Scudi del secondo. Finalmente si n Sc.  $50$ . del terzo via  $11 \frac{1}{2}$ . fa  $562 \frac{1}{2}$ . e Sc.  $25$ . via  $17 \frac{1}{2}$  quale si somma con  $562 \frac{1}{2}$ . fa  $1000$ . che si parte per  $2$  no Sc.  $34 \frac{2}{3}$ . del terzo. Per farne prova si sommano del secondo con Sc.  $34 \frac{2}{3}$ . del terzo, e con Sc.  $26 \frac{1}{3}$  Scudi del primo, fanno Sc.  $100$ . si sommano Sc.  $52 \frac{1}{2}$  con Sc.  $34 \frac{2}{3}$ . del terzo con Sc.  $13 \frac{1}{3}$ . terza parte secondo, fanno Sc.  $100$ . In ultimo si sommano Sc.  $52 \frac{1}{2}$  con Sc.  $39 \frac{1}{2}$ . del secondo, con Sc.  $8 \frac{2}{3}$ . quarta parte del terzo fanno Sc.  $100$ . sicchè torna bene.

Del Primo.	Del Secondo.	Del
Per Sc. 40. M. $17 \frac{1}{2}$	Per 30. M. $17 \frac{1}{2}$	Per 50
Per Sc. 60. P. $11 \frac{1}{3}$	Per 45. P. $11 \frac{1}{3}$	Per 25

$28 \frac{1}{2}$

$28 \frac{1}{2}$

Senza posizioni si risolve così. Si trova il minimo aumer mezzi, terzi, e quarti, che è 12. dal quale si sottra il terzo 4. e il quarto 3. restano 6. 8. 9. li quali si som 23. Ora per regola del Trè replicata tre volte. Sc 23 che sarebbe 12. per il primo ? 9. per il secondo ? ed 8. ed operato verranno Sc.  $52 \frac{1}{2}$ . per il primo, Sc. 3 secondo, e Sc.  $34 \frac{2}{3}$ . per il terzo.

33. D. Pietro, e Giovanni hanno un certo numero di Pietro all'altro dammi Sc. 10. de' tuoi, e ne avrò tre quelli, che restano a te; risponde Giovanni, dammi tuoi, e ne avrò cinque volte più di quelli, che rest cerca quanti Sc. aveva ciascuno.

R. Questo quesito è posto a carte 157. del Tanmaturgo senza regola di sciorlo. Per doppia falsa posizione P Sc. 20. ricevendo da Giovanni Sc. 10. ne ha Sc. 30. dunque Giovanni Sc. 10. cioè  $\frac{1}{3}$ . di Sc. 30. dunque anche esso ricevendone Sc. 10. da Pietro ne avrà Sc. 30. e rest Sc. 10.; mà ne doveva avere Giovanni Sc. 50. cioè Sc. più di quelli, che restano a Pietro. Dunque ne ha primo errore. Di nuovo Pietro abbia Sc. 38. con Giovanni fanno Sc. 48. il terzo di questi Sc. 16. con Sc. 1 tro sono Sc. 26. di Giovanni, che ricevendo Sc. di Sc. 38. fanno Sc. 36. di Giovanni, e dovevano el perchè fossero cinque volte più di Sc. 28. restati a Pi 104. meno secondo errore. Si moltiplica la prima via 104. secondo errore fa 2080. Si moltiplica 38. l

N n n n 2

zione via 20. primo errore fa 760. che sottratto da 2080. resta 1320. si sottra 20. primo errore da 104. secondo errore, resta 84. partitore, per il quale si parte 1320. e vengono Sc. 15  $\frac{1}{2}$ . di Pietro, alli quali s'aggiungono Sc. 10. di Giovanni fanno Sc. 25  $\frac{1}{2}$ . de quali il terzo sono Sc. 8  $\frac{1}{2}$ . che con Sc. 10. fanno Sc. 18.  $\frac{1}{2}$ . di Giovanni, alli quali aggiunti Sc. 10. di Pietro fanno Sc. 28  $\frac{1}{2}$ . cinque volte più di Sc. 5.  $\frac{1}{2}$ . restati al medesimo Pietro, e resta provata.

Pietro

Giovanni

Per 20.



M. 20

2080

Per 20 M. 20



2080

Per 28

M. 104

760

Per 26 M. 104

520

84 — 1320

84 — 1560

34. D. Uno fa testamento, e lascia à due Sc. 1000. con questo che la quinta parte del primo sia di Sc. 10. più, che la quarta parte del secondo. Si domanda quanti Scudi averà ciascuno Erede.

R. Deva avere il primo Sc. 60. la quinta parte Sc. 12. la quale è Sc. 10. più della quarta parte del secondo, sicche la quarta parte del secondo è Sc. 2. che moltiplicati per 4. fanno Sc. 8. del secondo che con Sc. 60. del primo fanno Sc. 68. che si sottrano da Sc. 1000. restano Sc. 932. meno primo errore. Di nuovo deva avere il primo Sc. 120. il secondo Sc. 56. secondo la condizione sommati sono Sc. 176. che si sottrano da Sc. 1000. restano Sc. 824. meno secondo errore, il quale si moltiplica via 60. prima posizione fa 49440. e 120. seconda posizione via 932. primo errore fa 111840. dal quale sottratto 49440. resta 62400. che si parte per 108. differenza degli errori 932. e 824. e vengono Sc. 577  $\frac{1}{2}$ . del primo. Sottratti da Sc. 1000. restano Sc. 422. del secondo. La quinta parte del primo sono Sc. 115  $\frac{1}{2}$ . la quarta parte del secondo sono Sc. 105  $\frac{1}{2}$ . che sono Sc. 10. meno del primo, come voleva il Testatore.

Per 60 M. 932 — 111840

Per 8 M. 932. — 52192

Per 120 M. 824 — 49440

Per 56 M. 824 — 6592

108 — 62400

108 — 45600


Sc. 577  $\frac{1}{2}$ Sc. 422  $\frac{1}{2}$ 

35. D. Uno ha comprato Ormesino, e Raso braccia non so quante: Mà l'Ormesino gli costò lir. 3. il braccio, ed il Raso lir. 5. il braccio, e spese in tutto lir. 100. e poi rivendè l'Ormesino à lir. 4. il braccio, ed il Raso à lir. 6. il braccio, ed avanza di guadagno lir. 26. Domando quante braccia comprò d'Ormesino, e quante di Raso.

R. Si

R. Si pongano braccia 5. di Ormesino, che à lir. 3. il braccio vagliono lit. 15. le quali si sottrano da lir. 100. restano lir. 85. per il Raso, che à lir. 5. il braccio, sono braccia 17. Ora braccia 5. di Ormesino à lir. 4. il braccio vagliono lir. 20. e braccia 17. di Raso à lire 6. vagliono lir. 102. che con lir. 20. fanno lir. 122. che sono lir. 4. meno primo errore. Si pongano braccia 10. di Ormesino, che à lir. 3. il braccio vagliono lir. 30. che sottratte da lire 100. restano lir. 70. per il Raso, che à lir. 5. il braccio sono braccia 14. Ora braccia 10. di Ormesino a lir. 4. il braccio costano lir. 40. e braccia 14. di Raso à lir. 6. il braccio costano lir. 84. che sommate con lire 40. fanno lire 124. che sono lire 2. meno secondo errore. Si sottrino lire 2. da lire 4. primo errore, restano lire 2. partitore; si moltiplicano braccia 5. d'Ormesino prima posizione via 2. secondo errore, fanno 10. e braccia 10. seconda posizione via 4. primo errore fanno 40. dal quale sottratto 10. resta 30. che partito per 2. vengono braccia 15. d'Ormesino. Pure si moltiplicano braccia 17. di Raso per 2. secondo errore fa 34. e braccia 14. via 4. primo errore, fa 56. dal quale si sottra 34. resta 22. che si parte per 2. vengono braccia 11. di Raso.

Si prova; brac. 15. di Ormesino à lire 3. vagliono lire 45. e braccia 11. di Raso à lire 5. vagliono lire 55. che sommate con lire 45. fanno lire 100. Ora brac. 15. à lire 4. il braccio, vagliono lire 60. e braccia 11. di Raso à lire 6. il braccio lire 66. che sommate con lire 60. fanno lire 126. che sono lire 26. di guadagno; Dunque torna.

Braccia 5.		M. 4 — 40	Braccia 17.	M. 4 — 56
10		M. 2 — 10	14.	M. 2 — 34
		<hr/>		<hr/>
		2 — 30		2 — 22
		<hr/>		<hr/>

Braccia 15. di Ormesino.

Braccia 11. di Raso.

36. D. Cinque Compagni si messero à giocare, e quattro vinsero giulj 100. al quinto compagno. Il secondo vinse meno del primo giulj 8. Il terzo meno del secondo giulj 12. gl'altri giulj infino in 100. vinse il quarto compagno. Mà ripostisi à giocare, il quinto compagno vinse la metà de' vinti dal primo, la quarta parte de' vinti dal secondo, la quinta parte de' vinti dal terzo, e tutti quelli vinti dal quarto, e dismessò il gioco trova avere rivinti giulj 40. Si domanda quanti giulj delli 100. ciascuno aveva vinto al quinto compagno.

R. Si ponga, che il primo avesse vinto giulj 24. Dunque il secondo aveva vinto giulj 16. il terzo giulj 4. ed il quarto giulj 56. fino in 100.

100. mà giulj 12. metà di quei del primo, giulj 4. quarta parte di quei del secondo,  $\frac{1}{4}$  quinta parte di quei del terzo, e giulj 56. tutti del quarto, fanno giulj 72  $\frac{1}{4}$ . che sono giulj 32  $\frac{1}{2}$ . più di 40. primo errore. Di nuovo si ponga per il primo giulj 28. per il secondo 20. per il terzo 8. e per il quarto 44. fino in 100. la metà sono giulj 14. vinti al primo, la quarta parte sono giulj 5. vinti al secondo, la quinta parte sono giulj 1  $\frac{1}{4}$ . vinti al terzo, e giulj 44. vinti al quarto, che fanno giulj 64  $\frac{1}{4}$ . che sono giulj 24  $\frac{1}{2}$ . più di 40. secondo errore. Si sottrino da giulj 32  $\frac{1}{2}$ . primo errore giulj 24  $\frac{1}{2}$ . secondo errore, restano 8  $\frac{1}{2}$ . partitore, si moltiplicano 32  $\frac{1}{2}$ . via 28. vengono 918  $\frac{1}{2}$ . e 24  $\frac{1}{2}$ . via 24. fanno 590  $\frac{1}{2}$ . che sottratti da 918  $\frac{1}{2}$ . restano 328, li quali si partono per 8  $\frac{1}{2}$ . e vengono giulj 40. che vinse il primo. Dunque 32. il secondo, 20. il terzo, ed 8. il quarto. La metà di 40. sono giulj 20. il quarto di 32. sono 8. il quinto di 20. sono 4. li quali con 8. del quarto sono giulj 40. che si disse aver rivinto il quarto. Sicchè si è soddisfatto giustamente alla domanda.

$$\begin{array}{rcl}
 \text{Per } 24. & \times & P. 32 \frac{1}{2} - 918 \frac{1}{2} \\
 \text{Per } 28. & \times & P. 24 \frac{1}{2} - 590 \frac{1}{2} \\
 \hline
 & & 8 \frac{1}{2} - 328
 \end{array}$$

37. D. Un Signore ha lasciato Rubbia 100. di grano, da darli a due luoghi Pj in tal modo, che la quinta parte delle Rubbia del primo luogo sopravanzi in Rub. 15. la sesta parte delle Rubbia da darli al secondo luogo. Si domanda quante Rubbia di 100. averà il primo, e secondo luogo da se?

R. Per il primo luogo siano Rub. 80. la quinta parte importa Rub. 16. che supera la sesta parte del secondo luogo in Rubbia 15. dunque la sesta parte è Rubbia 1. che moltiplicato per 6. vengono Rub. 6. del secondo, che sommate con 80. del primo, fanno Rubbia 86. che sono 14. meno di 100. Di nuovo per il primo luogo siano Rubbia 90. la quinta parte importa Rubbia 18. più di 15. Rubbia 3. sesta parte del secondo, che moltiplicate per 6. fanno 18 che con 90. del primo, fanno 108. che sono più 8. di 100. si sommano gli errori 14. e 18 fanno 32. partitore; Si moltiplicano 80 via 8. e 90. via 14. i prodotti 640. e 1260. si sommano, fanno 1900. che si partono per 32. e vengono Rub. 86. Scorzi 8. per il primo luogo, e Rub. 14. Scorzi 14. fino in 100. per il secondo Scorzi 22. fanno un Rubbio. Si prova; la quinta parte di Rubbia 86. Scorzi 8. sono Rubbia 17. Scorzi 6. che sono Rubbia 2. Scorzi 6. più di 15. sesta parte del secondo. Per il che moltiplicando Rubbia.

8.6.

2. 6. per 6. vengono Rubbia 13. 500r. 14. che sono q  
 le toccargli &c.

Per 80 M. 14 — 1260 Per 6. **X** M. 14 —

Per 90 P. 8 — 640 Per 18. **X** P. 8 —

22 — 1900

22 —

R. 86.8.

R. 13. 14

38. D. Uno piglia in un' Orto un paniere di pomi, da  
 prima porta ne lascia la metà, ed un mezzo pomo, e  
 alla seconda porta ne lascia il terzo, e un terzo di p  
 nalmente de i restati, alla terza porta ne lascia la q  
 te, e di più un quarto di pomo. E trova, che  
 nel paniere pomi 23. Si vuole sapere quanti pomi era  
 niere.

R. Si ponga, che nel paniere da principio fossero pomi  
 e di più mezzo pomo sono pomi 18. lasciati alla prin  
 restano 17. il terzo, e di più un terzo di pomo sono  
 sciati alla seconda porta, restano 11. il quarto, e di p  
 to di pomo sono pomi 3. lasciati alla terza porta, e re  
 sino in 23. mancano 15. si noti per 35. M. 15. Di nuov  
 che fussere 55. sottratti 28. per la prima porta, restar  
 tratti 9  $\frac{2}{3}$ . per la seconda porta, restano 17  $\frac{2}{3}$ . e sottra  
 la terza porta, restano pomi 13. sino in 23. mancano  
 noti per 55. M. 10. si moltiplichino in croce 55. second  
 via 15. primo errore fa 825. si moltiplichino 35. prima  
 via 10. secondo errore fa 350. il quale si sottra da 825  
 il quale si parte per 5. differenza degli errori, e ven  
 95. e tanti ne erano nel paniere. Si prova; pomi 48. si  
 la prima porta, restano 47. de' quali 16. si lasciano all  
 porta, restano 31. de' quali 8. si lasciano alla terza po  
 no 23. sicchè è ben fatta, e provata.

Per 35. M. 15 — 825

Per 55. M. 10 — 350

5 — 475


Pomi 95

39. D. Un Signore manda dieci Servi ad un pomario, e  
 ne, che gli portino pomi in questo modo, cioè il pri  
 il secondo pomi 2. il terzo pomi 4. (redoppiando i p  
 ve antecedente) il quarto pomi 8. &c. si domanda, de

fare per trè porte nell'uscire, e lasciare alla prima porta la metà de'pomi, ed un mezzo pomo al portinaro, alla seconda porta la terza parte de'pomi restati, ed un terzo di pomo al portinaro, ed alla terza porta la quarta parte de'pomi restati, ed un quarto di pomo al portinaro; Quanti pomi piglierà ciascuno nel pomario per sodisfare al lor Signore.

R. Se si volesse sodisfare alla domanda per false posizioni come alla passata, troppo ci vorrebbe; Però si moltiplicano i pomi da portarsi al padrone per 4. al prodotto s'aggiungono 3. pomi, e tanti ne doverà pigliare ciascun servo nel pomario. Per esempio per portarne 2. si moltiplica per 4. fa 8. aggiunti 3. sono 11. e tanti ne coglierà, ò piglierà il Servo per portarne 2. e così operasi per gl'altri, e questo modo si hà dall'Algebra, chè per chi l'intende, uno abbia da portare pomi 12. per sapere quanti ne deva cogliere si ponga per essi 1. cosa, alla prima porta dà  $\frac{1}{2}$ . cos. più  $\frac{1}{4}$ . resta  $\frac{1}{4}$ . cos. meno  $\frac{1}{4}$ . alla seconda dà  $\frac{1}{3}$ . cos. più  $\frac{1}{6}$ . resta  $\frac{1}{6}$ . cos. m.  $\frac{1}{6}$ . alla terza porta dà  $\frac{1}{4}$ . cos. più  $\frac{1}{8}$ . resta  $\frac{1}{8}$ . cos. m.  $\frac{1}{8}$ . uguale à 12. ed aggiunti  $\frac{1}{4}$ . alle parti sarà  $\frac{1}{4}$ . cos. uguale à 12  $\frac{1}{4}$ . e partito 12  $\frac{1}{4}$ . per  $\frac{1}{4}$ . viene 51. per i pomi, li quali si avevano con moltiplicare 12. per 4. con aggiungere 3. erano pure pomi 51. da cogliersi &c.

40. D. E un Triangolo A. B. C. rettangolo; il A. lato B C. è 18. la somma del lato A B. con A C. Ipotenusa è 36. Si domanda la quantità del lato A B. ed A C. distintamente.



R. Siccome nella semplice falsa posizione si è proposto qualche quesito geon etico da risolversi per essa, così qui se ne propongono alcuni da risolversi per doppia.

Si ponga per il lato A B. 4. per il lato A C. 32. acciò la loro somma faccia 36. il quadrato di 4. è 16. di 18. è 324. la somma di tali quadrati è 340. che deve essere uguale al quadrato di A C. 32. per la 47. del primo d'Euclide, ma il quadrato di 32. è 1024. dal quale si sottra 340. resta 684. meno. Dunque per 4. e 32. meno 684. Di nuovo sia il lato A B. 6. ed A C. 30. acciò la somma sia 36. il quadrato di 6. è 36. di 18. è 324. la lor somma è 360. che deve esser uguale à 900. quadrato di 30. per la medesima 47. del primo; onde sottrat to 360. da 900. resta 540. meno; dunque per 6. e 30. meno 540. si sottra 540. minore errore da 684. maggiore errore, resta 144. partitore, si moltiplica 6. via 684. fa 4104. si moltiplica pure 4. via 540. fa 2160. che si sottra da 4104. resta 1944 che si parte per 144. e viene 13  $\frac{1}{4}$ . per il lato A B. Così si trovà il lato A C. 22  $\frac{1}{4}$ . fino in 36.

Per 4.

Per 4.  $\times$  M. 684 — 4104  
 Per 6.  $\times$  M. 540 — 2160


Per 32. P 6  
 Per 30. P 5

144 — 1944

lato A B.  $13 \frac{1}{2}$

lato A C.

41. D. Sono due Triangoli rettangoli, A B C. D E F. i lati A B. e D F. l'ipotenuse sono uguali, B C. è braccio. 80. D E. è braccio 90. Le basi A C. ed E F. importano braccio. 100. Si domanda la superficie di ciascun Triangolo.



R. Per trovare le superficie de' Triangoli, bisogna prima quante braccia sia la base A C. ed E F. distintamente, per doppia falsa posizione. Si ponga la base A C. 30. sino in 100. Si quadri A C. 70. fa 4900. Si quadri 6400. si sommi 4900. e 6400. la somma 11300. deve alla somma de' quadrati di D E. 90. e di E F. 30. per il primo d'Euclide, stante che l'ipotenuse A B. e D F. son quadrati dunque 90. fa 8100. Si quadri 30. fa 900. la 9000. che sottratti da 11300. resta 2300. più; dunque 30. più 2300. di nuovo sia la base A C. 60. ed E F. 40. Si quadra 60. fa 3600. che sommato con 6400. quadrato di 80. fa 10000. che doveria essere uguale alla somma de' quadrati di 90. e 40. la quale è 9700. per la ragione sottratto 9700. da 10000. questo è 300. più. Sicché 40. più 300. questo minore errore si sottra da 2300. partitore.

Si moltiplica 70. prima posizione via 300. secondo errore si moltiplica 60. seconda posizione via 2300. prima 138000. dal quale si sottra 21000. resta 117000. e per 2000. e viene  $58 \frac{1}{2}$ . per le braccia della base A C. del primo modo si trovano le braccia 41  $\frac{1}{2}$ . sino in 100. E F.

Per 70.  $\times$  P. 2300 — 138000 Per 30.  $\times$  P. 2300 — 69000  
 Per 60.  $\times$  P. 300 — 18000 Per 40.  $\times$  P. 300 — 12000

2000 — 117000


Base A C.  $58 \frac{1}{2}$

Base E F.

O o o o

Ora per trovare la superficie de' Triangolo per Geometria pratica si moltiplica  $98 \frac{1}{2}$ . per 40. metà di B C. 80. vengono braccia 2340. per il Triangolo A B C. Ancora si moltiplica  $41 \frac{1}{2}$ . per 45. metà di D E. 90. vengono brac. 1867  $\frac{1}{2}$ . per la superficie del Triangolo D E F. che è quanto si cercava.

42. D. Sono due Triangoli rettangoli A B C. D E F. il lato A B. e 54. il lato D E. dell' altro Triangolo è 36. l'Ipotenusa A C. è il doppio dell'Ipotenusa D F. ed i lati B C. ed E F. insieme sono 99. Si domandano i lati di ciascun Triangolo distinti?



R. Questa non si scioglie per doppia falsa posizione, benchè sia simile alla passata, ma ci bisogna l'Algebra per essere l'Ipotenusa d'un Triangolo in proporzione doppia all'altra, dove nella passata era in proporzione d'equalità; e per Algebra non importa equazione composta, come la presente. Dal che si deduce, che quei quesiti, che per Algebra importano equazione composta, non si sciolgono per doppia falsa posizione; ma bensì quei, che importano equazione semplice, con tutto che ricerchino estrazione di radice, ma non à modo Algebratico, che allora sono d'equazione composta. Nelle seguenti domande si propongono quesiti con estrazione di radice, da sciogliersi per doppia falsa posizione. Adesso per Algebra si soddisaccia alla domanda.

Sia il lato B C. 1. cosa, il lato E F. sarà 99. meno 1. cosa. Si quadra 1. co. è 1. e si quadra il lato A B. 54. è 2916. si somma con 1. q. farà 1. q. più 2916. uguale ad A C. Ipotenusa per la 47. del primo d'Euclide. Medesimamente si quadra 99. M. 1. cosa, fa 1. q. più 9801. M. 198. cose. Pure si quadra il lato D. E. 36. fa 1296. che si somma con 1. q. più 9801. M. 198. cose, fa 1. q. più 11097. meno 198. cose uguale à D F. Ipotenusa per la medesima. 47. del primo d'Euclide; ma D F. è la metà di A C. si raddoppia dunque 1. q. più 11097. meno 198. cose in cambio di D F. con moltiplicarlo per 4. à modo di radice, e viene 4. q. più 44388. meno 792. cose uguale à 1. q. più 1296. in cambio di A C. Si riduce l'equazione, s'aggiungono alle parti 792. cose sarà 4. q. più 44388. uguali à 1. q. più 1296. cose più 2916. dalle parti si leva 1. q. e 2916. numero, sarà 3. q. più 41472. uguali a 792. cose. Si trasporti il num. 41472. all'altra parte sarà 3. q. uguali à 792. cose meno 41472. si partono le par-



metà di 264. è 132. si quadrà fa 17424. del quale si  
 mero 13824. perche ha il segno meno, resta 3600. da  
 la radice che è 60. che si sottra da 132. e resta 72. va  
 è lato BC. Per il quale si pose 1. cosa. Dunque il lato  
 72. cioè 27. Volendo trovare l' *apotemite* per la 47  
 Euclide, si sommi il quadrato 2916. di AB. 54. con il qu  
 di BC. 72. fa 8100. la di cui radice 90. è l' *apotemite*.  
 mamente si sommi il quadrato 1296. di D E. 36. co  
 to 729. di E F. 27 fa 2025. la di cui radice 45. è l' *apotemite*  
 che è la metà di A C. 90. come deve venire; che è  
 mandava.

43. D. Uno compra una quantità di libbre di Cera  
 la libbra quante sono le libbre, e un terzo di pi  
 lir. 38. Sol. 8. cioè Soldi 768. Si domanda quante

R. Questa domanda astratta da materia si fa così.  
 Si trovino due numeri in proporzione sequiterza, e  
 ti tra loro producano 768.

Si fanno le posizioni al solito, ma in cambio de' *anun*  
 zioni si pigliano i loro quadrati, e si opera al solito  
 mero, che ne viene si cava la radice quadrata, la  
 numero cercato.

Si ponga dunque, che un de' numeri sia 3. l'altro far  
 volta 3. ed una sua terza parte: moltiplicati fanno  
 no fare 768. si sottra 12 da 768. resta 756. meno  
 Di nuovo il primo numero sia 6. l'altro sarà 3. me  
 no 48. e dovevano fare 768. si sottra 48. da 768. r  
 secondo errore. Questo 720. si sottra da 756. pri  
 sta 36. per partitore. Ora in cambio delle *posiz*  
 ghiano i loro quadrati 9. e 16. ed in cambio dell'al  
 ghiano 36. e 64. li quali si moltiplicano in croce  
 trovati, e sottrando un prodotto dall'altro, per av  
 meno, la differenza si partirà per 36. differenza deg  
 si moltiplica 9. per 720. secondo errore fa 6480. per  
 primo errore fa 27216. da questo si sottra 6480. i  
 quale partito per 36. viene 576. da questo si cava  
 drata 24. primo numero, al quale aggiunta la fu  
 cioè 8. viene 32. Si può trovare il 32. con moltipli  
 de' secondi numeri posti nella prima, e seconda  
 gli errori &c. come qui si vede. Sicchè compra lib  
 Soldi 32. la libbra, che costano Soldi 768. cioè lir

$\begin{array}{r} 9 \\ \text{Per } 3 \end{array} \begin{array}{c} \diagup \diagdown \\ \diagdown \diagup \end{array} \text{meno } 756 - 27216$	$\begin{array}{r} 16 \\ \text{Per } 4 \end{array} \begin{array}{c} \diagup \diagdown \\ \diagdown \diagup \end{array} M \text{ } 756 - 48384$
$\begin{array}{r} 36 \\ \text{Per } 6 \end{array} \begin{array}{c} \diagup \diagdown \\ \diagdown \diagup \end{array} \text{meno } 720 - 6480$	$\begin{array}{r} 64 \\ \text{Per } 8 \end{array} \begin{array}{c} \diagup \diagdown \\ \diagdown \diagup \end{array} M \text{ } 720 - 11520$
$\underline{\quad 36 - 20736 \quad}$	$\underline{\quad 36 - 36864 \quad}$

Rad. q. 24. di 576

Rad. q. 32. di 1024.

L' estrarre le radici di qualsivoglia sortes' insegna à suo luogo , e qui si suppone si sappiano estrarre .

Più speditamente per Algebra , ponendo il primo numero 1. cosa , e per l'altro  $1\frac{2}{3}$ . cosa che moltiplicati fanno  $1\frac{2}{3}$ . quad. uguale à 768. quale partito per  $1\frac{2}{3}$ . sarà 1. q. uguale à 576. del quale la radice quadrata è 24. per il valore di 1. cosa, ed  $1\frac{2}{3}$  cosa vale 32. secondo numero .

44. D. Flavio dice à Giulio , io hò anni al doppio di tè ; Orazio sentendo questo dice , e io hò anni al doppio di Flavio , e moltiplicando il numero de' miei anni per quei di Flavio , ed il prodotto per gl'anni di Giulio fanno questo numero 27000. Si domanda quanti anni aveva ciascuo ? cioè si trovino tre numeri in proporzione doppia , che moltiplicato il primo per il secondo ed il prodotto per il terzo facciano 27000.

R. Sia il primo 1. il secondo 2. il terzo 4. li quali numeri moltiplicati fanno 8. quale 8. sottratto da 27000. resta 26992. primo errore di meno. Di nuovo sia 2. il primo, 4. il secondo, 8. il terzo, che moltiplicati fanno 64. che sottratto da 27000. resta 26936. secondo errore di meno , il quale si sottra da 26992. primo errore resta 56. partitore . Adesso in cambio de' numeri delle posizioni fatte si pigliano i loro cubi , cioè in cambio di 1. 2. e 4. si pigliano 1. 8. 64. e per quelli della seconda posizione 8. 64. 512. si moltiplica 8. via 26992. primo errore fa 215936. ed 1. via 26936. secondo errore fa il medesimo , che sottratto da 215936. resta il numero 189000. il quale si parte per 56. e viene 3375. del quale la radice cuba è 15. primo numero , ed anni di Giulio , il doppio 30. anni di Flavio , ed il doppio 60. anni d' Orazio . Quando dal primo numero facilmente si hanno gl'altri numeri , si risparmia fatica lasciando gl'altri .

Più brevemente per Algebra; ponendo per il primo numero 1. cosa per il secondo 2. co. e per il terzo 4. co. moltiplicate fanno 8. cubi uguali à 27000. questo partito per 8. viene 1. cubo uguale à 3375. del quale la radice cuba è 15. valore di 1. co. &c.

2 2 0 0 0

Si prova

Si prova con moltiplicare 15. 30. e 60. fanno 27000. come si to dover fare .

45. D. Quattro compagni si mettono à giocare: Il primo metti alcuni giulj . Il secondo ne mette fuori altrettanti , e la t   pi   ; il terzo ne mette fuori quanti il primo , e secondo quarto ne mette fuori il doppio del secondo, e moltiplicato mero de giulj di ciascuno messi fuori tra loro successivamente fanno questo prodotto 14580. si domanda i giulj del primo Cio   si trovino quattro numeri, che il secondo sia sesquialte primo il terzo sia quanto il primo, e secondo insieme, ed il tutto sia in proposizione al secondo doppia, e moltiplicati detti numeri tra loro facciano 14580.

R. Si supponga , che il primo numero sia 2. il secondo 3. il terzo ed il quarto 6. secondo le conditioni dette, che moltiplicati non 180. meno di 14580. questo numero 14400. primo errore nuovo si ponga , che il primo sia 4. il secondo 6: il terzo 12. quarto 12. che moltiplicati fanno 2880. meno di 14880. che n. 11700. secondo errore ; si sottra 11700. da 14400. resta il partitore . Ora si piglia per il primo num. 2. il quadrato di drato 16. e per l' altro num. 4. della seconda posizione 256. sto si moltiplica per 14400. primo errore fa 3686400. si moltiplicher   ancora 16. via 11700. secondo errore fa 187200. il quale sottra da 3686400. resta 3499200. che si parte per 2700. e ne viene 1296. dal quale si cava la radice censificata ,    quadrata drata , che    6. primo numero , il secondo    9. il terzo 15. quarto 18. secondo le date conditioni , e tanti giulj messi ciascuno .

Per Algebra si ponga per il primo num. 1. co. per il secondo 1. co. per il terzo  $2\frac{2}{3}$ . co. e per il quarto 3. co. si moltiplica 1. co.  $1\frac{2}{3}$  co. fa  $1\frac{2}{3}$  quadrato , e questo via  $2\frac{2}{3}$  co. fa  $3\frac{2}{3}$  cubo, che via 3. co. fa  $11\frac{2}{3}$  quadrato quadrato uguale    14580. che si parte per  $11\frac{2}{3}$ . viene 1296. del quale la radice quadrata quadrata    6. per il primo numero &c.

46. D. Qual'   quel numero , del quale  $\frac{2}{3}$  ed  $\frac{3}{4}$  moltiplicandosi insieme, ed il prodotto moltiplicandosi per  $\frac{3}{4}$  ed il prodotto per il prodotto per  $\frac{3}{4}$  del medesimo numero faccia 108884466432

R. Si ponga per detto numero 126. minimo , che ha le parti trovate aliquote , e moltiplicando 63. met   via 42. terzo il prodotto via 21. sesto , ed il prodotto via 18. settimo , il prodotto via 14. nono del posto numero fa 14002632. il quale sottratto da 108884466432. resta 108870463800. che    del vero primo errore . Di nuovo si ponga per il cercato numero

252. e moltiplicando 126. metà via 84. terzo, poi via 42. sesto, e via 36. settimo, e finalmente via 28. nono del posto numero fa 448084224. il quale sottratto dal proposto 108884466432. resta 108436382208. meno del vero secondo errore, il quale si sottra da 108870463800 primo errore, resta 434081592. Adesso 126. prima posizione si riduce à relato sarà 31757969376. il quale si moltiplica via il secondo errore 108436382208. fa 3443719305405895262208. si riduce ancora 252. seconda posizione à relato 1016255020032 il quale si moltiplica per il primo errore 108870463800. fa 110640155369962130841600. dal quale si sottra l'altro prodotto 3443719305405895262208 e resta 107196436064556235579392. che si parte per 434081592. differenza degli'errori, e viene 246949969867776. dal quale si estrae la radice relata sarà 656. numero cercato.

Per Algebra si spedisce più presto. Si ponga per il numero cercato 1. co. moltiplicandosi  $\frac{1}{2}$  co. via  $\frac{1}{2}$  co. fa  $\frac{1}{4}$ . quadrato questo via  $\frac{1}{2}$  co. fa  $\frac{1}{8}$  cubo, e questo via  $\frac{1}{2}$  co. fa  $\frac{1}{4}$  quadrato quadrato, e questo via  $\frac{1}{2}$  co. fa  $\frac{1}{8}$  relato uguale a 108884466432. e parti per  $\frac{1}{8}$  sarà 1 relato uguale à 246949969867776. del quale la radice relata è 756. numero cercato. Il modo di cavare tal radice s' insegna à suo luogo.



# TRATTATO DECIMO

## Delle Progressioni

### DISTINZIONE PR

#### *Delle Progressioni Arimmetiche*



A Progressione Arimmetica meri, che immediatamente una medesima differenza, qu e la prima è naturale, che suoi termini vanno avanza Come 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. La seconda Progressione è che comincia da 1. e la differ 1. 3. 5. 7. 9. &c.

La terza Progressione comincia da 1. e procede come 1. 4. 7. 10. 13. &c.

La quarta progressione procede con differenza la sesta di 6. &c. cominciando da 1.

Altre Progressioni non cominciano da 1. ma da procedono con la medesima differenza, e la con la differenza di 2. come 2. 4. 6. 8. 10. &c. 3. come 2. 5. 8. 11. 14. &c.

Questa seguente comincia dal 6. con la differenza 14. 18. 22. &c. e si continuerebbe quanto uno gere sempre 4. differenza, la quale si trova fo antecedente dal seguente immediato come da vero da 14. si sottra 10. resta 4. differenza. C gressioni. Ma volendo sminuire la Progressio mano in mano la differenza, come nelle passi 22. resta 18. il 4. da 18. resta 14. &c.

2. De' Termini di Progressione Arimmetica in n di mezzo raddoppiato da un numero uguale mini equidistanti dal medesimo termine. Co Raddoppiato 8. fa 16. e tanto fa 5. con 11. e 2 Di quanti termini sieno in numero pari, quei di n no il medesimo numero, che altri due equidi me 3. 5. 7. 9. 11. 13. Ora 7. con 9. fa 16. sicc

con 12. dal che nasce l' intendere la ragione, perche à voler sommare brevemente li termini di ciascuna progressione, si sommi il primo, e l'ultimo, e la somma si multiplichi per la metà de' termini.

*Del sommare brevemente i termini della Progressione*

*Arimmetica, sapendosi il numero de' termini con il primo, & ultimo termine.*

- |  |   |
|--|---|
| 3. Regola prima. Si somma il primo, & ultimo termine, e la somma si moltiplica per la metà de' termini, il prodotto farà la somma. Della progressione naturale 1. 2. 3. &c. l'ultimo termine sia 24. il quale è ancora numero de' termini in questa Progressione, però aggiunto 1. à 24. fa 25. il quale moltiplicato per 12. metà di 24. fa 300. per la somma cercata. In altro modo si moltiplica 25. termine seguente per 24. il prodotto 600. si parte per 2. e viene la somma 300. la somma di questa Progressione sempre è numero Triangolare. | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10 |
| Medesimamente per sapere la somma de' termini della seconda Progressione, che comincia da 1. e segue in numeri dispari con la differenza di 2. all'ultimo termine per esempio 15. si aggiunge 1. primo termine, fa 16. il quale si moltiplica per 4. metà de' termini fa 64. per la somma. In altro modo si moltiplica in se il numero de' termini, e viene la somma, come 8. via 8. fa 64.  | 11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17          |
| 4. Pure volendo la somma d' alcuna Progressione, che non comincia da 1. della quale il primo termine sia 5. l'ultimo 29. & il numero de' termini 7. si somma 5. e 29. fa 34. il quale si moltiplica per 3 $\frac{1}{2}$ . metà di 7. e viene la somma 119. ovvero 17. metà di 34. si moltiplica per 7. e fa 119. somma. Ancora si moltiplica 34. per 7. & il prodotto 238. si parte per 2. e viene 119.  | 18<br>19<br>20<br>21<br>22<br>23<br>24          |
| 5. Nel medesimo modo si sommano li termini in numero pari della Progressione Arimmetica di doppia differenza, come questa di 1. e di 2. alternativamente 4. 5. 7. 8. 10. 11. 13. 14. aggiungendo 4. al 14. fa 18. che si moltiplica per 4. metà de' termini viene la somma 72.   | 300<br>1<br>3                                   |
| 6. Si ricerca, che i termini sieno in numero pari; acciò sommando i termini estremi facciano quel numero, che fanno gl' altri termini cioè il secondo con il penultimo, il terzo con l' antepenultimo &c. come si è detto dell' altre Progressioni, e così 4. con 14. fa 18. e 5. con 13. pure fa 18. &c.  | 5<br>7<br>9<br>11<br>13                         |
| Ma se i termini della Progressione fussero in numero dispari, si lascia l' ultimo, e gli altri si sommano nel modo detto   | 15<br>64  |

detto, ed alla somma s'aggiunge l'ultimo lasciato  
averà la somma. O pure si lascia il primo termine  
sommano brevemente gl'altri, aggiungendo alla  
il primo. Sia per esempio 1. 3. 8. 10. 15. 17. a  
la differenza di 2. e di 5. e li termini sono 7. lasciato  
mo 22. si somma 1. con 17. fa 18. che si moltiplica  
metà de' termini, fa 54. il quale si somma con 22. fa  
la somma. Ovvero lasciato 1. si somma 3. con 3. con  
25. che si moltiplica per 3. fa 75. ed aggiunto 1. fa  
76. come per l'altro modo.

*Dalla somma de' termini con la cognizione del primo  
trovare il numero de i termini della Progressione  
naturale.*

7. Regola seconda. La somma sia 78. d'una Progressione  
che comincia da 1. per regola Ferma si moltiplica  
per 2. dal prodotto 156. si estrae la radice quadra  
avanza 12. la radice quadra, e l'avanzo dimostra  
termini essere 12. Si prova per la regola prima: Si  
12. fa 13. che si moltiplica per 6. metà de' termini  
somma data.

Si abbiano da trovare i termini d' una Progressione  
comincia da 5. e la somma de' termini è 110.

Si trova la somma de i quattro termini, che mancano  
prima ed è 10. che si aggiunge fa 120. ora questo si  
8. fa 240. del quale la radice quadra 15. e l'avanzo  
va 4. per li quattro termini, che mancano, e restan  
di tal Progressione, che si cercavano.

La ragione; perchè si moltiplichino la somma per 2. e d  
cavi la radice quadra si ha dall'Algebra, della qual  
perazione per chi l'intende. Sia la somma d'una Pro  
naturale 28. e si voglia il numero de' termini, il quale  
gressione è l'ultimo termine; per esso pongo 1; col  
aggiungo il primo termine 1. fa 1. cosa più 1. il qu  
per la metà de' termini, cioè per  $\frac{1}{2}$ . cosa, e viene  $\frac{1}{2}$   
fa uguale a 28. somma. Si moltiplicano le parti pe  
dove nasce il moltiplicare la somma per 2. ) e fanno  
cosa uguali a 56. ovvero 1. qu. uguale a 56. meno 1.  
di 1. è  $\frac{1}{2}$ . si quadra fa  $\frac{1}{4}$ . che si aggiunge a 56. fa 56  
la radice quadra  $7\frac{1}{2}$ . dalla quale si leva  $\frac{1}{2}$ . metà di  
numero de' termini cercati. Dal che si deduce, ch  
moltiplicare la somma per 2. e farebbe 56. e si aggi  
da 56  $\frac{1}{4}$ . si caverebbe la radice  $7\frac{1}{2}$ . dalla quale le

P p p p

numero de' termini . Così per tutte l'altre somme di Progressioni naturali : Ma per abbreviare operazioni si raddoppia la somma, dal numero venuto si estrae la radice quadra, la quale è sempre il numero de' termini .

*Dalla somma de' termini con la cognizione del primo, ed ultimo termine, trovare il numero de' termini in qualsiasi Progressione Aritmetica .*

8. Regola terza . Si moltiplica la somma per 2. il numero prodotto si parte per la somma del primo, ed ultimo termine, e verrà il numero de' termini . Sia la somma d'una Progressione 156. il primo termine 2. e l'ultimo 24. si moltiplica 156. per 2. il prodotto 312. si parte per 26. somma di 2. e 24. ne viene 12. numero de' termini .

*Dalla somma de' termini con la cognizione del primo termine, e del numero de' termini trovare l'ultimo termine .*

9. Regola quarta . La somma si moltiplica per 2. il prodotto si parte per il numero de' termini, e viene la somma del primo, ed ultimo termine, dalla quale si sottra il primo, resta l'ultimo cercato .

10. Come somma 156. moltiplicata per 2. fa 312. che si parte per 12. numero de' termini, viene 26. dal quale levato 2. primo termine resta 24. ultimo termine .

*Dalla cognizione del primo ed ultimo termine, e del numero de' termini trovare la differenza da un termine all'altro immediato .*

10. Regola quinta . Sia il primo termine 2. l'ultimo 24. ed il numero de' termini 12. si sottra il primo termine 2. dall'ultimo 24. il restato 22. si parte per 11. che è meno 1. di 12. numero de' termini e viene 2. differenza da un termine all'altro. E così in altri esempi . La ragione di questo operare si ha dall' Algebra per esempio . Il primo termine è 5. l'ultima 54. il numero de' termini 8. Si pone per la differenza 1. così il primo termine 5. il secondo dunque 5. più 1. così il terzo 5. più 2. cose, il quarto 5. più 3. cose, il quinto 5. più 4. cose, il sesto 5. più 5. cose, il settimo 5. più 6. cose, e l'ottavo 5. più 7. cose, uguale a 54. ultimo termine . Si leva 5. dalle parti (Eccoci di dove nasce il levare il primo termine dall'ultimo .) Restano 7. cose uguali a 49. questo partito per 7. vien 7. differenza cercata . E si osservi che il partitore 7. è meno 1. di 8. numero de' termini .

*Dall'ultimo termine, con il numero de' termini, e loro differenza trovare il primo termine .*

11. Regola sesta . Sia l'ultimo termine 100. il numero de' termini 32. e la differenza 3. si leva 1. dal 32. numero de' termini resta 31. che





- con 7. la seconda comincia per 7. e prosegue pure per 7. di questa per trovare l'ultimo termine per la regola settima si leva 1. da 15. numero de' termini di ciascuna progressione, resta 14. che si moltiplica per 7. ascendente, e differenza fa 98. al quale aggiunto 7. primo termine fa 105. ultimo termine, ed a 98. aggiunto 9. primo termine della prima fa 103. suo ultimo termine. Adesso si somma 5. primo termine con 105. ultimo termine fa 110. il quale si moltiplica per 15. metà de' termini, e giorni, il prodotto 1650. sono gli Scudi presi da tutti due, e perchè il maggior fratello ha preso ogni volta Sc. 2. più, in 15. volte ha preso Sc. 30. che sottratti da Sc. 1650. restano Sc. 1620. la metà sono del minore cioè Sc. 810. e 810. con 30. cioè Sc. 840. sono stati presi dal maggiore.
16. Due Fratelli hanno pigliato da una Cassa alquanti Scudi, il maggiore Sc. 840. il minore 810. in questo modo, la prima volta il minore prese Sc. 5. il maggiore 7. il minore 12. il maggiore 14. pigliando sempre Sc. 2. più del minore; Si domanda in quante volte hanno pigliato li detti Scudi.
- Da Scudi 840. si sottrano Sc. 810. restano Sc. 30. il quale si parte per 2. Scudi, che di più piglia il maggiore, e verrà 15. ed in 15. volte gli ha pigliati ciascuno.
17. Due sono debitori di ugual somma di lire a Carlo. Il primo si accordò a pagargli ogni giorno lir. 18. Il secondo a pagargli il primo giorno lira 1. il secondo 2. il terzo 3. continuando per progressione naturale: Si domanda cominciando in un medesimo giorno, in quanti giorni ciascuno averà pagato l'istessa quantità di lire, e di quante erano debitori.
- Si moltiplicano lir. 18. per 2. fa 36. dal quale levato 1. resta 35. ed in tanti giorni ciascuno averà pagato ugual somma di lire; per trovare quante, si moltiplica 18. per 35. fa 630 lire pagate dal primo. Per il secondo, l'ultimo termine della progressione naturale è 35. per la regola prima aggiungendo 1. a 35. fa 36. per 18. sua metà si moltiplica 35. al prodotto 630. sono le lir. pagate dal secondo dunque in giorni 35. ciascuno averà pagato lir. 630. per prova si fa altra domanda.
18. Due pagarono per ciascuno a Carlo lire 630. in questo modo, il primo pagò ogni giorno una certa, e determinata quantità di lire. Il secondo poi il primo giorno pagò lira 1. il secondo lir. 2. il terzo lir. 3. e così fino alla somma di lir. 630. Si cerca in quanti giorni pagarono, e quante lir. pagava il primo ogni giorno. Per la regola seconda si moltiplicano 630. per 2. dal prodotto 1260. si cava la radice quadra 35. ovvero l'avanzo 35. dimostra li giorni ne quali pagarono, Ora per 35. si partono lire 630. e vengono Nr. 18. che ogni dì pagava il primo.
19. Due

19. Due si accordarono di mettere da parte una quantità di Scudi, ciascuno ugual somma in questo modo; il primo mettendola da parte il primo mese Scudo 1. il secondo Sc. 3. il terzo Sc. 5. crescendo Sc. 2. ogni mese. Il secondo poi mettendola da parte ogni mese determinatamente Sc. 20. in quanti mesi avranno messo da parte la medesima quantità di Scudi, e qual sia.

Si sappia, che con la progressione de' numeri dispari sempre rappresentano il numero de' suoi termini quelli Scudi messi da parte determinatamente, come qui Scudi 20. sicchè in mesi 20. avranno messo la medesima quantità, cioè Sc. 400. per ciascuno, perchè a Sc. 20. il mese in 20. mesi tanti sono, e per trovare la somma de' termini della progressione de' numeri dispari, per il secondo modo della regola prima, si moltiplica il numero de' termini 20. in se, cioè per 20. e si avrà la somma di Sc. 400. dunque in mesi 20. ciascuno avrà posto da parte Sc. 400.

20. Due messero da parte ugual somma di Scudi. Il primo ponendo il primo mese Scudo 1. il secondo Sc. 3. e così crescendo 2. d'altro 12. mesi. Il secondo durò mesi 18. con porre la medesima quantità di Scudi ogni mese: Si domanda quanti Scudi erano questi. Per il secondo modo di trovare la somma nella progressione de' numeri, si moltiplica 12. per 12. fa 144. per li Scudi da ciascuno posti da parte, li quali si partono per mesi 18. risultano Sc. 8. che poneva da parte il secondo ogni mese.

21. Due altri convengono di pagare ad una Persona ugual quantità di lire. Il primo con pagare ogni giorno giulj 16. Il secondo con pagare il primo giorno giulj 2. il secondo giorno giulj 4. il terzo giulj 6. crescendo ogni giorno giulj 2. Si vuol sapere, avendo cominciato ambedue il pagamento nel medesimo giorno in quanti giorni avranno pagato la medesima quantità di giulj, e quanti faranno.

Si trovi il numero de' termini, da 16. si leva 1. resta 15. ed in tanti giorni avranno pagato ugual somma di giulj, si moltiplica 15. per 16. fa 240. per li giulj, che avrà pagato ciascuno. Si prova per il secondo 15. è il numero de' termini, raddoppiato fa 30. ultimo termine della progressione, per la regola prima, aggiunto 2. primo termine fa 30. fa 32. la metà 16. moltiplicata per 15. fa 240. somma di tutti li termini, e delli giulj pagati dal secondo uguali a quelli del primo.

22. Due sono ugualmente debitori di una quantità di Scudi. Il primo si accorda col creditore di pagare Sc. 20. il mese. Ed il secondo di pagare Sc. 4. Il Primo mese, il secondo mese Sc. 8. crescendo Sc. 4. ogni mese. Domando avendo soddisfatto al debito

bito nell'istesso mese, quanti mesi durarono à pagare, e la quantità de' Scudi pagati.

Quando la progressione comincia dal numero ascendente, come questa, si parte Sc. 20. del primo per Sc. 4. numero ascendente del secondo viene 3. il quale si moltiplica per 2. fa 10. dal quale sottratto 1. che manca nella progressione, resta 9. per il numero de' termini, e de' mesi, ne i quali pagarono. Si moltiplicano Sc. 20. per 9. viene 180. tanti Scudi pagò ciascuno.

Si veda se veramente pagò tanti Scudi il secondo. Per la prima regola si moltiplica 4. ascendente per 9. numero de' termini fa 36. ultimo termine, e Scudi dell'ultima paga; al quale si aggiunga il primo termine 4. fa 40. la metà 20. moltiplicata per 9. numero de' termini verrà 180. somma della progressione, e Scudi pagati dal secondo uguali à quelli del primo.

Avvertasi che cominciando la progressione per numero diverso dall'ascendente si opera come nel seguente quesito.

33. Due sono debitori ugualmente di una quantità di Scudi. Il primo paga Sc. 20.  $\frac{1}{2}$  il mese al creditore, e nel medesimo mese il secondo paga Sc. 3. all'istesso creditore con patto di pagare ne i mesi seguenti Sc. 5. di più, cioè nel secondo mese Sc. 8. nel terzo Sc. 13. &c. Domando, avendo sodisfatto al creditore nel medesimo mese, quanti mesi durarono à pagare, e quanti Sc. pagarono. Si raddeppiano Sc. 20.  $\frac{1}{2}$ . fa 41. somma del primo, ed ultimo termine nella progressione, da 41. si leva 3. primo termine resta 38. ultimo termine, ora per la regola ottava si trova il numero de' termini sottraendo da 38. il primo termine 3. resta 35. che si parte per 5. numero ascendente, o differenza viene 7. al quale aggiunto 1. fa 8. per il numero de' termini, e per li mesi, ne quali pagarono. Si moltiplica 8. via 20.  $\frac{1}{2}$ . Scudi, che paga il primo ogni mese, e vengono Sc. 164. da lui pagati. Si veda per il secondo, si somma 3. primo termine con 38. ultimo, viene 41. il quale si moltiplica per 4. metà del numero de' termini, il prodotto 164. sono Scudi pagati dal secondo uguali à quelli del primo.

Si d'avvertire in simili quesiti, che quando il numero de' termini viene con rotto, allora è necessario usare altro modo, nel che si è ingannato Giuseppe Unicornio nel lib. 2. caso quinto carte 77. Ecco il suo caso.

24. Sono due, che si partono da un medesimo luogo ad un tempo per l'istessa via. Il primo va continuamente miglia 17. al giorno. Il secondo lo segue facendo il primo giorno miglia 4. il secondo giorno miglia 7. il terzo miglia 10. &c. Si domanda in quanti giorni avrà giunto il primo.

Dice

Dice l'Unicorno, duplica 34. per 17. fa la somma del primo ed ultimo termine, e cavandone il primo 4. resta 30. che è l'ultimo di tale Progressione, e per trovare il numero de' termini, cavane il primo termine 4. resta 26. e questo parti per l'ascendente 3. verranno 8  $\frac{2}{3}$ . aggiungi 1. fa 9  $\frac{2}{3}$ . e tanti sono li giorni, ne quali il secondo aggiongerà il primo. Che questa Conclusione sia falsa, si prova; miglia 17. il giorno in giorni 9  $\frac{2}{3}$ . sono miglia 164  $\frac{2}{3}$ . ed il secondo in giorni 9. fa miglia 144. e nell'  $\frac{2}{3}$ . di giorno a ragione di miglia 31. che faria il decimo giorno, fa miglia 20.  $\frac{2}{3}$ . che sommate con 144. fanno miglia 164  $\frac{2}{3}$ . Sicchè questo averebbe passato il primo di  $\frac{2}{3}$ . di miglio. Per assegnare il tempo giusto si fa così. Si trova, che il primo in giorni 9. a miglia 17. il giorno, fa miglia 153 ed il secondo in giorni 9. miglia 144. Ora se camminassero tutto il decimo giorno, il primo farebbe miglia 17. il secondo miglia 31 sicchè il secondo lo sopravanzarebbe miglia 14. e per essere del pari ci vogliono miglia 9. da 144. a 153. però per regola del Trè si dica: Se miglia 14. in giorni 1. miglia 9. in che parte di giorno si averanno e risulterà  $\frac{1}{4}$ . il quale aggiunto a giorni 9. dice 9  $\frac{1}{4}$ . ed in tanti giorni faranno pari di viaggio, perchè il primo a miglia 17. il giorno, farà miglia 163  $\frac{1}{4}$ . ed il secondo il giorno 9. ne fa 144. ed in  $\frac{1}{4}$ . di giorno ne fa 19  $\frac{1}{4}$ . che sommato con 144. fanno appunto miglia 163  $\frac{1}{4}$ .

25. Due fanno viaggio, il primo fa miglia 17. il giorno, il secondo fa miglia 4. il primo giorno, miglia 8. il secondo giorno, miglia 12. il terzo &c. Si cerca dopo quanti giorni faranno insieme, e quante miglia averanno fatto.

Si parte 17. per 4. viene 4  $\frac{1}{4}$ . il rotto si lascia, il 4. si radoppia fa 8. dal quale si leva 1. (Perchè la Progressione non comincia da 1.) resta 7. ed in 7. giorni faranno vicini; perchè moltiplicate miglia 17. per 7. fa 119. e tante miglia averà fatto il primo dopo 7. giorni. Per il secondo si moltiplica 4. per 7. fa 28. e tante miglia fa il settimo giorno, aggiunto a 28. ultimo termine il primo 4. fa 32. la metà 16. moltiplicata per 7. fa 112. e tante miglia averà fatto il secondo dopo 7. giorni, e nell'ottavo giorno fa miglia 32. che viene ad avanzare miglia 15. sopra 17. che fa il primo, e ne averebbe d'avanzare 7. che tante se ne vogliono da 112. a 119. però per regola del Trè; Se 15. in giorni 1. in che parte di giorno miglia 7. ed operato verrà  $\frac{1}{3}$ . di giorno. Dunque faranno insieme dopo giorni 7  $\frac{1}{3}$ . Per sapere le miglia; Se miglia 32. in giorno 1. quante in  $\frac{1}{3}$ . di giorno? e verranno 14.  $\frac{1}{3}$ . che aggiunte a 112. fanno miglia 126.  $\frac{1}{3}$ . per il primo. Ora per il secondo; Se giorno 1. miglia 17. che  $\frac{1}{3}$ . di giorno? e verranno

raano miglia  $7\frac{1}{4}$ . che aggiunte a 119. fanno miglia  $126\frac{1}{4}$ . Sic.  
che ciascuno averà fatto le medesime miglia, e resta provato il  
quesito.

26. Due partono in un medesimo tempo da un luogo verso un'altro  
per una medesima strada. Il primo fa alcune determinate mi-  
glia ogni giorno. Il Secondo poi il primo giorno fa miglia 4. il se-  
condo giorno miglia 8. e così va crescendo miglia 4. ciascuna gior-  
no. Si domanda essendo arrivati insieme in giorni  $7\frac{1}{2}$ . quante  
miglia faceva determinatamente il primo.

Come nella passata si trova, che il secondo in giorni 7. hà fatto  
miglia 112. ed in  $\frac{1}{2}$ . di giorno, à ragione di miglia 32. l'otta-  
vo giorno hà fatto miglia  $14\frac{1}{2}$ . che con 112. fanno miglia  
 $126\frac{1}{2}$ . Ora se giorni  $7\frac{1}{2}$ . danno miglia  $126\frac{1}{2}$ . quan-  
te miglia darà giorno 1? e risulteranno miglia 17. che faceva il  
primo.

27. Uno paga Scudi 600. in questo modo. Il primo giorno Sc. 2. il  
secondo 4. e così segue à pagare Scudi 2. più ogni giorno. Si cer-  
ca in quanti giorni gli pagherà, e quanti Scudi nell'ultima paga.  
Si moltiplicano Sc. 600. per 4. al prodotto aggiunto 1. fa 2401. dalla  
sua radice quadrata 49. levato 1. restano 48. per li Scudi pagati  
nell'ultima paga: La metà 24. sono giorni, ne quali li paga.

Avvertasi, che essendo Sc. 620. moltiplicati per 4. con aggiungere 1.  
viene 1481. la radice quadrata sua è 40. ed avanza 80. il quale si  
parte per 4. vengono 20. e levato 1. da 49. restano Scudi 48. dell'  
ultima paga, la metà 24. sono li giorni, e nel ventesimo quinto  
giorno pagherà li restati Scudi 20.

28. Uno si è obligato à pagare lire 144. in questo modo, che il pri-  
mo giorno paga lira 1. il secondo lire 3. il terzo lire 5. e così se-  
gue per numeri dispari. Si domanda quante lire darà nell'ultima  
paga, ed in che giorno.

Per regola ferma si moltiplica 144. per 4. fa 976. del quale la radice  
è 34. e la metà 12. sono i giorni, e da 24. levato 1. resta 23. per  
le lire dell'ultima paga fatta nel giorno duodecimo.

29. Quesito. decimoquarto di Fr. Luca distinzione. seconda, trattato  
quinto, à carte 41. Da Fiorenza à Roma fieno miglia 100. Sono  
quattro compagni, che si partono da Fiorenza diversamente. Il  
primo cammina nel primo giorno un miglio, nel secondo giorno  
miglia 2. nel terzo miglia 3. e così va crescendo un miglio ciascun  
giorno. Il secondo compagno nel primo giorno va un miglio,  
nel secondo miglia 3. nel terzo 5. e così cresce 2. ogni giorno, il  
terzo compagno nel primo giorno va miglia 2. nel secondo mi-  
glia 4. nel terzo miglia 6. e così cresce 2. per numeri pari. Il quarto  
com-

dopo l'altro? Da Fr. Luca non è bene sciolto, onde si scioglie così.

Per le regole date, il primo in giorni 13. fa miglia 91. il 9. sino in 100. si pone sopra una linea con sotto 14. miglia, che farebbe nel giorno seguente. Sicchè in giorni 13  $7\frac{1}{2}$ . il primo arriva a Roma. Di 100. la radice q. 10. sono giorni, ne quali arriva il secondo. Il terzo in giorni 9. fa miglia 90. il 10. sino in 100. si pone sopra una linea con sotto 20. miglia, che farebbe nel decimo giorno starà così  $\frac{2}{3}\frac{2}{3}$ . chisato  $\frac{2}{3}$ . sicchè in giorni 9.  $\frac{2}{3}$  il terzo arriva a Roma. Finalmente il quarto in giorni 6. fa miglia 84. il 16. sino in 100. si pone sopra una linea con sotto 28. miglia, che farebbe nel settimo giorno, starà così  $\frac{2}{3}\frac{2}{3}$ . chisato  $\frac{2}{3}$ . sicchè in giorni 6  $\frac{2}{3}$ . arriva il quarto a Roma. Ora si sottrano da giorni 13  $7\frac{1}{2}$ . giorni 10. del secondo, restano giorni 3  $7\frac{1}{2}$ . che partirà il secondo compagno dopo il primo. Da giorni 10. si sottrano giorni 9.  $\frac{2}{3}$  del terzo resta un mezzo giorno, che partirà il terzo doppo il secondo, e finalmente si sottrano da giorni 9  $\frac{2}{3}$ . li giorni 6.  $\frac{2}{3}$ . restano giorni 2  $\frac{2}{3}$ . che partirà il quarto dopo il terzo, ed arriveranno ad un tempo in Roma.

31. Uno si parte da Fiorenza, ed arriva dopo giorni 13  $7\frac{1}{2}$ . ad un luogo, essendo andato il primo giorno un miglio., il secondo 2. il terzo 3. per Progressione naturale. Domandasi quante miglia erano da Fiorenza a quel luogo.

A giorni 13. aggiunto 1. fa 14. la metà 7. moltiplicata per 13. fa 91. per le miglia fatte ne i giorni intieri: adesso perchè nel decimo quarto giorno farebbe miglia 14. si dica; Se giorno 1. dà miglia 14. che miglia darà  $7\frac{1}{2}$ . di giorno? e ne darà 9. che aggiunte a 91. fanno miglia 100. da Fiorenza a quel luogo.

32. Uno a 32. Lavoranti diede un giorno al primo, che arrivò al lavoro Sol. 100. al secondo 97. e così scemò Sol. 3. fino all'ultimo. Si cerca quanti Soldi diede in tutto brevemente?

Per la regola sesta, si leva 1. da 32. resta 31, il quale si moltiplica per 3. ascendente fa 93. che sottratto da 100. ultimo termine resta 7. primo termine. Ora per la regola prima si trova la somma de' termini, aggiungendo 7. primo a 100. ultimo fa 107. il quale si moltiplica per 16. metà de' termini fa 1712. per la somma, e soldi pagati, che sono lire 85. soldi 12.

33. Uno si parte da un luogo, e va ogni giorno miglia 25. e dopo giorni 6. un' altro lo seguita con fare il primo giorno miglia

Q444

10. e

10. e l'altro giorno accresce alcune miglia, le quali vā crescendo ogni giorno, fino che dopo 12. giorni l'arriva. Si domanda quante miglia fece il secondo, e l'ultimo giorno, che l'arrivò.

A giorni 12. si aggiungono giorni 6. che era andato avanti il primo, fanno 18. che si moltiplica per 25. miglia, il prodotto 450. miglia che fa anche il secondo in giorni 12. che è il numero de' termini della Progressione, e 450. è la somma di tutti li termini. Adesso per la regola quarta, si raddoppia 450. viene 900. che si parte per 12. numero de' termini, risulta 75. somma del primo, ed ultimo termine, da 75. si leva 10. primo termine, resta 65. ultimo termine, e miglia che ha fatte l'ultimo giorno il secondo Viandante. Per la regola quinta si sottra 10. primo da 65. ultimo termine resta 55. che si parte per 11. numero de' termini meno 1. e viene 5. ascendente della Progressione. Onde aggiunto 5. a 10. fa 15, per le miglia del secondo giorno, che si cercavano.

34. Questo 27. di B. Luca a car. 42. dal Tartaglia nella seconda parte del lib. primo Cap. XV. Caso 26. più tosto imbrogliato, che emendato, qui più chiaramente proposto, e risoluto.

Una Lepre è avanti ad un cane passi 60. de' suoi, il qual Cane gli vā dietro con fare il medesimo numero di passi, che fa da li avanti la Lepre. Si cerca in quanti passi de' suoi il Cane sarà al pari della Lepre, mentre 5. passi del Cane sono uguali a passi 7. della Lepre.

Passi 2. di Lepre sono avanzati da passi 5. di Cane, come è chiaro. Onde per regola del Trè, se passi 2. di Lepre vengono avanzati da passi 5. di Cane, passi 60. di Lepre, che è avanti, da quanti passi di Cane saranno avanzati? e risulteranno passi 150. di Cane, ed in tanto sarà al pari della Lepre.

Si prova cosa i passi 150. che ha fatto anco la Lepre si aggiungono 60. che era avanti, fanno passi di Lepre 210. Ora si veda se il Cane ha fatto uguale spazio, dicendo per regola del Trè. Se 5. passi di Cane sono 7. di Lepre, passi 150. di Cane quanti di Lepre saranno? e saranno 210. e sta bene. Pure partendo 150. per 5. e 210. per 7. risulta 30. uguale spazio.

35. Uno piglia a suavare braccia 20. di terra da un Pozzo per Sc. 42. Si domanda avendone cavate braccia 20. quanti Scudi gli si devono di sua fatica.

Secondo alcuni si sodisfa alla domanda così: Si trova la somma di 20. termini di Progressione naturale per le 20. braccia s'aggiunge 1. a 20. fa 21. che si moltiplica per 10. metà de' termini, fa 210. Medesimamente si trova la somma di 20. termini per le braccia 10. aggiunt



aggiungendo 2. a 4. fa 6. che si moltiplica per 5. metà de' termini n. fa 55. Ora si dice: Se a te ricordi di mercede Scudi 42. che ne ricercherà 155? e rifuteranno studi: 1. da pagarsi per le braccia 10. e per braccio 1. gli si doveranno giulij 2. secondo questo modo d'operare: a 2. aggiungendo 4. fanno 6. giulij per braccio a 6. aggiungendo 6. fanno 12. giulij per braccio 3. a 12. aggiungendo 2. fanno giulij 20. per braccio 4. e così a 8. aggiungendo 10. e poi 12. e 14. &c. Per Progressione Arimmetica con la differenza di 2. si averanno li giulij dovuti alle braccia per ordine:

Altri moltiplicano 20. per 20. ed hanno 400. Pare 10. via 10. ed hanno 100. e poi per regola del Tre: Se 400. Scudi 42. quanti Scudi vogliono 400? e risulteranno Scudi 40.  $\frac{1}{2}$ .

36 Da un' Amico che mi poteva comandare richiesto di tutti li Bini, Terni, Quaterni, e Cinquine diverse, che potevano estrarsi nel giuoco di Genova di nomio 90.

Trova le seguenti regole poste in questo luogo, perchè si ricerca di trovare le somme di Progressioni Arimmetiche naturali come dirò.

La prima regola da me trovata; è per li Bini, cioè tutte le diverse estrazioni possibili di Nomi 150. presa due a due. (Quello che si dice di 150. intendasi di qualsivoglia altro numero.) Da 150. si leva 1. perchè 1. non fa Binario, resta 149. di questi come termini di Progressione naturale si trova la somma per la regola prima numero 3. pigliando la metà di 150. termine seguente, cioè 75. per il quale si moltiplica 149. e viene 11175. somma di tal Progressione, e tanti sono li Bini, o Binarij di 150. Nomi.

Si offervi, che a Binario 1. aggiungendo 2. fa Binarij 3. di tre Nomi aggiungendo 3. a Binarij 3. fanno Binarij 6. di 4. Nomi, a 6. aggiungendo 4. fanno Binarij 10. di 5. nomi, aggiungendo 5. e poi 6. 7. 8. &c. termini della Progressione naturale, si averanno li Binarij, o Bini de' nomi per ordine.

Acciò non resti dubbio, che 150. nomi costituiscono una Progressione naturale di 149. termini, si offervi questo ne' Binarij di otto lettere cioè A. B. C. D. E. F. G. H. secondo la disposizione seguente,  
 AB BC CD DE EF FG GH importando 7. termini; li quali  
 AC BD CE DF EG FH si moltiplicano per 4. metà di 8.  
 AD BE CF DG EH lettere termine seguente, e fanno  
 AE BF CG DH 12. e tanti Binarij sono. Da Binarij, o Bini dependono i Ternarij, o Ternarij, come dirò appresso.

37. La seconda Regola per i Terni è. Da 150. si leva 2. perchè non fanno un Terno, resta 148. si trova la somma di 148. termini di Progressione naturale; di 148. la metà è 74. per questo si moltiplica 149. fa 11026. somma di 448. termini e Binarii di 149. per la passata Regola: ma perchè i Terni risultano da tante Progressioni naturali, quanti sono i termini della prima con gradazione, e si è trovata la somma di una sola di 148. termine, nel medesimo modo si troverebbe la somma di termini 147. e poi di 146. &c. fino ad 1. si sommerebbero tutte quelle somme, e la somma totale farebbe il numero di tutti li Terni diversi. Che fatica sarebbe questa da farsi senza fretta, ciascuno intendente di Abbaco la conosce. Onde per Regola da me trovata si parte 150. per 3. per il quoziente 50. si moltiplica 11026. somma della prima Progressione, e Binarii di 149. termini, il prodotto 551300. dimostra tutti li Terni diversi di 150. nomi.

Qui potrei mettere di 9. lettere tutti li Ternarij, acciò sotto l'occhio si vedessero; che costituirebbero 7. Progressioni naturali diverse che sommate darebbero Terni 84. ma per brevità ciò tralascio, potendo ciascuno questo da sé provare, siccome anco nelle seguenti Regole di Quaterni, e Cinquine, dove le Progressioni sono assaiissime.

38. La terza Regola per li Quaterni, o Quaternarij è; da 150. si leva 3. che non fa quaterno resta 147. la somma della Progressione naturale di 147. termini si ha con moltiplicare 147. via 74. metà del termine seguente fa 10878. Binarii di 148. termini, si osservi; Ora si parte 149. per 3. viene  $49\frac{2}{3}$ . si parte ancora 150. per 4. viene  $37\frac{3}{4}$ . adesso si moltiplica 10878. per  $49\frac{2}{3}$ . fa 540254. Terni di 149. termini, e questo si moltiplica per  $37\frac{3}{4}$ . e fa 20260275. che sono li Quaterni diversi di 150. nomi.

39. Regola quarta per le Cinquine. Da 150. si leva 4. perchè non fa Cinquina, resta 146. la somma della Progressione naturale di 146. termini si ha moltiplicando 147. termine seguente per 78. metà di 146. fa 10731. Binarii di 147. termini. Di nuovo si osservi: Si parte 148 per 3. viene  $49\frac{1}{3}$ . si parte 149. per 4. viene  $37\frac{1}{4}$ . e si parte 150. per 5. viene 30. si moltiplica 10731. per  $49\frac{1}{3}$ . fa 529396. Terni di 148. termini. 529396. si moltiplica per  $37\frac{1}{4}$ . vengono 19720001. Quaterni di 149. termini, e li Quaterni si moltiplicano per 30. e risultano 591600030. Cinquine diverse di nomi 150.

Con quest'ordine da me trovato si possono trovare li Senarij, Settenarij &c. Perchè volendosi li Senarij diversi di 150. Nomi, da 150. si leva 5. perchè 5. non fa Senario del 145. come termini di Progressio-

gressione naturale si trova la somma la quale si moltiplica successivamente per li quozienti che si hanno da partire 147. per 3. 148. per 4. 149. per 5. e 150. per 6. e verranno tutti li Senarij di 150. nomi, e quello che si è detto di 150. si deve intendere di qualsivoglia altro numero osservando secondo quell'ordine insegnato.

Le diverse estrazioni di nomi 150. possibili sono.

A' uno à uno 150. Bini, Binarij 11175. Terni, ò Ternarij 551300. Quaterni, ò quaternarij 20260275. e finalmente Cinque-

591600030.

40. Volendo sapere il diverso scoprimento di più Dadi si offervi che un Dado varia 6. volte, e moltiplicando 3. metà di 6. via 7. termine seguente fa 21. e tante volte variano Dadi 2. per formare una sola Progressione naturale; e moltiplicando 7. via 8. fa 56. e tante volte variano Dadi 3. e moltiplicando 7. via 18. fa 126. e tante volte variano Dadi 4. &c.

41. Per sapere in quanti modi possano variare ordine cose di numero determinato come una fila di 20. Soldati, ovvero le 11. monosillabe di questo verso *Flos, Lex, Lux, Sol, Sal, Nix, Cor, Fons, Mare, Lac, Mel*; stando sempre fisso Mare di due sillabe à causa del verso; Si pigliano tanti termini di Progressione naturale 1. 2. 3. 4. &c. quante sono le cose per ordine, si moltiplica il primo termine 1. via 2. fa 2. e 2. via 3. fa 6. e questo via 4. fa 24. e così seguitando sino al numero proposto inclusive delle cose, quell' ultimo numero prodotto dimostra tutti li diversi modi di ordine di tali cose; onde seguitando à moltiplicare sino à 11. fa 39916800. variazione di detto verso. Siccome moltiplicando sino à 20. si averanno le variazioni di ordine de Soldati.

Una cosa non varia, due cose variano in due modi come A. B. nel primo modo, nel secondo modo B. A. tre cose variano in 6. modi, come si vede. A B C. distintamente à canto senz'altre parole, e così succede di tutte l'altre cose di numero determinato come ho detto.

A. B	A B C
B. A	A C B
	B A C
	B C A
	C A B
	C B A

42. E se pno volesse saper tutti gli Angeli in quanti modi possano variare ordine, operi secondo l'insegnamento detto, e lo saprà. Per sapere il numero di tutti gl'Angeli senza l'opinione del R. Alberto Magao lume conspicuo dell'Ordine Domenicano Comp. *Theol. lib. 2. cap. 23. Novem Ordines Angelorum sunt, quilibet ordo suas legiones habet, legio autem habet 6666. milites. Tot autem in singulis ordinibus sunt Legiones, quae in Legione sunt milites.* Un

Coro

Coro contiene 6666. legioni; ogni legione contiene Angeli 6666. e li 9. Cori contengono Angeli 399920004.

Il P. F. Antonino Polti del medesimo Ordine Domenicano dice, che alcuni convengono nell'opinione del grande Alberto, che gli Angeli dell'ultimo Coro siano 44435556. mà che l'immediato superiore ecceda dieci volte l'inferiore. Onde gli Arcangeli siano 444355560. &c. e la somma di tutti gl'Angeli sia di 4937883995062716.

Il P. F. Vincenzo Spargiato pure Domenicano dice gli Angeli Beati, e Dannati essere 1399999998600000000000. Gli Angeli dell'ultimo Coro sono moltissimi, perchè ciascun' Uomo ha un' Angelo per custode, che non è stato custode ad altro Uomo secondo la migliore opinione; oltre quelli, che alle diverse specie delle cose create sono proposti, come stima probabile S. Tommaso P. P. *quest. 113. art. 2. c. Probabile est, quod diversis speciebus rerum diversi Angeli ejusdem ordinis praeponantur. Unde etiam rationabile, ut diversis Hominibus diversi Angeli ad custodiam deputentur.*

Quanto faucoso sarà il trovare il numero di tutti li modi, che possono variare ordine gli Angeli anche presi nel minore numero 399920004. ciascuno lo conosce, dovendosi pigliare altri, e tanti termini di Progressioni Arimmetica naturale, e moltiplicarli come si è dettoq fino all'ultimo.

## DISTINZIONE SECONDA.

### Delle Progressioni Geometriche.

- I** Terminai delle Progressioni Arimmetiche van procedendo con la medesima differenza, ò numero ascendente per via di sommare; quelli però delle Progressioni geometriche si vanno avanzando, ò diminuendo con la medesima proporzione per via di moltiplicare, ò di partire per il numero denominatore della Progressione, che per questo la Progressione geometrica è un'ordine di numeri proporzionali, che si accrescono, ò diminuiscono per via di moltiplicare, ò di partire per il numero, che denomina quella Progressione. Come questo, 1. 2. 4. 8. 16. &c. Ovvero 1. 3. 9. 27. 81. &c. ò pure 1. 5. 25. 125. &c. ancora 4. 2. 1.  $\frac{5}{2}$   $\frac{5}{4}$   $\frac{5}{8}$  &c. La prima Progressione geometrica è doppia. Ondè moltiplicando il termine antecedente per 2. denominatore della Progressione viene il seguente. Come moltiplicando 2. per 2. viene 4. il 4. per 2. viene 8. &c. La seconda è tripla della quale il denominatore è 3. della quadrupla è 4. della quintupla è 5. &c. l'ultima posta prece-

de per dimmissione partendo il termine antecedente per 2. e vice il seguente come è chiaro.

3. Quando li termini di alcuna di queste Progressioni sono in numero dispari il termine di mezzo moltiplicato in se è uguale al prodotto fatto dalla moltiplicazione di due termini ugualmente distanti da quel di mezzo, come 3. 9. 27. 81. 243. il termine di mezzo 27. moltiplicato in se fa 729. e tanto fa 9. via 81. e 3. via 243.
4. Ma quando li termini sono in numero pari li due di mezzo fanno il medesimo prodotto, che due altri ugualmente distanti. Per esempio 1. 2. 4. 8. 16. 32. il 4. via 8. il 2. via 16. ed 1. via 32. fanno 32.

*Del trovare qualsivoglia termine di alcuna Progressione geometrica, ed assegnarli il suo luogo senza trovare tutti li termini.*

5. Nella Progressione, che comincia da 1. se si moltiplica alcun termine in se, il prodotto farà termine lontano dal termine moltiplicato, quanto esso è lontano da 1. inclusive, come in questa 1. 3. 9. 27. 81. 243. 729. moltiplicando 27. via 27. fa 729. il quale è il settimo termine, stante che il 27. è il quarto lontano termini 3. dal primo.
6. Ma moltiplicando un termine via un'altro termine, produce un termine lontano dal maggiore, quanto è lontano il minore dal primo termine, come moltiplicando nella detta Progressione 27. quarto termine via 243. sesto termine fa 6561. sono termine lontano 3. termini dal sesto, come è lontano il quarto 3. termini dal primo.
7. Volendosi però trovare l'ultimo termine in una Progressione assai lunga. Si notino alcuni termini di essa da capo per ordine, e si segnano sotto li termini della Progressione naturale detti esponenti, come si usa nell'Algebra, segnando 0. sotto il primo termine, 1. sotto il secondo, 2. sotto il terzo, e così successivamente. Si osservi questo nella Progressione geometrica doppia, e quello che di essa si dice di ogni altra Progressione geometrica si deve intendere.

1. 2. 4. 8. 16. 32. 64. 128. 256. 512. 1024. 2048.

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

E da sapere, che al prodotto della moltiplicazione de termini della Progressione geometrica corrisponde la somma de i termini della Progressione naturale. Onde moltiplicando 16. in se, cioè via 16. fa 256. e sommando 4. e 4. esponente di 16. fa 8. esponente di 256. e si avverta, che il termine geometrico è sempre 1. di più del numero esponente, e così 256. è il termine nono. Ancora mol-

ra moltiplicando 8. via 64. fa 512. e perchè 8. hà per esponente 3. e 64. hà il 6. sommando 3. con 6. fa 9. esponente di 512. decimo termine della Progressione . Ora se 512. si moltiplica in se cioè per 512. verrà il decimo nono termine con l'esponente 18. e in questo modo si può proseguire quanto bisogna .

8. Al contrario partendo un maggior termine geometrico per un minore l'avvenuto è un termine, cha averà per esponente il numero restato dal sottrarre l'esponente minore dal maggiore come partendo 512. che hà per esponente 9. per 8. che hà per esponente 3. viene 64. che hà per esponente 6. che resta dal sottrarre 3. dal 9. e 64. farà il settimo termine più 1. dell'esponente 6.

9. Se poi la Progressione non comincia da 1. mà da numero, per esso si parte il prodotto fatto dalli termini geometrici, e il quoziente farà il numero cercato, sotto il quale ci anderà il numero della somma degl'esponenti de' termini moltiplicati come in questa

3. 6. 12. 24. 48. 96. 192. 384. 768.

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Se si moltiplica 24. via 96. fa 2304. che si parte per 3. primo termine , viene 768. termine nono geometrico , che averà sotto l'esponente 8. somma di 3. esponente di 24. e di 5. esponente di 96.

10. Al contrario partendosi un termine geometrico maggiore per un minore ; il quoziente si moltiplica per il primo termine , il prodotto farà un termine sotto il quale ci anderà l'esponente del maggiore termine meno l'esponente del minor termine partitore. Per esempio; partendo 768. per 24. viene 32. che si moltiplica per 3. primo termine, e fa 96. che averà per esponente 5. cioè 8. esponente di 768. meno 3. esponente di 24. numero partitore.

*Del trovare la somma de Termini nelle Progressioni*

*Geometriche .*

11. Il termine seguente di qualsivoglia Progressione geometrica contiene tante volte la somma de i termini antecedenti , quante unità meno una rappresenta il denominatore della Progressione, e di più il primo termine dal quale comincia . Per la qual cosa nella Progressione doppia, il termine seguente contiene una volta la somma de i termini antecedenti, e di più il primo termine. Nella la Progressione tripla contiene due volte la somma de termini antecedenti , e di più il primo termine . Nella quadrupla 3. volte , nella quintupla 4. volte il termine seguente contiene la somma de termini antecedenti , e di più il primo termine , così si discorre dell'altre .

Sapendosi dunque il primo , ed ultimo termine della Progressione geo-

geometrica, ed il denominatore della Progressione si trova la somma per la seguente regola universale.

12. L'ultimo termine si moltiplica per il denominatore della Progressione, e verrà il termine seguente, dal quale si sottra il primo termine, il restato numero si parte per il denominatore della Progressione meno 1. Il quoziente è la somma de termini proposti della progressione. Nelle Progressioni di proporzione moltiplice.
13. Sia il primo termine 1. e l'ultimo 1024. della Progressione geometrica doppia. Pure dell'istessa sia il primo termine 7. e l'ultimo 1792. Si cercano le somme de termini.

Ultimo termine 1024 — 2. denominatore 1792 — 2

Termine seguente 2048 — 3584

1. Primo termine 7 sottra

Per 1. — 2047 somma somma 3577

Sia il primo termine 1. e l'ultimo 2187. Pure sia il primo 4. e l'ultimo 2916. della Progressione tripla si cercano le somme.

2187 — 3 2916 — 3

6561 — 8748

1 sottra 4 sottra

Per 2. — 6560 Per 2. — 8744

3280 somma 4372 somma

*Nelle Progressioni di proporzione sopra particolare.*

14. Sia il primo termine 64. e l'ultimo 486. di Progressione sesquialtera, il denominatore della quale è  $1\frac{2}{3}$ .

Pure sia il primo termine 27. e l'ultimo 64. di sesquiterza. Il denominatore della quale è  $1\frac{1}{3}$ .

Finalmente sia il primo termine 64. e l'ultimo 125. di sesquiquarta il denominatore della quale è  $1\frac{1}{4}$ . O si voglia dire ascendente della Progressione. Si cercano le somme.

486 —  $1\frac{2}{3}$  64 —  $1\frac{1}{3}$  125 —  $1\frac{1}{4}$

729 85  $\frac{1}{3}$  156  $\frac{1}{4}$

64 27 64

Per  $\frac{2}{3}$  — 663 Per  $\frac{1}{3}$  58  $\frac{1}{3}$  Per  $\frac{1}{4}$  — 92  $\frac{1}{4}$

Som. 1330 Somma 175 Somma 369

R r r r

Ecco,

Ecco, qui si è partito ancora per il denominatore della Progressione meno 1.

*Nelle Progressioni di Proporzione sopraparziante le parti terze, quarte, quinte, seste &c.*

15. Sia il primo termine 27. l'ultimo 125. della Progressione, della quale l'ascendente, o denominatore è  $1\frac{1}{2}$ . Ancora sia il primo 36  $\frac{1}{2}$ . e l'ultimo termine 196. della Progressione, della quale l'ascendente, o denominatore è  $1\frac{1}{2}$ . finalmente sia il primo termine 125. e l'ultimo 512. della Progressione denominata da  $1\frac{1}{2}$ . Si domandano le somme de' termini di tali Progressioni.

Si moltiplica l'ultimo termine 125. per  $1\frac{1}{2}$ . del termine seguente 208.  $\frac{1}{2}$ . si sottra 27. primo termine il restato 181.  $\frac{1}{2}$ . si parte per  $\frac{1}{2}$  cioè per il denominatore della Progressione meno 1. e viene la somma 272.

|  |  |  |
|--|--|--|
| $125 - 1\frac{1}{2}$                   | $196 - 1\frac{1}{2}$                   | $512 - 1\frac{1}{2}$                   |
| <hr/>                                  | <hr/>                                  | <hr/>                                  |
| 208 $\frac{1}{2}$                      | 343                                    | 819 $\frac{1}{2}$                      |
| 27                                     | 36 $\frac{1}{2}$                       | 125                                    |
| <hr/>                                  | <hr/>                                  | <hr/>                                  |
| Per $\frac{1}{2}$ -- 181 $\frac{1}{2}$ | Per $\frac{1}{2}$ -- 306 $\frac{1}{2}$ | Per $\frac{1}{2}$ -- 694 $\frac{1}{2}$ |
| <hr/>                                  | <hr/>                                  | <hr/>                                  |

Som. 272. Somma 408  $\frac{1}{2}$  1157

*Nelle Progressioni di Proporzione moltiplice sopraparticolare*

16. Sia il primo termine 24. l'ultimo 823  $\frac{1}{2}$ . di Progressione tripla sesquiquarta. Si domanda la somma de' termini: si moltiplica l'ultimo termine 823  $\frac{1}{2}$ . per 3  $\frac{1}{2}$ . denominatore viene 2677  $\frac{1}{2}$ . dal quale si sottra 24. primo termine, resta 2653  $\frac{1}{2}$ . che si parte per 2  $\frac{1}{2}$ . e viene la somma 1179  $\frac{1}{2}$ .

*Nelle Progressioni moltiplici sopraparzianti le parti terze, quarte, quinte &c.*

17. Sia il primo termine 32., e l'ultimo 665  $\frac{1}{2}$ . della Progressione doppia sopratriparziante le quarte. Si domanda la somma de' termini.

Si moltiplica l'ultimo termine 665  $\frac{1}{2}$ . per 2  $\frac{1}{2}$ . ascendente della Progressione fa 1830  $\frac{1}{2}$ . termine seguente, dal quale si sottra 32. primo termine, resta 1798  $\frac{1}{2}$ . il quale si parte per  $1\frac{1}{2}$ . e viene la somma 1027  $\frac{1}{2}$ .

*Del trovare l'ultimo termine d'alcuna Progressione geometrica sapendosi il primo termine la somma de' termini, l'ascendente della Progressione.*

18. Si moltiplica la somma per il numero ascendente meno 1. al prodotto si aggiunge il primo termine, la somma si parte per il numero



- numero ascendente, ò denominatore della Progressione, e risulterà l'ultimo termine cercato.
- Sia il primo termine 4. l' ascendente 3, la somma de termini 4372. si cerca l'ultimo termine.
- Si moltiplica 4372. per 2. che è meno 1. di 3. al prodotto 8744. si aggiunge 4. primo termine fa 8748. che si parte per 3. ascendente, e viene 2916. ultimo termine.

*Del trovare il primo termine della Progressione geometrica sapendosi l'ultimo, e la somma della Progressione con il numero ascendente.*

19. Si moltiplica l'ultimo termine per il numero ascendente, ò denominatore. Ancora si moltiplica la somma de termini per l' ascendente meno 1. e questo prodotto si sottra dal primo, e resta il primo termine.
- Sia l'ultimo termine della Progressione tripla 2916. e la somma de termini 4372. si cerca il primo termine.
- Si moltiplica 2916. per 3. denominatore della Progressione fa 8748. ancora si moltiplica la somma 4372. per 2. fa 8744. il quale si sottra da 8748. primo prodotto, e resta 4. primo termine.

*Del trovare il primo termine, e l' ascendente nelle Progressioni geometriche di Proporzione moltiplice sapendosi l'ultima termine, e la somma de termini.*

20. Dalla somma si sottra l'ultimo termine, il numero restato si fa partitore della somma, il quoziente, che ne viene è l' ascendente, ò denominatore, l'avanzo è il primo termine.
- Sia l'ultimo termine 2616. e la somma de termini 4372. d' alcuna Progressione geometrica. Domando il primo termine, e l' ascendente.
- Da 4372. si sottra 2616. resta 1756. per il quale si parte la somma 4372. il quoziente 3. è l' ascendente, l' avanzo 4. è il primo termine.

*Del trovare il Denominatore della Progressione geometrica di qualsivoglia Proporzione sapendo il primo, ed ultimo termine, e la somma de termini.*

21. Dalla somma de termini si sottra l' ultimo termine, il numero restato è il partitore. Dalla somma di nuovo si sottra il primo termine, il numero restato è da partirsi, e partito per il detto partitore, tutto il quoziente con il rotto ancora farà il denominatore.

R r r r s

Sia.

Sta il primo termine 125. l'ultimo 512. e la somma de termini 1157.  
d'alcuna Progreffione geometrica. Si cerca il suo denominatore.  
Dalla somma 1157. si sottra 512. ultimo termine, resta 645. parti-  
tore. Pure dalla somma 1157. si sottra 125. resta 1032. che si par-  
te per 645. e viene  $1\frac{4}{5}$ . schifato però il rotto, e la Progreffione è  
di proporzione sopratripaziente le quinte.

*Del sommare brevemente li numeri quadrati, delli quali le  
radici, o lati costituiscono Progreffione Arimmetica.*

- |  |      |
|--|------|
| Suppongo, che si sappia, che radice, o lato del qua-                 | 1    |
| drato: è qualsivoglia numero, che moltiplicato in se                 | 4    |
| stesso fa un prodotto, che è numero quadrato. Co-                    | 9    |
| me 2. via 2. fa 4. numero quadrato. ovvero 3. via 3. fa              | 16   |
| 9. numero pure quadrato, &c.   | 25   |
| Ora si voglia sapere la somma di 15. quadrati, de' quali             | 36   |
| le radici costituiscono Progreffione Arimmetica, na-                 | 49   |
| turale da 1. fino in 15.   | 64   |
| Si somma 15. con 16. termine seguente di tal Progreffione            | 81   |
| fa 31. e poi si moltiplica 15. via 16. fa 240. che si                | 100  |
| moltiplica via 31. fa 7440. il quale si parte per 6. per             | 121  |
| la ragione da dirsi, ne viene 1240. somma di 15.                     | 144  |
| quadrati. E così trovasi la somma di quanti si voglia                | 169  |
| altri per ordine..   | 196  |
| 23. Volendo ancora la somma brevemente de quadrati                   | 225  |
| de numeri dispari, che costituiscono Progreffione                    | 1240 |
| Arimmetica da 1. fino in 15.   |      |
| Si somma 15. con 17. termine seguente fa 32. Dipoi si                | 1    |
| moltiplica 15. via 17. fa 255. e questo per 32. fa 8160.             | 9    |
| il quale si parte per 2. differenza del numero dispari               | 25   |
| al prossimo seguente dispari, viene 4080. che si parte               | 49   |
| per 6. ne viene 680. per la somma de' detti quadrati. Si             | 81   |
| può anche partire in una sol volta per 12. e si averà il             | 121  |
| medesimo numero, ed intanto si è fatta la partizione in              | 169  |
| due volte acciò si sappia la ragione di partire per 2.               | 225  |
| e per 6. che si dirà   | 680  |
| 24. Volendo pure la somma de' quadrati, le radici de' quali ordina-  |      |
| tamente ascendono con la medesima differenza di 2. di 3. di 4. &c.   |      |
| cominciando dall' stesso numero, e costituendo Progreffione          |      |
| Arimmetica   |      |
| Si somma l'ultimo termine con il termine seguente distante con la    |      |
| medesima differēza di 2. di 3. ovvero di 4. &c. Si moltiplicano suc- |      |
| cessi-   |      |

cessivamente quel tre numeri, come nelle passate. L'ultimo prodotto si parte per la differenza di due termini prossimi, ed il quoziente per 6. e viene la somma de i proposti quadrati. Per esempio siano le radici 5. 10. 15. 20. 25. e si voglia sapere la somma de' loro quadrati,

25  
100  
225  
400  
625

Si somma 25. con 30. termine seguente fa 55. Poi si moltiplica 25. con 30. fa 750. e questo via 55. fa 41250. il quale partito per 5. differenza, viene 8250. e questo per 6. viene 1375. somma de quadrati. Come si vede provato.

1375

25. Per intendere la ragione, perche si parte per 6. se ne osservi l'origine. Si voglia la somma del primo quadrato, che è 1. la sua radice 1. si somma col termine seguente 2. fa 3. poi si moltiplica 1. via 2. fa 2. e questo via 3. fa 6. il quale si parte per 6. viene 1. somma del primo quadrato. Ecco di dove ha l'origine il partire per 6. L'istessa ragione si conosce, e si ha per la somma de' numeri quadrati, de' quali le radici sono numeri dispari, perchè 1. con 3. termine seguente, fa 4. Ora moltiplicando 1. via 3. fa 3. e questo via 4. fa 12. per il quale si parte il prodotto, ovvero per 2. e per 6. numeri di ripiego, per avere la somma de i quadrati. La medesima ragione vale ancora in trovare la somma de i quadrati, de i quali le radici vanno ordinatamente proseguendo per qualsivoglia differenza, purché esse radici mantengano Progressione Arimmetica, e comincino dalla medesima differenza.

*Per la somma de' numeri quadrati, trovare il numero.*

*de' quadrati sommati.*

26. Uno ha sommato una quantità di quadrati per ordine come 1. 4. 9. &c. ed ha trovato che la somma è 6201. Si domanda quanti siano stati tali quadrati.

Conto assai lungo sarebbe sommare li quadrati per ordine, fin che si avesse la somma detta. Però ho pensato al seguente modo. Si moltiplica la somma 6201. per 6. (del quale si è parlato antecedentemente) fa 37206. di questo numero si trovano le parti aliquote, o libere incòmposte, che sono misurate solo da 1. in questo modo. Il numero 37206. si parte per 2. primo numero incòmposto, ed unico fra numeri pari, viene 18603. Si pone da parte il 2. e 18603. si parte per 3. viene 2067. il 3. sotto il 2. e di nuovo per 3. si parte 2067. viene 689. il 3. sotto l'altro 3. Ora 689. non è partito senza avanzo per 5. per 7. per 11. numeri incòmposti, questi si lasciano, e si parte 689. per 13. viene 53. il 13. sotto il 3. e 53. per essere numero incòmpo-

sto

sto, cioè solo, misurato da 1. Si pone, sotto il 13. e si sono trovate le parti aliquote composte, cioè 2. 3. 3. 3. 13 53. per le quali si trova il numero de' quadrati, come dissi. Ma prima voglio dire come si trovino da esse le parti aliquote composte del medesimo 37206. per quello, che possi bisognare.

27. Si moltiplicano 13. via 53. ultime parti composte fa 689. e si ha la prima fila 13. 53. 689. la qual fila si moltiplica per altra parte aliquota composta, e si ha la seconda fila 3. 39. 159. 2067. la qual seconda fila si moltiplica per 3. altra parte aliquota composta, ( la prima fila non si moltiplica per 3. perchè già per esso è stata moltiplicata ) e si ha la terza fila 9. 117. 477. 6201. la qual fila si moltiplica per l'altro 3. l'altre due file già sono state moltiplicate per 3. e si ha la quarta fila 27. 351. 1431. 18603. Ora dovendosi moltiplicare per 2. parte aliquota composta differente dall'altre; per esso 2. si moltiplicano tutte le file, e si ha la quinta fila, come appresso, cioè 26. 106. 1378. 6. 78. 318. 4134. 12402. 954. 234. 18. 37206. 2862. 702. 54. 3. le quali cinque file contengono tutte le parti aliquote composte, e composte del numero 37206. onde aggiunto 1. che è parte aliquota d'ogni numero da principio, sono per ordine 1. 2. 3. 6. 9. 13. 18. 26. 27. 39. 53. 54. 78. 106. 117. 159. 234. 318. 351. 477. 689. 702. 954. 1378. 1431. 2067. 2862. 4134. 6201. 12402. 37206. questo ultimo è il numero del quale si sono trovate le parti aliquote, postoci perchè misura se stesso, come ogn'altro numero.

Ora si osservino due di tali parti, che sieno numeri immediati de' quali la somma faccia una parte aliquota già trovata. Le prime sono 2. 53. si lascia 1. per non essere numero la loro somma 5. non è parte aliquota delle trovate; le seconde sono 26. e 27. la loro somma 53 che è parte aliquota trovata, onde si è ancora trovato il numero de' quadrati, che il minimo 26.

Se ne faccia prova, trovando la somma per il numero 22. sommando 26. con 27. termine seguente fa 53. e moltiplicando 26. via 27. fa 702. e questo via 53. fa 37206. il quale partito per 6. viene 6201. somma proposta, e resta provato.

Ora venendo a mostrare, come per le sole parti aliquote composte si trova il numero de' quadrati, è necessario moltiplicarle fra se in tal modo, che facciano tre numeri, due de' quali sieno numeri immediati, il terzo sia la somma di tali numeri; il che facilmente si fa con poche avvertenze. Le parti aliquote composte di sopra trovate furono 2. 3. 3. 13. 53. perchè moltiplicando la prima 2. via 13. fa 26. il numero 26. e moltiplicando 3. via 9. e que-

questo via 3. fa 27. altro numero immediato dopo 26. la somma de' quali fa 53. ultima parte aliquota. Sicchè il numero 26. minimo è il numero de' quadrati.

Altro esempio; la somma d'alcuni quadrati per ordine è 819. Si domanda il numero di tali quadrati.

Si moltiplica 819. per 6. fa 4914. del qual si trovano le parti aliquote incomposte partendo 4914. per 2. il quoziente 2457. 819 — 6  
per 3. e l'altro quoziente 819. per 3. l'altro quoziente 273. per 3. e l'altro quoziente 91. per 7. li 2 — 4914  
numeri partitori 2. 3. 3. 7. e 13. ultimo quoziente 3 — 2457  
te; che è numero incomposto misurato solo da 1. 3 — 819  
sono le parti cercate. Per la qual cosa moltiplicando 3 — 273  
do 2. via 3. fa 14. numero immediato doppo il 13. 7 — 91  
e moltiplicando 3. via 3. fa 9. e questo via 3. fa 27. 13 — 13  
somma di 13. e 14. sicchè 13. è il numero de' quadrati per ordine  
essendo la loro somma 819. come si può provare per il 22.

*Per la somma de' quadrati fatta da numeri dispari per ordine cominciando da 1. trovare il numero de' quadrati sommati.*

28. Sia la somma 4495. Domando quanti quadrati di numeri dispari siano stati, compresi i?

La somma 4495. si moltiplica per 2. differenza da un numero dispari all' altro più prossimo, e il prodotto per 6. ovvero in una volta per 12. fa 53940. di questo si trovano le parti aliquote incomposte, partendo 53940. per 2. e 26970. 4465 — 12  
per 2. e 13485. per 3. e 4495. per 5. e 899. per 29.

li partitori 2. 2. 3. 5. 29. e 31. quoziente ultimo 2 — 53950  
numero incompsto sono le parti aliquote, delle quali si facciano 3. numeri per via di moltiplicazione, due dispari, che l'uno dall'altro differisca in 15 — 26970  
2. ed il terzo sia la loro somma. Tra le parti aliquote 3 — 15485  
già ci è 29. e 31. differenti in 2. Si moltiplica adunque 29 — 4495  
que 2. via 2. fa 4. e quello via 3. fa 12. e questo via 5. fa 60. somma di 29. e 31. ora di 29. minor numero si fanno due parti le maggiori senza dividere l'unità. e sono 15. e 14. la maggiore 15. è il numero de' quadrati sommati. Si poteva pure partire la metà della somma 60. che è 30. per 2. differenza de' numeri dispari, e si aveva 15. numero de' quadrati cercati. 29 — 899

La prova si fa con moltiplicare 29. con 31. fa 899. e questo per 60. fa 53940. che si parte per 12. e viene 4495. somma proposta, ed è fatta per il numero 22. di sopra, perchè 29. quadrati arrivano fino al quadrato di 29. ultimo numero dispari.

Per

*Per la somma de' quadrati conti da' numeri, che ascendono per il medesimo numero di differenza, dal quale cominciano, trovare il numero de' quadrati.*

29. Sia la somma 2275. di alcuni quadrati, che cominciano da 5. e proseguiscono col medesimo 5. Domando quanti siano stati. La somma 2275. si moltiplica per 5. fa 11375. questo per 6. fa 68250. Di questo si trovano le parti aliquote incomposte, sono 2. 3. 5. 5. 5. 7. 13. delle quali si trovino tre numeri per via di moltiplicazione, due differenti in 5. il terzo sia la loro somma. Onde moltiplicando 2. via 3. fa 6. questo via 5. fa 30. primo numero. Ancora moltiplicando 5. via 7. fa 35. secondo numero differente in 5. da 30. Finalmente moltiplicando 5. via 13. fa 65. terzo num. e somma degli altri due. Il minimo 30. si parte per 5. e viene 6. per il numero de' quadrati.

|       |     |    |         |                    |
|-------|-----|----|---------|--------------------|
| 2275  | — 5 | 2  | — 68250 | Prova              |
| 11375 | — 6 | 3  | 34125   | Per 5 — 30 5 25    |
| 68250 | — 5 | 5  | 11375   | 19 100             |
|       |     | 5  | 2275    | Quadrati 6. 15 225 |
|       |     | 5  | 455     | 20 400 Quadrati    |
|       |     | 65 | 91      | 35 625             |
|       |     | 13 | 13      | 30 900             |

Somma 2275

*Del sommare brevemente li numeri cubi, che vanno per ordine.*

|   |      |
|---|------|
| 30. R. Luca à carte 44. num. 30. dice così della ProgreSSIONE continua de' numeri cubi. Quella che ascende per cubi | Cubi |
| si ricoglie in questo modo. Siano cubi 12. per  | 1    |
| ordine si piglia la metà de' termini cioè 6. questo   | 8    |
| si moltiplica in se fa 36. poi si aggiunga 1. a 12. fa 13.  | 27   |
| e questo si moltiplica in se fa 169. che moltiplicato   | 64   |
| via 36. fa 6084. per tutta la somma de' cubi propo-   | 125  |
| sti. L'istesso modo ha trascritto Niccolò Tartaglia.  | 216  |
| lib. primo parte seconda cap. 14. num. 8.   | 343  |
| Più facilmente si averà però la somma de' cubi, che   | 612  |
| vanno per ordine in questo modo. Si somma la  | 729  |
| ProgreSSIONE naturale di 1. fino in 12. radici de'  | 1000 |
| cubi per la prima regola num. 1. cioè si piglia il  | 1331 |
| termine seguente 13. si moltiplica per 6. metà de'  | 1728 |
| termini 12. fa 78. somma di tali termini. Il numero   | —    |
| 78. si moltiplica in se, cioè via 78. il prodotto 6084.   | 6084 |
|   | 612  |

è la somma de' cubi, dal che ne segue, che qualsivoglia somma de cubi per ordine, che comincia da 1. è numero quadrato.

Cubi 12      78 via 78 fa 6084.

$$\begin{array}{r} 1 \\ 12 \\ \hline 78 \end{array} = 6$$

*Dalla somma de' Cubi per ordine trovare il numero de' Cubi sommati.*

31. Sia la somma de' cubi 6084. da questo numero si estraе la radice quadra, che è 78. questo si moltiplica per 2. fa 156. da questo pure si estraе la radice quadra, che è 12. ed avanza 12. l'uno, o l'altro dimostra il numero de' cubi essere 12. come si disse al num. 1. regola seconda per trovare il numero de' termini della Progressione naturale.

*Del sommare brevemente li numeri Cubi, che cominciano da qualsivoglia numero fino ad altro per ordine.*

32. Si cerca la somma da radici 7. fino in 30. si trova per la passata la somma de' cubi da 1. fino in 30. aggiungendo 1. a 30. fa 31. che si moltiplica per 15. metà di 30. fa 465. questo si moltiplica in se fa 216225. somma de' cubi da 1. fino in 30. ora si trova nel medesimo modo la somma de' cubi da 1. fino in 6. aggiunto 1. a 6. fa 7. che si moltiplica per 3. metà di 6. fa 21. il quale via 21. fa 441. somma di tali cubi, che si sottra da 216225. resta 215784. somma de' cubi da 7. fino in 30.

*Del trovare il numero de' Cubi sommati da qualsivoglia numero per ordine per la cognizione della somma, è del numero, dal quale cominciano i Cubi da sommarli.*

33. Sia la somma de' cubi 215784. e comincino dalla radice 7. Si trova per la passata la somma de' cubi da 1. fino a 6. è 441. che si aggiunge alla somma 215784. e fa 216225. da questo si estraе la radice quadra 465. che si moltiplica per 2. fa 930. del quale la radice quadra 30. e l'avanzo 30. è il numero de' cubi da 1. fino in 30. da 30. si sottra 6. che manca, resta 24. per li cubi sommati, e l'ultimo è stato il cubo di 30.

*Del sommare brevemente i Cubi, de' quali le radici cominciano da 1. e vadano proseguendo per la medesima differenza di 2. di 3. di 4. &c.*

34. Si sommano le radici de' cubi brevemente come si è insegnato nelle Progressioni Arimmetiche al num. 1. la somma si quadra il numero quadrato si moltiplica per le differenze, che ascendono le radici, sia 2. 3. 4. &c. dal prodotto si sottra la somma delle radici, se la differenza sarà 2. ma essendo 3. si sottra la somma delle radici duplicata, essendo 4. triplicata, e così per ordine. Il restato numero sarà la somma de' cubi.

§ f f f

Si

Si trovi la somma de' cubi, de' quali le radici cominciano da 1. sino à 7. per la differenza di 2. Ancora si trovi la somma de' cubi, de' quali le radici cominciano da 1. sino à 16. per la differenza di 5.

Nel primo esempio la somma delle radici è 16. via 16. fa 256. che si moltiplica per la differenza 2. fa 512. dal quale si sottra 16. somma delle radici, e resta 496. somma de' cubi. Nel secondo esempio la somma delle radici è 34. via 34. fa 1156. che si moltiplica per 5. differenza, viene 5780. dal quale si sottra 136. prodotto di 4. via 34. somma delle radici per doversi levare quadruplicata, resta 5644. somma di tali cubi. Se ne faccia prova, che si troverà giusta.

*Primo esempio*

| Radici | 16            |        | Prova |
|--------|---------------|--------|-------|
| 1      | 16            |        |       |
| 3      | <u>      </u> |        |       |
| 5      | 256 -- 2      | Cubi 1 |       |
| 7      | <u>      </u> | 27     |       |
|        | 512           | 125    |       |
| 16     | 16 Sottra     | 343    |       |
|        | <u>      </u> |        |       |

*Secondo esempio*

| Radici  | 34            |        | Prova |
|---------|---------------|--------|-------|
| 1       | 34            |        |       |
| 6       | <u>      </u> |        |       |
| 11      | 1156 -- 5     | Cubi 1 |       |
| 16      | <u>      </u> | 216    |       |
|         | 5780          | 1331   |       |
| 34 -- 4 | 136           | 4096   |       |
|         | <u>      </u> |        |       |

somma 496    somma 496    somma 5644    somma 5644

*Del sommare brevemente li cubi, de' quali le radici cominciano per numero, e seguitano con la differenza del medesimo numero.*

25. La somma delle radici de' cubi si moltiplica in se, il prodotto si moltiplica per il primo numero, o per la differenza, e si averà la somma di tutti li cubi di tali radici.

Le radici di alcuni cubi cominciano da 2. 4. e seguitano fino à 20. D'alcuni altri cominciano da 3. 6. fino à 21. Si domandano le somme de' cubi.

*Primo*

|               |               |
|---------------|---------------|
| 20            | 110           |
| 8             | 110           |
| <u>      </u> | <u>      </u> |

22    12100 -- 2

5 som. 24200 de' cubi

delle rad. som. 110

*Secondo*

|               |               |
|---------------|---------------|
| 21            | 84            |
| 3             | 84            |
| <u>      </u> | <u>      </u> |

2 -- 24    7056 -- 3

12    21168 som. de' cubi

termini 7

som. delle rad. 84

36. La





cato per 3. viene il terzo 6. il 6. per 3. viene il quarto 18. il 18. per 3. viene il quinto 54. &c. Il seguente è il doppio de' termini antecedenti; negozio assai lungo è trovare termini 64. per averne la somma, però si fa così: Si somma 1. con 2. fa 3. che si moltiplica in se fa 9. somma di 3. termini. Il 9. si moltiplica in se fa 81. somma di 5. termini. Si osservi che i termini si raddoppiano meno 1. e 81. si moltiplica in se fa 6561. somma di 9. termini, e gli antecedenti erano 5. e 6561. si moltiplica in se fa 43046721. somma di 17. termini, e questa si moltiplica in se fa 1853020188851841. somma di 33. termini; finalmente questa si moltiplica in se, e fa 3433683820392512484657849089281. somma di 65. termini, e perchè si voleva di 64. si parta per 3. e verrà 1144561273430837494885949676427. somma di 64. termini di tal Progressione.

Si trova nell'istesso modo la somma di 64. termini di Progressione geometrica doppia. Si moltiplica 4. in se terzo termine, cioè via 4. fa 16. quinto termine, anco in questa i termini si raddoppiano meno 1. e 16. si moltiplica in se fa 256. nono termine, e 256. in se fa 65536. decimo settimo termine, e questo in se fa 4294967296. trentesimo terzo termine, e questo in se fa 18446744073709551616. sessantesimo quinto termine, e levato 1 resta la somma di 64. termini di Progressione geometrica doppia, la quale si sottra, dall'altra somma di 64. termini, e resta la differenza 1144561273412390750812240144812. che si cercava, e fu domandata.

38. Supposto, che tre abbiano levato da un Granaro frumento in questo modo: Il terzo il primo giorno leva 1. grano, il secondo 2. il terzo 3. e così ogni giorno cresce 1. Il Secondo leva numero quadrato, ed il Primo leva numero cubo di quei grani che va levando il terzo. Essendo che questo terzo finalmente ha levato grani 66795. si cerca quanti giorni abbia durato a levare grano il terzo, e quanti grani ne abbia levato il secondo, ed il primo. Facilmente, e brevemente si sodisfa alle richieste. Per la regola seconda del primo delle Progressioni Arimmetiche grani 66795. si moltiplicano per 2. dal prodotto 133590. si estrae la radice quadra 365. ed avanza 365. l'una, e l'altro dimostra il numero de' termini della Progressione naturale, ed i giorni, che durò il terzo a levare grano. Ora per il numero 22. delle Progressioni geometriche a 365. si aggiunge 1. fa 366. il quale si somma con 365. fa 731. di poi si moltiplica 366. via 365. fa 133590. e questo via 731. produce 97654290. il quale si parte per 6. e risulta 16265715. somma di tutti i quadrati di termini 365. di Progressione

sione naturale, e grani levati dal secondo. Finalmente per il secondo modo del numero 30. si trova la somma di tutti li numeri cubi di 365. termini di Progressione naturale moltiplicando 66795. in se somma de' termini di tal Progressione, cioè per 66795. produce 4461572025. per detta somma, e per li grani levati dal primo, che à 60. grani per Dramma, che è un ottavo d'oncia grana 480. sono 1. oncia, e grani 5760. libbra 1. e libbre 600. comunemente facciano un Rubbio misura di Roma. Onde i grani del primo importano Rubbia 1290. libbre 578. e mezzo in circa. Sicchè il terzo durò giorni 365. cioè un'anno, il secondo levò grani 16275715. ed il primo grani 4461572025.

39. *Quesito 14. del cap. 66. di Girolamo Cardano. Supposto che il Giro della Terra sia di miglia 44310. e che due Volatili si partano dal medesimo luogo uno volando verso Oriente, l'altro verso Occidente sopra il detto Giro. Il primo faccia una Progressione Arimmetica; il primo giorno faccia 1. miglio, il secondo 2. il terzo 3. e così per l'innanzi. Il secondo faccia una Progressione di numeri cubi, il primo giorno 1. miglio, il secondo 8. il terzo 27. &c. Si domanda in che giorno si troveranno insieme detti Volatili.*

L'Autore scioglie il quesito per Algebra, e qui si scioglie per regola più facile cavata da essa Algebra. Si aggiunge  $\frac{1}{2}$  à 44310. e dalla somma si estraе la radice quadra, che è 210 $\frac{1}{2}$ . il mezzo si lascia e resta 210. somma de' termini della Progressione Arimmetica. La ragione di questo, e perchè come hò detto al num. 30. la somma de' termini della Progressione Arimmetica moltiplicata in se fa la somma de' cubi di tali termini: Per il che le miglia 44310. sono l'aggregato della somma della Progressione naturale 1. 2. 3. &c. e della somma de' cubi fatti dall'istessi termini, come loro radici. Onde da 44310. levandosi 210. resta 44100. somma de' numeri cubi, e quadrato di 210. dal che ne segue, che 44310. è uguale al quadrato 1. più 1. cosa, ovvero quadrato 1. è uguale à 44310. meno 1. cosa. Ora come vuole l'Algebra, si piglia la metà di 1. cosa cioè  $\frac{1}{2}$ . si moltiplica in se fa  $\frac{1}{4}$ . che si aggiunge al numero, e fa 44310 $\frac{1}{4}$ . dal quale si estraе la radice quadra, che è 210 $\frac{1}{2}$ . si leva  $\frac{1}{2}$ . per ragione del meno, resta 210. valore di 1. cosa, e somma della Progressione Arimmetica. Ecco di dove viene l'aggiungere  $\frac{1}{2}$  à 44310. cavarne la radice quadra, e lasciare il mezzo. Tornando ora al quesito, per trovare in quanti giorni li Volatili saranno insieme, si trovano i termini della somma 210. per la seconda regola delle Progressioni Arimmetiche moltiplicando 210. per 2. fa 420. dal quale si leva la radice quadra che è 20. ed avanza 20. l'uno, o l'altro

l'altro, è il numero de' termini, e conseguentemente li giorni dopo, i quali li Volatili s'incontrano.  
 Si prova moltiplicando 2 10. via 2 10. fa 44 100. somma de' cubi, e miglia fatte dal secondo Volatile in giorni 20. che sommate con 2 10. miglia fatte dal primo Volatile, fanno in tutto miglia 443 10. quante si suppone essera il Giro della Terra.

40. Il Cardano fa posizione d'Algebra assai più difficile: nota l'ertore di P. Luca in simile questo posto a carte 44. dove suppone P. Luca il Giro della Terra essere miglia 20400, ma non lo scioglie, stimando forse il Cardano non potersi dare soluzione per numeri razionali, come mostra P. Luca. Per sciorglo si operi così: Alle miglia 20400. si aggiunga  $\frac{1}{2}$ . la radice quadra  $142\frac{1}{2}$ . &c. è la somma de' termini. Per trovare il numero de' termini,  $142\frac{1}{2}$ . si moltiplica per 2. e da 285. prodotta, si estrae la radice quadra intiera 16. che dimostra i giorni intieri, alli quali si deve aggiungere il rotto in questo modo: Si trova la somma di 16. termini di Progressione naturale per la prima regola è 136. che si moltiplica in se, fa 18496. somma de' cubi, e miglia del secondo, con miglia 136. del primo, sono miglia 18632. le quali si sottrano da 20400. restano 1768. che si pone sopra una linea per numeratore. Adesso nel decimo settimo giorno il primo farebbe miglia 17. il secondo farebbe il numero cubo di 17. cioè 4913. che con 17. fanno 4930. da porsi per denominatore sotto la linea, che schiusa per 2. ed aggiunto a 16. fa  $16\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}$ . e in tanti giorni s'incontreranno.

Si prova, perche il primo in tal rotto di giorno fa miglia  $6\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}$ . ed il secondo miglia  $1761\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}$ . che sommate con miglia 18632. fatte in giorni 16. fanno appunto miglia 20400. preposte. Così si opera in simili.

*Del numero perfetto, abbondante, e diminuto.*

41. Si tratta qui del numero perfetto, per avere origine dalla progressione geometrica doppia. Euclide così lo definisce: Numero perfetto è quello che è uguale a tutte le sue parti, le quali parti si devono intendere aliquote, ed intiere: come 6. le di cui parti intiere 1. 2. e 3. sommate fanno 6, primo numero perfetto.

42. Li numeri perfetti si trovano per mezzo della Progressione geometrica doppia, perchè ordinati li termini, o numeri di tal Progressione, che comincia da 1. e prosegue 2. 4. 8. &c. si sommano per ordine, e quando la somma è numero primo, cioè che solo 1. lo misuri per la definizione 11. d'Euclide, allora quel numero, si moltiplica per numero antecedente immediatamente sommatosi come

come 1. e 2. fa 3. numero primo; si moltiplica per 2. e fa 6. primo numero perfetto. Di nuovo si somma 1. e 2. fa 3. e 4. fa 7. altro numero primo: Si moltiplica per 4. numero ultimo aggiunto fa 28. secondo numero perfetto, le di cui parti integrali sono 1. 2. 4. 7. e 14. che sommate fanno 28. medesimamente si sommano 1. 2. 4. 8. fanno 15. numero composto misurato dal 3. e dal 5. si seguita e con 15. si somma 16. termine seguente fa 31. numero primo, il quale si moltiplica per 16. fa 496. terzo numero perfetto. E così possono ritrovarsi tutti gl'altri. Come ha insegnato Euclide nell'ultima del nono.

### Progressione doppia.

1. 2. 4. 8. 16. 32. 64. 128. &c.

Somme 3. 7. 15. 31. 63. 127. 255.

numeri perfetti 6. 28. 496. 8128.

43. Dato il numero perfetto si trovano le sue parti con partirlo per 2. e il quoziente per 2. l'altro quoziente per 2. e venendo il quoziente numero dispari, s'intenda accresciuto di 1. e si seguiti a partire per 2. sino ad 1. e si averanno tutte le parti integrali del dato numero. Come sia il numero perfetto 496. si parte per 2. viene 248. questo per 2. viene 124. questo per 2. viene 62. questo per 2. viene 31. numero dispari, accresciuto di 1. fa 32. che si parte per 2. viene 16. questo per 2. viene 8. questo per 2. viene 4. questo per 2. viene 2. e questo per 2. viene 1. cioè le parti sono 1. 2. 4. 8. 16. 31. 62. 124. e 248. le quali parti fanno due Progressioni doppie, una da 1. sino in 16. l'altra da 31. sino a 248. e così avviene nelle parti d'altri numeri perfetti. Si osservi, che il numero dispari, come 31. è la somma de i numeri antecedenti, e sommata con 31. fa 62. seguente termine, che con esso 62. fa 124. e con esso 124. fa 248. e finalmente con esso 248. fa 496. numero perfetto. E questo sia detto per trovare le parti del numero perfetto, e per sommarle.
44. E' da sapere che il numero perfetto termina in 6. ovvero in 8. e che partendosi per 9. ovvero levandosi li 9. col sommare del numero perfetto, l'avanzo è 1.

### Del numero abbondante.

45. Il numero abbondante è quello, le di cui parti aliquote la sopravanzano, e per lo più deriva dalla moltiplicazione del numero perfetto, fatta per 2. 3. &c. Per esempio 2. via 6. fa 12 numero abbondante. 3. via 6. 18. numero abbondante. Pare 3. via 28. fa 84. numero abbondante. 4. via 28. fa 112. numero abbondante.
- Hò detto, che deriva per lo più, perchè alcuni numeri abbondanti non derivano da perfetti; come il numero 20. ed i composti da esso 40. 60. &c.

46. Per

46. Per trovare le loro parti integrali, si divide per 2. il numero abbondante, e per gl'altri numeri che lo misurano, ed aggiunto 1. da capo alli numeri partitori, quelli saranno le parti aliquote, siccome li quozienti per ordine contrario. Come per esempio dato il 12. numero abbondante, si parte per 2. 3. 4. 6. 12. e vengono le parti aliquote 6. 4. 3. 2. 1. che sommate fanno 16. che soprayanza 12. di 4.

*Del numero diminuto.*

47. Il numero diminuto è quello, le di cui parti aliquote sommate, fanno numero minore del dato numero, come dell'8. le parti aliquote del quale 1. 2. e 4. sommate fanno 7.

Li numeri infino à 18. numero abbondante, levato 6. numero perfetto, e 12. numero abbondante sono diminuti. Dal che si vede li numeri diminuti, esser in gran quantità, gli abbondanti in minor quantità, & i perfetti in pochissima quantità parlando rispettivamente; essendo che non si dia fine a poter trovare numeri perfetti, siccome la Progreffione doppia, dalla quale derivano, proceda in infinito.

*Dell'artificiofa disposizione de' termini di Progreffione Arimmetica di numero quadrato in tal modo, che ciascuno lato per lunghezza, e per larghezza importi di somma il medesimo numero, siccome ancora i due lati diametrali, che dividono egualmente la figura quadrata.*

48. Avendo trovato nel fine dell' Arimmetica del Signor Pietro Antonio Cataldi alcune tavole quadrate con la disposizione de termini della Progreffione Arimmetica in numero quadrato i che per ogni lato (come hò detto) ciascuna importava nella somma il medesimo numero senza regola di disporre tali termini, applicai l'animo à trovarla; e mi venne fatto, che per i quadrati di numero dispari trovai la seguente bella, e facile, senza la quale la disposizione è difficile, come ciascuno può sperimentare.

49. Questa regola ricerca alcune avvertenze, le quali per essere sempre uniformi la fanno facile. Sia preparato un quadrato di quadretti 81. che sono 9. per lato, nei quali si devono disporre i termini della Progreffione Arimmetica da 1. fino 81. che la somma di ciascun lato sia un medesimo numero, per sapere il quale basta moltiplicare la metà della somma del primo, ed ultimo termine per il numero de termini d' un lato, La metà di 1. e di 81. cioè di 82. è 41. il quale moltiplicato per 9. num. de' termini d' un lato fa 369. e tal numero deve importare la somma de numeri di ciascun lato del quadrato di 81. termini.

50. Ma al quadrato di termini in numero pari; si aggiunge 1. alli ter-

termini, li quali si moltiplicano per la metà del lato . Per esempio a 16. si aggiunge 1. fa 17. il quale si moltiplica per 2. metà de i termini del lato , e viene 34. somma di ciascun lato , quando sia ben disposto .

51. Per prima

avvertenza si

cominci a se-

gnare 1. sem-

pre sotto il

quadretto di

mezzo del

quadrato nel

lato EE, che è

il quadretto

di mezzo del

lato QQ. Per

seconda av-

vertenza si

segna 2. sot-

to, così il 3.

ed il 4. scen-

dendo sem-

pre a scala

gradatamen-

te verso man-

destra con-

scendere un

quadretto al-

A B C D E F G H I

37 | 78 | 29 | 70 | 21 | 62 | 13 | 54 | 5 | L

6 | 38 | 79 | 30 | 71 | 22 | 63 | 14 | 46 | M

47 | 7 | 39 | 80 | 31 | 72 | 23 | 55 | 15 | N

16 | 48 | 8 | 40 | 81 | 32 | 64 | 24 | 56 | O

57 | 17 | 49 | 9 | 41 | 73 | 33 | 65 | 25 | P

26 | 58 | 18 | 50 | 1 | 42 | 74 | 34 | 66 | Q

67 | 27 | 59 | 19 | 51 | 2 | 43 | 75 | 35 | R

36 | 68 | 19 | 60 | 11 | 52 | 3 | 44 | 76 | S

77 | 28 | 69 | 20 | 61 | 12 | 53 | 4 | 45 | T

A B C D E F G H I

A B C D E F G H I

la volta , ficchè il 4. farà nell' ultimo quadretto in fondo del lato HH. Per terza avvertenza si segna 5. nel primo quadretto di sopra da capo del lato immediatamente seguente II. Per quarta avvertenza per essere segnato il 5. nell' ultimo quadretto del lato LL. si segna 6. nel primo di MM. hora 7. 8. 9. si segnano per la seconda avvertenza. E giunti a humero novenario, che è il numero del lato per quinta avvertenza si segna 10. Sotto un quadretto nel medesimo lato DD. dove è segnato 9. si segnano 11. è 12. per la seconda , e per la terza si segna da capo 13. per la seconda si segna 14. 15. per la quarta si segna 16. nel primo del lato OO. Per la seconda si segna 17. 18. per la quinta si segna 19. sotto un quadretto dove è segnato 18. numero novenario . Per la seconda si segna il 20. per la terza si segna 21. da capo per la seconda si segna 22. 23. 24. e 25. e per la quarta si segna 26. nel primo del lato QQ. Per la seconda .

T t t t

27.

27. per la quarta sotto un quadretto si segna 28. per la terza si segna 29. da capo, per la seconda si segna 30. 31. 32. 33. 34. e 35. e per la quarta si segna 36. nel primo del lato 55. e per esser numero novenario per la quinta si lascia un quadretto, quale per esser l'ultimo del lato A.A. si segna 37. nel primo da capo dell'istesso lato A.A. per la seconda si seguano sino a 45. che è numero novenario, e perchè non si può lasciare sotto il quadretto, si lascia il primo da capo nel medesimo lato II. e si segna 46. nel secondo che è l'ultimo quadretto del lato M.M. Onde, per quarta avvertenza si segna 47. nel primo del lato NN. e seguendo l'avvertenze dette si segneranno tutti senza altra difficoltà, come si può vedere nel proposto quadrato, così si opera in tutti gl'altri di numero dispari, osservando solo, che in questo si riguardano i numeri novenari per operare come ho detto nella quinta avvertenza. perchè il lato del quadrato è di 9. termini, che se sarà di 7. si riguarderanno i numeri settenari &c.

52. Per disporre i termini di Progressione Arithmetica di numero quadrato, che sia il numero de' termini numero parimente pari, nel suo lato sarà facile il modo seguente. Sia per esempio un quadrato di sedici quadretti, ne i quali si devono distribuire i termini detti. Si cominci a contare o numerare il lato A B. segnando 1. nel primo quadretto da man sinistra di sopra, e lasciando due voti, si segni il 4. nel quarto quadretto. Nel lato C D. si segnano i due quadretti di mezzo, pure nel lato E F. nel lato poi G H. G come il primo A B. sicchè il 16. sarà

|   |    |    |    |    |   |
|---|----|----|----|----|---|
| A | 1  | 5  | 14 | 4  | B |
| C | 12 | 6  | 7  | 9  | D |
| E | 8  | 13 | 11 | 5  | F |
| G | 13 | 3  | 2  | 16 | H |

segnata nell'ultimo quadretto. Adesso si continuo i quadretti con ordine retrogrado, siccome prima con diritto, e si segnano ne' quadretti voti quei numeri che nel contare si dicono. Ora cominciando a contare uno dal quadretto dove è segnato 16. si segnerà 2. e 3. ne' quadretti voti del lato G H 5. e 8. del lato F E 9. e 12. del lato D C. finalmente 14. e 15. del lato B A. e così faranno segnati tutti, e ciascun lato importa la somma 34. Si avverta dunque, che la metà de' numeri si segna con ordine retto, e l'altra metà con ordine retrogrado, ne quadretti corrispondenti.



53. Pure sia il quadrato di 64. quadretti il di cui lato di termini 8. numero pariter pari si segnato 1. 4. 9. 16. nel lato A B. ne i quadretti secondo l'ordine retto si segnano ancora 10. 11. 14. e 15. ne quadretti del lato C D. da qui avanti si osservi, che vengano quattro quadretti intermezzi pieni, e quattro voti, e così non si potrà scambiare nel segnarsi: e segnato 64. nell'ultimo quadretto si comincerà a contare da quello uno con ordine retrogrado; e si legni ciascun numero, che tocca a ciascun quadretto voto; e farà segnato tutto come si vede. La somma di ciascun lato è 260.

|   |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
|---|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
| A | 1  | 63 | 62 | 4  | 5  | 59 | 58 | 8  | B |
| C | 56 | 10 | 11 | 53 | 52 | 14 | 15 | 49 | D |
|   | 48 | 18 | 19 | 45 | 44 | 22 | 23 | 41 |   |
|   | 25 | 39 | 38 | 28 | 29 | 35 | 34 | 32 |   |
|   | 33 | 31 | 30 | 36 | 37 | 27 | 26 | 40 |   |
|   | 24 | 42 | 43 | 21 | 20 | 46 | 47 | 17 |   |
|   | 16 | 50 | 51 | 13 | 12 | 54 | 55 | 9  |   |
|   | 57 | 7  | 6  | 60 | 61 | 3  | 2  | 64 |   |

54. Ancora volendo segnare il quadrato di 144. quadretti, il di cui lato è di termini 12. numero pariter pari si segni 1. nel primo quadretto di sopra à man manca del lato AB. si lascino due quadretti voti, e due si segnino col suo numero nel lato CD. il primo quadretto si lascia voto, e due si segnano, e due ordinatamente si lasciano voti, osservando per l'avvenire, che quattro quadretti intermezzi vengano segnati, e quattro no, e così per ordine retto si finirà di segnare, come si vede in figura. Mà volendo segnare tutto con ordine retrogrado si comincia à contare uno del quadretto, dove è segnato 144. e si segna 2. e 3. nelli due quadretti voti, e così si seguita fino in fine, ed allora ciascun lato sarà di somma 870.

|   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| A | 1   |     |     | 4   | 5   |     |     | 8   | 9   |     |     | 12  | B |
| C |     | 14  | 15  |     |     | 18  | 19  |     |     | 22  | 23  |     | D |
|   |     | 26  | 27  |     |     | 30  | 31  |     |     | 34  | 35  |     |   |
|   | 37  |     |     | 40  | 41  |     |     | 44  | 45  |     |     | 48  |   |
|   | 49  |     |     | 52  | 53  |     |     | 56  | 57  |     |     | 60  |   |
|   |     | 62  | 63  |     |     | 66  | 67  |     |     | 70  | 71  |     |   |
|   |     | 74  | 75  |     |     | 78  | 79  |     |     | 82  | 83  |     |   |
|   | 85  |     |     | 88  | 89  |     |     | 92  | 93  |     |     | 96  |   |
|   | 97  |     |     | 100 | 101 |     |     | 104 | 105 |     |     | 108 |   |
|   |     | 110 | 111 |     |     | 114 | 115 |     |     | 118 | 119 |     |   |
|   |     | 122 | 123 |     |     | 126 | 127 |     |     | 130 | 131 |     |   |
|   | 133 |     |     | 136 | 137 |     |     | 140 | 141 |     |     | 144 |   |

701

55. Finalmente volendo disporre i numeri in un quadrato di 256. quadretti, il di cui lato 16. pariter pari. Nel lato A B. si segni 1.e 2. e lasciando 4. quadretti voti, si segnano quattro seguenti &c. così alternatamēte nel lato C D. si segnano i primi due quadretti e lasciandone quattro voti, quattro si segnano, e così alternatamente. Nel lato E F. i primi due si lasciano voti, e quattro si segnano, e quattro si lasciano voti alternatamente; avvertendo nel proseguire, che 16. quadretti intermezzi siano segnati, e 16. siano voti. E contando poi con ordine retrogrado si segneranno i quadretti voti con quei numeri, che ordinatamente gli toccano, e farà segnato tutto il quadrato, che allora ciascun lato sarà di somma 2056. si lasciano di segnare i numeri per ordine retrogrado acciò meglio appa-  
 risca la disposizione per ordine retto. E così si opera rispetti-  
 vamentē negli altri quadrati, de' quali il lato sia numero pariter pari.

|   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |     |     |     |     |   |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|-----|-----|-----|-----|---|
| A | 1   | 2   |     |     |     |     | 7   | 8   | 9   | 10  |  |  |     |     | 15  | 16  | B |
| C | 17  | 18  |     |     |     |     | 23  | 24  | 25  | 26  |  |  |     |     | 31  | 32  | D |
| E |     |     | 35  | 36  | 37  | 38  |     |     |     |     |  |  | 43  | 44  | 45  | 46  | F |
|   |     |     | 51  | 52  | 53  | 54  |     |     |     |     |  |  | 59  | 60  | 61  | 62  |   |
|   |     |     | 67  | 68  | 69  | 70  |     |     |     |     |  |  | 75  | 76  | 77  | 78  |   |
|   |     |     | 83  | 84  | 85  | 86  |     |     |     |     |  |  | 91  | 92  | 93  | 94  |   |
|   | 97  | 98  |     |     |     |     | 103 | 104 | 105 | 106 |  |  |     |     | 111 | 112 |   |
|   | 113 | 114 |     |     |     |     | 119 | 120 | 121 | 122 |  |  |     |     | 127 | 128 |   |
|   | 129 | 130 |     |     |     |     | 135 | 136 | 137 | 138 |  |  |     |     | 143 | 144 |   |
|   | 145 | 146 |     |     |     |     | 151 | 152 | 153 | 154 |  |  |     |     | 159 | 160 |   |
|   |     |     | 163 | 164 | 165 | 166 |     |     |     |     |  |  | 171 | 172 | 173 | 174 |   |
|   |     |     | 179 | 180 | 181 | 182 |     |     |     |     |  |  | 187 | 188 | 189 | 190 |   |
|   |     |     | 195 | 196 | 197 | 198 |     |     |     |     |  |  | 203 | 204 | 205 | 206 |   |
|   |     |     | 211 | 212 | 213 | 214 |     |     |     |     |  |  | 219 | 220 | 221 | 222 |   |
|   | 225 | 226 |     |     |     |     | 231 | 232 | 233 | 234 |  |  |     |     | 239 | 240 |   |
|   | 241 | 242 |     |     |     |     | 247 | 248 | 249 | 250 |  |  |     |     | 255 | 256 |   |

56. Ef.

56. Essendo il lato del quadrato numero dispariter pari, il modo passato per ordine retto, serve solo per segnare i numeri ne' quadrati de' lati diametrali N. N. ed O. O. Per segnare gli altri numeri poi bisognano molti avvertimenti, come si può osservare nel quadrato il di cui lato è 6. quadrati, benchè per segnare i numeri ne' quadrati de' lati diametrali, si averanno tali numeri con segnare nel quadrato A. G. nel quadrato il di cui lato contiene quadrati 6. ed aggiunto 1. al 6. fa 7. con questa differenza si segnano i numeri nei quadrati del lato N. N. cioè 1. 8. 15. 22. 29. 36. siccome levandò 1. da 6. restà 5. con questa differenza si segnano i quadrati del lato O. O. cioè 6. 11. 16.

| Z | A  | B  | C  | D  | E  | F  | O |
|---|----|----|----|----|----|----|---|
| G | 1  | 35 | 34 | 3  | 32 | 6  | G |
| H | 30 | 8  | 28 | 27 | 11 | 7  | H |
| I | 24 | 23 | 15 | 16 | 14 | 19 | I |
| K | 13 | 17 | 21 | 22 | 20 | 18 | K |
| L | 12 | 26 | 9  | 10 | 29 | 25 | L |
| M | 31 | 2  | 4  | 33 | 5  | 36 | M |
| O | A  | B  | C  | D  | E  | F  | N |

21. 26. e 31. e così in tutti gl'altri quadrati, de' i quali il lato sia qualsivoglia numero'. Per segnare gl'altri numeri, si osservi che nel lato G. G. superiore, e nel lato M. M. infimo ci vanno sei numeri minori, e sei numeri maggiori corrispondenti talmente, che il minore sommi col maggiore 37. che si ha con sommare l'infimo termine 1. col massimo 36. e per lo più sono opposti, benchè i due quadrati di mezzo in ciascun lato del maggiore quadrato sommino 37. onde si possono tramutare da un lato al lato opposto senza variare somma ne' lati è così 34. e 3. del lato G. G. si possono con 4. e 33. mutare del lato M. M. e così 24. e 13. del lato A. A. con 19. e 18. del lato F. F. e rispettivamente succederà questo nel quadrato il di cui lato è 10. numero impariter pari; come si vede da me disposto, tuttavia si può variare, come hò detto ancora dell'antecedente. Lascio di cercarne regola, e modo per segnare tutti i numeri, acciò qualchedun altro s'impieghi in cercarla, tanto più, che mentre lo cercavo, m'imbattei ne i modi tenuti da Michele Stifelio in disporre i termini di Progressione Arimmetica nel quadrato, il quali se io avessi visto prima, non mi farei industriato di trovare i già insegnati, tuttavia non mi pento d'averli trovati per essere più facili di quelli dello Stifelio, come ognuno potrà giudicare, che però stimo bene di porgerli con le sue mede-

sue medesime parole recate in volgare aggiungendo solo qualche avvertimento per più facilitare l'operazione.

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 11 | 99 | 98 | 4  | 96 | 5  | 7  | 93 | 92 | 10  |
| 90 | 12 | 13 | 84 | 85 | 86 | 87 | 18 | 19 | 11  |
| 80 | 72 | 23 | 77 | 25 | 26 | 74 | 28 | 29 | 71  |
| 61 | 69 | 63 | 34 | 36 | 35 | 37 | 68 | 32 | 70  |
| 60 | 49 | 48 | 57 | 45 | 46 | 54 | 53 | 42 | 51  |
| 41 | 52 | 58 | 47 | 55 | 56 | 44 | 43 | 59 | 50  |
| 40 | 39 | 38 | 64 | 66 | 65 | 67 | 33 | 62 | 31  |
| 21 | 22 | 73 | 27 | 76 | 75 | 24 | 78 | 79 | 39  |
| 20 | 82 | 83 | 14 | 15 | 16 | 17 | 88 | 89 | 81  |
| 91 | 9  | 8  | 97 | 6  | 95 | 94 | 3  | 2  | 100 |

*Maravigliosa trasposizione de' termini di Progressioni  
Aritmetiche nel Cap. terzo à carte 24. à tergo.*

57. La Progressione Arimmetica se hà i termini secondo qualche numero quadrato, cioè se avrà termini 9. ovvero 16. ò pure 25. &c. (imperochè il 4. voglio che sia escluso) si potranno talmente trasporre quei termini in figura quadrata, che la medesima somma risulti sempre dal sommarli tutti i termini, che si ritrovano in ciascun lato, ò si pigli il lato per la larghezza, ovvero per lunghezza. Intendo in questo luogo per lati gl'ordini estremi de' quadretti non solo, ma anche quei di mezzo, anzi di più i diametrali, come nell'esempio seguente troverai nove ordini di quadretti per larghezza, e nove per lunghezza, e due diametrali; e sommando tutti i numeri, che in ciascun ordine, ò lato di quadretti 9. si trovano, ne verrà 20. volte il medesimo numero 369. per somma. Opera così. Comincia à segnare i numeri ne' quadretti del primo, e maggior quadrato, poi nelli quadretti del quadrato im-

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 16 | 81 | 79 | 77 | 75 | 11 | 13 | 15 | 2  |
| 78 | 28 | 65 | 63 | 61 | 25 | 27 | 18 | 4  |
| 76 | 62 | 36 | 53 | 51 | 35 | 30 | 20 | 6  |
| 74 | 60 | 50 | 40 | 45 | 38 | 32 | 22 | 8  |
| 9  | 23 | 33 | 39 | 41 | 43 | 49 | 59 | 73 |
| 10 | 24 | 34 | 44 | 37 | 42 | 48 | 58 | 72 |
| 12 | 26 | 52 | 29 | 31 | 47 | 46 | 56 | 70 |
| 14 | 64 | 17 | 19 | 21 | 57 | 55 | 54 | 68 |
| 80 | 1  | 3  | 5  | 7  | 71 | 69 | 67 | 66 |

mediatamente inferiore, e poi dell' altro fino all' ultimo .  
 Così segnerai i quadretti del primo quadrato A. numerà i quadretti (avverti, che per avere il numero de' quadretti, si moltiplicano i quadretti d'un lato meno uno per 4. cioè 8. per 4. fa 32. numero de' quadretti del primo quadrato ; del secondo faranno 24. del terzo 16. del quarto 8. &c. scemando sempre 8. quadretti ) del primo quadrato, e secondo tal numero piglia la metà de' termini di numeri minori, e l'altra metà di numeri maggiori, li quali qui pongo accompagnati per maggior chiarezza 1. e 81. 2. e 80. 3. e 79. 4. e 78. 5. e 77. 6. e 76. 7. e 75. 8. e 74. 9. e 73. 10. e 72. 11. e 71. 12. e 70. 13. e 69. 14. e 68. 15. e 67. 16. e 66. vedi come la metà de' termini de' minimi numeri impari vada per ordine nell' infimo lato D C. dell'altra metà di questi il primo cioè 9. si pone nel quadretto di mezzo del lato sinistro A D. sotto 10. e gl' altri dell' ordine ne i quadretti del supremo lato A B. dipoi vedi come la metà de i termini de i minimi numeri pari scendano per ordine nel lato destro B C. e l'altra metà nel lato sinistro A D. posto 16. nel primo quadretto di sopra . Nell' istessa maniera si segneranno i numeri nel secondo, nel terzo, e quarto quadrato, quando il lato è di quadretti di numero impari .

Primo

Primo Quadrato

A

|       |                  |    |    |    |    |    |
|-------|------------------|----|----|----|----|----|
| 28    |                  |    |    | 25 | 27 | 18 |
| <hr/> |                  |    |    |    |    |    |
|       |                  |    |    |    |    | 20 |
|       | Secondo quadrato |    |    |    |    | 22 |
| 23    |                  |    |    |    |    |    |
| 24    |                  |    |    |    |    |    |
| 26    |                  |    |    |    |    |    |
| <hr/> |                  |    |    |    |    |    |
|       | 17               | 19 | 21 |    |    |    |

|    |          |    |    |
|----|----------|----|----|
| 36 |          | 35 | 30 |
|    | Terzo q. |    | 32 |
| 33 | C        |    |    |
| 34 |          |    |    |
|    | 39       | 31 |    |

I numeri minori accompagnati con i maggiori da segnarsi nel secondo quadrato nel modo detto sono questi 17. e 63. 18. e 64.

|         |           |
|---------|-----------|
| V u u u | 19. e 63. |
|---------|-----------|

## Quarto 4.

|    |    |    |
|----|----|----|
| 40 |    | 38 |
| 39 |    |    |
|    | 37 |    |

19. e 63. 20. e 62. 21. e 61. 22. e 60. 23. e 59. 24. e 58. 25. e 57. 26. e 56. 27. e 55. 28. e 54. nel terzo sono questi 29. e 33. 30. e 52. 31. e 51. 32. e 50. 33. e 49. 34. e 48. 35. e 47. 36. e 46. nel quarto sono questi 37. e 45. 38. e 44. 39. e 43. 40. e 42. finalmente 41. che non

ha compagno si segna nel quadretto di mezzo .-

*Della disposizione di termini di numeri maggiori .*

58. I quadretti vti si segnano con i termini de' numeri maggiori perchè, come si può osservare, ciascun quadretto notato con termine di numero minore ne ha di contro un quadretto voto, siccome il quadretto angulare ha di contro l'altro quadretto angulare. Ora, in quel voto si pone il numero maggiore compagno del minore notato di contro, e così nel quadretto D. angulare si segna 80. compagno di 2. segnato nel quadretto angulare B. così 66. si segna nel quadretto angulare C. compagno di 16. segnato nell'opposto quadretto angulare A. Ora 82. si segna contro all'1. 79. di contro al 3. 78. di contro al 4. e così gl'altri. Ma chi non avesse accompagnato il numero minore col maggiore sottratti il minore da 82. e resterà il maggiore da segnarsi di contro al minore, come; Si sottratti 15. da 82. resta 67. numero maggiore, da segnarsi di contro al 15. il numero 82. si ha dal formarsi il primo termine. coll'ultimo 81. della Progressione. Questi maggiori numeri non si sono segnati, acciò rimanga più chiara la disposizione de' minori, oltre che si possono osservare nel quadrato, dove sono segnati tutti. Il numero 41. che si segna nel quadretto, che sta in mezzo a tutto il quadrato, si ha con pigliare la metà di 82. ma la somma, che importano i numeri di ciascun lato cioè 369. si ha dal moltiplicare 41. per 9. che tanti quadretti ha ciascun lato.

*Della disposizione de' numeri in un quadrato,*

*il di cui lato è di numero pari .*

59. L'esempio, che si pone è di 16. quadretti per lato, del quale la somma de' numeri bene disposti è 2056. qual numero si ha dalla moltiplicazione di 257. aggregato di 1. e 256. primo, ed ultimo termine della Progressione per 8. metà de' termini del lato, e perchè sono 34. lati, cioè 16. per lunghezza, e 16. per larghezza, 4. diametrali, e però si averà 34. volte la somma 2056.

Si accompagnino i minori, e maggiori termini per più facilità, come 1. e 256. 2. e 255. 3. e 254. &c. è pure si levi il termine minore da 257. resterà sempre il maggiore, come levato da 17. da 257. resta



resta 240. termine maggiore compagno di 17. minore termine.  
Quando il quadrato ha quadretti nel lato numerabili per 8. allora i termini scendono nel sinistro lato, e destro di qua, e di là infino che si riempiano tanti quadretti, quanti ne ha la metà del lato, ed allora si prosegue la segnando 9. nel secondo quadretto del lato superiore, e 10. e 11. per ordine nel lato infimo, e 12. e 13. nel superiore, cioè sempre due termini pari, e dispari, e segnato 12. nel penultimo quadretto del lato infimo si passa a segnare 23. e 24. nel lato sinistro immediatamente sotto l'8. e poi per ordine 25. e 26. nel destro 27. e 28. nel sinistro e finalmente 29. e 30. del destro lato, si osservi dunque, che finito di segnare i quadretti del lato di sotto, e di sopra, si seguita a segnare i quadretti nel lato sinistro, dove si tralasciò, e poi nel destro. Come adesso si segnano di contro i termini maggiori si è detto di sopra.

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 256 | 9   | 247 | 246 | 12  | 13  | 243 | 242 | 16  | 17  | 239 | 248 | 20  | 21  | 255 | 8   |
| 2   | 226 | 213 | 45  | 46  | 210 | 109 | 46  | 50  | 206 | 205 | 53  | 54  | 203 | 32  | 254 |
| 4   | 83  | 200 | 63  | 193 | 192 | 66  | 67  | 158 | 188 | 70  | 71  | 185 | 54  | 204 | 253 |
| 252 | 34  | 30  | 178 | 169 | 89  | 90  | 166 | 165 | 93  | 94  | 161 | 80  | 198 | 283 | 5   |
| 251 | 222 | 60  | 81  | 160 | 101 | 155 | 154 | 104 | 105 | 151 | 98  | 176 | 197 | 35  | 8   |
| 7   | 222 | 186 | 82  | 29  | 146 | 141 | 117 | 118 | 127 | 112 | 158 | 175 | 61  | 36  | 250 |
| 8   | 37  | 62  | 174 | 200 | 113 | 136 | 128 | 122 | 133 | 134 | 257 | 83  | 195 | 210 | 249 |
| 23  | 38  | 73  | 173 | 107 | 114 | 129 | 126 | 129 | 122 | 122 | 150 | 84  | 183 | 219 | 234 |
| 24  | 218 | 183 | 85  | 108 | 115 | 125 | 130 | 131 | 128 | 122 | 149 | 172 | 74  | 39  | 233 |
| 232 | 217 | 75  | 86  | 148 | 158 | 124 | 135 | 134 | 121 | 119 | 109 | 171 | 182 | 40  | 25  |
| 231 | 41  | 76  | 87  | 147 | 145 | 116 | 140 | 139 | 120 | 111 | 110 | 170 | 181 | 216 | 26  |
| 24  | 42  | 180 | 162 | 159 | 156 | 102 | 103 | 152 | 152 | 106 | 97  | 95  | 97  | 215 | 230 |
| 28  | 43  | 179 | 177 | 88  | 168 | 167 | 92  | 92  | 164 | 163 | 96  | 79  | 78  | 214 | 229 |
| 228 | 202 | 199 | 194 | 64  | 51  | 191 | 190 | 68  | 69  | 187 | 186 | 72  | 57  | 55  | 29  |
| 217 | 225 | 44  | 212 | 211 | 47  | 48  | 208 | 207 | 51  | 52  | 204 | 203 | 56  | 31  | 30  |
| 255 | 249 | 10  | 11  | 245 | 244 | 14  | 15  | 241 | 240 | 18  | 19  | 237 | 236 | 22  | 1   |

|                                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1                                | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 3                                | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Primo quadrato numerabile per 8. |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 10                               | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |

Nel secondo quadrato i quadretti del lato sono disparimente pari, che però come nel passato, avendo segnato il quadretto infimo, e supremo del lato destro, si segnano due nel sinistro lato, e due nel destro scendendo per ordine, e due altri nel sinistro, e due nel destro, e poi tre nel sinistro immediatamente segnando l'altro nel secondo quadretto del lato inferiore, e due altri nel lato superiore, e così si seguita per ordine sino che nel superiore lato siano segnati 53. e 54. poi 55. si segna nel penultimo quadretto del lato destro, siccome 56. del penultimo del lato inferiore, e così si segnano i quadrati de' i quali il lato è numero disparimente pari con i termini minori.

Ora resta a mostrare il modo di segnare i numeri minori nel quadrato, il cui lato è numerabile per 4. siccome si è mostrato nel primo



710.

per 4. segnandosi otto termini solitarij, e g'altri accompagnati, come si può osservare. Trè modi dunque ci vogliono per segnare i quadrati secondo i trè lati numerabili ò per 8. ò per 4. ò solo per 2.

|    |         |  |         |  |         |     |
|----|---------|--|---------|--|---------|-----|
|    | 63      |  | 66   67 |  | 70   71 | 58  |
| 59 |         |  |         |  |         |     |
| —  |         |  |         |  |         |     |
| 60 |         |  |         |  |         |     |
| —  |         |  |         |  |         |     |
| —  |         |  |         |  |         |     |
| 62 |         |  |         |  |         | 61  |
| —  |         |  |         |  |         | —   |
| 73 |         |  |         |  |         | —   |
| —  |         |  |         |  |         | —   |
| —  |         |  |         |  |         | —   |
| 75 |         |  |         |  |         | 74  |
| —  |         |  |         |  |         | —   |
| 76 |         |  |         |  |         | —   |
| —  |         |  |         |  |         | —   |
| —  |         |  |         |  |         | 177 |
| —  |         |  |         |  |         | —   |
| —  |         |  |         |  |         | 178 |
| —  |         |  |         |  |         | —   |
|    | 64   65 |  | 68   69 |  | 72   57 |     |

Terzo quadrato numerabile  
per 4.

Quando restano 16.termini di Progressione, si segnano nel quadrato per ordine, e verranno segnati con i suoi numeri i quattro quadretti di mezzo, che formano l'ultimo quadrato. G'altri numeri cambiano per formare l'antepenultimo quadrato, ovvero settimo, ponendo 121. segnato nel quadretto angulare sinistro di sopra, nel quadretto angulare destro di sotto, e 136. nel quadretto del 121. medesimamente 124. segnato nel quadretto angulare destro di sopra si segni nel quadretto angulare sinistro di sotto, e 133. nel quadretto di 124. quei di mezzo cambiano luogo, ponendo il destro nel sinistro, il sinistro nel destro, quel di sotto di sopra

Quar-

|    |  |    |    |    |    |       |
|----|--|----|----|----|----|-------|
|    | 89   | 90 |    | 93 | 94 | 80    |
| 81 | <p>Quarto quadrato segnato<br/>nel modo del secondo per<br/>avere il lato impariter pa-<br/>ri; e solo numerabile per<br/>2. come numero pari.</p> |    |    |    |    | —     |
| 82 |  |    |    |    |    | 83    |
| —  |  |    |    |    |    | 84    |
| —  |  |    |    |    |    | —     |
| 85 |  |    |    |    |    | —     |
| 86 |  |    |    |    |    | —     |
| 87 |  |    |    |    |    | —     |
| —  |  |    |    |    |    | 95    |
|    | 88   |    | 91 | 92 |    | 96 79 |

|     |   |     |     |     |     |
|-----|---|-----|-----|-----|-----|
|     | 101   |     | 104 | 105 | 98  |
| 99  | <p>Quinto quadrato, che<br/>è simile al primo per<br/>numerarsi per 8. però<br/>si segna come quello.</p> |     |     |     | —   |
| 100 |   |     |     |     | —   |
| 107 |   |     |     |     | —   |
| 108 |   |     |     |     | —   |
| —   |   |     |     |     | 109 |
| —   |   |     |     |     | 110 |
|     | 102   | 103 |     | 106 | 97  |

festo

|     |   |     |     |
|-----|---|-----|-----|
|     |   |     |     |
|     | 117   | 118 | 112 |
| 113 | sesto quadrato si-<br>mile al secondo ,<br>e quarto . |     |     |
| 114 |   |     |     |
| 115 |   |     |     |
|     |   |     | 119 |
|     | 116   |     | 120 |
|     |   |     | 111 |

Segnato per ordine .

|     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|
| 121 | 122 | 123 | 124 |
| 125 | 126 | 127 | 128 |
| 129 | 130 | 131 | 132 |
| 133 | 134 | 135 | 136 |

|     |                     |     |     |
|-----|---------------------|-----|-----|
| 136 | 123                 | 122 | 133 |
| 129 | settimo<br>quadrato |     | 132 |
| 125 |                     |     | 128 |
| 124 | 135                 | 134 | 121 |

Ultimo quadrato

|     |     |
|-----|-----|
| 126 | 127 |
| 130 | 131 |

e quel di sopra di sotto nel medesimo lato. Ovvero si segni la metà con ordine retto, e l'altra metà con ordine rettogrado, come al numero 52. si è insegnato.

60. Soggiunge lo Stifelio; Se la Progressione Arimmetica cominciasse da numero pari, tuttavia quella Progressione averà i numeri impari, allora quel che hò detto de numeri impari si deve intendere de termini pari, e quel che è stato detto de termini pari si deve intendere degl'impari.

Mà se la Progressione non avesse alcun numero impari, allora quel che si è detto de termini impari si dovrebbe accomodare ai termini pari per il contrario.

Soggiungo io però per più facilità, che prima si faccia il quadrato di quei termini, che uno vuole, secondo le regole date di Progressione Arimmetica naturale, e si abbia un quadrato simile di quadratti voti; e si riempiano di quei termini di quella Progressione, che

che uno vuole. Il primo quadrato ha i termini di Progressione naturale. Il secondo comincia da 2. e si veda, che dove il primo ha 1. il secondo ha 2. il terzo ha 3. e dove il primo ha 2. il secondo ha 4. il terzo 10. e dove il primo ha 3. il secondo ha 6. il terzo ha 15. cioè nel quadretto corrispondente &c.

| Primo |    |    |    |    |    |
|-------|----|----|----|----|----|
| 36    | 31 | 7  | 8  | 27 | 2  |
| 3     | 26 | 13 | 12 | 23 | 24 |
| 4     | 19 | 16 | 17 | 22 | 33 |
| 5     | 15 | 20 | 21 | 18 | 32 |
| 28    | 14 | 25 | 24 | 11 | 9  |
| 35    | 6  | 30 | 29 | 10 | 1  |

Secondo

|    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|
| 72 | 62 | 24 | 26 | 54 | 4  |
| 6  | 52 | 36 | 24 | 46 | 68 |
| 8  | 38 | 32 | 34 | 44 | 66 |
| 10 | 30 | 40 | 42 | 36 | 64 |
| 56 | 28 | 50 | 48 | 22 | 18 |
| 70 | 12 | 60 | 58 | 20 | 2  |

Ovvero i termini d' un quadrato già disposti si moltiplicano per un medesimo numero, i prodotti si pongano ne' quadretti corrispondenti d'un'altro quadrato simile, e così nel secondo ci sono i prodotti avuti dalla moltiplicazione de' termini del primo quadrato sempre per 2, e nel terzo per 5. &c.

X x x x

Ter-

|     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 180 | 155 | 35  | 40  | 125 | 19  |
| 15  | 139 | 65  | 60  | 115 | 160 |
| 20  | 95  | 80  | 85  | 110 | 165 |
| 25  | 75  | 100 | 105 | 90  | 170 |
| 140 | 70  | 185 | 120 | 55  | 45  |
| 175 | 30  | 150 | 145 | 50  | 5   |

*Delle disposizioni de' termini continui geometrici.*

61. Si possono disporre i termini continui della Progressione geometrica in quel modo, che si dispongono i termini continui della Progressione Arimmetica, cioè ponendo il minimo termine della Progressione geometrica nel quadretto, dove si porrebbe il minimo della Progressione Arimmetica, e gl'altri ancora fino a porre il massimo della Progressione geometrica nel quadretto, dove si porrebbe il massimo della Progressione Arimmetica; e così poi moltiplicando i termini di ciascun lato daranno sempre il medesimo numero per prodotto, siccome davano il medesimo numero per somma col formare i termini di ciascun lato di Progressione Arimmetica. La prima figura è disposta secondo le regole dello Stifelio. La seconda è disposta per il modo da me di sopra insegnato di notare i termini per ordine retto, e retrogrado, benchè in poco varia la disposizione per l'uno, e per l'altro modo.

|       |       |      |      |      |       |      |       |
|-------|-------|------|------|------|-------|------|-------|
| 32758 | 4     | 2    | 4096 | 1    | 16384 | 8192 | 8     |
| 256   | 32    | 64   | 2048 | 32   | 64    | 256  |       |
| 16    | 512   | 1024 | 128  | 128  | 512   | 1024 | 16    |
| 8     | 16384 | 8192 | 1    | 4096 | 4     | 2    | 32768 |

Ciascun lato importa di prodotto 1073741824.

Nella

x x x



Nelle seguenti figure sono disposti i termini di Progressione geometrica tripla, cominciando dal 3.  
 Nella prima secondo le regole dello Stile sono disposti 27 termini, ed altri, e tanti nella seconda, nel modo che ho insegnato di disporre i termini di numero dispari di Progressione Arimmetica di sopra.  
 Si osservi, che la disposizione è molto diversa, benché sia de i medesimi termini. La moltiplicazione de i numeri di ciascuna lato dell'una, e dell'altra figura, darà di prodotto il numero sotto scritto alla prima figura 24. volte, cioè 12. volte per ciascuna, essendo 12. lati, 5. per il lungo, 5. per il largo, e due diametrali &c.

|              |              |             |            |             |    |
|--------------|--------------|-------------|------------|-------------|----|
| 6561         | 818590795443 | 90954532827 | 2187       |             | 9  |
| 20318177609  | 513441       | 124766163   | 57049      |             | 81 |
| 243          | 171347       | 1540323     | 1386907    | 10106059203 |    |
| 729          | 41588721     | 29683       | 4620969    | 3368686401  |    |
| 272863598481 | 3            | 27          | 1122895467 | 374198689   |    |

250814007763397128429404486097761

|             |              |              |             |             |    |
|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|----|
| 171347      | 272863598481 | 2187         | 3368686401  |             | 27 |
| 81          | 513441       | 818590795443 | 6561        | 41588721    |    |
| 124766163   | 243          | 1540323      | 10106059203 | 29683       |    |
| 57049       | 374198689    | 3            | 4620969     | 20318177609 |    |
| 90954532827 | 729          | 1122895467   | 9           | 1386907     |    |

Mentre si stava per stampare l'artificiose disposizione de' termini di Progressione Arimmetica trovai nell'Arimmetica del Cardano al  
 X x x x x Capi-


**Capitolo 42. numero 39. sette quadrati con i numeri disposti,**  
 chiamati Planetarij, applicando quello, che ciascuna lato somma 15. alla Luna, 34. è Mercurio, 65. à Venere, 111. al Sole, 175. à Marte, 260. à Giove, 350. à Saturno, senza regola di disporgli, benchè dica di essere stati ritrovati con grandissimo artificio, e sono i medesimi, che hà posto il Cataldi nominato da principio, ed è falso, che l'uso loro serva alla Magia, come dice il medesimo Cardano.



**TRAT-**

# TRATTATO DECIMOQUARTO<sup>717</sup> DISTINZIONE PRIMA

## *Dell' estrazioni di Radici da qualsivoglia numero.*

1.  A prima radice, che si chiama quadra, ò quadrata è qualsivoglia numero moltiplicato in se stesso, & il numero prodotto si dice quadrato, ovvero censo. Come 7. via 7. fa 49. il 7. si chiama radice quadra, ò censa rispetto al 49. numero quadrato.
2. La seconda radice si chiama cuba, ed è qualsivoglia numero tre volte preso, e successivamente moltiplicato. Come 5. via 5. fa 25. e questo via 5. fa 125. numero cubo, rispetto al quale il 5. si chiama radice cuba.
3. La terza si chiama radice quadrata quadrata, ò censa censa, ed è qualsivoglia numero quattro volte preso, e successivamente moltiplicato. Come 3. via 3. fa 9. e questo via 3. fa 27. e questo via 3. fa 81. numero quadrato quadrato, rispetto al quale il 3. si chiama radice quadrata quadrata. Il numero quadrato quadrato nasce ancora dal numero quadrato moltiplicato in se. Come il quadrato 9. via 9. fa 81. **QQ.**
4. La quarta si chiama radice relata, ed è qualsivoglia numero preso 5. volte, e successivamente moltiplicato. Come 2. via 2. fa 4. e questo via 2. fa 8. e questo via 2. fa 16. e questo via 2. fa 32. numero relato, rispetto al quale il 2. è radice relata. Il numero relato nasce ancora dalla moltiplicazione del quadrato 4. via il cubo 8.
5. La quinta si chiama radice cuba quadrata, ò quadrata cuba, ed è qualsivoglia numero preso 6. volte, e successivamente moltiplicato. Come 2. via 2. via 2. via 2. via 2. via 2. fa 64. numero cubo quadrato, rispetto al quale 2. è radice cuba quadrata. Nasce ancora il cubo quadrato dal quadrarsi il cubo 8. ovvero dal cubarsi il quadrato 4. e così 8. via 8. fa 64. siccome 4. via 4. via 4. fa 64.
6. La sesta si chiama radice seconda relata, ed è qualsivoglia numero preso 7. volte, e successivamente moltiplicato come 3. via 3. via 3. via 3. via 3. via 3. via 3. fa 2187. secondo relato, rispetto al quale il 3. è radice seconda relata. Nasce ancora il secondo relato

lato dalla moltiplicazione del quadrato *N. G.* 7, via il relato 223.  
e del cubo 27, via il *QQ.* 81.

In tal maniera si discorre dell'altre radici, e loro potestà di numeri  
le quali si possono conoscere dalla seguente tavola,

*Tavola delle radici, e loro potestà.*

| 0. |    | 1.  | 2.   | 3.    | 4.     | 5.      | 6.       | 7.        | 8.         | 9. |
|----|----|-----|------|-------|--------|---------|----------|-----------|------------|----|
| N  | R  | Q   | C    | QQ    | Rel.   | CO      | R. sec.  | QQQ       | EC         |    |
| 1. | 2. | 4.  | 8.   | 16.   | 32.    | 64.     | 128.     | 256.      | 512.       |    |
| 2. | 3. | 9.  | 27.  | 81.   | 243.   | 729.    | 2187.    | 6561.     | 19683.     |    |
| 3. | 4. | 16. | 64.  | 256.  | 1024.  | 4096.   | 16384.   | 65536.    | 262144.    |    |
| 4. | 5. | 25. | 125. | 625.  | 3125.  | 15625.  | 78125.   | 390625.   | 1562500.   |    |
| 5. | 6. | 36. | 216. | 1296. | 5184.  | 25920.  | 129600.  | 531441.   | 2176640.   |    |
| 6. | 7. | 49. | 343. | 2401. | 16807. | 117649. | 592704.  | 2768064.  | 11007832.  |    |
| 7. | 8. | 64. | 512. | 4096. | 32768. | 232144. | 1612608. | 11764900. | 47829696.  |    |
| 8. | 9. | 81. | 729. | 6561. | 58320. | 478296. | 3826328. | 31381056. | 251994240. |    |

7. La prima fila per lunghezza contiene i numeri esposti della Pro-  
gressione naturale, che sono 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. la seconda  
fila contiene i segni delle potestà de numeri. N. sotto 0. significa  
numero semplice, ed assoluto. R sotto 1. significa radice. Q sotto  
il 2. significa quadrato, ed il 2. mostra, che si piglia la radice 2.  
volte con moltiplicarsi per produrre il quadrato. C sotto il 3. si-  
gnifica cubo, che si produce con pigliarsi 3. volte la radice, e  
moltiplicarsi come si è detto di sopra. QQ. sotto il 4. significa  
quadrato quadrato, il quale risulta dalla moltiplicazione della  
radice quattro volte presa. Rel. sotto il 5. significa relato &c.

8. Le altre file per larghezza dimostrano i numeri delle potestà di  
Progressione geometrica con i segni di proporzione doppia, tri-  
pla, quadrupla fino alla nonupla, e tante sono necessarie all'estraz-  
zione di tutte le radici, e così la prima rappresenta numero sem-  
plice, la seconda le radici, la terza i quadrati, la quarta i cubi,  
la quinta i relati, la sesta i cubi quadrati, la settima i secondi re-  
lati, l'ottava i quadrati quadrati quadrati, e la nona i cubi cubi.  
E volendo proseguire le Progressioni si avrebbero si quadrati  
primi relati, li terzi relati, li cubi quadrati quadrati, li quarti  
relati &c. Quando si volessero estrarre tali radici, ma descenden-  
do bastano le file fino al 9. che tanti sono i numeri di piti.

*Del puntare le figure de' numeri proprii per qualsivestira estra-  
zione di radice.*

9. Le figure del numero dal quale si deve cavare la radice si pun-  
tano in questa conformità, cominciando dalla prima inferiore de  
mano destra di chi scrive: Per l'estrazione di radice quadrata

si punta una figura, e l'altra nò, seguitando à puntarle quanto bisogna. Per l'estrazione di radice cuba si punta una figura, e due nò del numero proposto. Per l'estrazione della radice quadrata quadrata si punta una figura, e tre nò. Per l'estrazione della radice relata si punta una figura, e quattro nò del numero proposto, e così proseguendo nell'altre radici superiori con puntare la prima da mano destra &c. Queste figure saranno puntate, di tante costerà la radice. Le figure non puntate fra le puntate mostrano li mezzi proporzionali, che ci corrono da 1. fino alla potestà, che denomina la radice. Come nell'estrazione della radice quadrata si lascia una figura, perche da 1. à 4. ci è un mezzo proporzionale: cioè 2. Nell'estrazione della radice cuba si lasciano due figure corrispondenti alli due mezzi proporzionali da 1. fino all'8. cioè 2. e 4. la medesima ragione vale nell'altre estrazioni di radici, e si può osservare nella tavola antecedente:

*Del far la tavola per i numeri particolari, e proprii appartenenti all'estrazioni delle radici.*

10. Nella prima fila descendente da mano sinistra si pongono littér-  
mini, o numeri di Progressione naturale quanti si vogliono; da qua-  
sti hanno origine i numeri dell'altre file, perche il 3. della pri-  
ma si pone nella seconda dirim-  
pote, dal sommarli li due 3. 4 → 6  
viene 6, che è il secondo numero  
della seconda fila di contro: 24. 6 → 15 → 20  
dal sommarli 6 viene 10, che  
si pone di contro al 5. pare dal  
sommarli 5 e 10. viene 15. quar-  
to numero, e così gli altri.

Nell'istesso modo, che sono originati i numeri della seconda fila dal-  
li numeri della prima, così risultano i numeri della terza da quelli  
della seconda, i numeri della quarta da quelli della terza, avver-  
tendo di replicare il terzo numero di ciascuna fila nella seguen-  
te di contro. Come 3 della prima replicato come primo nella se-  
conda fila. Il 10. terzo numero della seconda fila replicato come  
primo nella terza fila. Il 36. terzo numero della terza replicato  
come primo nella quarta fila, e così in infinito.

*Dalla Tavola formare i numeri proprii per l'estrazione  
delle radici.*

11. I numeri particolari, o proprii delle radici si fanno così. Al  
3. della prima fila, che significa quadrato; come si è detto nell'  
esposizione dell'altra tavola, si aggiunga zero, e stia in questo  
modo

modo 20. questo è numero proprio per cavare la radice quadrata da qualsiasi numero .

- Il 3. che significa Cubo , hà di contro un'altro 3. Al primo 3. si aggiungono due zeri così 300. perchè ciascun numero richiede un zero per se, & altri, e tanti, quanti numeri sono distinti nelle file di contro . Onde, perchè di contro ci è un' altro 3. però si aggiungono due zeri al 3. uno per se, e l' altro per il 3. di contro, al secondo 3. si aggiunge un zero, e sono li numeri proprii per la radice cuba 300. e 30.

Bisogna sapere di più, che si devono pigliare i numeri retrogradamente ancora, tralasciando il numero simile, & uguale, quando ci è, come 4. che significa quadrato quadrato hà 6. di contro, onde si ritorna in dietro dicendo 4. 6. 4. e questi con i zeri come si è detto 4000. 600. 40. sono numeri proprii per la radice quadrata quadrata . Il 5. significa primo relato, & hà di contro 10. e 10. se si ritorna in dietro ci è un altro 10. Per il che si lascia; e si piglia un'altra volta il 5. come 5. 10. 10. 5. che con i suoi zeri sono numeri proprii per cavare la radice relata 50000. 10000. 1000. 50. & in questo modo si trovano i numeri proprii per la radice cuba quadrata 600000. 150000. 20000. 1500. 60. e per l'altre radici ancora .

*Dell'origine de numeri intieri quadrati .*

12. In qualsiasi Progressione geometrica, che principia da 1. tutti li termini, ò numeri un si, & un no sono quadrati: come 1. 25. 625. 15625. come si può osservare nella tavola posta dopo il numero 6. & Euclide nella proposizione 9. lib. 9. dimostra tutti li numeri proporzionali, che principiano da 1. se dopo questo sarà numero quadrato, esser quadrati, se numero cubo, essere tutti numeri cubi. Come quadrati 1. 4. 16. 64. &c. cubi 1. 8. 64. 512. &c.

13. I numeri intieri quadrati per ordine, si hanno dal sommarli i numeri impari, cominciando 1. per ordine come 1. e 3. fa 4. quadrato, e 5. fa 9. quadrato, e 7. fa 16. quadrato &c.

14. Per sapere un numero quadrato da quanti numeri impari sia composto, basta cavarne la radice, perchè il numero di essa denota quanti dispari con 1. compreso costituiscono il quadrato; per esempio 25. la di cui radice 5. mostra esser composto da questi cinque numeri impari 1. 3. 5. 7. 9. Così degl' altri .

15. La differenza di due quadrati immediati, e la somma delle loro radici, come la differenza da 9. a 16. è 7. somma di 3. e 4. radici di tali quadrati: E così ogni quadrato sommato con la sua radice, e con la radice del quadrato seguente, fa il quadrato

trato seguente, come 4. sommato con 2. sua radice, e con 3. radice di 9. fa 9. suo quadrato. Ovvero, che è l'istesso, ogni quadrato con il doppio della sua radice con 1. di più, fa il quadrato seguente, come 9. sommato con 6. e con 1. fa 16. quadrato seguente.

Altro modo generale per trovare la differenza fra due quadrati, è sommare le loro radici, e moltiplicare la somma per la differenza di tali radici, risulterà la differenza de i quadrati. Per esempio, si trovi la differenza dal quadrato di 20. a quello di 25. Si sommi 20. con 25. fa 45. che si moltiplica per 5. differenza da 20. a 25. fa 225. differenza cercata. Ovvero si moltiplica 20. per 5. fa 100. e 25. per 5. differenza, fa 125. si somma 100. con 125. torna 225. come per l'altro modo.

Si prova quadrando 20. fa 400. e quadrando 25. fa 625. da questo sottratto 400. resta 225. loro differenza.

16. I numeri quadrati terminano in 1. 4. 5. 6. 9. 0. quelli, che terminano in 5. devono avere à canto il 2. con un numero pari, come 625. quelli, che terminano in 1. e 9. devono avere à canto numero pari, come 81. e 49. così quelli, che terminano in 4. come 64. quelli che terminano in 6. devono avere à canto numero dispari, come 36. quelli che terminano in 0. devono avere zeri in numero pari, come 100. 400. e 90000. e che li numeri, che li sono à canto siano quadrati.

Dal numero quadrato levando li 7. l'avanzo è 1. 3. 4. 0. e levando li 9. l'avanzo è 1. 4. 7. 0. singolarmente.

### *Primo modo di cavare la radice quadrata.*

17. Nell'estrazione di radici quadrate, e cube, per essere più facili, non ci serviamo del modo Germanico insegnato da Michele Stifelio insigne matematico, mà del seguente.

Proposto per esempio questo numero 9290304. dal quale si deva cavare la radice quadra. Si punta di sopra 4. 3. 9. e 9. un sì, & un nò come si è detto, e per essere quattro figure Radici Quadrato puntate, di quattro figure sarà la radice. Bisogna sapere à mente i quadrati de' numeri diti, o almeno avere la nota di quelli presente, come qui si vede. Si comincia dunque levando il maggior quadrato, che si possa dal numero puntato 9. à manò sinistra, che è 9. resta 0. la di cui radice 3. si segna da manò sinistra per più commodità di formarne i partitori, il 3. si moltiplica per 2. numero per il quadrato, (mà per il modo

Y yyy

dello

dello Stifello si moltiplica per 20. come si dirà ) fa 6. primo partitore, per il quale si parte il 2. dopo il primo punto da mano sinistra, che per non poterli partire, si pone 0. à canto alla radice 3. e dice 30. che si moltiplica per 2. fa 60. secondo partitore, per il quale si parte 290. viene 4. Si avverta, che avanzi tanto, che dal numero avanzato con la figura 3. seguente, fino al terzo punto trapassi, & uguagli il quadrato del 4. cioè 16. ovvero d'altro numero, che dal partire venisse, e questa avvertenza si deve avere ogni volta, che si parte: Qui avanza à sufficienza, che però 4. si pone dopo 30. il quale 4. si moltiplica per 60. stato partitore, e il prodotto 240. si sottra da 290. resta 50. che accompagnato con il 3. che segue fa 503. dal quale si sottra 16. quadrato di 4. resta 487. al pari del quale si cala 0. dice 4870. la radice 304. si moltiplica per 2. fa 608. terzo partitore, per il quale si parte 4870. viene 8. ed avanza 64. con la figura seguente, dal quale appunto si può levare il quadrato di 8. si pone l' 8. dopo 304. e dice 3048. l' 8. si moltiplica per 608. partitore, il prodotto sottratto da 4870. resta 6. che col 4. dice 64. dal quale si leva 64. quadrato di 8. resta 0. ed è finita l' operazione, e la radice quadra è 3048.

### Operazione più breve

|                   |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|
| Radice            | 3048 — 9290304 | 3048 — 9290304 |
|                   | 240            | 48704          |
|                   | —              | 0              |
| Primo partitore 6 | 503            | 6              |
| Secondo 60        | 16             | 604            |
| Terzo 608         | —              | 6088           |
|                   | 4870           |                |
|                   | 4864           |                |
|                   | —              |                |
|                   | 64             |                |
|                   | 00             |                |

Nell'operazione più breve il num. 4. della radice, si pone ancora dopo 60. partitore dice 604. che si moltiplica per 4. il prodotto à mente si sottra da 2903. resta 487. medesimamente l' 8. ultima figura della radice si pone dopo il partitore 608. dice 6088. che si moltiplica per 8. e si sottra à mente da 48704. come si fa à partire per danda alla breve, resta 0. e così nel medesimo tempo, si leva il prodotto fatto dalla radice via il partitore, & il quadrato della medesima radice.

Secom-



*Secondo modo di estrarre le radice quadra.*

18. Avendo da cavare la radice quadra da 6765201. si puntino al solito 1. 2. 6. 6. dall'ultimo 6. puntato si leva 4. maggior quadrato resta 2. che si segna sotto, che con 76. fino al secondo punto dice 276. e la radice 2. del quadrato 4. si moltiplica per 20. numero proprio di questa radice fa 40. primo partitore, per il quale si parte 276, viene 6. avvertendo, che dall' avanzo si possa cavare il quadrato del quoziente, che qui si cava appunto. Onde si segna 6. a canto alla radice 2. e per operare brevemente, si aggiunge 6. al partitore 40. dice 46. che moltiplicato per 6. radice, e sottratto da 276. resta 0. e così resta cavata la radice fino al secondo punto. Si calano le figure 52. fino al terzo punto da partirsi, si fa il secondo partitore moltiplicando 26. per 20. numero proprio fa 520. per il quale non si può partire 52. onde si pone 0. dopo il 26. dice 260. che si moltiplica per 20. fa 5200. terzo partitore, ed al pari di 52. si calano le figure 01. fino al quarto punto fanno 5201. che si partono per 5200. viene 1. da porsi dopo 260. e farà tutta la radice 2601. ed avanza 1. dal quale sottratto 1. quadrato dell' ultima figura di radice; resta 0. Sicchè 2601. è la radice discreta di 6765201. Onde se si moltiplicherà 2601. in se verrà 6765201. numero proposto, che è la sua vera prova.

20. numero proprio

Radice 2601 — 6765201

Primo partitore 40      276

Secondo 520      05201

Terzo 5200      0

Prove del 7. e del 9. :

$$\begin{array}{r} 7 \\ 4 \overline{) 28} \\ \underline{4} \phantom{0} \\ 4 \end{array} \quad \begin{array}{r} 9 \\ 0 \overline{) 81} \\ \underline{0} \phantom{0} \\ 0 \end{array}$$

Si levano li 7. da 2601. radice, resta 4. che si moltiplica via 4. fa 16. dal quale levati li 7. resta 2. numero della prova. Per il che levando li 7. dal numero proposto 6765201. resta 2. e sta bene; Ma se ci fusse avanzato numero per non essere stat a discreta la radice, allora levati li 7. da quello; il residuo si aggiunge al prodotto fatto dal moltiplicarsi gl' avanzi dalla radice &c. Così ancora si fa la prova del 9.

*Altro modo di estrazione di radice quadra.*

19. Soggiungo quest'altro esempio, acciò si praticchi qualche brevità d'operazione da mè usata: Si abbia da trovare la radice quadra di 56972304. puntate le figure al solito. Da 56. ultimo punto da mano sinistra si leva 49. maggior quadrato, che levar si possa, prodotto dalla radice 7. posta da parte sotto il 20. numero proprio, resta 7. che con le figure 97. fino al punto secondo fa 997. da partirsi: Si trova il partitore primo con moltiplicare la radice

Y y y 2

ce 7.

ce 7. per 20. fa 140. per esso si parte 797. avvertendo, che dall'avanzo si possa levare il quadrato del quoziente, viene 5. perchè avanzo 97. dal quale si può levare 25. quadrato di 5. il quale 5. si pone dopo la radice 7. fa 75. per 5. si moltiplica 140. partitore il prodotto 700. si sottra da 797. resta 97. e da questo si leva 25. quadrato di 5. resta 72. ma per abbreviare operazione, il zero nel partitore 140. si piglia per 5. che è come aggiungere 5. a 140. fa 145. benchè 140. e gl'altri partitori non si mutino. Onde si moltiplica 145. per 5. fa 725. che si sottra à mente, come nel partire per danda alla breve da 797. resta 72. Ecco che con un'operazione si leva il prodotto del quoziente via il partitore, e il quadrato del medesimo quoziente. Al pari del 72. si calano le due figure 23. fino al terzo punto fanno 7227. da partirsi, il partitore si trova con moltiplicare 75. radice per 20. al solito fa 1500. per il quale si parte 7223. con l'avvertenza, che dall'avanzo si possa levare il quadrato del quoziente, e viene 4. che si pone dopo 75. fa 754. e per 4. si moltiplica 1504. pigliando l'ultimo zero del partitore per 4. come si è detto fa 6016. che sottratto da 7223. resta 1207. al pari del quale calando 04. ultime figure fanno 120704. si moltiplica la radice 754. per 20. fa 15080. per questo si parte 120704. con la solita avvertenza, viene 8. che posta dopo 754. fa 7548. e per 8 moltiplicato 15088. partitore accresciuto di 8. fa appunto 120704. che sottratto resta 0. &c.

$$\begin{array}{r}
 20 \\
 \text{Radice } 7548 \text{ — } 56972304. \\
 140 \qquad 797 \\
 1500 \qquad 7223 \\
 15080 \qquad 120704
 \end{array}$$

Prova con moltiplicare à crocetta

$$\begin{array}{r}
 7548 \\
 7548 \\
 \hline
 \end{array}$$

Torna 56972304

0

*Dell'estrarre la radice vicina da numeri non quadrati con formare il retto, che dia poco più.*

20. Sia proposto 30. dal quale si deva cavare la sua radice vicina, dico vicina, perchè i numeri non quadrati hanno radice sorda, così detta à causa, che con numeri non potendosi esprimere rende sordo ciascuno in udirla; e si dice ancora irrazionale, non soggiacendo à ragione di numero; benchè con numeri si possa trovare radice sempre più vicina, mai però giusta appunto, altrimenti farebbe di numero quadrato, che farebbe contro il supposto di numero non quadrato. Ora tornando al proposto 30. la radice sarà 5. che quadrato fa 25. che sottratto da 30. resta 5. il quale si pone sopra una linea con sotto 10. prodotto fatto dalla radice 5. moltiplicato per 2. numero proprio del quadrato, come

me

me costa dalla tavola al 10. dice  $1\frac{1}{2}$ . schifato  $\frac{5}{2}$ . che col 5. fa  $5\frac{5}{2}$ . prima radice vicina di 30. tal radice si quadra fa  $30\frac{5}{2}$ . Volendosi radice più vicina si parte  $\frac{5}{2}$ . che sopravanza il 30. per 11. doppio della radice  $5\frac{5}{2}$ . viene  $3\frac{5}{2}$ . il quale si sottra da  $5\frac{5}{2}$ . resta  $5\frac{3}{2}$ . radice più vicina della passata, perchè quadrandola fa  $30\frac{3}{2}$ . il quale avanzo sopra 30. è pochissimo rispetto alla radice: e volendosi radice più vicina si parte  $1\frac{1}{2}$ . per il doppio di  $5\frac{3}{2}$ . e il quoziente si sottra da  $5\frac{3}{2}$ . resterà una radice più vicina della passata, e così in infinito.

*Dell' estrarre la radice vicina da' numeri non quadrati  
con formare il rotto, che dia poco meno.*

21. Sia il medesimo 30. dal quale si deva cavare la sua radice vicina, la radice intiera è 5. il quadrato 25. sottratto da 30. avanza 5. che si pone sopra una linea con sotto 1. differenza dal quadrato 25. al quadrato 36. il quale 11. si ha con sommare 5. radice di 25. e 6. radice di 36. dice  $1\frac{1}{2}$ . che con 5. fa  $5\frac{1}{2}$ . radice vicina. Onde moltiplicandola in 11. cioè quadrandola fa 29.  $1\frac{1}{2}$ . che è di 30. meno  $\frac{1}{2}$ . il quale si parte per il doppio della radice  $5\frac{1}{2}$ . sommato con la differenza, che è da  $5\frac{1}{2}$ . sino al 6. radice di 36. che è 11.  $1\frac{1}{2}$ . e viene  $3\frac{1}{2}$ . il quale si somma con  $5\frac{1}{2}$ . radice passata fa  $5\frac{3}{2}$ . per radice più vicina, che quadrata fa  $29\frac{3}{2}$ . che di 30. è meno  $\frac{1}{2}$ . questo si parte per il doppio di  $5\frac{3}{2}$ . con la differenza sino al 6. e il quoziente si aggiunge alla radice ultima trovata, e si averà una radice più vicina, e così sempre.

*Modo di riformare il rotto, che una volta dia più,  
l' altra meno.*

22. Del medesimo 30. sia trovata la radice vicina  $5\frac{1}{2}$ . che quadrata fa  $30\frac{1}{2}$ . che volendola più vicina in meno si parte 5. avanzo da 25. sino in 30. per il doppio del numero intiero della radice sommato con il rotto della radice, cioè per  $10\frac{1}{2}$ . viene  $\frac{5}{2}$ . che si aggiunge 5. fa  $5\frac{5}{2}$ . radice più vicina in meno della passata. Il suo quadrato è  $29\frac{5}{2}$ . che è meno  $\frac{1}{2}$ . di 30. volendola più vicina in più si parte 5. per il doppio di 5. sommato con  $\frac{5}{2}$ . cioè per  $10\frac{5}{2}$ . viene  $\frac{5}{2}$ . che con 5. fa  $5\frac{5}{2}$ . radice più vicina della passata in più, perchè quadrandola darà  $30\frac{5}{2}$ . e così seguitasi quanto uno vuole.

*Misto di due rotte per la radice quadra vicina.*

23. Avendo io osservato, che ponendo l'avanzo sopra la linea con sotto il doppio della radice, l' intiero con tal rotto quadrandolo rende più del numero proposto, e così  $5\frac{1}{2}$ . quadrato fa  $30\frac{5}{2}$ . ma ponendo sotto la linea 11. differenza de quadrati 25. e 36. ovvero più 1. del doppio della radice 5. fa  $1\frac{1}{2}$ . che con 5. quadrandolo produ-


produce meno di 30. Però si sommi  $\frac{2}{3}$ , e  $\frac{1}{3}$ , fa  $\frac{5}{3}$ . di questo si pigli la metà cioè  $\frac{5}{6}$ . rotto misto da aggiungerli a 5. fa  $5\frac{5}{6}$ . radice più vicina delle due dette, ed è la medesima, che l'ultima passata.

*Come si trovi la radice, o lato per linea di numero non quadrato.*

24. Benchè la radice di 30. non si dia per l'appunto in numero, si dà però in linea, così d'ogn'altro numero non quadrato.

Per questo effetto si piglino due numeri, che moltiplicati facciano 30. siano 3. e 10. ovvero 5. e 6. ancora 4. e  $7\frac{1}{2}$ . con rotte si possono trovare infiniti, perchè se si parte il 30 per qualsivoglia numero il quoziente, e il partitore sono li due numeri, che moltiplicati producono 30. ma non sono facili all'operazione. Si può pigliare ancora 1. e 30. Per ora si piglino 3. e 10. sommati fanno 13. sopra una linea, divisa in 13. parti uguali, si faccia con il compasso un semicircolo, e dal punto di 3. parti per un verso, e di 30. per l'altro si alzi una linea perpendicolare alla circonferenza, dico tale linea essere la radice, ed il lato del quadrato 30. di superficie. Medesimamente 6. e 5. secondi numeri sommati, fanno 11. si piglino della medesima linea 11. parti, sopra esse si faccia il semicircolo, e dal punto di 5. parti per un verso, e di 6. per l'altro, si alzi la perpendicolare alla circonferenza: dico tale linea perpendicolare essere la radice, e lato appunto di 30. uguale all'altra.

La ragione è, perchè la linea perpendicolare è mezzo proporzionale tra la linea di 3. parti, e di 10. parti nel primo caso, nel secondo tra la linea di 5. parti, e di 6. per la nona del sesto d'Euclide. Onde la linea di 3. parti sta alla linea perpendicolare A B. come la medesima perpendicolare alla linea di 10. parti, e il quadrato fatto dalla perpendicolare A B. è uguale al rettangolo fatto dalla linea di 3. parti di larghezza, e di 10. parti di lunghezza; e così nell'altro caso la linea di 5. parti sta alla linea perpendicolare C D. come l'istessa perpendicolare alla linea di 6. parti, ed al contrario; ed il quadrato della linea C. D. è uguale al rettangolo fatto dalla linea di 5. parti di larghezza, e di 6. di lunghezza.



*Altro modo di riformare il rotto alla radice vicina.*

25. Prima di estrarre la radice quadra da interi, e rotte quadrati, voglio apportare il modo di Raffaello Bombelli posto a carte 35. della

della sua Algebra per avvicinarsi sempre più nelle radici irrazionali quadre.

Si voglia trovare la radice di 13. numero non quadrato. La radice intera è 3. avanza 4. il quale si parte per il doppio della radice 3. cioè per 6. viene  $\frac{2}{3}$ . primo rotto, che si aggiunge al 3. fa  $3\frac{2}{3}$ . per la prima radice, il suo quadrato è  $13\frac{4}{9}$ . Ora volendosi più avvicinare al 6. doppio di 3. si aggiunga il rotto  $\frac{2}{3}$ . e per 6  $\frac{2}{3}$ . si parta il 4. viene  $\frac{3}{4}$ . e questo rotto si aggiunge al 3. fa  $3\frac{1}{4}$ . per la seconda radice più vicina della passata il di cui quadrato è  $12\frac{3}{4}$ . e volendo radice più giusta. si aggiunga  $\frac{1}{4}$ . al 6. per 6  $\frac{1}{4}$ . si parta 4. viene  $\frac{1}{2}$ . ed aggiunto questo al 3. fa  $3\frac{1}{2}$ . radice più vicina delle passate; il suo quadrato è  $13\frac{1}{4}$ . e così si può seguitare quanto uno vuole.

*Quando il numero proposto è meno 1. ad essere quadrato.*

26. Sia proposto 8. la radice 2. il suo quadrato 4. ed avanza 4. che sopra una linea con sotto 4. doppio di 2. radice, fa  $\frac{4}{2}$ . cioè 2. che aggiunto al 2. risulta 3. per la radice, o il suo quadrato 9. che è 1. più di 8. e così succederà usando questo modo nel cavare la radice da numeri manchevoli di 1. ad essere quadrati.

Per aggiustare la radice 3. si parte 1. di più, che dà nel quadrato per 6. doppio di 3. come si disse nel num. 20. viene  $\frac{1}{6}$ . che si sottra da 3. resta  $2\frac{5}{6}$ . per la radice, il di cui quadrato è  $8\frac{25}{6}$ . Però si offervi, che il denominatore del rotto è il doppio della radice intera, che viene da principio, e il numeratore è meno 1. così di 15. la radice è  $3\frac{1}{3}$ . di 24. e  $4\frac{1}{2}$ . &c.

*Del cavare la radice quadra da intieri, e rotti quadrati.*

27. Sia proposto  $70\frac{1}{4}$ . dal quale si deva cavare la radice quadra. Il 70. si moltiplica per 16. denominatore, ed al prodotto si aggiunge 5. numeratore fa 1125. dal quale si cava la radice quadra, che è 33. ancora si cava da 16. denominatore del rotto è 4. per questo si parte 33. viene  $8\frac{1}{4}$ . per la radice quadra dal proposto numero.

Si offervi, che dovendosi cavare la radice dal denominatore del rotto, è necessario sia numero quadrato, altrimenti l'intiero, e rotto non farebbe quadrato, ne averebbe radice discreta.

Il rotto ancora, dal quale si deva cavare la radice quadrata, deve avere il numeratore, e denominatore quadrato, come  $\frac{9}{4}$ . per essere il 4. e il 9. numeri quadrati, la sua radice discreta farà  $\frac{3}{2}$ .

*Del*

*Del covere la radice quadra. da rotto non quadrato.*

28. Nicòlò Tartaglia usa due modi nel trovare la radice quadrata vicina d'un rotto non quadrato. Il primo è questo: Nella seconda parte lib. 2. cap. 2. num. 2. proposto  $\frac{7}{4}$ . cava la radice dal 5. che è 2. l'avanzato 1. pone sopra una linea con 4. sotto, doppio della radice farà la radice  $2\frac{1}{4}$ . nel medesimo modo la cava da 7. denominatore, che è 2  $\frac{1}{4}$ . per questa parte l'altra, risulta  $\frac{1}{2}$ . per la radice propinqua, che quadrandola darà meno  $\frac{1}{4}$ .

Più vicina si aveva usando il modo di quelli chiamati da esso più naturali, che matematici nel num. 8. cap. 1. lib. 2. che al doppio della radice aggiungono 1. che è l'istesso, come hò detto al numero 21. di porre sotto l'avanzo 5. differenza del quadrato 4. al quadrato 9. sicchè la radice di 5. numeratore è  $2\frac{5}{7}$ . di 7. denominatore  $2\frac{1}{4}$ . onde per questa partita l'altra risultava  $\frac{1}{2}$ . per radice più vicina, e quadrandola darà di più  $\frac{1}{4}$ . solamente.

Trova pure il Tartaglia la radice di  $\frac{7}{4}$ . partendo  $2\frac{1}{4}$ . radice di 7. per 3. radice di 9. e ne viene  $\frac{1}{2}$ . per la radice propinqua, che darà di più  $\frac{1}{4}$ . ma usando il modo riprovato dal Tartaglia la radice sarà  $\frac{1}{4}$ . perche di 7. numeratore farà  $2\frac{1}{4}$ . che partita per 3. radice di 9. dà il detto rotto, il quale quadrato, farà meno  $\frac{1}{4}$ . del rotto proposto.

*Secondo modo di trovare la radice di rotto non quadrato.*

29. Sia proposto il medesimo  $\frac{7}{4}$ . per cavarne la radice quadrata dice il Tartaglia, che si moltiplichi 5. numeratore via 7. denominatore fa 35. da questo si cavi la radice, è 6. questo si parte per 7. denominatore viene  $\frac{6}{7}$ . per la radice propinqua, che quadrata darà  $\frac{36}{49}$ . più di  $\frac{7}{4}$ . Per l'altro modo la radice fu più lontana.

*Ma nota, dice il Tartaglia: Che se bene di questo secondo modo malamente si intende la causa della sua operazione, nondimeno tal modo è generalmente più giusto, ovvero meno fallace del primo. Mi maraviglio assai, che il Tartaglia non sia arrivato ad intendere la causa di tal modo di operare, e che dica non potere essere intesa se non da chi ha la pratica delle proporzioni, e proporzionalità, e de' suoi mirabili effetti. Di poi quasi pentito pretenda d'assegnare la causa dal num. 4. fino al 10. con alcune proposizioni di Euclide non toccando la vera causa, che qui assegno. In tutte le specie di radici ripete la medesima scusa di non potere assegnare la causa dell'operare; dirò.*

*Causa vera, e legittima di operare ignorata dal Tartaglia.*

30. Proposto di nuovo  $\frac{7}{4}$ . Si moltiplica 5. via 7. fa 35. di questo la prima radice è 6. che si parte per 7. e viene  $\frac{6}{7}$ . per la radice vicina di tal rotto. La ragione, e causa di tal operare è questa:

Si

Si riduce  $\frac{3}{7}$  implicitamente in questo rotto  $\frac{3}{7}$  uguale a  $\frac{3}{7}$ . con moltiplicarsi il numeratore 5. per 7. fa 35. numeratore, e con moltiplicarsi il denominatore 7. per 7. fa 49. denominatore, se si schiserà quel rotto per 7. tornerà  $\frac{5}{7}$ . Essendo dunque questi due rotti uguali, trovata la radice di uno, è trovata aneora dell' altro. La radice prima vicina di 35, è 6. e la radice di 49, è 7. appunto per essere quadrato 49. partito 6. per 7. viene  $\frac{7}{6}$ . radice propinqua di  $\frac{5}{7}$ . cioè di  $\frac{3}{7}$ . dunque la vera causa di tale operare è ridurre il rotto proposto in rotto uguale di denominatore quadrato, e viene più giusta la radice, perchè del numeratore solo si deve cavare la radice propinqua, essendo quella del denominatore discreta, e razionale.

*Radice più vicina di quella trovata dal Tartaglia.*

31. Se di 35. non si piglierà la prima radice 6. che rende 1. di più ma si piglierà la seconda  $5\frac{5}{7}$ . come si è detto nel numero 26. e questa seconda si partirà per 7. verrà  $\frac{7}{7}$ . radice di  $\frac{5}{7}$ . perchè quadrata darà solo di più  $7\frac{5}{7}$ . onde quanto sia più vicina della passata è chiaro.

*Altro Modo con ridurre il rotto ad altro uguale di numeratore quadrato.*

32. Sia proposto il medesimo  $\frac{5}{7}$ . dal quale si deva cavare la radice q. si moltiplica 5. via 7. fa 35, la radice prima di 35. è 6. per il quale si parte 5. numeratore viene  $\frac{5}{6}$ . per la radice propinqua di  $\frac{5}{7}$ . che quadrata darà meno  $7\frac{5}{6}$ . del rotto proposto, che però è più vicina di quella venuta, quando il rotto si è ridotto a denominatore quadrato avendo dato più  $7\frac{5}{6}$ . come appare nel num. 29. ma si sommi  $\frac{5}{6}$  radice che da di più con  $\frac{5}{7}$  radice che da di meno e della somma si pigli la metà, che sarà  $7\frac{5}{12}$ . per radice più propinqua, essendo ritornata la passata. Questo artificio fù da me insegnato al num. 23. Avvertasi, che  $\frac{5}{7}$  fù ridotto implicitamente a  $\frac{5}{7}$  rotto uguale di numeratore quadrato.

*Del cavare le radici de' numeri intieri, e rotti non quadrati.*

33. Proposto dal Tartaglia  $5\frac{2}{3}$  da cavarli la radice quadra, prima la cava da 5. e 2. ed avanza 1. il quale via 3. denominatore con l'aggiunta di 2. numeratore fa 5. che si pone sopra una linea. Il doppio della radice 2. cioè 4. si moltiplica per 3. denominatore fa 12. che si pone sotto linea, sopra la quale è 5. dice  $7\frac{1}{3}$ . che con  $2\frac{2}{3}$ . per la radice vicina, e quadrata e verrà di più  $7\frac{2}{3}$  d'un terzo, e assolutamente  $7\frac{2}{3}$ . e non  $7\frac{2}{3}$  come dice il Tartaglia.

Si averà più vicina però, se alla moltiplicazione fatta di 4. doppio della radice via 3. denominatore, che fa 12. si aggiunga 1. allora

Z z z z

la

- la radice sarà  $2\frac{1}{7}$ . che darà solo di più  $\frac{1}{7}$ . che è poco, nella radice pochissimo.
34. Per il secondo modo sia l'istesso  $5\frac{1}{7}$ . ridotto in  $\frac{35}{7}$ . si moltiplica 17. per 3. fa 51. la di cui radice propinqua è  $7\frac{1}{7}$ . che si parte per 3. denominatore viene  $2\frac{1}{7}$ . per la radice vicina, la quale quadrandosi darà di più  $\frac{1}{7}$ . la ragione, e causa di quell'operare ignorata dal Tartaglia si è detta al numero 30. ed è che  $\frac{1}{7}$ . sono ridotti a  $\frac{1}{7}$ . e trovata la radice  $7\frac{1}{7}$ . di 51. si parte per 3. radice discreta di 9. denominatore, e viene la detta radice  $2\frac{1}{7}$ .
35. Per il modo da me trovato per  $7\frac{1}{7}$ . si parte 17. numeratore, e verrà  $2\frac{1}{7}$ . per la radice più propinqua della passata, perchè quadrata farà meno  $\frac{1}{7}$ . la ragione di tale operare perchè  $\frac{1}{7}$ . son ridotti implicitamente in  $\frac{1}{7}$ . di numeratore quadrato uguali a  $\frac{1}{7}$ . come hò detto al num. 32. la prima radice propinqua di 51. è  $7\frac{1}{7}$ . e la radice discreta di 289. e 17. questo partito per  $7\frac{1}{7}$ . risultò la detta radice.
- Modo d'Oronzio Fineo nel trovare la radice q. vicina.*
36. Questo Autore insegna aggiungere a i numeri non quadrati binarij di zeri, come due, quattro, sei &c. e da questi numeri accresciuti, e per dir meglio moltiplicati per 190. per 10000. &c. cava la radice propinqua, dalla quale distingue tante figure, quanti furono i binarij di zeri aggiunti, e ne forma il rotto con porre altri, e tanti zeri sotto con 1. da principio, tramezzate da una linea. Per esempio al num. 20. fa proposto 30. da cavarne la radice q. a 30. aggiunti sei zeri fa 30000000. del quale la radice q. è 5478. pigliando l'avanzo per 1. dalla quale radice si distinguono tre figure, cioè 478. per li tre binarij di zeri aggiunti con sotto 1000. per denominatore; Sicchè la radice sarà  $5\frac{478}{1000}$ . che quadrata, fa  $30\frac{478}{1000}$ . tale radice è vicinissima, e vicina si averanno per tale modo l'altre radici come dirò; che è contro il Tartaglia, che vuole persuadere il contrario, biasimando tal modo.
- Si voglia cavare ancora da  $5\frac{1}{7}$ . ovvero da  $\frac{35}{7}$ . si riduca a denominatore quadrato sarà  $\frac{1}{7}$ . si aggiungano a 51. otto zeri, & altri, e tanti a 9. la radice quadrata propinqua di 510000000. è 7145. pigliando l'avanzo da ultimo per 1. e la radice discreta di 90000000. denominatore è 30000. per questo partito 7145. ne verrà  $2\frac{1}{7}$ . per la radice prossima di  $5\frac{1}{7}$ . che quadrata darà poco più di  $\frac{1}{7}$ . Ecco dunque, che chi si vuole servir bene del modo d'Oronzio, sempre più può accostarsi nelle radici

qua-



quadrati, e nell'altre ancora; perche non rinfresca la fatica in operare.

*Altro modo d'Oronzo.*

37. Sia proposto  $\frac{1}{4}$  del quale si voglia la radice quadra propinqua. Si moltiplica 5. i numeratore. V. g. per 60. fa 300. numeratore della radice. Ora 3600. quadrato si moltiplica per 5. numeratore il prodotto 18000. pure si moltiplica per 7. denominatore, fa 126000. del quale la radice propinqua 335. è il denominatore della radice. Tutta la radice, è  $\frac{335}{7}$ . schifato  $\frac{4}{7}$ . e questa è la radice quadra di  $\frac{1}{4}$ . per questo modo, che darà poco meno.

38. Non voglio lasciare d'avvertire, che dovendosi cavare la radice q. ed ogn'altra da numero grande intiero con rotto. Si levi la radice dall'intiero per il primo modo lasciando il rotto, perchè dando tal radice un poco più farà assai vicina; per esempio si abbia da cavare la radice quadra da 6528  $\frac{1}{4}$ . Si cavi da 6528. farà 80  $\frac{4}{7}$ . e quadrandola darà 6528  $\frac{4}{7}$ . che è quasi la quantità proposta &c.

*Dell'origine de' numeri cubi.*

39. I numeri cubi si hanno dal sommarli i numeri dispari per ordine 1. primo cubo, dal sommarli due dispari seguenti 3. e 5. viene 8. secondo cubo, dal sommarli tre 7. 9. 11. viene 27. terzo cubo; dal sommarli 13. 15. 17. 19. che sono quattro, viene 64. quarto cubo; e così dal sommarli li cinque seguenti si averà il quinto cubo &c.

Volendo però trovare i numeri cubi ordinatamente per le differenze da un cubo immediato all'altro, si formano tali differenze con aggiungere 1. a 6. fa 7. prima differenza fra li cubi 1. e 8. Ora 7. si aggiunge a 12. secondo termine di Progressione Arimmetica fa 19. seconda differenza. Radici Cubi Differenze Progressione  
za fra li cubi 8. e 27. 1 1 7 6  
al 19. si aggiunge 2 8 19 18  
18. terzo termine di 3 27 37 18  
Progressione fa 37. 4 64 61 24  
terza differenza fra 5 125 61 30 &c.  
li cubi 27. e 64. e così si prosegue con aggiungere al 37. 24. quarto termine di Progressione Arimmetica, che si avanza per 6. come può osservarsi nella cominciata tavola.

Avendosi la differenza di due cubi immediati per trovare il termine di detta Progressione, di aggiungere a tale differenza, perchè si abbia la differenza fra il cubo maggiore de' detti due, e fra il cubo immediatamente seguente; si moltiplica la radice del maggiore

Z z z z z

re

re cubo per 6. e viene il termine cercato. Per esempio differenza 37. frà li cubi 27. e 64. la radice cuba di 64. è 4. che si moltiplica per 6. fa 24. termini della Progressione, che aggiunto a 37. fa 61. differenza frà 64. e 125. cubo seguente.

*Da quanti, e quali numeri dispari è costituito il numero cubo.*

40. Volendo sapere da quanti numeri seguiti per ordine dispari sia composto un numero cubo, da quello si cavi la radice, perchè essa dimostra li numeri dispari quanti siano, e per sapere quali siano per il numero della radice, si parte il cubo, e venendo numero dispari, quello è uno, che tiene il luogo di mezzo; Per il che secondo quanti devono essere, se ne pigliano la metà antecedenti, e l'altra metà susseguenti immediatamente, e tali saranno.

Per esempio sia il cubo 343. la radice 7. del quale mostra quanti numeri dispari sono: per 7. si parte 343. viene 49. il quale è il numero dispari di mezzo, e perchè devono essere 7. li tre antecedenti sono 43. 45. 47. e li susseguenti 49. sono 51. 53. 55. che sommati con 49. formano il cubo 343.

Ma essendo la radice numero pari, partendo per essa il suo cubo verrà numero pari, dal quale levato 1. ed aggiunto 1. si averanno due numeri dispari di mezzo: Onde pigliando la metà antecedenti, l'altra metà susseguenti numeri dispari immediati a compire il numero della radice, si averanno tutti quelli, che compongono il cubo proposto. Per esempio sia il cubo 216. per la sua radice 6. si parte viene 36. dal quale levato 1. ed aggiunto 1. verranno 35. e 37. numeri dispari di mezzo, li due antecedenti sono 31. e 33. e li susseguenti 35. e 37. sono 39. e 41. li quali sommati fanno 216. cubo proposto.

| Cubo                     | Cubo             |    |    |   |
|--------------------------|------------------|----|----|---|
| Per Radice 7 — 343       | Per Rad. 6 — 216 | 36 | 36 |   |
| Num. dispari di mez. 49. |                  | 36 | 1  | 1 |

35. e 37. num. dispari

*Diversi modi di trovare la differenza frà due cubi.*

41. Li numeri proprj per l'estrazione delle radici, che si hanno per la tavola posta al numero 10. servono per trovare la differenza frà potestà, e potestà di numero, che segua immediatamente. Per esempio volendo la differenza di due quadrati, de' quali le radici sono 5. e 6. già di essi nel num. 15. che sommando 5. e 6. davano 11. per la differenza de' loro quadrati, e adesso dico che si moltiplichi 5. mi-

5. minor radice per 2. numero proprio per la radice quadrata, fa 10. al quale si aggiunge 1. (il che si fa in tutte l'altre forti di radici) fa 11. per la cercata differenza.

Ora volendo la differenza di due cubi immediati, de' quali le radici siano 2. e 3. sempre si quadra la minor radice, quì 2. fa 4. che si pone sopra 2. sua radice, di contro à questi si pongono li numeri proprj per la radice cuba, che sono per la tavola detta 3. e 3. e si moltiplica 4. via 3. fa 12. 
$$\begin{array}{r} 4 - 3 - 12 \\ 2 - 3 - 6 \end{array}$$
 pure 2. via 3. fa 6. si somma 12. con 6. con 1. di più, come hò detto per la radice quadra, fa 19. differenza fra i cubi 8. e 27. de quali le radici sono 2. e 3. Differ. 19 così per tutti gl' altri. Questo modo si noti bene perchè serve à formare il rotto nelle radici cube sorde.

42. Altro modo generale è. Si quadra l'una, e l'altra radice, ed i quadrati si sommano con il prodotto fatto dalla moltiplicazione e la somma si moltiplica per la differenza delle radici, e risulterà la differenza de cubi. Per esempio si trovi la differenza de cubi, de quali le radici sono 8. e 12. Il quadrato di 8. è 64. di 12. è 144. il prodotto di 8. via 12. è 96. la somma di 64. 144. è 96. è 304. che si moltiplica per 4. differenza da 8. à 12. fa 1216. differenza di detti cubi. Si prova il cubo di 8. è 512. il cubo di 12. è 1728. da questo si sottra 512. resta 1216. differenza detta.

43. Altro modo è: Si moltiplica una radice via l'altra, il prodotto si moltiplica per 3. un de numeri proprj per la radice cuba, il prodotto si moltiplica per la differenza delle radici, al prodotto si aggiunge il cubo di tal differenza, la somma è la differenza de cubi si trovi la differenza de cubi, le radici de quali sono 6. e 10. Si moltiplica 6. via 10. fa 60. questo via 3. fa 180. e questo via 4. differenza da 6. à 10. fa 720. al quale si aggiunge 64. cubo di 4. e viene 784. per la differenza di taii cubi.

44. Altro modo è: Si moltiplica una delle radici per la loro differenza il prodotto si moltiplica per la somma delle radici, e questo prodotto si serba. Ora si quadra l'altra radice non moltiplicata, il quadrato si moltiplica per la differenza delle radici, il prodotto si somma con l'altro prodotto serbato, e dà la differenza cercata. Si trovi pure la differenza de cubi, le radici de quali sono 6 e 10. si moltiplica 6. via 4. fa 24. questo si moltiplica via 16. somma di 6. e 10. fa 384. Ora si quadra 10. fa 100. che si moltiplica via 4. differenza da 6. à 10. fa 400. e questo si somma con 384. fa 784. differenza come sopra de cubi.

*Del*

*Dell' estrarre la radice cuba à modo Italiano.*

45. Radice cuba si disse sul principio essere qualsiasi numero preso tre volte, e successivamente moltiplicato. L'ultimo prodotto è numero cubo, e rispetto al quale numero preso è sua radice. Come 3. via 3. fa 9. e questo via 3. fa 27. numero cubo, la di cui radice è 3.

Per estrarre, ò trovare la radice cuba di qualche proposto numero,

| fa bisogno sapere à mente li cubi de numeri<br>digi, ò avergli avanti di se, come sono li<br>qui appresso. E sia il numero proposto<br>2024284625. del quale si deva trovare la<br>radice cuba. Si punta di sopra il 5. e la<br>sciate due figure si punta il 4. e poi l'altro 4.<br>e finalmente il 2. per la ragione detta nel<br>numero 9. e per essere quattro figure punta-<br>te, di quattro figure sarà la radice del pro-<br>posto numero. | Radici | Cubi |
|--|--------|------|
|  | 1      | 1    |
|  | 2      | 8    |
|  | 3      | 27   |
|  | 4      | 64   |
|  | 5      | 125  |
|  | 6      | 216  |
|  | 7      | 343  |
|  | 8      | 512  |
|  | 9      | 729  |

Si comincia trovando la radice cuba di 2. puntato è 1. che si segna da mano sinistra, come si fa nel partire, il di cui cubo 1. si sottra da 2. resta 1. che col 0. seguente dice 10. del quale si trova il partitore; si quadra 1. radice, cioè si moltiplica via 1. fa 1. che si triplica moltiplicandosi per 3. fa 3. partitore, si parte il 10. avvertendo che entri tante volte, di modo che del numero, che avanza accompagnato con 2. figura seguente, se ne possa levare il quadrato del quoziente seconda figura, per dir così, radicale, ed il detto quadrato triplicato, cioè moltiplicato per 3. ed il prodotto moltiplicato via la prima figura radicale. Ora dicendo, che il 3. in 10. entra 3. volte, non avanza tanto secondo le condizioni dette, però diremo entri 2. volte, che si pone appresso 1. prima figura radicale, il 2. si moltiplica per 3. partitore, il prodotto 6. si sottra da 10. resta 4. che col 2. seguente dice 42. dal quale si sottra 12. prodotto di 4. quadrato di 2. via 3. e via 1. prima figura radicale, resta 30. col 4. seguente dice 304. dal quale si sottra 8. cubo di 2. resta 296. che con il 2. che segue dice 2962. del quale si trova il partitore come sopra, cioè si quadra 12. radice fino adesso trovata fa 144. che si moltiplica per 3. fa 432. partitore, per 432. si parte 2962. con le condizioni dette, cioè che avanzi tal numero, che accompagnato con la seguente figura sia maggiore del quadrato del quoziente, e questo triplicato, ed il prodotto moltiplicato per 12. figure radicali, ò almeno sia uguale, acciò da esso si possa levare tal prodotto, e viene 6. terza figura della radice, per il quale si moltiplica 432. partitore fa 2592. che

104-

735

sottratto da 2962. resta 370. che con l'otto seguente dice 3708. dal quale levato 1296. quadrato di 6. triplicato, e moltiplicato per 12. resta 2412. che col 4 seguente dice 24124. dal quale si sottra 216. cubo di 6. e resta 23908. che col 6. seguente dice 239086. del quale si trova il partitore quadrando 126. e triplicando il quadrato sarà 47628. e partendo con le condizioni dette, vien 5. quarta figura di radice: Per 5. si moltiplica 47628. il prodotto 238140. sottratto da 239086. resta 946. che col 2. seguente dice 9462. dal quale levato 9450. quadrato di 5. triplicato, e moltiplicato via 126. resta 12. che col 5. seguente dice 125. dal quale si sottra 125. cubo di 5. ultima figura radicale, resta 0. e la radice cuba è 1265.

Radice cuba.

1265

3 Partitore primo

12 — 12

144 — 3

432. Partitore sec.

6 — 6

36 — 3

108 — 12

1296

126 — 126

15876 — 3

47628. Partitore terzo

5 — 5

25 — 3

75 — 126

9450

2024284625

10

42

12

304

8

2962

2592

3708

1296

24124

216

239086

238140

9462

9450

125

125

Prove del 7. e del 9.

5 6 5 8  
5 X 6 5 X 8

46. La prova si fa con moltiplicare 1265. via 1265. fa 1600225. e questo via 1265. fa il numero sopra proposto. Quando fuisse avanzato numero, quello si aggiunge al secondo prodotto &c.

47. La

47. La prova del 7. si fa con levare li 7. dalla radice 1256. l'avanzo 5. si segna tre volte : una sopra la lettera X. e due volte dalla parte sinistra : Si moltiplica 5. via 5. fa 25. levati li 7. resta 4. che si moltiplica via l'altros. fa 20. levati li 7. resta 6. per numero della prova, che si segna dalla parte destra del X. Ora levando li 7. dal numero proposto per trovar si la radice cuba resta 6. che si segna dalla medesima parte, e mostra essere giusta l'operazione. Così si fa la prova del 9. essendo di essa il numero 8. avanzato.

*Dell' estrarre la radice Cubica per via de. numeri proprj.*

48. Affai facile è trovare la radice cuba di qualche numero per li numeri 300. è 30. proprj per questa radice, come si disse al numero 11. perchè non bisognano tante osservazioni dette nel modo Italiano.

Sia proposto 239483190. del quale si puntano le figure 3. e 9. si trova il maggior cubo vicino a 239. primo punto da man sinistra, che non lo passi, sarà 216. la di cui radice 6. si pone da parte, e 216. si sottra da 239. resta 23. al pari del quale si calano le figure 483. fino al secondo punto, fa 23483. di questo si trova il partitore così si pone 6. radice trovata, e sopra esso 36. suo quadrato, di contro al 36. si mette 300. e di contro al 6. si mette 30. numeri proprj, si moltiplica 36. via 300. fa  $36 - 300 - 10800$  10800. si moltiplica pure 6. via 30. fa  $6 - 30 - 180$  180. la somma di questi due prodotti 10980. e il partitore per il quale si parte 23483. il quo. Partitore 10980 ziente 2. è la seconda figura della radice, e tutta la radice fino adesso è 62. il 2. posto di contro al prodotto 10800. il quadrato 4. di contro al 180. e di sotto il cubo 8.  $10800 - 2 - 21600$  li quali numeri si chiamano descen-  $180 - 4 - 820$  denti à differenza di 6. e 36. chiamati  $8 \quad 8$  ascendenti. Li descendentis sono un termine più il quale è 8. Ora si moltiplica 10800. per 2. fa 21600. pure si moltiplica 180. per 4. fa 720. questi prodotti si sommano con 8. fanno 22328. il quale si sottra dal numero partito 23483. resta 1155. Qui si avverta, che se non si potesse sottrarre per essere maggiore, allora bisognerebbe scemare il 2. ò altra figura presa per quoziente, al pari di 1155. poste le figure 190. fino all' altro punto fa 1155190. da partirsi : Il partitore si trova nel modo passato, ponendo sopra 62. radice fino adesso trovata 3844.  $3844 - 300 - 1153200$  suo quadrato dicontra à questo si  $62 - 30 - 1860$

pone 300. di contro à 62. si pone 30. si moltiplica 3844.  $22328$  Partitore 1155060 per

per 300. fa 1153200. che si pone di contro medefinamente si moltiplica 62. per 30. fa 1860. che posto di contro sotto l' altro per ordine , e sommati fanno 1155060. per il quale si parte 1155190. viene 1. che aggiunto alla radice fa 621. è questo 1. posto di contro al prodotto 1153200. e il quadrato 1. di contro al prodotto 1860. che moltiplicati non variano prodotto 1153200 — 1  
 che però si sommano con 1. cubo, termine ultimo descendentente fanno 1155061, che si sottra da 1155190. resta 129 ed è finita l'operazione. —————  
 La radice 621. si cuba, ed al numero cubo 1155061  
 239483061. si aggiunge l' avanzo 129. e deve tornare il numero proposto , essendosi bene operato .

Radice cuba 621

239483190  
 216

Prova del 7.

Per 10980

23483  
 22328  
 —————

5 X 2  
 5 X 2  
 3

Per 1155060

1155190  
 1155061  
 —————

129

49. Per prova del 7. si levano li 7. dalla radice 621. resta 5. che si cuba fa 125. dal quale levati li 7. resta 6. che si somma con 3. che si ha dal levare li 7. da 129. avanzo fa 9. levato 7. resta 2. numero della prova, ora levando li 7. dal numero proposto deve restare 2. siccome resta, così la prova del 9. chi non vuol cubare il 5. lo pone tre volte intorno la lettera X. e si moltiplicano levando li 7. da i prodotti , e si aggiunge 3. dell' avanzo al residuo de prodotti &c.

*Del formare il rotto alla radice de numeri non cubi .*

50. Prima di formare il rotto alla radice passata, sia proposto un numero piccolo non cubo per più facilità, sia 45. la radice cuba è 3. il suo cubo 27. che sottratto da 45. resta 18. il quale si pone sopra una linea per numeratore, come si fa nel partire. Il denominatore si trova così, si quadra la radice 3. trovata fa 9. che si pone sopra, di contro si pongono 3. e 3. numeri proprij per 9 — 3 — 27  
 la radice cuba , e si hanno al num. 10. nella tavola , Si moltiplica il quadrato 9. per 3. fa 27. 3 — 3 — 9  
 pure il 3. per 3. fa 9. che sommato con 27. fa 36. —————  
 denominatore del rotto il quale si averà ancora con pigliare la differenza dal cubo di 3. al cubo 4. meno 1. la qual differenza si trova in più modi, come si è insegnato al numero 31. 34. e 22. Ancora si ave-

A a a a

si avrà il medesimo denominatore, se si moltiplica la radice 3, via 4. radice seguente, ed il prodotto 12. si moltiplica per 3. per regola ferma facendo 36. e così sempre per trovare il denominatore ad altre radici sorte cube. Dunque la radice cuba di 45 è  $3\frac{1}{3}$ . con lo schifare  $3\frac{1}{3}$ . che cubandosi fa  $42\frac{1}{3}$ . manchevole più di 2. da 45. e però tal rotto si deve riformare come insegnerò.

*Osservazioni fatte sopra le radici de numeri non cubi.*

51. La radice cuba con il rotto formato nel modo antecedentemente detto, cubandola, rende per lo più meno del numero proposto, ed alcuna volta più. Quello, che dirò de numeri fra il cubo 27. e il cubo 64. vale proporzionalmente fra gli altri cubi, anzi fra li quadrati quadrati, fra li relati, e fra l'altre potestà ancora. Cominciando dagli 8. la sua radice cuba è  $3\frac{1}{3}$ . e cubata fa  $27\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}$  che è qualche poco meno di 28. Di 29. la radice cuba è  $3\frac{1}{3}$ . e cubata fa  $28\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}$ . che è più discosto da 29. che l'altra cubata da 28 e così cresce questo discostamento in meno fino a 45. da 45. fino a 59. va decrescendo questo discostamento a poco a poco, che per questo di 47. la radice cuba è  $3\frac{1}{3}$ . che cubata fa  $44\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}$ . di 50. è  $3\frac{1}{3}$ . che cubata fa 49  $\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}$ . di 57. è  $3\frac{1}{3}$ . che cubata fa  $56\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}$ . di 60. poi è  $3\frac{1}{3}$ . che cubata fa  $60\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}$ . Ecco che da qui cresce fino ad uno di più, perche di 63. la radice è  $3\frac{1}{3}$ . cioè 4. che è la medesima di 64. e questo avviene ogni volta, che il numero proposto è meno 1. ad esser cubo, che però si pone la differenza 37. dal cubo 64. sopra una linea per numeratore, e per denominatore 38. cioè uno di più sotto, che con 3. fa  $3\frac{1}{3}\frac{1}{3}$ . radice cuba di 63. che cubata fa  $62\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}$ . che poco manca nel cubo, meno nella radice.

Mà tornando a quel che dicevo, usando il modo detto nel formare il rotto fino alla metà fra un cubo, e l'altro immediato di numeri intieri, il discostamento per meno va crescendo, e si va poi diminuendo fino al numero esclusive, che sta discosto dal cubo seguente la sua radice, cioè fino a 66. volendoci 4. fino al cubo 64. il qual 4. è la radice cuba di 64. Onde ne segue, che se il numero proposto da cavarli la radice cuba, è vicino all'uno, ovvero all'altro cubo, la radice con il rotto nel modo detto formato, sarà propinqua. Ma quāto il numero proposto sarà vicino al mezzo, tanto più la radice sarà discosta dalla vera. Per il che di 30. che è vicino al cubo 27. la radice è  $3\frac{1}{3}$ . che cubata da 27.  $27\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}$ . sicché tal radice si può dir propinqua. Di 43. che è vicino al mezzo, la radice è  $3\frac{1}{3}$ . che cubata fa 40.  $40\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}$ . sicché tal radice si può dir lontana. Finalmente di 59. numero vicino al cubo 64. la radice è  $3\frac{1}{3}$ . che cubata fa 58.  $58\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}$ . sicché tal radice si può dir propinqua.

Si



*Si mostra, che il detto vale nelle radici maggiori di numeri non cubi.*

52. Il detto nell'osservazioni fatte segue proporzionalmente nell'estrazione della radice cuba da numeri maggiori. Per esempio cavandosi la radice cuba da 912710. numero proposto dal Tartaglia, la radice intiera è 97. ed avanza 37. qual posto sopra una linea con sotto 28518. denominatore, che si ha da moltiplicare 97. radice cuba intiera via 98. ed il prodotto, 9506. dal moltiplicarsi per 3. ovvero per altri modi detti al numero 39. fa tutta la radice cuba 97.  $777\frac{1}{3}$ : la quale sarà propinqua, stante che 912710. è vicino al cubo di 97. ode cubata fa 92709.  $777\frac{1}{3} \times 97 \times 98 = 92709$ . che è poco meno del proposto numero. Pure medesimamente cavando la radice cuba di 941095. che è vicino al cubo di 98. ( si avverta, che allora si dice vicino ogni qual volta non ci corre più di 97. radice intiera del proposto numero, e qui appunto da 941095. a 941192. cubo di 98. ci corre la differenza di 97. ) sarà la rad. cuba 97  $777\frac{1}{3}$ . che cubata fa 941095  $777\frac{1}{3} \times 97 \times 98 = 941095$ . che è più il rotto. Ma pigliando la radice cuba di 926932 farebbe 97  $777\frac{1}{3}$ . la quale cubata fa 926859  $777\frac{1}{3} \times 97 \times 98 = 926859$ . che è meno 72  $\frac{1}{3}$ . del numero proposto, e questo avviene se cono quello, che ho detto per trovarli lontano 926932. dal cubo di 97: e di 98. Ora 72  $\frac{1}{3}$ . di meno deve correggerli nella sua radice, come insegnerò :

53. Al numero 37. si cavò la radice cuba di 239483190. e si trovò essere 621. l'avanzo 129: il quale posto sopra una linea con sotto 1158786. denominatore, che si ha da moltiplicarsi 621. via 622. ed il prodotto via 3. come si è detto, o per altro modo, dice 621.  $777\frac{1}{3}$ . che cubata fa 239483189  $777\frac{1}{3} \times 621 \times 622 = 239483189$ . che è rotto poco meno del proposto numero stante che questo è vicino al cubo di 621. così riuscirà vicina la radice cuba 621.  $777\frac{1}{3}$ . del num. 240641795. differente dal cubo di 622 in 53. perchè cubata farà 240641795  $777\frac{1}{3} \times 622 \times 623 = 240641795$ . che è più il rotto. Ma se il numero proposto sarà lontano, e da cubo di 621. e di 622. allora la radice con il rotto fatto nel detto modo cubata darà numero lontano dal proposto in proporzione della lontananza dalli detti cubi. Come sia proposto 24062454 del quale la radice secondo il modo dato, che il Tartaglia si gloria d'aver trovato lui sarà 621  $\frac{1}{3}$ . e cubata fa 240061988  $\frac{1}{3}$ . meno del numero proposto 465  $\frac{1}{3}$ . qual differenza è grande, e maggiore sarebbe, cioè di migliaia, di decine di migliaia &c. se la radice arrivasse a migliaia, a decine di migliaia &c. Or a 465  $\frac{1}{3}$ . deve correggerli nel rotto della radice, il che ha trascurato il Tartaglia di fare con dire nel cap. 3. num. 18. E vero che il cubo di tal ra-

A a a a a 2

di-

dice cioè col rotto formato come si è detto, alle volte è alquanto più, e alle volte meno del proposto numero per varii accidenti, li quali non gli voglio stare a narrare perchè dubito, che ti verrebbe a fastidio.

I varj accidenti sono li detti da me al num. 40.

*Dell'emendare la radice cuba riformando il rotto.*

54. Al num. 39. si cavò la radice cuba di 45. e fà  $3\frac{1}{2}$ . schifato  $\frac{1}{2}$ . che cubata fà  $48\frac{1}{2}$ . che sono  $2\frac{1}{2}$ . meno di 45. Volendo emendare il rotto di tal radice si aggiunge  $2\frac{1}{2}$ . à 18. numeratore del rotto non schifato fà  $20\frac{1}{2}$ . che ridotto in ottavi sono 161. pure 36. denominatore si moltiplica per 8. à farne ottavi sono 288. e si averà questo rotto  $\frac{161}{288}$ . che con 3. sarà la radice propinqua di 45. perchè cubando  $3\frac{1}{2}$ . darà  $45\frac{1}{8}$ . chi per più facilità avesse aggiunto solamente 2. la radice sarebbe stata  $3\frac{1}{2}$ . che cubata averebbe dato  $44\frac{1}{2}$ .

L'emendazione del rotto consiste in aggiungere quel numero di meno, che hà dato la radice nel cubarsi sino al numero proposto al numeratore del rotto di prima origine, cioè che non sia schifato, ovvero in levare il numero di più, che hà dato la radice nel cubarsi del numero proposto dal numeratore del rotto di prima origine, cioè che non sia schifato.

55. Al numero 41. nel cavare la radice cuba di 92693 si trovò essere  $97\frac{1}{2}$ . schifato  $\frac{1}{2}$ . che cubata diede 72. meno del proposto numero. Si aggiunga 72. lasciando il rotto, al numeratore 14259. fà 14331. col medesimo denominatore 28518. dice  $\frac{14331}{28518}$ . schifato per 3. con 97. sarà la radice cuba  $97\frac{1}{2}$ . e cubata fà 926931. che manca di poco rotto: E chi avesse aggiunto ancora  $\frac{1}{2}$ . allora averebbe sopravanzato di poco rotto. Avvertasi, che 72. si poteva porre sopra una linea con sotto 28518. e schifarlo per 6. veniva  $\frac{12}{28518}$ . che sommato con  $97\frac{1}{2}$ . ne sarebbe venuta la medesima radice  $97\frac{1}{2}$ . di sopra &c

56. Al numero 42. si trovò la radice cuba 621. cubata avere dato meno 465. del numero 240062454. Ora si aggiunga 465. al numeratore 579393. di prima origine, con sotto il denominatore 1158786. che ridotti il numeratore, e denominatore in ottavi sarà  $\frac{465}{1158786}$ . che cò 621. sarà la propinqua radice del proposto numero, e cubata fà 240062454.

*Del pigliare un rotto di piccola denominazione da accompagnarsi alla radice trovata, & emendarlo.*

57. Trovata la radice del numero intiero per l'avanzo si può aggiungere

gere un rotto di piccola denominazione : Come  $\frac{5}{8}$ ,  $\frac{7}{9}$ ,  $\frac{11}{16}$ . secondo che pare, o piace, e cubandola, si veda se dà di più, ovvero meno del numero proposto; dando di meno si aggiungano quelle parti di rotto, che bisognano alla radice, come si è fatto nel num. 44. e nel num. 45. ma dando di più si devono levare; e perchè di questo non hò dato esempio, propongo questo num. 926800 del quale la radice di numero intero è 97. per l'avanzo pongo  $\frac{2}{3}$ . rotto di minima denominazione, e cubando  $97\frac{2}{3}$ . fa 926859  $\frac{8}{27}$ . che è più del proposto numero  $59\frac{1}{3}$ . il 59. lasciando il rotto posto sopra una linea con sotto il denominatore 28518. trovato con moltiplicare 97. radice cuba con 98. e con moltiplicare il prodotto per 3. ovvero con quadrare 97. e moltiplicare il quadrato per 3. e 97. per 3. numeri proprj per la radice cuba, la somma de' prodotti fa pure 28518. denominatore, e dice  $\frac{1}{3} \cdot 77\frac{1}{3}\frac{2}{3}$ . che si leva da  $97\frac{2}{3}$ . resta  $97\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}$ . per la propinqua radice cuba; e cubata fa 926800  $\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}$ . cioè il rotto di più. Ecco insegnato il modo di emendare il rotto alle radici di numeri non cubi, che non solo sono vicine, ma vicinissime.

**Del trovare la radice cuba di rotti-ubi .**

58. Allora il rotto farà cubo, quando il numeratore, e denominatore saranno numeri cubi: Come  $\frac{7}{4}$  si cava la radice cuba da 64. che è 4. da 729. che è 9. e ne viene  $\frac{9}{4}$ . per la radice cercata.

Si avverta, che alle volte il rotto sarà cubo, e per non essere schifato il numeratore, e denominatore, non faranno numeri cubi: come  $\frac{1}{3} \frac{2}{3} \frac{4}{3}$ . è rotto cubo, ed il numeratore, e denominatore non sono numeri cubi, ma schifato per 2. viene  $\frac{1}{3} \frac{2}{3} \frac{4}{3}$ : la di cui radice cuba è  $\frac{2}{3}$ .

*Del trovare la radice cuba vicina di rotti non cubi.*

59. Se del rotto non cubo, il denominatore sarà cubo, per la sua radice discreta, si parte la radice cuba propinqua del numeratore, e il quoziente farà la radice cuba vicina. Per esempio sia il rotto  $\frac{7}{8}$ . la radice cuba di 8. è 2. la propinqua di 7. è 1.  $\frac{7}{8}$ . questa si parte per 2. viene  $\frac{7}{16}$ . per la radice cuba propinqua di  $\frac{7}{16}$ . e cubata darà  $\frac{7}{64}$ . è  $\frac{1}{8}$ . In circa di più.

Pure se del rotto non cubo il numeratore sarà cubo, per la radice propinqua del denominatore, si parte la discreta del numeratore e verrà la radice vicina di tal rotto. Per esempio sia il rotto  $\frac{1}{2}$ , la propinqua radice cuba di 9, è 2.  $\frac{1}{2}$ , e di 8, la radice discreta è 2, questa partita per 2.  $\frac{1}{2}$ , viene  $\frac{1}{4}$ , per la radice cuba vicina di  $\frac{1}{2}$ .

## Quando

*Quando il rotto non ha denominatore, ne numeratore cubo.*  
 60. Sia il proposto  $\frac{1}{2}$ . per trovarsi la radice cuba vicina: In pratica per 36 quadrato di 6. denominatore si moltiplica 5. numeratore fa 180. del quale la prima cuba vicina  $5\frac{1}{2}$ . che si parte per 6. denominatore viene  $9\frac{1}{2}$ . per la radice cuba di  $\frac{1}{2}$ . che scarleggerà alquanto, e pigliandoli ne 108. esimo di più, alquanto abbonderà. Questa pratica è posta da Niccolò Tartaglia parte 2. lib. 2. cap. 4. num. 2. dove dice di non poter manifestare la causa di tale operare, senza aver dichiarato il Trattato delle proporzioni; il che avverti nel cap. 2. num. 4. per cavare la radice propinqua quadrata da rotti non quadrati. Nel cap. 6. num. 2. per cavare la radice propinqua quad. quad. da rotti non q. q. Nel cap. 8. num. 2. per cavare la radice relata da rotti non relati. Nel cap. 10. num. 2. per cavare la radice censa cuba da rotti non censi cubi. Nel cap. 12. num. 2. per cavare la radice seconda relata da rotti non secondi relati. Nel cap. 14. num. 2. nel cap. 16. num. 2. e finalmente nel cap. 20. n. 2. del medesimo lib. 2. parte 2. per cavare la radice terza relata da rotti non terzi relati. Nel num. 30. accenna la causa della pratica nel cavarli la radice quadra da rotto non quadrato, e fu che si riduceva implicitamente tal rotto ad un altro di denominatore quadrato. La medesima causa assegno della pratica qui del moltiplicare per il quadrato del denominatore il numeratore, ed è di ridurre implicitamente quel rotto a denominatore cubo. Il rotto è  $\frac{1}{2}$ . si moltiplica per 36. quadrato di 6. il numeratore 5. fa 180. ora se si moltiplica 36. quadrato, per 6. sua radice fa 216. cubo. questo sotto una linea con 180. fa  $\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}$ . rotto di denominatore cubo uguale a  $\frac{1}{2}$ . e pigliandosi la radice cuba vicina di 180. è  $5\frac{1}{2}$ . che si parte per 6. radice cuba discreta di 216. è viene  $\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}$ . radice cuba vicina di  $\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}$ . o di  $\frac{1}{2}$ . per essere a questo uguale, e di tal pratica di operare non ci è altra causa, che questa assegnata, e vale per tutti quei luoghi citati del Tartaglia, perchè sempre il rotto vien ridotto nel cap. 6. num. 2. ad un altro rotto di denominatore relato nel cap. 8. num. 2. &c. uguale al rotto proposto. Il non aver consiuto il Tartaglia una causa così propria, e facile mi fa dubitare fortemente, che tali pratiche abbia prese da altri.

*Del ridurre il rotto ad altro di numeratore cubo &c.*

61. Sia il medesimo  $\frac{1}{2}$  dal quale si deve cavare la radice cuba, per 25. quadrato di 5. si moltiplica 6. denominatore fa 150. del quale la prima radice cuba è 5.  $5\frac{1}{2}$ . per questa si parte 5. numeratore, viene schisato  $\frac{1}{2}\frac{1}{2}$ . radice vicina di  $\frac{1}{2}$ . che cubata darà poco più. La censa di questo operare è perchè vien ridotto implicitamente  $\frac{1}{2}$ . a  $\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}$ . rotto uguale di numeratore cubo, e però la sua radice discreta

scresca è 5. che viene partita dall'altra vicina di 150. è questa vicine più vicina, che quando il rotto si riduce ad altro uguale di denominatore cubo, come si può sperimentare.

*Del cavare la radice cuba da interi, e rotti cubi.*

62. Si riducono gl'interi al rotto, che sia schifato, e se tanto il numeratore, che il denominatore saranno numeri cubi, allora verrà radice discreta cuba. Sia proposto  $4 \frac{2}{3}$ . si moltiplica 27. per 4. al prodotto si aggiunge 17. fa 125. del quale la radice cuba è 5. che si parte per 3. radice cuba di 27. denominatore, ne viene  $1 \frac{2}{3}$ . per la radice cuba discreta del proposto numero. Avvertasi, che il denominatore deve essere cubo, e acciò la radice sia discreta.

*Del cavare la radice cuba da interi, e rotti non cubi.*

63. Il modo di operare non è differente da quello di cavare la radice cuba vicina da rotti non cubi. Primieramente si riduce il rotto a minimi termini per lo schifare, se non è ridotto. Il numero intero si moltiplica per il denominatore, al prodotto si aggiunge il numeratore, la somma si moltiplica per il quadrato del denominatore del rotto, da questo prodotto si cava la radice cuba vicina, la quale si parte il denominatore del rotto, il quoziente, sarà la radice cuba propinqua cercata, e così operasi in pratica, la quale importa il ridurre tal quantità ad un'altra uguale di denominatore cubo. Il numero proposto dal Tartaglia è  $3 \frac{2}{3}$ . che ridotto è  $\frac{7}{3}$ . il quadrato di 2. è 4. per il quale si moltiplica 7. numeratore fa 28. del quale la radice cuba propinqua è  $3 \frac{1}{3}$ . che si parte per 2. viene  $1 \frac{1}{3}$ . per la radice propinqua di  $3 \frac{2}{3}$ . Il Tartaglia rimette il lettore al Trattato delle proporzioni per intendere la causa di tal'operare, che non è altra, che ridurre  $\frac{7}{3}$  a  $\frac{2}{3}$ . rotto uguale di denominatore cubo. Onde cavandosi la radice da 28. è  $3 \frac{1}{3}$ . e da 8. sarà 2. radice discreta. Per questo partendo  $3 \frac{2}{3}$ . si ha  $1 \frac{1}{3}$ . radice di  $\frac{2}{3}$ . di  $\frac{1}{3}$ . e di  $3 \frac{2}{3}$ . quantità uguali fra se. Ma quando il numero intero sarà grande con rotto, si levi la radice cuba dal numero intero solamente, e se bisogna si riformi il rotto come ho insegnato, sarà minore fatica. Sia proposto  $240641795 \frac{1}{2}$ . del qual numero la radice cuba è 621. ed avanza 1158734  $\frac{1}{2}$ . che dimostra il proposto numero essere vicino al cubo di 622. onde per l'osservazioni dette al num. 40. si ponga l'avanzo senza rotto sopra una linea con sotto il denominatore trovato con moltiplicare 621. via 621. e con moltiplicare il prodotto per 3. ovvero con moltiplicare per 3. il quadrato di 621. e l'istesso 621. e la somma 1158986. denominatore dice  $\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2}$ . che schifato, ed accompagnato con 621. fa la




66. Si forma un rettangolo  $A B C D$  con i suoi diametri  $A D$ . e  $G B$ . che per lunghezza contenga tante parti uguali, quante unità il numero, del quale si vuol trovare la radice cuba. Ora ne contenga 8. del quale si fa essere la radice cuba discreta 2. acciò si conosci facilmente l'operazione, e per la lunghezza sia una di quelle parti. Si prolunga il lato  $C A$  in  $E$ , & il lato  $C D$  in  $F$  indefinitamente. L'artificio consiste di tirare una linea retta, che passi per il punto dell'angolo  $B$ . e che intersechi le linee prolungate in due punti, che ciascuno sia equidistante dal punto dell'intersecazione de diametri; e per far ciò si adatta la riga piana al punto dell'angolo  $B$ . talmente, che attraversi le linee  $C E$ . e  $C F$ . Dipoi si pone un piede del compasso nel punto dell'intersecazione de diametri fermo, l'altro si porta al punto  $E$ , ed al punto  $F$  delle linee attraversate dalla riga, la quale non deve rimoversi dal punto dell'angolo  $B$ , ma solo allargarsi da una parte, e stringersi dall'altra per trovare la detta uguale distanza, e trovata si tira la linea  $E F$ . che passa per il punto  $B$ . ed allora si ha la radice cuba appunto in linea, che è  $D F$ . e si sono trovate due linee proporzionali tra 1. di larghezza, ed 8. di lunghezza, cioè  $D F$ . 2. ed  $A E$ . 4. per la quarta proposizione del 6. libro d'Euclide: Perchè essendo li triangoli simili  $B D F$ . &  $E A B$ . i lati omologhi sono proporzionali, e così  $B D$ . 1. sta a  $D F$ . 2. come  $E A$ . 4. al lato  $A B$ . 8.

*Del trovare la radice cuba facilmente appunto per linea  
di qualsivoglia numero non cubo per grande che sia,  
che è duplicare il cubo.*

67. Problema celebre è quello di duplicare il cubo comandato dal Rè Minos nella magnifica struttura del Sepolcro di Glauco; perchè essendo stato fatto il Sepolcro di figura cuba, a guisa del dado, di piedi 100. per lato, comandò all'Architetto, che per più magnificenza lo raddoppiasse: Ma essendo ignorante, raddoppiò il lato, e secondo quello pensava di fabricare il Sepolcro, che non solo doppio, ma ottuplo sarebbe stato. A tempo di Platone si suscitò di nuovo il Problema, imperocchè essendo afflitti dalla
- B b b b b
- pesti-

pestilenza i Popoli Dalli consultarono l' Oracolo per il rimedio per far cessare la peste, e dicono alcuni, che subornata la Sacerdotessa da qualche matematico ò pure dall' istesso Platone, rispose, che allora farebbe cessata, quando si fusse raddoppiato l'Altare, il quale era di figura cuba. Quei Popoli allora fabbricarono un' altro Altare sopra il primo in tutto simile, e così questi pigliano l'abbaglio in un altro modo avendo fatto con l'antecedente un prisma, e non un cube; e perche la peste non cessava, ebbero ricorso all' Oracolo di nuovo, e la Sacerdotessa instrutta rispose: Non essersi raddoppiato l'Altare nella figura di prima. Onde furono à consultarli con Platone, che comandò alli suoi Scolari, che studiassero il modo di raddoppiarlo nella medesima figura cuba; e finalmente fù fatto con gloria grande del medesimo Platone.

Ora volendo trovare il lato del cubo raddoppiato del Sepolcro di Glauco, che prima era di piedi 100. questi si moltiplicano per 100. & il prodotto 10000. di nuovo per 100. fa 1000000. numero cubo; e di tanti piedi cubi era il Sepolcro, che moltiplicati per 2. fanno 2000000. e di tanti piedi cubi deve costare il Sepolcro raddoppiato. Onde è necessario trovare il lato per linea di 2000000. il che non pare possi riuscire per la pratica passata con fare un rettangolo di tanta lunghezza. Tuttavia non è così usando questo modo da mè pensato. Si divida 2000000. per 8000. numero cubo, la di cui radice discreta è 20 risulta 250. il quale di nuovo si parta per 125. numero cubo la di cui radice discreta è 5. risulta 2. numero non cubo. Per la passata pratica si faccia un rettangolo lungo 2. misure, largo 1. e si trovi il lato, ò radice cuba di 2. in linea, che sarà A. B. questa si pigli 5. volte per lunghezza per la radice cuba 5. di 125. di nuovo questa linea composta, si pigli 20. volte per la radice



cuba 20. di 8000. ovvero si può pigliare 2. volte, e questa composta 10. volte. Ovvero ancora si può pigliare 4. volte, e questa composta 5. volte per essere 2. e 10. pure 4. e 5. numeri di ripiego di 20. Questo modo di dividere un numero non cubo in numeri cubi, ed in uno





*Del trovare la differenza d'un numero quadrato quadrato all' altro qq.*

69. Col sottrarre il minor numero qq. dal maggiore si averà la differenza loro come sottrando 16. da 81. si averà la loro differenza 65. ma volendosi la differenza per mezzo della radice del minore, che nel dato esempio è 2. questa si quadra, e cuba,  $8 - 4 - 32$  ed il quadrato 4. ed il cubo 8. si pone sopra per  $4 - 6 - 24$  ordinè, di contro si pongono 4. 6. 4. numeri pro-  $2 - 4 - 8$  prj per questa radice, come si disse al num. 10. e 11. con i quali si moltiplicano, ed i prodotti si sommano con 1. più, e la somma è la differenza. Differenza 65 za dal qq. della radice 2. al qq. della radice 3. cioè 65. nel medesimo modo si trova la differenza tra gl'altri numeri qq. immediati. E si avverta, che la somma di quei prodotti senza 1. è il numero che serve di denominatore al rotto nelle radici sorte ponendosi per numeratore il numero che avanza. Per esempio cavandosi la radice quadrata quadrata da 24. è 1. ed avanza 8. che si pone sopra una linea con sotto 64. somma de prodotti come hò detto dice  $\frac{8}{64}$ . schizzato  $\frac{1}{8}$ . Alle volte 65. differenza può servire per denominatore.

*Del cavare la radice qq. da numero quad. quad.*

70. Proposto qualunque numero qq. si può cavare da quello la radice quadrata, e da questa di nuovo cavare la radice quadrata per il numero 17. ovvero 18. e questa seconda sarà la radice qq. che si volesse. Per esempio sia 707281. numero qq. del quale la radice q. è 841. da questo si cava la radice q. che è 29. per la radice qq. di 707281.

*Del cavare la radice qq. per li numeri proprj di tal radice.*

71. Primieramente bisogna sapere a mente li numeri qq. con le sue radici da 1. fino a 9. ovvero avere innanzi la loro tavola, che qui si vede. I numeri per questa radice sono 4. 6. e 4. che con i zeri, che si aggiungono secondo hò detto nel num. 11. fanno 4000. 600. e 40.

Sia proposto 256072050625: si punta il 5. e lasciate 3. figure si punta l'altro 5. dipoi il 7. ed il 2. per il num. 9. e la radice sarà di quattro figure, ficcome i punti. Dal 2. ultimamente puntato si sottra 1. qq. resta 1. che con l'altre figure fino al secondo punto dicono 15607. da partirsi. Si trova il partitore con porre sopra 1. radice, 1. quadrato, e sopra questo 1. cubo, con dirimpetto 4000. 600. e 40. con i quali si moltiplicano, ed i prodotti si sommano, e fanno 4640. partitore, per il quale si

Tavola

| R. | QQ   |
|----|------|
| 1  | 1    |
| 2  | 16   |
| 3  | 81   |
| 4  | 256  |
| 5  | 625  |
| 6  | 1296 |
| 7  | 2401 |
| 8  | 4096 |
| 9  | 6661 |

par-

parte 15607. e viene 2. il quale si pone di contro al maggior prodotto. Ora di contro 4000.

|        |   |      |       |         |
|--------|---|------|-------|---------|
| Cub. 1 | → | 4000 | via 2 | fa 8000 |
|--------|---|------|-------|---------|

e 4. suo quadrato, di contro

|       |   |     |       |      |
|-------|---|-----|-------|------|
| Qu. 1 | → | 600 | via 4 | 2400 |
|-------|---|-----|-------|------|

600. e 8. suo cubo, di contro

|        |   |    |       |     |
|--------|---|----|-------|-----|
| Rad. 1 | → | 40 | via 8 | 320 |
|--------|---|----|-------|-----|

40. e poi 16. suo quadrato

|  |  |  |  |    |
|--|--|--|--|----|
|  |  |  |  | 16 |
|  |  |  |  | 16 |

quadrato; e questi si chiamano numeri descendentì,

per i quali si moltiplicano i prodotti fatti da numeri detti ascendenti con i numeri proprj, benchè qui ora i prodotti sieno l'istessi numeri proprj, perchè gl' ascendenti sono unità; cioè 2. via 4000. fa 8000. e 4. via 600. fa 2400. e 8. via 40. fa 320. li quali prodotti posti di contro, e sommati con 16. qq. fanno 10736. da sottrarsi da 15607. numero partito, e resterà 4871. al quale si accompagnano l'altre figure sino al terzo punto, e sono 48712005. di questo numero si prepara il partitore pigliando di 12. radici qq. sino adesso trovato, il quadrato 144. ed il cubo 1728. numeri ascendenti, si pongono di contro 4000. 600. e 40. numeri proprj, per i quali si moltiplicano, ed i

|       |           |            |
|-------|-----------|------------|
| 1728. | via 4000. | fa 6912000 |
| 144.  | via 600.  | fa 86400   |
| 12.   | via 40.   | fa 480     |

prodotti si sommano, e la somma 6998880. è il secondo partitore; per il quale partendo

48712005. viene 6. che accompagnato con 12. radice qq. dice 126. con il quale 6. si fanno i numeri descendentì pigliando il suo quadrato 36. il suo

|         |         |             |
|---------|---------|-------------|
| 6912000 | via 6   | fa 41472000 |
| 86400   | via 36  | fa 3110400  |
| 480     | via 216 | fa 103680   |
| 1296    |         | 1296        |

cubo 216. ed il suo qq. 1296. con i quali si moltiplicano gl' antecedenti prodotti per ordine, come si vede,

ed i nuovi prodotti si sommano con 1296. qq. e 44687376. somma si sottra da 48712005. numero partito, e resta 4024629. al quale accompagnate l'altre figure sino al quarto, ed ultimo punto sono 40246290625. numero da partirsi. Si trova il partitore con gli ascendenti 126. radice qq. con il suo quadrato 15876. e con il suo cubo 2000376. moltiplicati per ordine con i numeri proprj 4000. 600. e 40. e con sommare li prodotti, ed è la somma 8011034640. numero partitore, per il quale partendo il detto numero verrà 5. che

|          |           |               |
|----------|-----------|---------------|
| 2000376. | via 4000. | fa 8001504000 |
| 15876.   | via 600.  | fa 9525600    |
| 126.     | via 40.   | fa 5040       |

accompagnato con 126. fa 1265. per tutta la radice qq. con il 5. si fanno i numeri

Terzo partitore 8011034640

ri de-

ri descendententi 5. 25. 125. e 625. si moltiplicano per ordine con i prodotti antecedenti, e si sommano i nuovi prodotti, con 625. qq. la somma è 40246290625. da sottrarsi da altro, e tanto numero, resta 0. e la radice qq. è 1265.

Radice qq. 1265  
 8001504000. via 5. 40007520000. 2560720050625  
 9525600. via 25. fa 238140000. Da 15607  
 5040. via 125. fa — 630000 Sottra 10736  
 625. 625

Da 48712005  
 Num. da sot. 40246290625 Sottra 44687376

Da 40246290625  
 Sottra 40246290625

*Dalla prova reale, e del 7. alla radice qq.*

72. Se la radice qq. discreta si moltiplicherà in se, ed il prodotto in se tornerà il numero, dal quale fu cavata la radice qq. e così moltiplicandosi 1265. in se, cioè via 1265. produrrà 1600225. e questo in se produrrà 2560720050625. numero dal quale si cavò la radice qq. 1265. La prova del 7. si fa con levarsi li 7. Prova del 7. dalla radice 1265. resta 5. che si segna quattro volte intorno l'X. Dipoi si moltiplica 5. via 5. fa 25. levati li 7. resta 4. che via l'altro 5. fa 20. levati li 7. resta 6. che via l'ultimo 5. fa 30. e levati li 7. resta 2. numero della prova, che deve restare dal levarsi li 7. dal numero 2560720050625. qq. siccome resta &c.

5  
 5 X<sup>2</sup>  
 5

*Dell' avvicinarsi sempre più nella radice non discreta qq.*

73. Sia proposto il numero 32. dal quale si abbia da cavare la radice qq. sarà 2. il suo quadrato 16. sottratto di 32. resta 16. che sopra una linea, e sotto 64. che si trova come hò detto al numero 58. dice  $\frac{2}{3} \frac{2}{3}$ . che schisato, e con il 2. dice  $2 \frac{2}{3}$ . per la radice qq. ma ridotto a quadrato da poco più di 25. sicchè questo è meno circa 7. Il Tartaglia essendo contento di tal radice non insegna modo d'avvicinarsi più seguitato in questo da Giuseppe Unicornio cap. 22. lib. 2. e pure come si vedrà in piccole radici di 24. e rotto darà di svario fino a 900. ed in maggiori darà differenze grandissime. Per avvicinarsi più il 7. di meno si pone sopra una linea col medesimo denominatore primo 64. dice  $2 \frac{2}{3}$ . che si somma con  $2 \frac{2}{3}$ . fa  $2 \frac{2}{3}$ . per la seconda radice qq. più vicina, e ridotta a qq. darà poco più di 30. di nuovo 2. che manca con il denominatore 64. dice  $2 \frac{2}{3}$ . che sommato con  $2 \frac{2}{3}$ . fa  $2 \frac{2}{3}$ . per la terza radice qq.

qq. più vicina, e ridotta a quad. quad. darà poco più di 32. che è differenza di rotto, onde è da contentarsi.

74. Sia proposto  $361200.$  del quale la radice qq. prima è  $24 \frac{2}{3}$ . schifato il rotto,  $24 \frac{1}{3}$ , e ridotta a quadrato fa  $360300.$  che è quasi 900. meno. Onde deve si trovare radice più propinqua con riformare il rotto, che però si aggiunga 900. al numeratore  $29424.$  fa  $30324.$  con sotto il denominatore  $58848.$  che schifato con 24. dice  $24 \frac{2}{3} \frac{1}{3} \frac{2}{3} \frac{2}{3}$ , per la radice qq. seconda, che ridotta a qq. fa  $361200.$   $\frac{2}{3} \frac{1}{3} \frac{2}{3} \frac{2}{3} \frac{2}{3} \frac{2}{3} \frac{2}{3} \frac{2}{3} \frac{2}{3} \frac{2}{3} \frac{2}{3} \frac{2}{3} \frac{2}{3} \frac{2}{3} \frac{2}{3} \frac{2}{3} \frac{2}{3} \frac{2}{3} \frac{2}{3} \frac{2}{3}$ . che è solo di più il rotto.

75. Finalmente sia  $31751620554.$  del quale la radice qq. prima è  $422 \frac{2}{3} \frac{2}{3} \frac{2}{3} \frac{2}{3} \frac{2}{3} \frac{2}{3} \frac{2}{3} \frac{2}{3} \frac{2}{3} \frac{2}{3} \frac{2}{3} \frac{2}{3} \frac{2}{3} \frac{2}{3} \frac{2}{3} \frac{2}{3} \frac{2}{3} \frac{2}{3} \frac{2}{3}$ . schifato  $\frac{2}{3}$ . ridotta a quad. quad. sarà senza rotto  $31751503478.$  che è meno del proposto numero  $117076.$  maggior differenza sarebbe stata. se si fosse proposto un numero vicino alla metà del quadrato del 422. e del qq. 423. Onde si conosce, che tal radice è assai lontana, e che il Tartaglia non doveva contentarsi di tal radice, ma dar modo di più avvicinarsi. Si aggiunge  $117076.$  al numeratore  $37709498.$  del primo rotto fa  $37826574.$  che con sotto  $301675984.$  denominatore che è la differenza meno 1. del quad. quad. di 422. dal qq. 423. che si trova come ho insegnato al num. 58. e schifato tal. rotto con 422. dice  $422 \frac{2}{3} \frac{2}{3} \frac{2}{3} \frac{2}{3} \frac{2}{3} \frac{2}{3} \frac{2}{3} \frac{2}{3} \frac{2}{3} \frac{2}{3} \frac{2}{3} \frac{2}{3} \frac{2}{3} \frac{2}{3} \frac{2}{3} \frac{2}{3} \frac{2}{3} \frac{2}{3}$ . radice qq. seconda, che ridotta a quad. quad. darà 310. meno del proposto numero, che si aggiunge al numeratore  $37826574.$  fa  $37826884.$  con il primo denominatore  $301675984.$  sotto, che schifato con 422. sarà la radice qq. terza  $422 \frac{2}{3} \frac{2}{3} \frac{2}{3} \frac{2}{3} \frac{2}{3} \frac{2}{3} \frac{2}{3} \frac{2}{3} \frac{2}{3} \frac{2}{3} \frac{2}{3} \frac{2}{3} \frac{2}{3} \frac{2}{3} \frac{2}{3} \frac{2}{3} \frac{2}{3} \frac{2}{3}$ . che ridotta a quad. quad. darà 1. e rotto meno del proposto numero. Ma chi la volesse più propinqua ponga 2. sopra una linea con sotto il denominatore  $301675984.$  detto: e si sommi con l'ultima radice, che la somma sarà radice qq. più vicina.

#### *Del cavare la radice qq. da rotti qq.*

76. Se il proposto rotto schifato, che sia, averà il numeratore qq. e il denominatore qq. averà radice qq. discreta per esempio  $\frac{2}{3} \frac{2}{3} \frac{2}{3}$ . schifato per 2. è  $\frac{2}{3} \frac{2}{3}$ . e perchè 16. e 81. son numeri qq. la sua radice qq. discreta è  $\frac{2}{3}$ . Quando il rotto ha numeratore, e denominatore quadrato quadrato, si può cavare la radice qq. e schifarla non avendo schifato tal rotto. Come di  $\frac{2}{3} \frac{2}{3} \frac{2}{3} \frac{2}{3} \frac{2}{3} \frac{2}{3} \frac{2}{3} \frac{2}{3} \frac{2}{3} \frac{2}{3} \frac{2}{3} \frac{2}{3} \frac{2}{3} \frac{2}{3} \frac{2}{3} \frac{2}{3} \frac{2}{3} \frac{2}{3}$ . schifato  $\frac{2}{3}$ .

#### *Del cavare la radice qq. da rotti non qq.*

77. Sia proposto  $\frac{1}{4}$  dal quale si abbia da cavare la radice qq. si riduca  $\frac{1}{4}$  a  $\frac{2}{3} \frac{2}{3} \frac{2}{3}$ . rotto uguale di denominatore qq. moltiplicando 4. via 64. fa cubo, e 3. ancora via 64. fa 192. del quale la radice qq.

qq. propinqua è  $3\frac{1}{2}$ . che si parte per 4. radice discreta qq. di 256. denominatore viene  $\frac{3}{4}$ . per la radice qq. vicina di  $\frac{1}{2}$ . ed ecco la causa di moltiplicarsi il numeratore 3. per il cubo di 4. denominatore, e partirsi la radice qq. vicina per il medesimo 4. che è ridurre il rotto ad altro denominatore qq.

Si riduca  $\frac{1}{4}$ . a  $\frac{1}{1}\frac{1}{2}$ . rotto uguale di numeratore qq. la radice qq. dia 108. è  $3\frac{1}{2}$ . per la radice si parte 3. radice qq. discreta di 81. viene  $\frac{3}{4}$ . radice qq. vicina di  $\frac{1}{2}$ .

Avvertasi, che essendo il denominatore quadrato di  $\frac{1}{2}$ . si moltiplica il numeratore 3. via 4. fa 12. la radice qq. propinqua di 12. che è 1.  $\frac{1}{2}$ . si parte per 2. radice quadrata di 4. viene  $\frac{1}{2}$ . per la radice qq. di  $\frac{1}{4}$ . la ragione di quest'operare è la medesima, che la passata essendo ridotto  $\frac{1}{4}$ . a  $\frac{1}{1}\frac{1}{2}$ . rotto uguale di denominatore qq.

Avvertasi ancora, che essendo il denominatore del rotto cubo come  $\frac{1}{8}$  per la sua radice 2. si moltiplica 7. numeratore fa 14. di questo la radice qq. propinqua si parte per 2. e verrà  $\frac{7}{2}$ . radice qq. propinqua di  $\frac{1}{2}$ . la causa è perchè  $\frac{1}{8}$ . sono ridotti a  $\frac{1}{4}$ . rotto di denominatore qq.

Avvertasi finalmente se il denominatore sarà di potestà maggiore che quadrato quadrato, allora si abbassa a quad. quad. come sia  $\frac{1}{16}$ . il 32. è relato, però si parte per 2. sua radice viene 16. qq. si parte pure 29. per 2. viene 14.  $\frac{1}{2}$ . del quale la radice qq. propinqua 1  $\frac{1}{2}$ . si parte per 2. radice qq. di 16. viene  $\frac{1}{2}$ . radice qq. vicina di  $\frac{1}{4}$ . la causa sempre è medesima ignorata dal Tartaglia. Le medesime avvertenze vagliono rispettivamente nell'altre di radici da cavarli da rotte irrazionali.

*Del cavare la radice qq. da numeri, e rotte quadrati quadrati, e non qq.*

98. Sia proposto 150  $\frac{1}{2}$ . si moltiplica 150. per 16. aggiungendo 1. fa 2401. del quale la radice qq. 7. si parte per 2. radice qq. di 16. viene 3  $\frac{1}{2}$ . per la radice quad. quad. del proposto numero.

Sia proposto ancora 1975  $\frac{1}{2}$ . ridotto in  $\frac{1975}{2}$ . si cava la radice qq. da 160000. che è 20. che si parte per 3. radice qq. di 81. viene 6  $\frac{1}{3}$ . per la cercata radice qq.

99. Quando si hanno da cavare le radici qq. da intieri, e rotte irrazionali si possono avere le medesime avvertenze date per i rotte non qq. e per regola generale ridurre tal quantità ad altra di denominatore qq. sia proposto 3  $\frac{1}{2}$ . che a modo di rotto dice  $\frac{7}{2}$ . per il cubo di 2. che è 8. si moltiplica 7. fa 56. del quale la radice qq. propinqua è 2  $\frac{1}{2}$ . che si parte per 2. denominatore, viene 1  $\frac{1}{2}$ . per la radice qq. vicina cercata.

Si può ridurre a numeratore qq. moltiplicando 343. cubo di 7. per 2. de-

2. denominatore fa 696. del quale la radice qq. vicina è  $5\frac{1}{2}$ . per questo partendo 7. radice qq. discosta di 2400. viene  $1\frac{1}{2}$ . radice qq. più vicina della passata, come si può sperimentare.

80. Quando saranno numeri grandi accompagnati con rotto: si trovi la radice qq. vicina degli interi, che dia un poco più, e sarà trovata. Come 361200.  $\frac{1}{2}$ : la radice qq. propinqua fu 24.  $\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}$ . di 361200. che ridotta a qq. diede di più il rotto, che si avvicina a  $\frac{1}{2}$ .

Altre cose potrei addurre, le quali per non esser lungo più del dovere, tralascio, ricordo solo la pratica d'Oronzio. per avvicinarsi alla radice qq. di aggiungere al numero proposto gli zeri a quattro a quattro &c.

*Delle radici relate dette ancora sforde solide.*

81. Radice relata, come si disse da principio è qualsiasi numero pigliato cinque volte, e successivamente moltiplicato, & il prodotto ultimo si chiama numero relato, rispetto al quale il numero preso si chiama radice relata. Come cinque volte il 2. che via 2. fa 4. questo via 2. fa 8. questo via 2. fa 16. e questo via 2. fa 32. numero relato, del quale la radice è 2. Il numero relato si ha ancora dal moltiplicare il quadrato 4. via il cubo 8., e dal qq. 16. via 2. sua radice. Nel numero, o figura, che termina la radice, termina ancora il suo relato. Come radice 2. relato 32. radice 3. relato 243.

*Del trovare la differenza da un relato all' altro.*

82. Se si sottrarrà un relato minore da un maggiore, resterà la loro differenza. Come sottraendo 32. relato di 2. da 1024. relato di 4. resta 992. lor differenza. Ma volendosi trovare la differenza per mezzo della radice da un relato all'altro immediato, che è ciò, che qui serve per avere il denominatore del rotto nelle radici relate sforde si fa così. Sia la radice 2.

|    |   |    |   |    |
|----|---|----|---|----|
| 16 | — | 5  | — | 80 |
| 8  | — | 10 | — | 80 |
| 4  | — | 10 | — | 40 |
| 2  | — | 5  | — | 10 |
|    |   |    |   | 1  |

si pone sopra essa 4. suo quadrato, sopra questo 8. suo cubo, e sopra questo 16. suo qq. di contro si pongono li meri proprii 5. 10. 10. 5. per la radice relata, come si disse al num. 11.

I numeri contraposti si moltiplicano, e i prodotti si sommano con 1. più, e la somma 211. è la differenza, che è dal relato di 2. al relato di 3. della qual differenza meno 1. servesi il Tartaglia per denominatore, così me ne servo io, benché altri Autori più antichi si servano della medesima differenza rispettivamente in tutte le radici per formarne il rotto a proporzione di essa. Si veda il lib. 10. al num. 10. 11. e 12. dell' Arimmetica di Francesco Galigai Fiorentino, dove un tal Bene-

C c c c c

detto

detto trova la radice foris cubi secondo l'appressamento proporzionando l'avanzo a tal differenza, per il che è manifesto altri aver tentato d'avvicinarsi nelle radici forde, che è contro quel che dice il Tartaglia, lui esser stato il primo.

*Del cavare la radice relata da qualsivoglia numero*

83. Primieramente sia preparata la tavola de' numeri relati con le sue radici da 1. fino al 9. per chi non la sapeffe à mente.

I numeri proprii sono per questa specie di radici 5.      Tavola

10. 10. 5. che servono per trovare la differenza      1      1

da relato à relato, e per formare il rotto, come      2      32

ho detto, con i suoi xeri sono 50000. 10000.      3      243

1000. e 50. per formare i numeri partitori.      4      1024

Si deva cavare la radice relata da quello numero      5      3125

3570467226624. si punta il primo 4. di sopra, e      6      7776

lasciate quattro figure si punta 2. & altre quat-      7      16807

tro si punta il 7. per la ragione detta al num 9.      8      32768

I tre punti mostrano, che la radice sarà di tre fi-      9      59049

gure. Ora da 357. ultimo punto si sottra 243. numero relato minore più vicino, la di cui radice 3. si segna da parte, e resta 114. al pari del quale si calano l' altre cinque figure fino al secondo punto, e sono 11404672. numero da partirsi.

Il partitore si trova così. Sopra 3. radice trovata si pone 9. suo quadrato, sopra 9. si pone 27. suo cubo, sopra 27. si pone 81. qq. di contro questo si pone 50000.

di contro 27. il numero 10000.      81 via 50000 fa 4050000

di contro 9. il numero 1000. e      27 via 10000      270000

di contro il 3. il numero 50. si      9 via 1000      9000

moltiplicano i numeri contra-      3 via 50      150

posti, & i prodotti, si somma-

no, la somma 4229150. è il

Partitore 4229150

numero partitore per il quale si parte: 11404672. viene 2. che s'ac-

compagna con 3. radice trovata dice 32. l'istesso 2. si pone di

contro al primo prodotto, il 4. suo quadrato di contro al secon-

do prodotto, l'8. suo cubo di contro al terzo prodotto, il 16. suo

qq. di contro al quarto prodotto 150. si moltiplicano tali prodot-

ti per questi numeri detti      4050000 via 2 fa 8100000

descendenti, i prodotti si      270000      4      1080000

sommano con 32. relato, e      9000      8      72000

la somma 9234432. si sottra      150      16      2400

dal numero partito, e resta      32      32

2150240. al pari del quale      

---

si calano l' altre figure fino      De sottrarsi 9234432

al



755

al primo punto son 315024026624. da partirsi. Si trova il partito-  
 re con il 32. radice fino adesso trovata, ponendo i numeri ascen-  
 denti sopra esso 1024. suo quadrato, sopra questo il cubo 32768.  
 e sopra questo il qq. 3048576 via 50000 fa 52428800000  
 1048576. e di con- 32768 — 10000 — 327680000  
 tro gli numeri pro- 1024 — 1000 — 1024000  
 pri per ordine si mol- 32 — 50 — 1600  
 tiplicano per essi, e i  
 prodotti si somma-

no, la somma sarà il numero partitore 52757505600. per il quale  
 si parte il sopradetto numero, e viene 4. il quale si pone dopo 32. fa  
 324. per tutta la radice: dipoi il 4. si pone centro al primo pro-  
 dotto, il 16. 52428800000 via 4 fa 209715200000  
 suo quadrato 327680000 — 16 — 5242880000  
 di contro al 1024000 — 64 — 65536000  
 secondo, il 64. 1600 — 256 — 409600  
 suo cubo di 3024 1024  
 contro al ter.

zo, il 256: di D a sottrarsi 215024026624  
 contro al quarto, e sotto 1024. suo relato. Gli prodotti si multi-  
 plicano con i numeri descendenti di contro i prodotti si somma-  
 no, e la somma è il numero da sottrarsi dal numero partito, che  
 per essere uguale, avanza  
 o. e la radice relata discre- Radice Rel. 324.  
 ta è 324. che ridotta à re- 3570467226624  
 lato farà il numero pro- 243  
 posto, e serve di prova. Si  
 levano li 7. dalla radice,  
 resta 2. fatto relato è 32.  
 dal quale levando li 7. resta  
 4. per prova, e tanto resta  
 à levare li 7. dal numero proposto. Sicchè stà bene, e torna la pro-  
 va del 7. Così si fa la prova del 9. &c.

*Del trovare la radice relata vicina ne i numeri  
 non relati, con riformare il rotto del-  
 la radice.*

84. Sia proposto 200. la di cui radice relata intiera è 2. il suo relato  
 32. si sottra da 200. resta 168. che si pone sopra una linea, e sotto  
 si pone 210. denominatore, che è la differenza del relato di 2. al  
 relato di 3. meno 1. come si disse al num. 71. con 2. dice  $2\frac{168}{110}$ .  
 per la prima radice relata, e di questa è contento il Tartaglia,  
 mà ridotta à numero relato manca più di 27. da 200. che però si  
 C c c c c 2



iero per 32. al prodotto aggiunto 17. la somma è 18424351793. la di cui radice relata è 113. la quale si parte per 2. radice relata di 32. denominatore, viene 56  $\frac{1}{2}$ . per la radice relata discreta.

*Del cavare la radice relata da rotto relato.*

87. Allora sarà rotto relato, quando tanto il numeratore, e denominatore è numero relato. Per esempio  $\frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3}$ . ondè cavando la radice relata da 3125. è 5. e di 16807. è 7. e  $\frac{1}{2}$ . è la radice relata di quel rotto.

*Del cavare la radice propinqua relata da numero intero, e rotto non relato.*

88. Primieramente si deve il denominatore del rotto proposto ridurre a relato, se tale non è, con il suo numeratore, tal che questo rotto sia uguale al primo. Dipoi si moltiplica l'intero per il denominatore, ed al prodotto si aggiunge il numeratore del rotto, dalla somma si cava la radice relata assai propinqua, che si parte per la radice relata del denominatore, e risulterà la radice relata propinqua cercata, per esempio.

Sia proposto 44370  $\frac{2}{3}$ . Ora  $\frac{2}{3}$ . si riduca a  $\frac{4}{6}$ . moltiplicandolo per 16. quad. quad. di 2. il 32. si moltiplica per 44370. al prodotto si aggiunge 16. numeratore, fa 1419856. del quale la radice relata propinqua, è 17. che si parte per 2. radice relata discreta di 32. denominatore viene 8  $\frac{1}{2}$ . per la radice propinqua relata della quantità proposta. Se il  $\frac{2}{3}$ . fusse stato ridotto a  $\frac{1}{3}$ . veniva il medesimo, perchè la radice relata vicina sarebbe stata 34. che partita per 4. radice relata discreta di 1024. veniva 8  $\frac{1}{2}$ .

Proposto medesimamente 6999  $\frac{1}{2}$ , ridotto  $\frac{1}{2}$ . in 7  $\frac{1}{2}$ . e per 3. moltiplicato 6999. con aggiungere 2. fa 223970. del quale la radice propinqua relata è 14  $\frac{1}{2}$ . che si parte per 2. radice relata discreta di 32. denominatore del rotto, viene 5  $\frac{1}{2}$ . per la radice relata propinqua della proposta quantità.

*Modo di trovare il rotto alla radice fonda relata.*

89. Raffaello Bombelli nella sua Algebra propone 44370  $\frac{1}{2}$ . da cavar si la radice relata propinqua antecedentemente da me posto, trova il lato, che è 8. il suo relato 32768. sottra da 44370  $\frac{1}{2}$ . resta 11602  $\frac{1}{2}$ . questo parte per cinque volte 8. cioè per 40. viene 290  $\frac{1}{2}$ . e a questo aggiunge 1024. quadrato di 32. metà di 64. quadrato di 8. fa 1314.  $\frac{1}{2}$ . e di questo piglia il lato quadrato, che è 36  $\frac{1}{2}$ . del quale ne cava 32. detto di sopra, resta 4  $\frac{1}{2}$ . e a questo aggiunge 16. quarta parte del quadrato di 8. fa 20  $\frac{1}{2}$ . e il suo

l'uo lato quadrato è  $4\frac{1}{2}$ . e di questo se cava 4. metà dell' 8. resta  $\frac{1}{2}$ . e questo è il rotto, che aggiunto all'8. fa  $8\frac{1}{2}$ . come per il mio modo. Questa pratica con altri numeri non riuscirà perche si darà in estrazioni di radici sforde quadrate, come si può sperimentare.

*Del cavare la radice propinqua relata da' rotti non relati.*

99. Rotto non relato è quello, che ha il numeratore, o denominatore non relato, ovvero l'uno, e l'altro non relato. Come  $\frac{7}{2}$ . solamente il denominatore è relato, che però si trova la radice propinqua relata di 7, che è  $1\frac{1}{2}$ . che si parte per 2. radice relata discretata di 38. viene  $\frac{1}{2}$ . per la propinqua radice relata di  $\frac{7}{2}$ . che ridotta a relato darà poco più, cioè  $1\frac{1}{2}\frac{1}{2}$ . oltre  $\frac{1}{2}$ .
91. Sia proposto  $\frac{1}{8}$ . messo dal Tartaglia nel num. 2. del Cap. 8. lib. 2. car. a mè 43. dice che si moltiplica il 5. numeratore per il quad. quad. di 8. cioè per 4096 fa 20480. del quale la radice relata propinqua  $7\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}$ . si parte per 8. denominatore, e viene  $\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}$ . per la radice propinqua relata di  $\frac{1}{8}$ . si protesta di non potere dire la causa di tale operare senza saperfi il Trattato delle proporzioni.

La causa però è l'aver ridotto  $\frac{1}{8}$ . in  $\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}$ . rotto uguale di denominatore relato con moltiplicare il 5. via 4096. qq. di 8, ed 8. via 4096. fa 32768. benchè questo non si fa espressamente, onde la radice propinqua relata di 20480. si è partita per 8. radice relata discretata di 32768.

92. Et acciochè questo meglio si conosca, si sappia che  $\frac{1}{8}$ . si poteva ridurre in  $\frac{1}{2}\frac{1}{2}$ . moltiplicando per 4. il numeratore, e denominatore, e cavando la radice propinqua relata di 20. è  $1\frac{1}{2}$ . che si parte per 2. radice relata di 32. denominatore, e veniva  $\frac{1}{2}\frac{1}{2}$ . per la radice relata propinqua di  $\frac{1}{8}$ . e ridotta al relato fa  $\frac{1}{2}$ . e  $\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}$ . e  $\frac{1}{2}\frac{1}{2}$ . radice più propinqua di quella del Tartaglia, la quale manca nel relato più di  $\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}$ . di  $\frac{1}{8}$ . e questa manca meno di  $\frac{1}{2}\frac{1}{2}$ . di  $\frac{1}{8}$ .

93. Nel luogo citato dice il Tartaglia  $\frac{1}{8}$ . fu da me proposto a Girolamo Cardano, ed a Ludovico Ferrari suo creato nella nostra pubblica disputa, i quali, dice, fecero due errori, uno, che assegnarono una radice non trovata per la sua regola: Ma per quella d'Oronzio, e del Stifelio. L'altro errore l'aver assegnato  $\frac{1}{2}\frac{1}{2}$ . per la radice relata di  $\frac{1}{8}$  essendo che il relato di tal radice, scarseggia un ottavo intero, e circa  $1\frac{1}{4}$  da  $\frac{1}{8}$ . &c.

In poche parole il Tartaglia pretende icreditare quattro, ma con falsità, perchè sia il Cardano e Ferrari avessero operato per la regola

gola dello Stifelio, avrebbero operato per la regola del Tartaglia, essendo chiaro, che la regola del Tartaglia consiste in assegnare il denominatore all'avanzo numeratore per formare il rotto nelle radici forde, ma tal regola, e modo si deduce dalla tavola dello Stifelio posto nel lib. 1. a parte 44. dove assegna i numeri peculiari, e proprj per le radici, ed io l'hò accennato nel trovare la differenza da un cubo all'altro da un qq. all'altro, e da un relato all'altro, Dunque usando il Cardano, ed il Ferrari la regola del Stifelio non farebbero errore, ò lo farebbe il medesimo Tartaglia. Ne meno farebbero errore operando per regola d'Oronzio, anzi per essa uno si può sempre più avvicinare nell'assegnare la radice forda propinqua: E nel dato esempio di  $\frac{1}{2}$ . si riduca il rotto a  $\frac{2}{4}$ . di denominatore relato, e poi per il modo d'Oronzio si aggiungano dieci zeri al 20. numeratore, e dieci zeri al 32. denominatore, la radice relata differita di questo è 200. del numeratore 182. in circa, e vien questo rotto  $\frac{2}{4} \frac{200}{182}$ . schifato  $\frac{1}{2} \frac{2}{4}$ . per la radice relata propinqua. Di questo il relato ridotto in ottavi sono  $\frac{2}{8}$ .  $\frac{2}{8} \frac{2}{8}$ . e rotto. Che non si corre un centesimo d'ottavo, essendo di minore denominazione, dove l'assegnata dal Tartaglia è  $\frac{2}{8} \frac{2}{8} \frac{2}{8} \frac{2}{8} \frac{2}{8}$ . e nel relato manca 17. centesimi d'un ottavo. Dal che si vede esser falso quel che dice il Tartaglia, che la regola d'Oronzio sia trovata per un discorso naturale, e non per ragione geometrica con quell'aggiungere di zeri, che benchè nella propinque radici quadre, e cube par, che non molto erri dalla verità, ma nell'altre maggiori, ovvero più alte radici maggiori dimostra i suoi errori. Questo non succede nella regola d'Oronzio, ma in quella dell'istesso Tartaglia, quando non si riformi il rotto, come hò insegnato. Si vedde di sopra, che cavata la radice cuba secondo il Tartaglia da 240062454. si 621  $\frac{2}{3}$ . e diede di meno 465  $\frac{1}{3}$ . medesimamente cavando la radice qq. da questo numero 21765606040. la radice qq. 420  $\frac{2}{3}$ . da differenza 500265229  $\frac{2}{3}$ . Ancora cavando la radice relata da 9754950249. sarà secondo il Tartaglia 99  $\frac{2}{3}$ . che ridotta a relato darà di meno 2462717  $\frac{1}{3}$ . Queste son differenze grandi, e maggiori occorreranno in più alte radici di più numeri secondo la regola del Tartaglia, le non si riformerà il rotto di queste radici, come di sopra hò detto. Dal che si deduce, che il Cardano, e il Ferrari non hanno fatto sì grand'errore, come vuole il Tartaglia, nell'assegnare la radice relata di  $\frac{1}{2}$ . che s'aria si pote.

Non seguo più avanti in estrazioni di più alte radici, si perchè di loro poco è l'uso, si perchè essendo composte delle passate, chi saprà quelle, saprà cavare altre maggiori. Per esempio sia proposto

Ho 5331028315456. da eavarli la radice quadrata cuba , di esso si cavi la radice quadrata, che è 7301384. e di questa si cavi la radice cuba , che è 194. e questa sarà la radice quadrata cuba del proposto numero. Ovvero si poteva cavare prima la radice cuba, che sarebbe stata 37636. e di questa cavare la quadrata, e sarebbe venuto il medesimo 194. Oltre di che sempre si segue il medesimo modo servendosi de numeri proprj per ciascuna radice, come si è detto. Per il che facilmente ciascun pratico nelle passate opererà nell'altre .

*Uso delle seguenti tavole .*

94. Qui metto alcune tavole , per le quali senza fatica si trovano i lati, e le radici de quadrati, e cubi &c. e col sottrarre si trovano le loro differenze per formare il rotto nelle radici sorde, e riformarlo . Apporto un' esempio , che serve per direzione .

Sia proposto 1845. del quale si voglia trovare la radice cuba vicina. Si osservi nella vavola de cubi , che 1728. cubo di 12. si avvicina, e 2197. cubo seguente passa detto numero , però si sottra 1728. dal proposto num. 1845. resta 117. numeratore , si sottra pure 1728. da 2197. resta 469. differenza di quei cubi, levato 1. resta 468. denominatore , e dice  $\frac{117}{468} \frac{1}{4}$ . che schisato. è  $\frac{1}{4}$ . ed aggiunto con 12. fa  $12 \frac{1}{4}$ . ovvero  $12 \frac{1}{4}$ . per la prima radice propinqua di 1845. Ora per trovare il cubo di tal radice, si veda nella tavola il cubo di 49. numeratore, che è 117649 che si parte per 64. cubo di denominatore , viene 1838. che è di 1845. meno 7. che si aggiunge à 117. numeratore del primo rotto fa 124. col detto denominatore 468. fa  $\frac{124}{468} \frac{1}{4}$ . schisato  $\frac{1}{4} \frac{1}{4}$ . che con 12. dice  $12 \frac{1}{4} \frac{1}{4}$ . radice cuba più vicina della passata . Ed ecco per le tavole trovata la radice , e riformato il rotto .

In questo medesimo proposito mi sovviene ancora di dire che il rotto delle radici si può ridurre a rotto di denominatore decinale come il detto  $\frac{124}{468} \frac{1}{4}$ . si aggiungono zeri al 31. numeratore. V. g. tre, fa 31000. questo numero si parte per 117. viene 265. quasi, che sopra una linea con sotto 1000. dice  $\frac{265}{1000} \frac{1}{4}$ . rotto decinale, il quale accompagnato con il 12. fa  $12 \frac{265}{1000} \frac{1}{4}$ . per la radice cuba di 1845. vicina, ed hà questo comodo, che per trovare il suo cubo si moltiplica 12265. in se, e di nuovo nel prodotto numero , e da 1845. 026709625. si puntano 9. figure , perchè 3. via 3. fa 9. per li zeri aggiunti , per il partire à tronco, come dicono che si fa , e resta 1845. cubo vicino di tal radice , e numero di sopra proposto .

TAVOLE

# T A V O L E

| Radici | Quadrati | Cubi  | Quadrati quadrati | Relati.  |
|--------|----------|-------|-------------------|----------|
| 1      | 1        | 1     | 1                 | 1        |
| 2      | 4        | 8     | 16                | 32       |
| 3      | 9        | 27    | 81                | 243      |
| 4      | 16       | 64    | 256               | 1024     |
| 5      | 25       | 125   | 625               | 3125     |
| 6      | 36       | 216   | 1296              | 7776     |
| 7      | 49       | 343   | 2401              | 16807    |
| 8      | 64       | 512   | 4096              | 32768    |
| 9      | 81       | 729   | 6561              | 59049    |
| 10     | 100      | 1000  | 10000             | 100000   |
| 11     | 121      | 1331  | 14641             | 151051   |
| 12     | 144      | 1728  | 20736             | 248832   |
| 13     | 169      | 2197  | 28561             | 371293   |
| 14     | 196      | 2744  | 38416             | 537824   |
| 15     | 225      | 3375  | 50625             | 759375   |
| 16     | 256      | 4096  | 65536             | 1048576  |
| 17     | 289      | 4913  | 83521             | 1419857  |
| 18     | 324      | 5832  | 104976            | 1889568  |
| 19     | 361      | 6859  | 130321            | 2476099  |
| 20     | 400      | 8000  | 160000            | 3200000  |
| 21     | 441      | 9261  | 194481            | 4084101  |
| 22     | 484      | 10648 | 234256            | 5153632  |
| 23     | 529      | 12167 | 279841            | 6436343  |
| 24     | 576      | 13824 | 331776            | 7962624  |
| 25     | 625      | 15625 | 390625            | 9765625  |
| 26     | 676      | 17576 | 456976            | 11881376 |
| 27     | 729      | 19683 | 531441            | 14348907 |
| 28     | 784      | 21952 | 614756            | 17210368 |
| 29     | 841      | 24389 | 707281            | 20511149 |
| 30     | 900      | 27000 | 810000            | 24300000 |
| 31     | 961      | 29791 | 923521            | 28629151 |
| 32     | 1024     | 32768 | 1048576           | 33554432 |
| 33     | 1089     | 35937 | 1185921           | 39135393 |
| 34     | 1156     | 39304 | 1336336           | 45435424 |
| 35     | 1225     | 42875 | 1500625           | 52521875 |
| 36     | 1296     | 46656 | 1679616           | 60466176 |
| 37     | 1369     | 50653 | 1874161           | 69343957 |
| 38     | 1444     | 54872 | 2085136           | 79235168 |

D d d d d

39

| Radici | Quadr. | Cubi   | Quadrati quadr. | Relati     |
|--------|--------|--------|-----------------|------------|
| 39     | 1521   | 59319  | 2313441         | 90224199   |
| 40     | 1600   | 64000  | 2560000         | 102400000  |
| 41     | 1681   | 68921  | 2825761         | 115856201  |
| 42     | 1764   | 74088  | 3111696         | 130691232  |
| 43     | 1849   | 79507  | 3418801         | 147008443  |
| 44     | 1936   | 85184  | 3748096         | 164915234  |
| 45     | 2025   | 91125  | 4100625         | 184528125  |
| 46     | 2116   | 97336  | 4477456         | 205962976  |
| 47     | 2209   | 103823 | 4879681         | 229345007  |
| 48     | 2304   | 110592 | 5308416         | 254803968  |
| 49     | 2401   | 117649 | 5764801         | 282475249  |
| 50     | 2500   | 125000 | 6250000         | 312500000  |
| 51     | 2601   | 132651 | 6765201         | 345025251  |
| 52     | 2704   | 140608 | 7311616         | 380204032  |
| 53     | 2809   | 148877 | 7890481         | 418195493  |
| 54     | 2916   | 157464 | 8504056         | 459219024  |
| 55     | 3025   | 166375 | 9150625         | 503284375  |
| 56     | 3136   | 175616 | 9834496         | 559731866  |
| 57     | 3249   | 185193 | 10556001        | 601692057  |
| 58     | 3364   | 195112 | 11316490        | 656336768  |
| 59     | 3481   | 205379 | 12117361        | 714924299  |
| 60     | 3600   | 216000 | 12960000        | 777600000  |
| 61     | 3721   | 226981 | 13845841        | 844596301  |
| 62     | 3844   | 238328 | 14776336        | 916132832  |
| 63     | 3969   | 250047 | 15752961        | 992436543  |
| 64     | 4096   | 262144 | 16777216        | 1073841824 |
| 65     | 4225   | 273625 | 17785625        | 1156065625 |
| 66     | 4356   | 287496 | 18974736        | 1252332576 |
| 67     | 4489   | 300763 | 20151121        | 1350125107 |
| 68     | 4624   | 314432 | 21381376        | 1453933568 |
| 69     | 4761   | 328509 | 22667121        | 1564031349 |
| 70     | 4900   | 343000 | 24010000        | 1680700000 |
| 71     | 5041   | 357911 | 25411681        | 1804229351 |
| 72     | 5184   | 373248 | 26873856        | 1934917632 |
| 73     | 5329   | 389017 | 28398241        | 2073071593 |
| 74     | 5476   | 405224 | 29986576        | 2219006624 |
| 75     | 5625   | 421875 | 31640625        | 2373046875 |
| 76     | 5776   | 438976 | 33362176        | 2536525576 |
| 77     | 5929   | 456533 | 35153041        | 2706784157 |
| 78     | 6084   | 474552 | 37015056        | 2887174368 |
| 79     | 6241   | 493039 | 38950081        | 3077056399 |



| Radici | Quadr. | Cubi    | Quadrati quad. | Relati.     |
|--------|--------|---------|----------------|-------------|
| 80     | 6400   | 512000  | 40960000       | 3276800000  |
| 81     | 6561   | 531441  | 43046721       | 3486784401  |
| 82     | 6724   | 551368  | 45212176       | 3707398432  |
| 83     | 6889   | 573787  | 47458321       | 3939040643  |
| 84     | 7056   | 592704  | 49787136       | 4182119424  |
| 85     | 7225   | 614125  | 52200625       | 4437053225  |
| 86     | 7396   | 636056  | 54700816       | 4704270176  |
| 87     | 7569   | 658503  | 57289761       | 4984209207  |
| 88     | 7744   | 681472  | 59969536       | 5277319168  |
| 89     | 7921   | 704969  | 62742241       | 5584059449  |
| 90     | 8100   | 729000  | 65610000       | 5904900000  |
| 91     | 8281   | 753571  | 68574961       | 6240321451  |
| 92     | 8464   | 778688  | 71639296       | 6590815232  |
| 93     | 8649   | 804357  | 74805201       | 6956883693  |
| 94     | 8836   | 830584  | 78074896       | 7339040224  |
| 95     | 9025   | 857375  | 81450625       | 7737809375  |
| 96     | 9216   | 884736  | 84934656       | 8153726976  |
| 97     | 9409   | 912673  | 88529281       | 8587340237  |
| 98     | 8604   | 941192  | 92236816       | 9039207968  |
| 99     | 9801   | 970299  | 96059601       | 9509900499  |
| 100    | 10000  | 1000000 | 100000000      | 10000000000 |
| 101    | 10201  | 1030301 | 104060401      | 10510100501 |
| 102    | 10404  | 1061208 | 108243216      | 11040808032 |
| 103    | 10609  | 1092727 | 112550881      | 11592740743 |
| 104    | 10816  | 1124864 | 116985856      | 12166529024 |
| 105    | 11025  | 1157625 | 121550625      | 12762815625 |
| 106    | 11236  | 1191016 | 126247696      | 13382255776 |
| 107    | 11449  | 1225043 | 131079601      | 14025517307 |
| 108    | 11664  | 1259712 | 136048896      | 14693280768 |
| 109    | 11881  | 1295029 | 141158161      | 15386239549 |
| 110    | 12100  | 1331000 | 146410000      | 16105100000 |
| 111    | 12321  | 1367631 | 151807041      | 16850581551 |
| 112    | 12544  | 1404928 | 157351936      | 17623416832 |
| 113    | 12769  | 1442897 | 163047361      | 18424351793 |
| 114    | 12996  | 1481544 | 168896016      | 19254145824 |
| 115    | 13225  | 1520875 | 174900625      | 20113571875 |
| 116    | 13456  | 1560896 | 181063936      | 21003416576 |
| 117    | 13689  | 1601617 | 187388721      | 21924480357 |
| 118    | 13924  | 1643032 | 193877776      | 22877577568 |
| 119    | 14161  | 1685159 | 200533921      | 23863536599 |
| 120    | 14400  | 1728000 | 207360000      | 24883200000 |

D d d d a

121

| 762<br>Radici | Quadrati | Cubi    | Quadrati Quadr. | Relati       |
|---------------|----------|---------|-----------------|--------------|
| 121           | 14641    | 1771561 | 214358881       | 25937424601  |
| 122           | 14884    | 1815848 | 221533456       | 27027081632  |
| 123           | 15129    | 1860867 | 228886641       | 28153056843  |
| 124           | 15376    | 1906624 | 236421376       | 29316250624  |
| 125           | 15625    | 1953125 | 244140625       | 30517578125  |
| 126           | 15876    | 2000376 | 252047376       | 31757969376  |
| 127           | 16129    | 2048383 | 260144641       | 33038369407  |
| 128           | 16384    | 2097152 | 268435456       | 34359738368  |
| 129           | 16641    | 2146689 | 276922881       | 35723051649  |
| 130           | 16900    | 2197000 | 285610000       | 37129300000  |
| 131           | 17161    | 2248091 | 294499221       | 38579489651  |
| 132           | 17424    | 2299968 | 303595776       | 40074642432  |
| 133           | 17689    | 2352637 | 312900721       | 41615795893  |
| 134           | 17956    | 2406104 | 322417936       | 43204003424  |
| 135           | 18225    | 2460375 | 332150625       | 44840334375  |
| 136           | 18496    | 2515456 | 342102016       | 46525874176  |
| 137           | 18769    | 2571353 | 352275361       | 48361724457  |
| 138           | 19044    | 2628072 | 362673936       | 5004900368   |
| 139           | 19321    | 2685619 | 373301041       | 51888844699  |
| 140           | 19600    | 2744000 | 384160000       | 53782400000  |
| 141           | 19881    | 2803221 | 395254161       | 55730836701  |
| 142           | 20164    | 2863288 | 406586896       | 57735339232  |
| 143           | 20449    | 2924207 | 418161601       | 59797108943  |
| 144           | 20736    | 2985984 | 429981696       | 61917364224  |
| 145           | 21025    | 3048625 | 442050625       | 64097340625  |
| 146           | 21316    | 3112136 | 454371856       | 66358290976  |
| 147           | 21609    | 3176523 | 466948881       | 68641485507  |
| 148           | 21904    | 3241792 | 479785216       | 71008221968  |
| 149           | 22201    | 3307949 | 492884401       | 73439775749  |
| 150           | 22500    | 3375000 | 506250000       | 75937500000  |
| 151           | 22801    | 3442951 | 519885601       | 78502725751  |
| 152           | 23104    | 3511808 | 533794816       | 81136812032  |
| 153           | 23409    | 3581577 | 547981281       | 83841135993  |
| 154           | 23716    | 3652264 | 562448656       | 86617093024  |
| 155           | 24025    | 3723875 | 577200625       | 89466096875  |
| 156           | 24336    | 3796416 | 592240896       | 92389579776  |
| 157           | 24649    | 3869893 | 607573201       | 95388992557  |
| 158           | 24964    | 3944312 | 623201296       | 98465804766  |
| 159           | 25281    | 4019679 | 639128961       | 101621504789 |
| 160           | 25600    | 4096000 | 655360000       | 104857600000 |
| 161           | 25921    | 4173281 | 671892241       | 108175616801 |

| Radici | Quadrati | Cubi    | Quadrati quadr. | Relati       |
|--------|----------|---------|-----------------|--------------|
| 162    | 26244    | 4251538 | 688747536       | 111577100832 |
| 163    | 26569    | 4330747 | 705911761       | 115063617043 |
| 164    | 26896    | 4410944 | 723394816       | 118636749824 |
| 165    | 27225    | 4492125 | 741200625       | 122298103125 |
| 166    | 27556    | 4574296 | 759333136       | 126049300576 |
| 167    | 27889    | 4657463 | 777796321       | 129891985607 |
| 168    | 28224    | 4741632 | 796594176       | 133827821568 |
| 169    | 28561    | 4826809 | 815730721       | 137858491849 |
| 170    | 28900    | 4913000 | 835210000       | 141985700000 |
| 171    | 29241    | 5000211 | 855036081       | 14621169851  |
| 172    | 29584    | 5088448 | 875212056       | 150536645632 |
| 173    | 29929    | 5177717 | 895745041       | 154963892093 |
| 174    | 30276    | 5268024 | 916636176       | 159494694624 |
| 175    | 30625    | 5359375 | 937890625       | 164130859375 |
| 176    | 30976    | 5451776 | 859512576       | 168874213376 |
| 177    | 31329    | 5545233 | 981506241       | 173726604657 |
| 178    | 31684    | 5639752 | 1003875856      | 178689902368 |
| 179    | 32041    | 5735339 | 1026623681      | 183765996899 |
| 180    | 32400    | 5832000 | 1049760000      | 188956800000 |
| 181    | 32761    | 5929741 | 1073283121      | 194264244901 |
| 182    | 33124    | 6028568 | 1097199376      | 199690286432 |
| 183    | 33489    | 6128487 | 1121513121      | 205236901143 |
| 184    | 33856    | 6229504 | 1156228726      | 212736085584 |
| 185    | 34225    | 6331625 | 1171310625      | 216699865625 |
| 186    | 34596    | 6434856 | 1196883216      | 221620278176 |
| 187    | 34969    | 6539203 | 1222830961      | 228669389707 |
| 188    | 35344    | 6644672 | 1249198336      | 234849281168 |
| 189    | 35721    | 6751269 | 1275989841      | 241162079949 |
| 190    | 36100    | 6859000 | 1303210000      | 247609900000 |
| 191    | 36481    | 6967871 | 1330863361      | 254194901951 |
| 192    | 36864    | 7077888 | 1358954496      | 260919263232 |
| 193    | 37249    | 7189057 | 1387488001      | 267778518493 |
| 194    | 37636    | 7301384 | 1416468496      | 274794888224 |
| 195    | 38025    | 7414875 | 1445900625      | 281950621875 |
| 196    | 38416    | 7529536 | 1475789056      | 289254654976 |
| 197    | 38809    | 7645273 | 1506138481      | 296709280557 |
| 198    | 39204    | 7762392 | 1536938616      | 304316815968 |
| 199    | 39601    | 7880599 | 1568239241      | 312079600999 |
| 200    | 40000    | 8000000 | 1600000000      | 320000000000 |
| 201    | 40401    | 8120601 | 1632240801      | 328080401001 |
| 202    | 40804    | 8242408 | 1664969416      | 336323216032 |

766  
Radici. Quadrati Cubi Quadrati quadr. Relati

|     |       |          |            |              |
|-----|-------|----------|------------|--------------|
| 203 | 41209 | 8365427  | 1698181681 | 344730881243 |
| 204 | 41616 | 8489664  | 1731891456 | 353305857024 |
| 205 | 42025 | 8615125  | 1766100625 | 362050628125 |
| 206 | 42436 | 8741816  | 1800814096 | 370967703776 |
| 207 | 42849 | 8869743  | 1836036801 | 380059617807 |
| 208 | 43264 | 8998912  | 1871773696 | 389328928768 |
| 209 | 43681 | 9129329  | 1908029761 | 398778220049 |
| 210 | 44100 | 9261000  | 1944810000 | 408410100000 |
| 211 | 44521 | 9393931  | 1982119441 | 418227202051 |
| 212 | 44944 | 9528128  | 2019963136 | 428232184832 |
| 213 | 45369 | 9663597  | 2058346161 | 438427732293 |
| 214 | 45796 | 9800344  | 2097273616 | 448816553824 |
| 215 | 46225 | 9938375  | 2136750625 | 459401384375 |
| 216 | 46656 | 10077696 | 2176782336 | 470184984566 |
| 217 | 47089 | 10218313 | 2217373921 | 481170140857 |
| 218 | 47524 | 10360232 | 2258530576 | 492359665568 |
| 219 | 47961 | 10503459 | 2300257521 | 503756397099 |
| 220 | 48400 | 10648000 | 2342560000 | 515363200000 |
| 221 | 48841 | 10793861 | 2385443281 | 527182965101 |
| 222 | 49284 | 10941048 | 2428912656 | 539218609632 |
| 223 | 49729 | 11089567 | 2472973441 | 551473077343 |
| 224 | 50176 | 11239424 | 2517630976 | 563949338624 |
| 225 | 50625 | 11390628 | 2562890625 | 576650390625 |
| 226 | 51076 | 11543176 | 2608757776 | 589579257376 |
| 227 | 51529 | 11697083 | 2655237841 | 602738989907 |
| 228 | 51984 | 11852352 | 2702336256 | 616132666368 |
| 229 | 52441 | 12008989 | 2750058481 | 629763392149 |
| 230 | 52900 | 12167000 | 2798410000 | 643634300000 |
| 231 | 53361 | 12326391 | 2847396321 | 657748550151 |
| 232 | 53824 | 12487168 | 2897022976 | 672109330432 |
| 233 | 54289 | 12649337 | 2947295521 | 686719856393 |
| 234 | 54756 | 12812904 | 2998219536 | 701583371424 |
| 235 | 55225 | 12977875 | 3049800625 | 716703246875 |
| 236 | 55696 | 13144256 | 3102044416 | 732082482176 |

|     | Radici | Quadrati | Cubi       | Quadrati quadr. | Relati |
|-----|--------|----------|------------|-----------------|--------|
| 237 | 56169  | 13312053 | 3154956561 | 747724704957    |        |
| 238 | 56644  | 13481272 | 3208542736 | 763633171168    |        |
| 239 | 57121  | 13551919 | 3262808641 | 779811265199    |        |
| 240 | 57600  | 13824000 | 3317760000 | 796262400000    |        |
| 241 | 58081  | 13997521 | 3373402561 | 812990017201    |        |
| 242 | 58564  | 14172488 | 3429742096 | 829997587232    |        |
| 243 | 59049  | 14348907 | 3486784401 | 847288609443    |        |
| 244 | 59536  | 14526784 | 3544535296 | 864866612224    |        |
| 245 | 60025  | 14706125 | 3603000625 | 882735153125    |        |
| 246 | 60516  | 14886936 | 3662186256 | 900897818976    |        |
| 247 | 61009  | 15069223 | 3722098081 | 919358226007    |        |
| 248 | 61504  | 15252992 | 3782742016 | 938120019968    |        |
| 249 | 62001  | 15438249 | 3844124001 | 957186876249    |        |
| 250 | 62500  | 15625000 | 3906250000 | 976562500000    |        |

## DISTINZIONE SECONDA

Della proporzione, e proporzionalità, e loro operazioni.

*Del trovare i mezzi proporzionali, e l'ascendente della proporzione per via d'estrazzioni di radici, e di molti quesiti per esse risolti, e finalmente delle proposizioni del quadrato, del cubo, del quadrato quadrato, del relato primo &c.*

1. **L**A ragione è una vicendevole relazione di due quantità di un medesimo genere, come di linea a linea, di numero a numero.
2. La proporzione è una somiglianza di ragioni comparando due quantità fra se. Come 2. ad 1. e 4. a 2.
3. La proporzione si divide in razionale, ed in irrazionale.
4. La razionale può essere sempre espressa con numeri, quale è la proporzione di una linea di palmi 4. ad una linea di palmi 2.
5. L'irrazionale poi non può essere significata con numeri, come è la proporzione del lato del quadrato al suo diametro.
6. La proporzione pure si divide, ed è altra di uguaglianza, che li trova fra quantità uguali come fra 5. e 5. 7. Al-

7. Altra disuguaglianza, che si trova fra quantità disuguali, come fra 7. e 3. fra 5. e 10.
8. Questa è di maggiore, o di minore disuguaglianza. Di maggiore, quando la maggior quantità si compara con la minore, quale è la proposizione di 6. a 3.
9. Di minor disuguaglianza, quando la minore si compara con la maggiore quantità, come 3. a 6.
10. La proporzione razionale di maggiore di uguaglianza è di cinque generi, cioè moltiplice, sopraparticolare, sopraparziante, moltiplice sopraparticolare, e moltiplice sopraparziante.
11. Nelli medesimi generi è divisa la proporzione razionale di minore disuguaglianza con l'aggiunta della proposizione sotto, come sotto moltiplice &c. Ma perchè tali proporzioni si dicono più brevemente con lasciare alcuni termini latini con quelli si esplicheranno.
12. La proporzione moltiplice, è quando il numero maggiore antecedente contiene appunto alcune volte il numero minore seguente come da 2. a 1. è proporzione doppia, da 3. a 1. tripla, da 8. a 2. quadrupla &c. Partendo il numero antecedente per il seguente si averà il denominatore della proporzione. Come partendo 8. per 2. viene 4. che denomina quadrupla tal proporzione.
13. La sopraparticolare è quando il numero maggiore antecedente contiene il minore seguente una volta sola, e di più una sua parte. Come da 3. a 2. ovvero da 9. a 6. è proporzione sesquialtera. Da 4. a 3. ovvero da 16. a 12. è sesquiterza, da 5. a 4. ovvero da 15. a 12. sesquiquarta &c. I denominatori sono  $1\frac{1}{2}$ ,  $1\frac{2}{3}$ , ed  $1\frac{3}{4}$ .
14. La sopraparziante è quando il numero maggiore antecedente contiene una volta sola il minore seguente, e di più alcune sue parti. Come da 5. a 3. è proporzione soprabiparziante le terze, da 7. a 4. sopratriparziante le quarte. I denominatori sono  $1\frac{2}{3}$ , e  $1\frac{3}{4}$ .
15. La moltiplice sopraparticolare è, quando il numero maggiore antecedente contiene più volte il minore, e di più alcuna sua parte: Come da 5. a 2. ovvero da 20. a 8. è proporzione doppia sesquialtera, da 13. a 4. tripla sesquiquarta; da 31. a 5. quadrupla sesquiquinta. I denominatori sono  $2\frac{3}{4}$ ,  $3\frac{1}{2}$ , e  $4\frac{1}{5}$ .
16. L'ultima moltiplice sopraparziante è quando il maggior numero antecedente contiene alcune volte il minore seguente, e di più alcune sue parti, come da 8. a 3. si dice doppia soprabiparziante le

ter-

terze; da 28. à 5. si dice quintupla sopratriparsiente le quinte.  
Da 67. à 9. settupla quatriparziente le none. I denominatori sono  $2\frac{1}{2}$ ,  $5\frac{1}{2}$ , e  $7\frac{1}{2}$ .

17. Se la comparazione si fa al contrario, dal minor numero al maggiore, allora la proporzione è di minore disuguaglianza, ed alla denominazione della proporzione, si pone avanti la preposizione sub: come subtripla, subsesquialtera &c. come si è detto di sopra.

18. Quando le proporzioni hanno il medesimo denominatore, sono uguali; come 2. à 1. e 8. à 4. Quella poi è maggiore, che ha maggiore denominatore; come la tripla è maggior della doppia.

### *Del sommare le Proporzioni.*

19. Li termini antecedenti tra di loro si moltiplicano, il prodotto è il termine antecedente, così li termini susseguenti si moltiplicano, il prodotto è il termine susseguente della proporzione, che risulta.

#### *A Sommare*

3. à 2. Sesquialtera    1. à 4. Subquadrupla    3. à 1. Tripla  
Con 4. à 3. Sesquiterza    3. à 1. Tripla    1. à 3. Subtripla

Ha 12. à 6. Doppia    3. à 4. Subsесquiterza    3. à 3. uguale

### *Del sottrarre le Proporzioni.*

20. Il termine antecedente di una si moltiplica per il susseguente dell'altra, che si sottra, viene l'antecedente; ancora si moltiplica il susseguente con l'antecedente in croce, e viene il susseguente termine della proporzione restata, come ne i seguenti esempi.

#### *A Sottrarre*

Da 4. à 1. Quadrupla    Da 2. à 1. Doppia

**X**

3. à 1. Tripla

3. à 1. Tripla

Resta 4. à 3. Sesquiterza    Resta 2. à 3. Subsесquialtera

### *Del moltiplicare le Proporzioni per numeri interi.*

21. Li termini della proporzione si riducono à quadrato, ed è moltiplicata per 2. li riducono à cubo, ed è moltiplicata per 3. si riducono à quadrato quadrato, ed è moltiplicata per 4. &c. come volendo moltiplicare per 4. la sesquialtera 3. à 2. fa 81. à 16. cioè quinta sesquiesdecima.

E e e e

*Del*

*Del moltiplicare le Proporzioni per rotto.*

22. Volendo moltiplicare la venuta proporzione 81. à 16 per  $\frac{1}{3}$ . si riducono li termini 81. e 16. à cubo perchè il numeratore del sotto è 3. esponente del cubo, sono 531441. e 4096. da quali si cava la radice quadrata quadrata per il denominatore del rotto 4. esponente di tal radice, come si hà dalla tavola posta nel principio di questo Trattato, e si hanno 27. à 8. proporzione tripla supertriparziante l'ottave.

*Del partire le proporzioni per numero intiero.*

23. Volendo partire per 2. si cava da termini della proporzione la radice quadra; volendo partire per 3. si cava la radice cuba, per 4. la radice quadrata quadrata &c. Come 256. à 81. si parta per 4. viene 4. à 3. cioè tripla sesquialtera, essendo il 4. radice quad. quad. di 256 siccome il 3. del 81. per operazione contraria al moltiplicare.

*Del partire le Proporzioni per rotto.*

24. Volendo partire la proporzione 27. à 8. per  $\frac{1}{3}$ . si riducono 27. e 8. à quadrati quadrati 531441. e 4096. per il denominatore 4. esponente di tal radice, siccome da essi si cava la radice cuba per il numeratore 3. esponente di tal radice, e risulta 81. à 16. per tal partire.

*Del partire la Proporzione per altra Proporzione.*

25. Quando la proporzione si divide per numero astratto, risulta sempre proporzione per quoziente, ma dividendo proporzione per proporzione, risulta numero, e non proporzione. Ora per fare ciò si sottra la proporzione dividente dalla proporzione da partirsi, sino che venga uguaglianza, o si muti specie di proporzione, e quante volte si fa il sottrarre, tante unità contiene il numero quoziente, che risulta, come volendo partire 729. à 64. per la proporzione sesquialtera 3. à 2. si dispongono le Proporzioni come qui si vedono. Si moltiplicano in croce, i prodotti si schifano, e sotto di nuovo si pone la propor-

729. à 64

3. à 2

Primo resto 1458. à 192  
cioè 243. à 33Secondo resto 486. à 96  
cioè 81. à 16Terzo resto 162. à 48  
cioè 27. à 8Quarto resto 54. à 24  
sic-



zione dividente 3: à 2. fino 3.  
che i prodotti sono uguali, e  
perchè il sottrarre si è fatto 6.  
volte, il quoziente di tal par-  
tire è 6. per il che se si mol-  
tiplicherà la proporzione se-  
quentera 3. à 2. per 6. verrà  
l'altra proporzione partita  
729. à 64.

$$\begin{array}{r} 271 \\ \text{cioè } 9 \times 3 \text{ à } 4 \\ \quad \quad \quad 3 \times 3 \text{ à } 2 \\ \hline \end{array}$$

Quinto resto 18. à 12

$$\begin{array}{r} \text{cioè } 3 \times 3 \text{ à } 2 \\ \quad \quad \quad 3 \times 3 \text{ à } 2 \\ \hline 6 \text{ à } 6 \\ \text{Uguaglianza} \end{array}$$

26. Nel partire 2187. à  
128. per 37. à 8. non  
viene uguaglianza, ma  
dopo la seconda sot-  
trazione si muta gene-  
re di proporzione di  
maggiore in minore di  
uguaglianza, però non  
si doveva fare la terza  
sottrazione. Le due  
sottrazioni danno 2.  
di quoziente, e resta 3.  
à 2. che è la terza parte  
di 27. à 8. e per questo tutto il quoziente è  $2\frac{1}{3}$ . sicchè fra quelle  
due proporzioni è proporzione doppia sesquiterza.

$$\begin{array}{r} 2187 \times 3 \text{ à } 128 \\ 27 \times 3 \text{ à } 8 \\ \hline \end{array}$$

Resto 17496 à 3456

$$\begin{array}{r} \text{cioè } 81 \times 3 \text{ à } 16 \\ \quad \quad \quad 27 \times 3 \text{ à } 8 \\ \hline \end{array}$$

Resto 648 à 432

$$\begin{array}{r} \text{cioè } 3 \times 3 \text{ à } 2 \\ \quad \quad \quad 27 \times 3 \text{ à } 8 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 24 \text{ à } 54 \\ \text{cioè } 4 \text{ à } 9 \end{array}$$

27. Posto qualsivoglia ordine di numeri, la proporzione, che è fra  
gl'estremi numeri, costa della somma di tutte le proporzioni di  
mezzo: Come 3. 5. 6. 8. 12. 13. 14. la proporzione di 3. à 14. è la  
medesima, che raccolta da 5. à 3. da 6. à 5. da 8. à 6. da 12. à  
8. da 13. à 12. e da 14. à 13. perchè la lor somma importa que-  
sta proporzione 524160. à 112320. cioè 14. à 3. con lo schifo.

28. La proporzione razionale si dice intiera, siccome l'irrazionale  
è rotta, essendo minuzia di qualche proporzione intiera, che na-  
sce sovète dal partirsi la proporzione per numero. La proporzio-  
ne di numero razionale à numero razionale è razionale; la pro-  
porzione di numero irrazionale à numero irrazionale può essere  
razionale: Come rad. sorda q. 6. à rad. sorda q. 24. ha proporzione  
doppia: Ma la proporzione di numero razionale à numero irra-  
zionale, sempre è irrazionale.

#### Della Proporzionalità.

29. La proporzionalità è una comparazione di proporzioni, come  
6. à 3. così 8. à 4. questa è discreta, e discontinua.

E c e c e 2

Quan-

Quando poi il medesimo numero è conseguente, ed antecedente è continua. Come 1. à 2. e 2. à 4. e questa si ritrova nelle progressioni geometriche, dove ciascun termine, che non sia il primo, ne l'ultimo, è conseguente, e poi antecedente all'altro, che ne segue: Come 1. 3. 9. 27. 81. il 3. è conseguente del 1. ed antecedente del 9. &c.

30. Di tre forti è la proporzionalità, Arimmetica, geometrica, ed armonica. L'Arimmetica consiste nelle differenze uguali, come 3. à 5. è 8. à 10. ed hà le proporzioni de termini disuguali. La geometrica hà le differenze disuguali fra se, e le proporzioni de termini uguali, come 2. à 5. è 4. à 10. di queste due si è trattato à bastanza ai suoi luoghi, però si passa alla terza.

31. La proporzionalità armonica hà disuguali differenze, e disuguali proporzioni de termini, i quali almeno sono tre, per esempio, 6. 4. 3. e tale è la proporzione degl' estremi, cioè di 6. à 3. quale è la differenza del primo al secondo alla differenza del secondo al terzo, cioè di 2. ad 1.

32. Per costituire tre termini di proporzionalità armonica si pigliano tre termini di qualsivisia Progressione Arimmetica, come 2. 3. e 4. si moltiplica il primo via il secondo, il primo via il terzo, ed il secondo via il terzo, li prodotti 6. 8. e 12. sono termini armonici, che presi al contrario, così stà 12. à 6. come 4. differenza à 2. seconda differenza in proporzione doppia, come ne termini Arimmetici era 4. à 2. medesimamente 5. 3. 1. termini di Progressione Arimmetica sono armonici 15. 5. 3. in proporzione quintupla, come 5. ad 1. e così degl'altri.

*Sapendo il primo, e terzo termine armonico trovar quello di mezzo.*

33. Sia il primo 6. il terzo 3. in proporzione doppia, dal 6. si sottra 3. resta 3. che si parte per il denominatore della proporzione più 1. cioè per 3. viene 1. che si aggiunge al terzo 3. fa 4. per il termine di mezzo, e così sempre.

*Sapendo il primo, e secondo trovare il terzo termine armonico.*

34. Sia il primo 15. il secondo 5. questo si sottra da 15. resta 10. che si somma con 15. fa 25. per il quale si parte 50. prodotto di 10. restato via il secondo 5. viene 2. che si sottra dall'istesso 5. resta 3. per il terzo termine. In altro modo, si sottra 5. da 15. restato che si aggiunge à 15. fa 25. per questo si parte 75. prodotto di 15. primo via 5. secondo, viene 3. terzo. termine armonico.

*Sapendo il secondo, e terzo trovare il primo termine armonico.*

35. Sia il secondo 15. e il terzo 12. questo si sottra da 15. resta 3. che si moltiplica via 15. fa 45. che si parte per 9. differenza dall'3. resta

restito a 12. viene 5. che si aggiunge a 15. secondo, e viene 20. primo cercato.

*Della proporzionalità contrarmonica.*

36. La proporzionalità contrarmonica è una disposizione di tre numeri secondo la proporzionalità contigua, con la quale la proporzione della prima differenza all'altra è la medesima, che pro-

2 1

porzione del maggiore estremo al minore, come 3. 5. 6

37. La contrarmonica si ha dall'armonica, imperocchè mutate le differenze nella proporzionalità armonica, subito si ha la mutazione del termine di mezzo, come si può osservare.

1 2 2 1

Armonici 3. 4. 6. Contrarmonici 3. 5. 6.

*Sapendo il secondo, e terzo termine contrarmonico trovare il primo.*

38. Sia il terzo 3. il secondo 5. si quadra  $2\frac{2}{3}$ . metà di 5. fa  $6\frac{1}{2}$ . al quale si aggiunge 6. prodotto di 2. differenza da 3. a 5. via 3. terzo fa  $12\frac{1}{2}$ . del quale la radice quadra  $3\frac{1}{2}$ . si aggiunge a  $2\frac{1}{2}$ . metà di 5. fa 6. per il primo termine contrarmonico.

*Sapendo il primo, e secondo termine contrarmonico trovare il terzo.*

39. Sia il primo 6. e 5. il secondo, la loro differenza 1. si moltiplica via 6. primo fa 6. che si sottra da  $6\frac{1}{2}$ . quadrato di  $2\frac{1}{2}$ . metà di 5. secondo, resta  $\frac{1}{2}$ . la di cui radice quadra  $\frac{1}{2}$ . si aggiunge a  $2\frac{1}{2}$ . metà di 5. viene 3. terzo termine armonico.

*Sapendo il primo, ed il terzo termine armonico trovare il secondo.*

40. Sia il primo 6. il terzo 3. si divida la loro differenza 3. nella proporzione, che sono fra loro 6. e 3. per fare tal divisione si som. 6. e 3. fa 9. però si dica, se 9. fusse 3. che sarebbe 6. sarebbe 2. che sarebbe 3? sarebbe 1. Ora si somma 2. con 3. terzo fa 5. termine mezzano o secondo. Ovvero si sottra 1. da 6. primo, resta pure 5. per il secondo termine contrarmonico.

Sia ancora il primo 40. il terzo 24. si sottra questo da 40. resta 16. che si divide in 10. e 6. che sta come 40. a 24. il 10. si aggiunge a 24. ovvero si sottra 6. da 40. nell'uno, o nell'altro modo si averà 34. secondo termine armonico. In altro modo, si sottra 24. da 40. resta 16. che si parte per  $2\frac{1}{2}$ . cioè per uno più, che il denominatore della proporzione, viene 6. che si sottra da 40. e resta 34. per il secondo termine contrarmonico.

*Del*

*Del trovare i mezzi proporzionali, e l'ascendente della porzione per l'estrazione delle radici.*

Avanti di proporre alcuni quesiti, ne i quali si ricerca l'estrazione delle radici di sopra insegnate voglio mostrare una pratica di trovare i mezzi proporzionali con l'ascendente della proporzione.

41. Sono tre numeri proporzionali, de quali il primo è 7: ed il terzo 63. Si domanda il secondo numero proporzionale, e l'ascendente.

Si moltiplica il primo 7. via il terzo 63. dal prodotto 441. si estraе la radice quadrata 21. e questo è il secondo proporzionale per la 16. del lib. 6. d'Euclide. Si parte 21. per 7. 3. numero ascendente, e denominatore della proporzione.

42. Sono quattro numeri proporzionali, de quali il primo è 2. ed il quarto 54. Si domanda il secondo, e il numero ascendente?

Al numero 55. si mostrò la pratica di trovare le due linee proporzionali fra la prima, e quarta. Ora per trovare i due numeri mezzi proporzionali fra il primo, e quarto corrispondenti a quadrato, e cubo; Si quadra il primo 2. fa 4. per questo si moltiplica il quarto 54. dal prodotto 216. si cava la radice cuba, che è 6. numero secondo proporzionale, che si parte per il primo 2. viene 3. num. ascendente, per il quale si moltiplica 6. ovvero si parte 54. viene 18. terzo numero proporzionale.

43. Sono cinque numeri proporzionali, de quali il primo è 3. il quinto 768. Si domanda il secondo, e l'ascendente.

Essendo tre mezzi proporzionali corrispondenti a quadrato, a cubo, e a quadrato quadrato; Il primo 3. si riduce alla penultima dignità cioè a cubo, che è 27. per il quale si moltiplica il quinto 768. fa 20736. e da questo si cava la radice quadrata quadrata che è 12. secondo numero proporzionale, che si parte per il primo 3. viene 4. ascendente, onde per 4. moltiplicando 12. viene 48. terzo, e moltiplicando 48. viene 192. quarto, il quale pur si aveva con partire per 4. il quinto 768. ed il 48. con partire 192. E da avvertire, che ogni volta si hanno due numeri immediati proporzionali con partire il seguente per l'antecedente, risulta l'ascendente della Progressione, e il denominatore della proporzione.

44. Sono sei numeri proporzionali, de quali il primo è 2. ed il sesto 6250. Si domanda il secondo, e gli altri.

Li quattro numeri mezzi proporzionali corrispondono al quadrato, al cubo, al quadrato quadrato, ed al relato; però il primo 2. si riduce al quadrato quadrato 16. per il quale si moltiplica 6250. sesto fa 100000. dal quale si cava la radice relata, che 10. secondo numero proporzionale, che si parte per 2. primo viene 5. de-

nomi-

numeratore della proporzione. Per 5. si moltiplica 10. viene 50. terzo. Questo per 5. viene 250. quarto, e questo per 5. viene 1250. quinto numero proporzionale, il quale pure si aveva con partire il sesto 6250. per 5. &c.

45. Con il medesimo ordine si segue ad operare, perchè essendo sette numeri proporzionali con sapere il primo, e l'ultimo si trova il secondo con ridurre il primo a relato, e questo con moltiplicarlo per l'ultimo, e dal prodotto con cavarne la radice quadrata cuba, il quale secondo si parte per il primo, e si trova il denominatore della proporzione, per il quale moltiplicando il secondo e poi il terzo, e gl' altri susseguentemente, si averanno tutti li numeri proporzionali, siccome ancora si averanno con partire per il medesimo denominatore della proporzione l'ultimo numero proporzionale, e poi il penultimo, e gl' altri di mano in mano fino ad averli trovati tutti,

*Del trovare il denominatore della proporzione, e per esso li mezzi proporzionali più brevemente.*

46. Essendo noti il primo, e l'ultimo de numeri continui proporzionali, si trovano i mezzi proporzionali con trovare l'ascendente, o denominatore della proporzione in questo modo.

Si parte l'ultimo per il primo, dal quoziente si cava la radice quadrata, se è un mezzo proporzionale solamente, mà essendo due si cava la radice cuba, se tre la radice quadrata quadrata, se quattro la radice relata, se cinque la radice quadrata cuba, e così si segue per ordine, e la radice cavata è l'ascendente della proporzione, per il quale si moltiplica il primo, ovvero si parte l'ultimo numero proporzionale, e viene il secondo, o il penultimo seguitando, come si è detto antecedentemente.

47. Sono tre numeri proporzionali, de quali il primo è 7. il terzo 63. si cerca il secondo.

Il 63. si parte per 7. vien 9. del quale la radice quadra 3. è il denominatore, o ascendente della proporzione, per 3. si moltiplica 7. primo numero, ovvero si parte 63. ultimo numero viene 21. numero secondo proporzionale.

48. Sono quattro numeri proporzionali, de quali il primo è 1. il quarto 54. Si domandano gl' altri due.

Il 54. si parte per 1. dal quoziente 54. si cava la radice cuba, che è 3. per la ragione della proporzione: per 3. si moltiplica il primo 1. viene il secondo 6. e questo per 3. vien il terzo 18. ovvero per 3. si parte l'ultimo 54. vien 18. terzo, questo per 3. vien 6. secondo.

49. Sono cinque numeri proporzionali, de quali il primo è 3. il quinto 768. Si domandano gl' altri tre.

Il 768. si parte per 3. dal quoziente 256. si cava la radice quadrata quadrata, che è 4. denominatore della proporzione, per 4. si moltiplica 3. vien 12. secondo, questo per 4. vien 48. terzo, e questo per 4. viene 192. quarto numero proporzionale, che si averà pure con partire 768. quinto per 4. &c.

50. Sono finalmente 17. numeri continui proporzionali, de quali il primo è 2. il decimo settimo 305175781250. si ricerca il denominatore della proporzione &c.

Il num. detto si parte per il primo 2. dal quoziente 152587890625. si cava la radice quad. quad. quad. quad. che è 5. denominatore della proporzione, per il quale moltiplicando 2. fa 10. secondo numero proporzionale, e 10. per 5. fa 50. terzo numero proporzionale in quintupla proporzione &c.

51. Per sapere, che radice va cavata, si offervi quest'ordine, perchè quanti numeri proporzionali sono, per esempio 17. tante dignità si numerano sino a tal numero, che di contro dimostra la specie di radice, che si deve cavare, cioè quad. quad. quad. quad. e se sono 10. numeri proporzionali il 10. dimostra doverli cavare la radice cuba cuba. Qui ricorda che si può cavare le radici semplici, che fanno la composta. Come da 512. la radice cuba, che è 8. e da 8. la radice cuba 2. che è radice cuba cuba di 512.

TAVOLA,  
Ed ordine delle potestà de' numeri

|    |                            |        |
|----|----------------------------|--------|
| 1  |                            | 1      |
| 2  | Radice                     | 2      |
| 3  | Quadrato                   | 4      |
| 4  | Cubo                       | 8      |
| 5  | Quadrato quadrato          | 16     |
| 6  | Relato                     | 32     |
| 7  | Quadrato cubo              | 64     |
| 8  | Secondo relato             | 128    |
| 9  | Quadrato quad. quad.       | 256    |
| 10 | Cubo Cubo                  | 512    |
| 11 | Quadrato primo relato      | 1024   |
| 12 | Terzo relato               | 2048   |
| 13 | Cubo quad. quad.           | 4096   |
| 14 | Quattro relato             | 8192   |
| 15 | Quadrato secondo relato    | 16384  |
| 16 | Cubo primo relato          | 32768  |
| 17 | Quadrato quad. quad. quad. | 65536  |
| 18 | Quinto relato              | 131072 |

|    |                               |               |
|----|-------------------------------|---------------|
| 19 | Quadrato cubo cubo            | 777<br>262144 |
| 20 | Sesto relato                  | 524288        |
| 21 | Quadrato quad. primo relato   | 1048576       |
| 22 | Cubo secondo relato           | 2097152       |
| 23 | Quadrato terzo relato         | 4194304       |
| 24 | Settimo relato                | 8388608       |
| 25 | Cubo quad. quad. quad.        | 16777216      |
| 26 | Ottavo relato                 | 33554432      |
| 27 | Quadrato quarto relato        | 67108864      |
| 28 | Cubo cubo cubo                | 134217728     |
| 29 | Quadrato quad. secondo relato | 268435456     |
| 30 | Nono relato                   | 536870912     |

*Alcune evidenze delle quantità proporzionali.*

$$x:y::z:u$$

$$x+y+z+u$$

$$y:x+z$$

52. Di quattro numeri continui proporzionali la somma del primo, e terzo sta alla somma di tutti, come il secondo alla somma del primo, e terzo; siano 3. 6. 12. 24. così stà 18. à 45. come 6. à 15.

53. Di quattro numeri continui proporzionali 3. 6. 12. 24. così stà la somma del primo, e secondo alla somma del terzo, e quarto, come il primo al terzo proporzionale, e così stà 9. à 36. come 3. à 12.

54. Di quattro numeri proporzionali 3. 6. 12. 24. così stà la somma del primo 3. e del terzo 12. cioè 15. alla somma del secondo 6. e del quarto 24. cioè à 30. come stà il primo 3. al secondo 6.

55. Di quattro numeri proporzionali continui partendo la somma, ovvero qualche altro numero per i detti numeri, li quozienti faranno proporzionali. Come 45. per 3. per 6. per 12. e per 24. vengono 15.  $7\frac{3}{4}$ .  $3\frac{1}{2}$ . e  $1\frac{1}{2}$ . proporzionali. Ovvero 24. partendo per li medesimi numeri vengono 8. 4. 2. e 1. proporzionali.

56. Di quattro numeri proporzionali il prodotto del primo via il quarto è uguale al prodotto del secondo via il terzo. Siano 3. 6. 12. 24. il primo 3. via il quarto 24. fa 72. come fa 6. secondo via 12. terzo.

57. Di quanti si vogliono numeri continui, o discontinui per esempio di quattro 3. 6. 12. 24. il quadrato della somma di tutti è uguale alla somma de prodotti del primo, secondo, terzo, e quarto via gl'altri tre rimanenti congiunta con i quadrati di tali numeri.

Della somma 45. il quadrato è 2025. uguale alla somma del prodotto 126. fatto da 3. via 42. di 134. fatto da 6. via 39. di 396. fatto da 12. via 33. di 504. fatto da 24. via 21. e de quadrati 9. 36. 144. 576. fatti da tali numeri.

FFFF

58. Di

58. Di trè numeri proporzionali, la somma de' prodotti di ciascun numero via la somma degl'altri due partita per il doppio della somma de' trè numeri, il quoziente è il secondo numero.

Sieno 3. 6. 12. la loro somma 21. e la somma de' prodotti è 252. questo si parte per 42. doppio di 21. viene 6. secondo numero. Per trovare il primo, e terzo numero: Si sottra 6. da 21. resta 15. del quale si facciano due parti, che moltiplicate frà se producano 36. quadrato di 6. secondo numero. Si piglia la metà di 15. che è  $7\frac{1}{2}$ . si moltiplica in se, cioè via  $7\frac{1}{2}$ . fa  $56\frac{1}{4}$ . dal quale si sottra 36. quadrato di 6. resta  $20\frac{1}{4}$ . dal quale si cava la radice quadra, che è  $4\frac{1}{2}$ . che si aggiunge a  $7\frac{1}{2}$ . e da questo anco si sottra, il resto 3. e la somma 12. sono le parti, che producono 36. ed i numeri primo, e terzo.

59. Di trè numeri proporzionali la somma è 93. per ciascuno de' numeri partendo 225. li quozienti risultati sono i medesimi numeri proporzionali, si cerca quali siano.

Si cava la radice quadra da 225., che è 15. secondo numero, che si sottra da 93. resta 78. del quale si fanno due parti che moltiplicate facciano 225. per la passata operando si troveranno essere 3. e 75. sicchè li trè numeri proporzionali sono 3. 15. 75.

60. Di trè numeri proporzionali, il prodotto del primo via il secondo moltiplicato via il terzo è uguale al cubo del secondo: Come 3. 6. 12. il 3. via 6. fa 18. e questo via 12. fa 216. cubo di 6. secondo numero.

61. Di trè numeri proporzionali nella ragione, che sono due altri frà loro, sempre farà il medesimo prodotto a moltiplicare il minore di due nella somma del maggiore numero de' trè proporzionali, che a moltiplicare il maggiore di due nella somma del minore, e mezzano delli trè numeri proporzionali.

Siano gli trè 3. 6. e 12. li due 5. e 10. nella medesima ragione. La somma di 6. e 12. è 18. via 5. numero minore di due fa 90. fa pure 90. la somma di 3. e 6. cioè 9. via 10. numero de due maggiore.

62. Di trè numeri proporzionali sempre tal proporzione farà dal quadrato del primo al quadrato del secondo numero, che dal primo al terzo. Come 3. 6. 12. così stà 9. a 36. che 3. a 12. Per la 17. del lib. 6. d'Euclide.

63. Di trè numeri proporzionali sapendo il primo, e secondo trovare il terzo, cioè il primo 3. secondo 6. si quadra il secondo 6. fa 36. il quale si parte per primo 3. e viene il terzo 12. per la 16. del lib. 6. d'Euclide. Ma per regola generale quando si hanno due numeri proporzionali immediati, come il primo, e secondo, o il quarto, e quinto &c. per l'antecedente si parte il seguente,



779

guente, e questo si moltiplica per il quoziente, che è il denominatore della proporzione, e verrà l' altro. Nell' esempio detto per 3. si parte 6. che si moltiplica per il quoziente 2. e viene 12. terzo numero.

64. Di tre numeri proporzionali in tripla proporzione li quadrati sommati fanno 364. Si domanda il primo numero proporzionale. Sia il primo 1. il secondo 3. il terzo 9. li loro quadrati fanno 91. per il quale si parte 364. e viene 4. la di cui radice quadrata 2. è il primo cercato.

65. Di tre numeri proporzionali sottratta la radice quadrata del primo dalla radice quadrata del terzo, ed il restato numero si moltiplica via la somma di dette radici, ed al prodotto si aggiunge il quadrato del primo, e viene il terzo numero. Allora il primo numero è 1. il secondo la radice quadrata del terzo, come 1. 4. 16.

66. Di quattro numeri continui proporzionali, il prodotto fatto dal primo via la somma de quattro numeri, aggiunto con il quadrato del primo fa il quadrato del terzo numero, come 2. 4. 8. 16. il primo 2. via 30. somma de' numeri fa 60. con 4. quadrato del primo fa 64. quadrato del terzo 8.

67. Di quattro numeri continui proporzionali la radice quadrata della somma de' due primi, sottratta dalla radice della somma del terzo, e quarto il restato numero se si moltiplica per la somma delle due radici, ne verrà sempre la differenza, che è dalla somma de' due primi, alli due ultimi, come 3. 6. 12. 24. verrà 27. per la differenza.

68. Di quattro numeri in continua proporzione se si partirà il prodotto del secondo via il quarto per il prodotto del primo via il terzo, e dal quoziente si piglia la radice quadrata sempre sarà uguale al denominatore della proporzione di detti numeri, come sieno 3. 6. 12. 24. dal partire 144. per 36. viene 4. la di cui radice 2. mostra il denominatore della proporzione doppia.

69. Di alquanti i numeri proporzionali continui sottratta la radice quadrata del primo dalla radice quadrata dell'ultimo, il numero restato se si moltiplica via la somma delle due radici fa un prodotto uguale all'altro fatto dalla somma di tutti li numeri senza l'ultimo via il numero denominatore della proporzione meno 1. siano 1. 4. 16. 64. 256. la radice di 256. è 16. dalla quale sottratto 1. radice di 1. resta 15. che moltiplicato via 17. somma di 1. e 16. fa 255. prodotto uguale all'altro fatto da 85. somma di quattro numeri senza 256. moltiplicato per 3. meno 1. di 4. numero della proporzione.

FFFFF

Questi

*Questi, ne quali si ricerca l'estrazione di alcuna radice per loro soluzione.*

70. Quattro Soldati nel dar la Scalata, essendo entrati nella Piazza nemica, sono stati rimunerati dal Capitano con una quantità di scudi. Il primo, che entrò, ricevè più scudi del Secondo, il Secondo del Terzo, ed il Terzo del Quarto in proporzione geometrica continua. Si domanda essendo stati gli scudi del Primo, e Quarto Soldato 1064. e del Secondo, e Terzo Soldato scudi 560. quanti scudi ricevè ciascuno.

Per distinguere gli scudi di ciascuno, si riduce à cubo il numero 560. fa 175616000. numero da partirsi. Ora 560. si moltiplica per 3. fa 1680. con il quale si somma 1064. numero degli scudi del Primo, e Quarto, fa 2744. per il quale si parte 175616000. e ne viene 64000. Ora si fa di 560. due parti, che moltiplicate trà se facciano 64000. si parte per 2. il num. 560. il quoziente 280. si moltiplica in se fa 78400. dal quale si sottra il detto 64000. resta 14400. del quale si piglia la radice quadra 120. che si aggiunge à 280. fa 400. scudi del Secondo Soldato, e 120. si sottra da 280 resta 160. numeri degli scudi del Terzo Soldato. Si quadra 160. fa 25600. che si parte per 400. viene 64. numero de scudi del Quarto Soldato, li quali si sottrano da 1064. restano 1000. scudi del Primo Soldato. Si poteva ancora partire 400. per 160. veniva  $2\frac{2}{5}$ . numero della proporzione, onde per esso moltiplicando 400 veniva 1000. per il Primo, e per  $2\frac{2}{5}$ . partendo 160. veniva 64. per il Quarto.

Gli numeri sono proporzionali 64. 160. 400. e 1000. onde di quattro numeri proporzionali si trova ciascun distinto, sapendosi la somma del Primo, e Quarto, e del Secondo, e Terzo per il modo detto.

71. Daniele avendo dato à guadagno sc. 640. à fare à capo d'anno à Carlo, questo dopo anni 2. restituì sc. 705  $\frac{1}{4}$ . per saldo di capitale, e guadagno. Si vuol sapere à che ragione per 100. ricevè detti sc. 640?

Si moltiplicano sc. 640. per scudi 705  $\frac{1}{4}$ . dal prodotto 451584. si cava la radice q. 672. che sono scudi di Capitale, e guadagno del primo anno, da' quali sottratti sc. 640. restano sc. 32. di guadagno. Onde per la regola del Trè: Se con sc. 640. si guadagnano sc. 32. quanti se ne guadagneranno con sc. 100? e risultano sc. 5. dall'operazione, e à ragione di sc. 5. per 100. l'anno ricevè Carlo li sc. 640. Si avverta che 672. è numero mezzo proporzionale trà 640. 705  $\frac{1}{4}$ .

72. In altro modo si opera così: per trovare à quanti denari è sta'o da-

dato à guadagno lo scudo il mese, e sarà à denaro 1. che è l'istesso che à scudi 5. per 100. l'anno. Si moltiplica 20. per 20. fa 400. il quale si moltiplica per  $705 \frac{1}{4}$ . e produce 282240. che si parte per 640. viene 441. del quale la radice q. è 21. da questo si sottra 20. che si moltiplicò da principio, resta 1. e à denaro 1. per scudo il mese furono dati à guadagno sc. 640.

Da questo modo io n'arguisco quest'altro; si moltiplichino 100. per 100. il prodotto 10000. si moltiplichino per  $705 \frac{1}{4}$ . e fa 7056000. che si parte per 640. risulta 11025. dal quale si cava la radice q. 105. e da questo si leva 100. che si quadrò da principio, resta 5. per li scudi cercati.

73. Un Ebreo avendo dato ad usura Sc. 1000 à ragione di capo di anno à Giulio. Passati anni 3. senza alcun pagamento, Giulio diede all'Ebreo Sc. 1331. restituendo il Capitale, e pagando gl'interessi. Si domanda à quanti scudi per 100. l'anno diede ad usura l'Ebreo.

Li sc. 1000. e li sc. 1000. con l'usura dopo il primo anno, e li scu. 1000. con l'usura dopo il secondo anno, e li scudi 1331. che sono li scudi 1000. con l'usura dopo il terzo anno sono numeri proporzionali; per trovare il secondo proporzionale, si quadra il primo 1000. fa 1000000. che si moltiplica per il quarto 1331. dal prodotto 1331000000. si cava la radice cuba per la 34. ovvero 37. di questo è 100. numero secondo proporzionale di scudi fra Capitale, ed usura. Ora per sapere à quanti scudi per 100. l'anno, si dice; Se 1000. tornano 100. che torneranno sc. 100. dopo un anno? e tornano scudi 110. da i quali si sottrano 100. e restano scudi 10. ed à tanti per 100. l'anno diede li suoi scudi ad usura l'Ebreo.

74. Per l'altro modo: Si riduce 20. à cubo, e 8000. che si moltiplica per 1331. fa 10648000. che si parte per 1000. viene 10648. del quale la radice cuba è 22. da questo sottratto 20. ridotto à cubo. resta 2. per li denari, che con un scudo guadagna l'Ebreo il mese à ragione di capo d'anno, per 2. si moltiplica 5. vengono sc. 10. per 100. l'anno.

Per il mio modo, si riduca 100. à cubo, sarà 1000000. che si moltiplica per 1331. il prodotto si parte per 1000. ne viene 1331000. dal quale si cava la radice cuba 110. e da questo si sottra 100. e resta 10. per li scudi cercati.

75. Per altro modo. Avendo insegnato al numero 100. di sopra à trovare il numero della proporzione sapendosi il primo, e l'ultimo proporzionale, si può sciogliere il quesito per esso. E prima nel passato, dove il primo numero fa 640. il terzo, ed ultimo 705  $\frac{1}{4}$ . que-

questo si parte per 640. ne viene  $\frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4}$ . schifato  $\frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4}$ . dal quale si cava la radice q. per la 27. di questo è  $\frac{2}{3} \frac{2}{3}$ . denominatore della proporzione, per il quale si moltiplica il primo 640. ne viene 672. numero secondo proporzionale, Capitale, e guadagno dopo il primo anno. Si può trovare 672. con partire 705  $\frac{1}{4}$ . per il medesimo  $\frac{2}{3} \frac{2}{3}$ .

Nel presente quesito per 1000. si parte 1331. viene  $\frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4}$ . da questo si cava la radice cuba, che è  $\frac{1}{2} \frac{1}{2}$ . per il denominatore della proporzione, per esso si moltiplica 1000. viene 1100. per il secondo numero proporzionale Capitale, e guadagno dopo il primo anno, e per  $\frac{1}{2} \frac{1}{2}$ . partendo 1331. quarto numero vien il terzo 1210. Capitale, e guadagno dopo il secondo anno. Da 1331. si sottra 1210. resta 121. onde per regola del Trè si dice: Con 1210. si guadagnerà 121. che si guadagnerà con 100? e si guadagneranno sc. 10. cercati.

*Caso 46. di Frà Luca à carte 181. risoluto da esso per Algebra.*

26. Uno presta a un altro lir. 6. e colui li rende in capo d'anni 2. lire 20. Domando à che ragione stette la lira il mese.

Si moltiplica 20. via 20. fa 400. e questo per le lire 20. rese per saldo fa 8000. che si parte per lire 6. viene 1333  $\frac{1}{3}$ . la radice q. di questo meno 20. mostra i denari, à ragione de' quali stette la lira il mese facendo à capo d'anno, che faranno denari 16  $\frac{1}{4}$ . poco meno.

*Caso 48. di Frà Luca, à carte 182. altrimenti concluso.*

77. Uno presta à un altro lire 25. per 5. anni à fare à capo d'anno, e non sò à che ragione la lira il mese, e in capo di 5. anni colui li rende frà Capitale, e merito lire 100. Domandasi à che ragione fù prestata la lira il mese.

Si riduce 20. à relato sarà 3200000. che si moltiplica per lire 100. il prodotto si parte per lire 25. prestate, viene 12800000. e la radice relata di questo meno 20. mostra i denari, à ragione de' quali fù prestata la lira il mese, che sono denari 6  $\frac{3}{4}$ . poco meno. Ma riducendo 100. à relato operando come hò detto, allora la radice relata di 40000000000. meno 100. mostra le lire, à ragione delle quali per 100. l'anno à fare à capo, si prestarono lire 25. che sono lire 32. poco meno.

*Questo avuto in Roma il dì 16. Luglio 1709. da risolvere.*

78. Perono dati à moltiplico sc. 1000. con patto, che ad ogni fine di anno il guadagno diventasse capitale al medesimo interesse se per l'altro anno, essendosi continuato per anni 5. Il debitore restitui

al

per 1200. il prodotto si parte per 1000. del quoziente 1200000000. la radice relata meno 100. è la ragione del guadagno per 100. che farà di Sc. 3. bajocchi 71. quattrini 2. rispondendo alla mercantile, come si disse ne i meriti à capo di anno, 54. domanda, dove son post'altri quesiti.

79. Uno ha comprato braccia 63. di roba per tanti scudi, quante sono le braccia, che comprerebbe per Sc. 28. domando quanti scudi ha speso in dette braccia 63.

Si moltiplicano braccia 63. per scudi 28. dal prodotto 1764. si estrae la radice q. che è 42. che denota li scudi spesi in braccia 63. mentre braccia 42. valerebbero scudi 28.

80. Uno compra una quantità di libbre di Cera à tanti soldi la libbra, quante sono le libbre, ed un terzo di più, e spende lire 38. soldi 8. si cerca quante libbre ne compri.

Si riducono lire 38. soldi 8. in soldi 768. Dipoi si ponga che compri lib. 1. e perche il prezzo è un terzo di più, sarà soldo  $1\frac{2}{3}$ . Ora si dice se soldo  $1\frac{2}{3}$ . vien da 1. da che verranno soldi 768? dall'operazione risulterà 576. da questo si cava la radice q. che è 24. per le libbre che compra. Il terzo di 24. è 8. che aggiunto à 24. fa 32. per li soldi spesi nella libbra, onde moltiplicando 24. per 32. tornano li soldi 768. spesi, e resta provato il quesito.

81. Un Funambolo vuol fare un volo sopra una fune, la quale attacca nell'altezza di braccia 96. d'una Torre, e l'altro capo della fune ferma nel piano lontano dalla Torre braccia 72. Si domanda quante braccia di fune saranno per il volo.

La fune così adattata forma un triangolo rettangolo, del quale si fa la base essere 72. il catetto, ò perpendicolare 96. si cerca l'Ipotenusa per la fune. Si moltiplica 72. via 72. fa 5184. ancora si moltiplica 96. via 96. fa 9216. che si somma con 5184. fa 14400. quadrato dell'Ipotenusa uguale à due quadrati della base, e del catetto per la penultima del lib. 2. d'Euclide. Onde cavando la radice q. da 14400. si trova il lato essere 120. braccia della fune per il volo.

82. Essendo per il volo braccia 120. di fune, ed essendo attaccata lontana dalla Torre braccia 72. nel suo piano. Si domandano le braccia dell'altezza della Torre, dove è attaccato l'altro capo della fune.

Dal quadrato di 120. che è 14400. come sopra, si sottra 5184. quadrato di 72. resta 9216. quadrato della perpendicolare, il suo la-

to

to 96. sono le braccia 'dell' altezza della Torre . Nel medesimo modo si troverà 72. di base per la medesima proposizione d' Euclide .

83. E' un campo , che per un lato contiene braccia 39. per il secondo braccia 42. e per il terzo braccia 45. Si domanda quante braccia quadre di terreno contenga detto Campo .

Dalla Geometria pratica si ha il modo con sommare braccia 39. 42. e 45. dalla metà 72. della somma 126. si sottrano 39. 42. 45. restano 24. 21. e 18. Ora moltiplicando 24 via 21. fa 504. e questo via 18. fa 9072. e questo finalmente via 63. fa 571536. dal quale si cava la radice q. che importa 756. braccia quadre di terreno di detto Campo . Altri modi insegno nella Geometria , senza estrazione di radice .

84. E' un rettangolo, del quale la somma de' lati importa 60. e la somma de' quadrati di tali lati 1962. Si domanda ciascuno lato da se . Si quadra 30. metà di 60. fa 900. che si raddoppia fa 1800. questo si sottra da 1962. resta 162. da 81. sua metà si piglia la radice q. 9. che si aggiunge a 30. fa 39. lato maggiore , e si sottra da 30. resta 21. lato minore del rettangolo , e così operasi in simili .

85. Sono due cubi : la somma de' loro lati importa 50. e la somma della loro superficie corporea 49400. Si domanda il lato di ciascun cubo .

Si riduce 50. a cubo 125000. del quale la quarta parte 31250. si sottra da 49400. resta 18150. che si parte per 150. prodotto di 50. via 3. per regola ferma viene 121. dal quale si cava la radice q. 11. che si leva da 25. metà di 50. resta 14. lato d' un cubo , ed 11. si aggiunge a 25. fa 36. lato dell' altro cubo , che si cercava ; e così in altre simili .

86. Tre hanno Giulj : i Giulj del primo , e secondo moltiplicati per quelli del terzo fanno 100. Del primo, e terzo per quei del secondo fanno 136. e del secondo , e terzo per quei del primo fanno 156. si vogliono sapere i Giulj di ciascuno distintamente .

Si divide 256. maggior prodotto , benchè si può pigliare qualsivoglia, in due parti con la differenza di 36. che è da 100. a 136. altri due prodotti ; il che si fa facilmente levando 36. da 156. resta 120. la metà 60. è una parte , l' altra 96. somma di 60. è 36. Si moltiplica una parte 60. via l' altra 96. fa 5760. che si parte per 40. differenza da 60. a 100. primo prodotto, ovvero da 96. a 136. secondo prodotto , risulta 144. del quale la radice q. 12. è il numero de' Giulj del primo ; per 12. si parte 96. maggior parte risulta 8. del secondo , e per l'istesso 12. si parte 60. minor parte di 156. risulta 5. del terzo . Diofanto lib. 4. quest. 16.

87. E'

87. E' un Campo , che contiene di superficie braccia quadre 616 convertendosi in cerchio uguale, secondo la pratica di Archimede , quante braccia sarà di diametro ?

Si moltiplica 616. per 14. il prodotto 8624. si parte per 11. dal quoziente 784. si cava la radice quadra , che è 28. per le braccia del diametro .

Ovvero à 616. si aggiungono i suoi  $\frac{1}{4}$ . cioè 168. dalla somma 784 si cava la radice q. 28. per il diametro . Si prova , un cerchio ha di diametro braccia 28. Si domanda quante braccia quadre conterrà la sua superficie .

Si moltiplica 28. via 28. fa 784. il quale si moltiplica per 11. il prodotto 8624. si parte per 14. e vengono 616. braccia quadre di superficie di detto cerchio . Ovvero da 784. si levano li suoi  $\frac{1}{4}$ . restano 616. braccia &c.

88. In altro modo si trova il diametro 28. Si trova la superficie d'un cerchio , del quale il diametro sia 7. moltiplicandolo in se fa 49. e questo per 11. e partendo il prodotto per 14. vengono braccia  $38\frac{2}{3}$ , di superficie di tal cerchio, e dovevano essere 616. però queste si partono per  $38\frac{2}{3}$ . risulta 16. del quale la radice q. 4. si moltiplica per 7. diametro posto fa 28. diametro cercato .

89. Sono tre sfere disuguali , l'Asse , ò Diametro della prima è 18. della seconda è 14. è della terza 7. Si domanda il diametro di una quarta sfera uguale in solidità alle tre dette sfere .

Si riducono 18. 14. e 7. à cubi 5832. 2744. e 343. li quali si sommano dalla somma 8919. si cava la radice cuba propinqua per le regole date , è 20  $\frac{7}{8}$ . e tanto sarà il diametro della quarta sfera uguale in solidità alle tre poposte .

90. Per prova , la somma delle solidità delle tre sfere deve essere uguale alla solidità della quarta sfera .

Per trovare la solidità della sfera , l'Asse; ò diametro di essa si moltiplica per 3  $\frac{1}{2}$ . viene la Circonferenza del Cerchio massimo , la quale Circonferenza si moltiplica per il diametro , il prodotto si parte per 4. risulta la superficie del Cerchio massimo: La superficie si moltiplica per il raggio della sfera; ò metà dell'Asse, al prodotto si aggiunge il suo terzo , partendo per 3. e sommando , e viene la solidità della sfera .

|   |                    |
|---|--------------------|
| Della Sfera , della quale il Diametro è 18. la solidità | 3054 $\frac{3}{4}$ |
| Della Sfera , della quale il Diametro è 14. la solidità | 1437 $\frac{1}{2}$ |
| Della Sfera , della quale il Diametro è 7. la solidità  | 179 $\frac{1}{8}$  |
|   | <hr/>              |
| Somma   | 4672               |

Della Sfera  $\frac{1}{2}$  della quale il Diametro è 20  $\frac{7}{8}$ . la solid. 4673  $\frac{1}{2}$  .  
 G g g g g La diffe-

La differenza di 1. po co più nasce dal diametro della quarta sfera preso razionale, quando non è. Onde volendo una quarta sfera uguale appunto a trè differenti, si pigliano di queste i Diametri 10. 8. e 6. li cubi 1000. 512. e 216. si sommano; dalla somma 1728. si cava la radice cuba 12. per il Diametro di misure razionali della quarta Sfera uguale appunto alle trè dette.

91. Si prova con trovare la solidità della quarta Sfera in altro modo. Il cubo di 12. Diametro, che è 1728. si moltiplica per 11. il prodotto 19008. si parte per 21. secondo Archimede, e risulta  $905\frac{2}{3}$ . per la solidità della quarta Sfera. Cost della prima farà  $523\frac{1}{2}$ . della seconda  $268\frac{1}{2}$ . della terza  $113\frac{2}{3}$ . sommate queste trè solidità fanno  $905\frac{2}{3}$ . solidità della quarta Sfera.

92. Qui avverto non essere possibile di due Sfere di Diametro di misure razionali fare una terza Sfera di Diametro di misure razionali, come si è fatta la quarta di trè. La ragione di questo è, perchè non si danno due numeri cubi, de' quali la somma sia numero cubo, come si danno 3. Tuttavia due quantità cube sorde si danno, che sommate fanno numero cubo, come sono queste da me trovate, cioè 108. più radice q. di 7480.  $\frac{2}{3}\frac{2}{3}$ . e 108. meno radice q. di 7480  $\frac{2}{3}\frac{2}{3}$ . la somma delle quali è 216. numero cubo, che la sua radice è 6. della prima quantità la radice cuba è 4. più rad. q.  $3\frac{2}{3}$ . e della seconda è 4. meno rad. q.  $3\frac{2}{3}$ . la loro somma 8. Per lo che non è assolutamente vero quello, che dice il Signor Pietro de Fermat alla Questione 8. del lib. 2. di Diofanto, il numero cubo non poterli dividere in due cubi, potendosi dividere di misure irrazionali, come si divide qualsivia numero da Matematici *media*, & *extrema ratione*, venendo sempre le parti con radici sorde. Di più Diofanto nella prima questione del libro 4. insegna à dividere un dato numero in due cubi; de' quali sia data la somma de' loro lati, e non eccettua il numero cubo, dunque si può dividere, benchè i cubi siano di quantità irrazionale, ne quali viene diviso.

93. D'una Sfera, l'Asse, è Diametro della quale è 28. Si domanda facendosi di detta Sfera un cubo, quanto sarà il suo lato.

Si trova la solidità della Sfera con moltiplicare 28. via 28. ed il prodotto 784. di nuovo via 28. fa 21952. Ora per regola di Archimede 21952. si moltiplica per 11. ed il prodotto si parte per 21. risulta  $11498\frac{2}{3}$ . solidità di detta Sfera, la radice cuba sorda di tal numero è il lato del cubo, e propinqua è  $22\frac{1}{2}\frac{1}{2}$ . talmente che riducendola à cubo eccederà di poco rotto  $11498\frac{2}{3}$ .

94. Trè Fratelli hanno ereditato una quantità di scudi. Il maggiore di



di sua parte hà avuto feudi 720. li quali moltiplicati per quei del mezzano, e il prodotto per quei del minor fratello fanno 110592000. Si domanda effendo le trè quantità de' feudi frà se proporzionali, quanti feudi ereditò il mezzano, & il minore.

Si cava la radice cuba da 110592000. che è 480. secondo numero proporzionale, e feudi del mezzano 480. si moltiplica in se quadrandolo fa 230400. che si parte per 720. feudi del primo, e risulta 320. numero degli feudi del minore; sicchè il mezzano ereditò feudi 480. il minore feudi 320. che si cercavano. Il quesito si poteva proporre così:

95. Trè si sono ripartiti frà se alquanti feudi in proporzione sesquialtera. Quelli del primo moltiplicati per li feudi del secondo, & il prodotto per quei del terzo fecero 110592000. Domandasi la quantità degli feudi di ciascuno.

Di 110592000. la radice cuba 480. numero secondo proporzionale si parte per  $1\frac{2}{3}$ . denominatore della proporzione, viene 320. terzo e dipoi 480. si moltiplica per  $1\frac{2}{3}$ . e produce 720. primo numero proporzionale.

96. Trè avendo fatto acquisto di una quantità di feudi, il primo ebbe il terzo, il secondo il quarto, & il terzo il sesto di quelli feudi, & i restati feudi furono donati ad una Chiesa. Si vuol sapere li feudi di ciascuno, e li donati, sapendosi, che moltiplicati gli feudi del primo per quei del secondo, & il prodotto per quei del terzo fecero 139968.

Si moltiplicano i denominatori delle parti 3. via 4. fa 12. e questo via 6. fa 72. e questo via 139968. produce 10077696. dal quale si cava la radice cuba 216. per li feudi acquistati, de' quali il terzo sono feudi 72. del primo, il quarto feudi 54. del secondo, il sesto feudi 36. del terzo, e feudi 54. che avanzano sono li donati alla Chiesa. La prova è moltiplicare 72. via 54. il prodotto 3888. via 36. e farà 139968. numero detto.

97. Un prencipe hà donato à persone diverse cinque quantità proporzionali di feudi. Alla meno meritevole hà donato feudi 250. alla più meritevole Sc. 5856  $\frac{2}{3}$ . Si domanda quanti feudi hà donato all' altre.

Sono cinque numeri proporzionali, de quali si sa il primo 250. e il quinto 5856  $\frac{2}{3}$ . si cercano gl' altri trè.

Si riduce à cube 250. & è 15625000. che si moltiplica per 5856  $\frac{2}{3}$ . fa 91506250000. dal quale si cava la radice q. q. 550. Ovvero prima si cava la radice q. 302500. e da questa di nuovo si cava la radice q. 550. che è il secondo numero, il quale si parte per 250. numero primo, viene 2  $\frac{2}{3}$ . denominatore della proporzione, per

G g g g 2

2  $\frac{2}{3}$ . si

2  $\frac{7}{8}$ . si moltiplica 550. viene 1210. terzo numero, e questo per il medesimo 2  $\frac{7}{8}$ . produce 2662. quarto numero; e tanti scudi donò a quelle persone il Prencipe:

98. Uno comprò libbre 15. di cera, e le pagò tanti giulj, di modo che un' altro avrebbe pagato giulj 1521. alla medesima ragione, in tal numero di libbre di cera, quanto fù il numero prodotto da lib. 15. via il num. de' Giulj loro prezzo. Si domanda con questo, quanti giulj spese nelle dette lib. 15. di cera?

R. Il quesito si può sciogliere per doppia falsa posizione, più brevemente per Algebra, tuttavia più speditamente cavando la radice quadra da 1521. che è 39. numero di giulj cercati, e moltiplicando 39. via 15. risultano 585. numero terzo libbre di cera, che costano li detti giulj 1521. dal che si deduce, che essendo il numero terzo della regola del Trè prodotto del primo via il secondo numero, il quarto è il quadrato del secondo numero. In altro esempio canne 3. di panno costano scudi 7. che costeranno canne 21? che è il prodotto di 3. via 7. e verranno scudi 49 quadrato di 7. &c.

99. Dato qualsivoglia numero maggiore di 2. trovarne un' altro, che la somma de' loro quadrati sia numero quadrato.

Regola per il numero pari è pigliare la metà dell' antecedente, e del susseguente numero pari, e moltiplicarle, il prodotto sarà il cercato numero: Per esempio il dato numero sia 6. la metà dell' antecedente numero pari 4. è 2. e del susseguente numero pari 8. è 4. il prodotto 8. di 2. via 4. è il cercato numero. Il quadrato di 6. è 36. di 8. è 64. la somma di 36. e 64. è 100. numero quadrato, la cui radice è 10. si noti, che la radice sempre è più 2. del numero maggiore, che si ha dalla somma de' quadrati, e così 10. e più 2. di 8. e così in tutti gl' altri.

Regola seconda per il numero dispari è moltiplicare la metà del numero antecedente pari, via il numero susseguente pari, o al contrario, il prodotto è il cercato numero: per esempio, sia 5. la metà di 4. antecedente pari è 2. e il susseguente pari è 6. il prodotto 12. è il numero cercato prodotto di 2. via 6. & al contrario di 3. via 4. Il quadrato di 5. è 25. e di 12. è 144. la somma di 25. è 144. è 169. numero quadrato, la cui radice è 13. più 1. sempre del numero maggiore 12. e così degl' altri.

100. Si trovino quattro numeri, de' quali il primo al secondo sia maggiore, che il terzo al quarto, e che la somma de' Quadrati del primo, e secondo sia quadrato, siccome la somma de' quadrati del terzo, e quarto sia quadrato, e il prodotto de' i quattro così trovati sia pure numero quadrato.

Per

ne cominciando dal 3. 4. 5. &c. nella seconda si pongano li corrispondenti di modo, che la somma de' quadrati de' due corrispondenti sia numero quadrato per le regole dell'antecedente, e nella terza si pongano li prodotti fatti da' numeri corrispondenti. Ora di tali prodotti si osserva quasi sono quei due, che moltiplicati facciano numero quadrato, acciò questo succeda, bisogna che l'uno all' altro abbia ragione di numero quadrato, e partendo l' uno per l' altro, il quoziente sia quadrato per la 26. del lib. 8. d'Euclide. Per facilitare tale osservazione, si parta l'uno de' prodotti, per numero quadrato, come per 4. 9. 16. &c. e se verrà per quoziente un prodotto superiore; questo con il prodotto partito moltiplicandosi farà quadrato. Si parta per 4. il terzo prodotto 60. il quoziente 15. non è tra prodotti; si lascia. Si parta 48. per 4. il quoziente 12. è il primo prodotto; Dunque 12. e 48. moltiplicati fanno 576. numero quadrato: li quattro numeri de' prodotti 12. 48. sono 3. 4. 6. 8. de' quali non si verifica la condizione messa nella domanda, che il primo al secondo sia maggiore, che il terzo al quarto, perchè 3. 4. 6. 8. sono proporzionali, si lascia. Partendo 1680. per 4. prodotto di 15. 112. viene il quoziente 420. prodotto superiore fatto da 12. via e li quattro numeri sono 12. 13. 35. e 12. che sciogliono il caso, perchè 12. a 13. è maggiore che 35. a 12. avendo anche tutte l'altre condizioni.

Parimente partendo 9828. prodotto di 27. via 364. per 9. numero quadrato viene 1092. prodotto superiore fatto da 13. via. Dunque se sono trovati altri quattro 364. 27. 84. 13. che fanno alla domanda.

Ancora partendo 6720. prodotto di 30. via 224. per 16. viene

prodotto superiore 420. fatto da 12. via 35. sicchè si sono trovati altri quattro al proposito, cioè 224. 30. 35. e 12. e prolungandosi la Tavola si troveranno altri.

Si provino li primi quattro 112. 15. 35. 12. la somma de' quadrati 12544. e 225. di 112. e 15. fa 12769. quadrato del lato 113. Pure la somma de' quadrati 1225. e 144. di 35. e 12. fa 1369. quadrato dal lato 37. finalmente il prodotto 705600. fatto dalla moltiplicazione di detti numeri è quadrato del lato 840. così si possono provare gl'altri.

101. Si trovino tre numeri quadrati, che le tre loro differenze, e le differenze de' loro lati, ò radici sieno numeri quadrati.

Lo scioglimento di questa difficilissima domanda dipende dall' antecedente. Si piglino quattro numeri già trovati 112. 15. 35. 12. e il numero maggiore sia il primo. Per trovare li lati, ò Radici de' tre quadrati cercati si dà questa regola.

La metà della differenza trà la somma de' quadrati fatti dal prodotto del primo via il terzo numero, e dal prodotto del secondo via il quarto, e la somma de' quadrati fatti dal prodotto del primo via il quarto numero, e dal prodotto del secondo via il terzo numero, è il minimo lato, ò numero.

Al quale aggiungendo il quadrato della differenza del primo, e quarto numero sopra il prodotto del secondo, e terzo numero risulta il lato mezzano, ò secondo numero radicale.

Al quale aggiunto il quadruplo del prodotto del primo, secondo, terzo, e quarto numero, viene il maggior lato, ò radice.

Si esemplifica, il prodotto del primo 112. via il terzo 35. e 3920. e del secondo 15. via il quarto 12. è 180. di 3920. il quadrato è 15366400. di 180. il quadrato è 32400. la somma di questi quadrati è 15398800. Di nuovo il prodotto del primo 112. via il quarto 12. è 1344. suo quadrato 1806336. e del secondo 15. via il terzo 35. è 525. suo quadrato 275625. la somma di questi due ultimi quadrati è 2081961. che si sottra dall'altra 15398800. resta la differenza 13316839. la dicui metà 6658419  $\frac{1}{2}$  è il minimo lato d'un quadrato cercato.

Per il secondo, il prodotto di 112. via 12. come sopra è 1344. e di 35. via 15. è 525. la loro differenza è 819. il quadrato di questa è 670761. che si aggiunge al minimo lato 6658419  $\frac{1}{2}$ . viene il lato mezzano 7329180  $\frac{1}{2}$ .

Finalmente il prodotto di 112. 15. 35. e 12. è 705600. che moltiplicato per 4. fa 2822400. che si aggiunge a 7329180  $\frac{1}{2}$ . lato mezzano, e viene il lato maggiore 10151580  $\frac{1}{2}$ . li quali lati si moltiplicano per 14. per levare il tutto, e risultano li seguenti lati  
26633678.

26633678. 2931672. e 40606322. li quali provengono in vero da questi altri quattro numeri, cioè 224. 30. 35. e 12. trovati di sopra in terzo luogo. Li quadrati di detti lati intieri sono 709352803807684. 859470188825284. e 1648873386367684. le loro differenze sono le seguenti 939520582560000. 150117385017600. e 789403197542400. che sono quadrati da lati 30651600. 12252240. e 28096320. le differenze de lati sono 2683044. 11289600. e 1397264. e sono quadrati de lati 1638. 3360. e 3738.

Da quattro numeri 364. 27. 84. e 13. dell'antecedente, vengono li tre lati  $453739664 \frac{1}{4}$ .  $459810960 \frac{1}{4}$ . e  $502739664 \frac{1}{4}$ . li quali moltiplicati per 4. fanno ancora 1814958658. 1839243840. e 2010958658. lati senza rotto, che moltiplicati in se daranno tre altri quadrati, che si cercavano.

Trovati li quattro numeri, come sopra 112. 15. 35. 12. si possono variare con pigliarne due proporzionali, lasciando gl' altri due come prima. Si pigli il doppio de' primi due, allora saranno 224. 30. 35. 12. ovvero si pigli il doppio di tutti quattro saranno 448. 60. 70. 24. e siccome si sono duplicati, si potevano triplicare, quadruplicare &c. e li quattro triplicati &c. fanno l' istesso effetto, e come ho accennato si possono triplicare due soli, come questi: 112. 15. 105. 36. il prodotto di tutti è 6350400. quadrato del lato 2520. la somma de' quadrati del terzo, e quarto è 12321. quadrato del lato 111. la somma de' quadrati del primo, e secondo è 18769. quadrato del lato 137. come si è detto di sopra. Dunque soddisfanno alla domanda antecedente, e per essi si può soddisfare a questa.

*Proposizioni del quadrato, del cubo, del quadrato quadrato del relato primo, del quadrato cubo &c.*

La proposizione del quadrato si ha da Euclide, che è la quarta del lib. 2. La proposizione del cubo Nicolò Tartaglia attribuisce a se stesso, mentre nella seconda parte lib. 2. cap. 3. num. 14. dice così.

*La causa della regola data per cavare la radice cuba è similmente quella da formare il rotto delle propinque radici cube delli numeri non cubi si può assignare da questa sottostritta proposizione non posta da Euclide, ne da altri, eccetto che da Girolamo Cardano da noi a lui mostrata, con la quale proposizione fu da me trovata la regola generale al capitulo di costà, e cubo uguale a numero, ed a molti altri suoi dependenti.*

*Se sarà una linea divisa in due parti ( come si voglia ) il cubo fatto da tutta la linea sempre sarà uguale a questi otto prodotti, ovvero solidi, cioè alli due cubi fatti da quelle due parti, insieme con quelli sei solidi delli*

delli quali trè sono contenuti da trè superficie quadrate di un de cubi, e dall'altra parte della linea divisa, e trè sono contenuti da trè superficie quadrate dell'altro cubo; e dall'altra parte della linea divisa. Tuttavia la proposizione del cubo fu trovata prima da Leonardo Pisano, come si ha da Francesco Galigai Fiorentino nell' *Arimmetica* lib. x. num. 7.

*Regola di Leonardo Pisano da trovar le radici cube.*

*secondo l'appressamento.*

Quando una linea sia divisa in due parti, sarà il cubo di ciascuna parte con trè cotanti della moltiplicazione del quadrato di ciascuna parte uguale al cubo di tutta la linea.

Questa proposizione breve è la medesima, che la Junga del Tartaglia, il quale ha letto l'*Arimmetica* del detto Galigai, mentre lo cita contro se stesso ne i meriti à capo d'anno insieme con Giovanni Sfortunati da Siena nella prima parte lib. 11. Capitolo 11. numero 3.

Onde io non so come Egli dica, che tal proposizione non sia stata » posta, che da Girolamo Cardano, e che per essere stata ignorata » dagl'antichi, e moderni Matematici non abbia potuto, ne saputo dare regola à molte sottili particolarità in Geometria, ed in » Algebra: E che Giovanni di Sacro Bosco, Giorgio Valla, F. Luca. Michele Stifelio. ed Oronzio usino altri modi fra loro diversi, » e differenti dal suo, nondimeno per la sua proposizione si potrà » assegnare la causa propinqua di tutte le varie azioni usate in ciascuno di quelli da ciascun di loro: Perchè tutti li varj modi, che » trovar si possono per eseguir tal'atto sì per vie naturali, come » Matematiche dependano dalla detta sua proposizione.

Quanta lode provenga da queste sue parole à Leonardo Pisano per tal proposizione, ciascuno lo conosce, talmente che viene purgato tutto quel biasimo, che il Tartaglia gli ha dato in farlo Autore della regola falsa di formare il rotto alle radici forde cube, data da Fra Luca; perchè al Capitolo 3. numero 2. ha detto *Fra Luca tolse tal regola da Leonardo Pisano, e Leonardo Pisano la portò d'Arabia; giudico che gl'Arabi non havessero regola generale à tale particolarità; ma molto mi maraviglio, che il detto Fra Luca non si accorgesse della falsità di tale sua notata regola, ma penso, che la copiasse senza considerazione, ed esperienza.* E viene restituito l'onore a gl'Arabi, siccome à i Greci acciati da lui d'ignoranza.

Dalla Proposizione di Leonardo Pisano, e da' numeri peculiari, e proprij delle radici assegnati da Michele Stifelio nel lib. 1. cap. v. par. 44. e posti da me al num. 10. ed 11. hanno origine, e si deducano tutte laltre Proposizioni, che si possono fare delle Potestà de' numeri, siccome si vedono fatte da me le seguenti. Il nu-

Il numero peculiare, e proprio per la  $r$  radice quadrata nella Tavola dello Stifelio è 2. onde ne formo la proposizione, che è la quarta del lib. 2. d'Euclide, a tenore di Leonardo Pisani così.

1. Quando una linea sia divisa in due parti, sarà il quadrato di ciascuna parte con 2. cotanti della prima, nella seconda parte uguale al quadrato di tutta la linea.

Quadrato di 4. — 16

Quadrato di 2. — 4

Prodotto di 4. in 2. — 8

Sia tutta la linea 6. e sia divisa in 4. ed

Prodotto di 2. in 4. — 8

in 2. Il quadrato di ciascuna parte Quadrato della linea 6. — 36  
fornato è 20. con 2. cotanti di 4. in 2. cioè di 8. è 16. il quale  
fornato con 20. fa 36. quadrato di tutta la linea 6.

*Proposizione seconda per la radice cuba, della quale i numeri propri sono 3. e 3. a tenore di quella di Leonardo Pisano.*

2. Quando una linea sia divisa in 2. parti sarà il cubo di ciascuna parte con 3. cotanti del prodotto del quadrato della prima parte nella seconda, e con 3. cotanti del prodotto del quadrato della seconda nella prima uguale al cubo di tutta la linea.

Sia la linea 6. divisa in 4. ed in 2. Il cubo delle parti è 72. li 3. cotanti del quadrato di 4. in 2. è 96. Cubo di 4. — 64  
e 3. cotanti del quadrato di 2. Cubo di 2. — 8  
in 4. è 48. sommati fanno 216. 3. cot. del quad. di 4. in 2. — 96  
cubo di tutta la linea 6. 3. cot. del quad. di 2. in 4. — 48

Cubo della linea 6. — 216

*Proposizione terza per la radice quadrata quadrata, della quale i numeri propri sono 4. 6. 4. a tenore di quella di Leonardo Pisano.*

3. Quando una linea sia divisa in due parti, sarà il quadrato quadrato di ciascuna parte con 4. cotanti del cubo della prima parte nella seconda, e con 6. cotanti del quadrato della prima nel quadrato della seconda, e con 4. cotanti del cubo della seconda nella prima, uguale a tutta la linea.

Sia tutta la linea 6. divisa Il qq. di 4. — 256  
in 4. ed in 2. Il quadrato Il qq. di 2. — 16  
quad. di 4. è 256. Il qq. 4. cot. del cubo di 4. in 2. — 512  
di 2. è 16. li 4. cotanti del 6. cot. del q. di 4. nel q. di 2. — 384  
cubo di 4. in 2. è 512. li 4. cot. del cubo di 2. in 4. — 128

6. cotanti del quadrato Quad. q. di tutta la linea 6. — 1296  
di 4. nel quadrato di 2. è 384. e 4. cotanti del cubo di 2. in 4. è 128.  
sommati i prodotti fanno 1296. per il quadrato quadrato di tutta la linea 6.

H h h h h

Propo-

*Proposizione quarta per la radice prima relata, della quale i numeri sono 5. 10. 10. 5. a tenore di quella di Leonardo Pisano.*

4. Quando una linea sia divisa in due parti, farà il Relato di ciascuna parte con 5. cotanti del quadrato quadrato della prima parte nella seconda con 10. cotanti del cubo della prima parte nel quadrato della seconda, e con 10. cotanti del cubo della seconda nel quadrato della prima parte, e con 5. cotanti del quad. quad. della seconda nella prima, uguale a tutta linea.

Sia tutta la linea 6: di. Il Relato di 4. ————— 1024  
 divisa in 4. ed in 2. Il Relato di 2. ————— 32  
 relato di 4. è 1024. 5. cot. del qq. di 4. in 2. ————— 2560  
 Il relato di 2. è 32. 10. cot. del cubo di 4. nel q. di 2. — 2560  
 li 5. cotanti del quad. 10. cot. del cubo di 2. nel q. di 4. — 1280  
 drato quadrato di 4. 5. cot. del qq. di 2. in 4. ————— 320  
 in 2. è 2560. li 10. Relato di tutta la linea 6. ————— 7776  
 cotanti del cubo di 4. nel quadrato di 2. è 1260. li 10. cotanti  
 del cubo di 2. del quadrato di 4. e 1280. finalmente li 5. cotanti  
 del quadrato quadrato di 2. in 4. è 320. li quali prodotti somma-  
 ti fanno 7776. relato di tutta la linea 6.

*Proposizione quinta per la radice quadrata cuba, della quale i numeri proprij sono 6. 15. 20. 15. 6. a tenore di quella di Leonardo Pisano.*

5. Quando una linea sia divisa in due parti farà il quadrato cubo di ciascuna parte con 6. cotanti del relato della prima parte nella seconda con 15. cotanti del quadrato quadrato della prima, nel quadrato della seconda, con 20. cotanti del cubo della prima nel cubo della seconda, con 15. cotanti del quadrato quadrato della seconda nel quadrato della prima, e con 6. cotanti del relato della seconda nella prima, uguale a tutta la linea.

Sia tutta la linea 6. Quadrato cubo di 4. ————— 4096  
 divisa in 4. ed Quadrato cubo di 2. ————— 64  
 in 2. il quadrato 6. cot. del Relato di 4. in 2. ————— 12288  
 cubo di 4. è 15. cot. del qq. di 4. nel 4. di 2. — 15360  
 4096. ed il quad. 20. cot. del cubo di 4. nel cubo di 2. 10240  
 drato cubo di 2. 15. cot. del qq. di 2. nel q. di 4. — 3840  
 è 64. li 6. co. 6. cot. del Relato di 2. in 4. ————— 768  
 tanti del Relato Quadrato cubo di tutta la linea 6. 46656  
 di 4. in 2. sono 12288. li 15. cotanti del quad. quad. di 4. nel qua-  
 drato di 2. sono 15360. li 20. cotanti del cubo di 4. nel cubo di 2.  
 sono 10240. li 15. cotanti del quad. quad. di 2. nel quad. di 4. so-  
 no 3840. e finalmente li 6. cotanti del relato di 2 in 4. sono 768 che  
 sommati fanno 46656. per il quadrato cubo, ovvero cubo qua-  
 drato di tutta la linea 6.

Que-



dagli Arimmetlici radice, da' Geometri lato, fa numero cubo per la definizione XIX. del lib. 7. d'Euclide, ed il numero cubo moltiplicato in quel primo numero, fa quadrato quadrato, il quale si ha ancora con moltiplicare il numero quadrato in se &c. come si disse, e si vede nella Tavola posta da principio di questo Trattato.

11. Si venga alle proposizioni sopra poste per conoscerne l'origine, e di dove si hanno i numeri proprj per l'estrazione delle radici secondo la Tavola dello Stifelio. Nella prima proposizione per la radice quadrata fu divisa la linea 6. in due parti in 4. ed in 2. ma qui si dica il numero 6. sia diviso in 4. ed in 2. il quadrato di 6. è 36. le parti 4. e 2. si pongano due volte, e si moltiplichino dicendo: 4. via 4. fa 16. di nuovo: 4. via 2. fa 8. pure 2. via 4. fa 8. e finalmente 2. via 2. fa 4. la somma 36. uguale al quadrato di 6. per l'unica proposizione del numero 9.

|       |    |
|-------|----|
| 4. 2. | 16 |
| 4. 2. | 8  |
|       | 8  |
|       | 4  |
|       | —  |
|       | 36 |

12. Qui è da osservare, che sono 4. prodotti, perchè si è diviso il numero in due parti: Onde vengono tanti prodotti, quanti ne significa il numero 4. che è il quadrato nella doppia proporzionalità: che se fusse stato diviso il numero 6. in 3. parti, come 1. 2. e 3. allora si hanno 9. prodotti, essendo il 9. numero quadrato nella tripla proporzionalità, se in 5. i prodotti farebbero 25. numero quadrato nella quintupla proporzionalità &c. essendo che ci sono tre prodotti, che sono li 3. quadrati delle parti 1. 4. e 9. e 2. cotanti di ciascuna nell'altra parte, cioè 2. 3. e 6. raddoppiati, la somma de' quali fa 36. quadrato di 6.

|   |   |    |
|---|---|----|
| 1 | 1 | 1  |
| 2 | 2 | 2  |
| 3 | 3 | 2  |
|   |   | 4  |
|   |   | 3  |
|   |   | 2  |
|   |   | 6  |
|   |   | 6  |
|   |   | 9  |
|   |   | —  |
|   |   | 36 |

13. Di più è da osservare di sopra, che due prodotti sono quadrati nel primo esempio cioè 16. e 4. e due sono uguali, cioè 8. e 8. che sono 2. cotanti di 4. nel 2. li quali 2. cotanti è il numero nella Tavola dello Stifelio per la radice quadrata.
14. E perchè a moltiplicare il quadrato nella sua radice, viene il cubo: Moltiplicato il quadrato 36. via 6. sua radice, fa 216. numero cubo. Ma perchè 16. 8. 8. e 4. sono parti integrali di 36. e 4. e 2. di 6. se si moltiplicheranno 16. 8. 8. e 4. per 4. per 2. verranno 8. prodotti, la somma de' quali sarà pure 216. numero cubo per l'unica proposizione del num. 9.

Si offervi che il primo prodotto 64. è il cubo di 4. e l'ultimo 8. è cubo di 2. i trè prodotti uguali, cioè 32. sono 3. cotanti del quadrato di 4. in 2. e gl'altri trè prodotti, cioè 16. sono trè cotanti del quadrato di 2. in 4. li quali due 3. sono numeri proprj per l'estrazione della radice cuba nella Tavola dello Stifelio.

4  
2

Mà se il 6. si fusse diviso in trè parti, cioè 1. 3. 6. e 3. e si fussero moltiplicati li 9. prodotti di sopra i quadra, farebbero venuti 27. prodotti numero cubo proporzionalità. Così ancora se si fusse diviso in 5. farebbero venuti prodotti 125. numero cubo nella proporzionalità.

15. E perchè à moltiplicare il cubo nella sua radice numero quadrato quadrato; onde moltiplicando 216. sua radice, fa 1296. quad. quad. come si ricava dallene X. del lib. 8. d'Euclide: Mà essendo questi 8. prodotti 32. 32. 16. 16. 16. e 8. numeri integrali del cubo 216. e 4. e 2. del 6. radice, se si moltiplicano questi 8. numeri per 4. e per 2. vengono 16. prodotti, la somma de' quali è 1296. numero quadrato quadrato, il medesimo si averebbe con l'istessi prodotti con moltiplicare 16. 8. 8. 4. numeri del quadrato, via 16. 8. 8. 4. perchè quadrato via quadrato fa quadrato quad. Si offervi, che il primo prodotto è 256. quadrato quadrato di 4. e l'ultimo 16. qq. di 2. quattro prodotti uguali, cioè 128. mostrano 4. cotanti del cubo 4. in 2 sei prodotti uguali, cioè 64. sono 6. cotanti del quadrato di 4. nel quadrato di 2. gl'ultimi quattro prodotti uguali sono 4. cotanti del cubo della seconda, cioè di 2. in 4.

16.  
8.  
8.  
4.

I numeri de' cotanti 4. 6. e 4. sono proprj per la radice nella Tavola dello Stifelio. Di più si offervi, che li prodotti, perchè 16. è numero quadrato quadrato nella proporzionalità, che se si fusse diviso il numero allora i prodotti farebbero stati 81. qq. nella triplice proporzionalità.

16. E perchè à multiplicare il numero quadrato quadrato nella sua radice viene il relato, e gli 16. prodotti passati sono parti integrali del qq. 1296. e 4. e 2. 16 32 512  
della radice 6. se si moltiplicano di 16. prodotti per 4. e per 2. vengono 32. prodotti, la somma de quali 7776. sarà il relato primo. 8 32 512  
Mà perchè à multiplicare il cubo per il quadrato viene il relato; Si pigliano 8. prodotti del cubo, cioè 64. 32. 32. 16. 16. 16. 8. e quattro prodotti del quadrato cioè 16. 8. 8. e 4. e si moltiplichino scambievolmente si avranno i medesimi 32. prodotti, de quali la somma 7776. è numero primo relato per l'unica proposizione del num. 9. 256  
Si osservi, che il primo prodotto è il relato di 4. l'ultimo è relato di 2. li primi cinque prodotti sono 5. cotanti del qq. di 4. in 2. gli seguenti dieci prodotti uguali sono 10. cotanti del cubo del 4. nel quadrato di 2. gli altri prodotti uguali sono 10. cotanti del cubo di 2. nel quadrato del 4. finalmente gl'ultimi cinque prodotti uguali sono 5. cotanti del qq. di 2. nel 4. 128  
I numeri de cotanti 5. 10. 10. e 5. sono propri per la radice relata secondo la tavola dello Stifelio. 128  
Si osservi di più, che sono prodotti 32. numero relato primo nella doppia proporzionalità per essere stato diviso il numero della radice in due parti, perchè se fusse stato diviso in tre i prodotti sarebber stati 43. primo relato nella tripla proporzionalità &c. 64  
17. Se di nuovo si moltiplicassero gli antecedenti 32. prodotti per 4. e per 2. verrebbero prodotti 64. la somma de quali faria numero quadrato cubo 46656. il quale ancora si averebbe se si moltiplicassero gli 8. prodotti del cubo cioè 64. 32. 32. 32. 16. 16. 16. e 8. in se medesimi, perchè cubo via cubo fa quadrato cubo. Ed in questo modo si potrebbe proseguire à trovare il secondo relato, il quad. quad. quad. il cubo, cubo &c. Ma si crescerebbe fatica, e non sapere  
18. Resta da osservare nelle proporzioni passate, ed in tutte l'altre, che

che si facessero, che la seguente dipende dall'antecedente, cominciando dalla prima del quadrato, che è la quarta del lib. 2. di Euclide, ma perchè divide la linea in due parti sole vengono i prodotti del quadrato, del cubo &c. di doppia proporzionalità, e di questo modo fa le sue proposizioni Niccolò Tartaglia; io ho pensato rendere tali proposizioni universali, con dividere la linea, o si voglia dire il numero in quante parti si vogliano per quell'unica proposizione dedotta da quella del Comandino posta al numero 9. con abbreviare i prodotti, cominciando da quella del quadrato come fondamento di tutte l'altre.

*Proposizione del quadrato, cubo, quadrato quadrato, relato primo, quadrato cubo &c.*

*Con dividere la linea, ovvero il numero non solo in due parti, ma in in quante parti piace, e però rese universali con brevità ne' suoi prodotti, che servono a molte speculazioni.*

*Proposizione del quadrato, che è la quarta del lib. 2. d'Euclide.*

19. Quando sarà diviso un numero in quante parti piace, sarà il quadrato di ciascuna parte con 2. cotanti, cioè con il doppio della prima nella seconda, e della somma della seconda, e prima nella terza, e della somma della terza, seconda, e prima nella quarta, e della somma della quarta, terza, seconda, e prima nella quinta parte, e così fino all'ultima, uguale al quadrato del numero diviso.

Sia diviso il numero 14. in 2. 3. 4. 5. i. quadrati di questi numeri sono 4. 9. 16. e 25. li 2. cotanti di 2. in 3. sono 12. la somma di 3. e 2. 5. li 2. cotanti, dunque di 5. In 4. sono 40. la somma di 4. 3. e 2. e 9. il 2. cotanti di 9. in 5. sono 90. la somma di 4. 9. 16. 25. 12. 40. e 90. è 196. quadrato di 14.

4

9

16

25

12

40

90

196

*Proposizione del cubo resa universale*

20. Quando un numero sia diviso in quante parti piace, sarà il cubo di ciascuna parte con 3. cotanti del quadrato della prima parte nella seconda, e reciprocamente con 3. cotanti del quadrato della seconda nella prima, e con 3. cotanti del quadrato della somma della seconda, e prima nella terza, e reciprocamente con 3. cotanti del quadrato della terza nella somma della seconda, e prima, e con 3. cotanti del quadrato della somma della terza, seconda, e prima nella quarta, e con 3. cotanti del quadrato della quarta nella somma medesima, e così fino all'ultima parte, sarà uguale al cubo del numero diviso.

Sia

|  |   |
|--|---|
| Sia il numero 12. diviso in 3. 4. e 5. li cubi di questi numeri sono 27. 64. e 125. li 3. cotanti del quadrato di 3. in 4. sono 108. e 3. cotanti del quadrato reciprocamente di 4. in 3. sono 144. Adesso la somma della seconda parte 4. e della prima 3. è 7. li 3. cotanti del quadrato di 7. in 5. sono 735. e 3. cotanti del quadrato di 5. in 7. sono 525. li quali prodotti sommati fanno 1728. numero cubo di 12.   | 27<br>64<br>125<br>108<br>144<br>735<br>525<br><hr/> 1728   |
| Di nuovo sia diviso il numero 20. in sei parti, cioè 3. 1. 5. 6. 1. 4. li cubi di questi numeri sono 27. 1. 125. 216. 1. e 64. li 3. cotanti del quadrato di 3. in 1. sono 27. li 3. cotanti del quadrato di 1. in 3. sono 9. la somma di 1. e di 3. è 4. li 3. cotanti del quadrato di 4. in 5. sono 240. li 3. cotanti del quadrato di 5. in 4. sono 300. la somma di 5. di 1. e di 3. è 9. li 3. cotanti del quadrato di 9. in 6. sono 1458. li 3. cotanti del quadrato di 6. in 9. sono 972. la somma di 6. di 5. di 1. e di 3. è 15. li 3. cotanti del quadrato di 15. in 1. sono 675. li 3. cotanti del quadrato di 1. in 15. sono 45. la somma delle parti è 16. li 3. cotanti del quadrato di 16. in 4. sono 3072. e finalmente li 3. cotanti del quadrato di 4. in 16. sono 768. li quali prodotti sommati fanno 8000. numero cubo di 20. | 27<br>1<br>125<br>216<br>1<br>240<br>300<br>1<br>64<br>1458<br>972<br>9<br>675<br>45<br>300<br>1478<br>972<br>675<br>45 |
| Ecco ridotti à 16. prodotti soli quelli, che sarebbero 216. se si moltiplicassero quelli 6. numeri in se facendo 36. prodotti, e di nuovo 36. moltiplicati per quelli 6. numeri ne compirebbero 216.   | 3072<br>768<br><hr/> 8000   |

*Proposizione del quadrato quadrato resa universale.*

21. Quando un numero sia diviso in quante parti piace sarà il quadrato quadrato di ciascuna parte con 4. cotanti del cubo della prima parte nella seconda, e reciprocamente con 4. cotanti del cubo della seconda nella prima, e con 4. cotanti del cubo della somma della seconda, e prima nella terza, e reciprocamente con 4. cotanti del cubo della terza nella somma della seconda, e prima, e così fino all'ultima parte, e di più con 6. cotanti del quadrato della prima nel quadrato della seconda, e con 6. cotanti del quadrato della somma della seconda, e prima nel quadrato della terza, e con 6. cotanti del quadrato della somma della terza, seconda, e prima nel quadrato della quarta, e così fino all'ultima parte, uguale al quadrato quadrato del numero diviso.

Sia

|   |  |
|---|--|
| e reciprocamente li 4. cotanti del cubo di 4. in 5. sono 1280. li 4. cotanti del cubo della somma di 4. e di 5. cioè di 9. in 3. sono 8748. e 4. cotanti del cubo di 3. in 9. sono 972. li 4. cotanti del cubo della somma di 3. di 4. e di 5. cioè di 12. in 2. sono 13824. e 4. cotanti del cubo di 2. in 12. sono 384. di più 6. cotanti del quadrato di 5. nel quadrato di 4. sono 2400. li 6. cotanti del quadrato della somma di 4. e di 5. cioè di 9. nel quadrato di 3. sono 4374. e finalmente 6. cotanti del quadrato della somma di 3. di 4. e di 5. cioè di 12. nel quadrato di 2. sono 3456. li quali prodotti sommati fanno 38416. quadrato quadrato di 14. | 16<br>2000<br>1280<br>8748<br>972<br>13824<br>384<br>2400<br>4374<br>3456<br><hr/> 38416 |
|---|--|

*Proposizione del primo Relatore universale.*

22. Quando un numero sia diviso in quante parti piace, sarà il primo Relato di ciascuna parte con 5. cotanti del qq. della prima nella seconda, e reciprocamente con 5. cotanti del qq. della seconda nella prima, e con 5. cotanti del qq. della somma della seconda, e prima parte nella terza, e reciprocamente con 5. cotanti del qq. della terza nella somma della seconda, e prima, e così fino all'ultima parte: e di più con 10. cotanti del cubo della prima nel quadrato della seconda, e vice versa con 10. cotanti del cubo della seconda nel quadrato della prima, e con 10. cotanti del cubo della somma della seconda, e prima nel quadrato della terza, ed al contrario con 10. cotanti del cubo della terza nel quadrato della somma della seconda, e prima, e così fino all'ultima parte, uguale al primo relato del numero diviso.

S'avverta, che si pongono 5. cotanti, e 10. cotanti reciprochi, stante che i numeri proprj, per la radice prima relata sono 5. 10. 10. e 5. onde il 5. ed il 10. sono replicati.

|   |        |
|---|--------|
| Sia diviso il numero 14. in quattro parti, cioè in 2.   | 32     |
| 3. 4. 5. li relati primi di questi numeri sono 32.      | 243    |
| 243. 1024. e 3125. li 5. cotanti del qq. di 2. in 3.    | 1024   |
| sono 240. e 5. cotanti del qq. di 3. in 2. sono 810. li | 3125   |
| 5. cotanti del qq. della somma di 3. e di 2. cioè di 5. | 240    |
| in 4. sono 12500. e 5. cotanti del qq. di 4. in 5.      | 810    |
| sono 6400. e 5. cotanti del quad. q. della somma        | 12500  |
| di 4. di 3. e di 2. cioè di 9. in 5. sono 164025.       | 6400   |
| e 5. cotanti del qq. di 5. in 9. sono 28125. di         | 164025 |
| liiii   | più    |

più 10. cotanti del cubo di 2. nel quadrato di 3. sono 720. e 10 cotanti del cubo di 3. nel quadrato di 2. sono 1080. e 10. cotanti del cubo della somma di 3. e di 2. cioè di 5. nel quadrato di 4. sono 20000. e 10. cotanti del cubo di 4. nel quadrato di 5. sono 16000. e 10. cotanti del cubo della somma di 4. di 3. e di 2. cioè di 9. nel quadrato di 5. sono 182250. e finalmente 10. cotanti del cubo di 5. nel quadrato di 9. sono 101250. li quali prodotti sommati fanno 537824. numero primo relato di 14.

28125  
720  
1080  
20000  
16000  
182250  
101250  

---

537824

*Proposizione del quadrato cubo resa universale.*

23. Quando un numero sia diviso in quante parti piace, sarà il quadrato cubo delle parti con 6. cotanti del relato della prima parte nella seconda, e con 6. cotanti del relato della seconda nella prima, e con 6. cotanti del relato della somma della seconda e prima nella terza, e con 6 cotanti del relato della terza nella somma della seconda, e prima, e così fino all'ultima parte. E con 15. cotanti del qq. della prima nel quadrato della seconda e con 15. cotanti del qq. della seconda nel quad. della prima, e con 15. cotanti del qq. della somma della seconda, e prima nel quad. della terza, e con 15. cotanti del qq. della terza nel quad. della somma della seconda, e prima, e così fino all'ultima parte, e di più, con 20. cotanti del cubo della prima nel cubo della seconda, e con 20. cotanti del cubo della somma della seconda, e prima nel cubo della terza, e con 20. cotanti del cubo della somma della terza, seconda, e prima nel cubo della quarta, così fino all'ultima parte, uguale al quadrato cubo del numero diviso.

Sia diviso il num. 10. in tre parti 2. 5. e 3. li quadrati cubi delle parti, sono 64. 15625. e 720. li 6. cotanti del relato di 2. nel 5. sono 960. e 6. cotanti del relato di 5. in 2. sono 37506. e 6. cotanti del relato della somma di 2. e di 5. cioè di 7. nel 3. sono 302526. e 6. cotanti del relato di 3. nel 7. sono 10206. e 15. cotanti del qq. di 2. nel quad. 5. sono 6000. e 15. cotanti del qq. di 5. nel quad. di 2. sono 37500. e 15. cotanti del quad. q. della somma di 5. e di 2. cioè di 7. sono 59535. e di più 20. cotanti del cubo di 2. nel cubo di 5. sono 20000. e 20. cotanti del cubo della somma di 5. e di 2. cioè di 7. nel cubo di 3. sono 185220. li quali prodotti sommati fanno 1000000. quadrato cubo di 10.

64  
15625  
720  
960  
37506  
302526  
10206  
6000  
37500  
59535  
20000  
185220  

---

1000000  
*Propo-*

24. Quando sia diviso un numero in quante parti piace, sarà il relato secondo delle parti con 7. cotanti del quadrato cubo della prima nella seconda, e con 7. cotanti del quadrato cubo della seconda nella prima, e con 7. cotanti del quadrato cubo della somma della seconda, e prima nella terza, e con 7. cotanti del q. cubo della terza nella somma della seconda, e prima, e così fino all'ultima parte, e con 21. cotanti del relato della prima nel quadrato della seconda, e con 21. cotanti del relato della seconda nel quadrato della prima, e con 21. cotanti del relato della somma della seconda, e prima nel quadrato della terza, e con 21. cotanti del relato della terza nel quadrato della somma della seconda, e prima, e così fino all'ultima parte, e con 35. cotanti del qq. della prima nel cubo della seconda, e con 35. cotanti del qq. della seconda nel cubo della prima, e con 35. cotanti del qq. della somma della seconda, e prima nel cubo della terza, e con 35. cotanti del qq. della terza nel cubo della somma della seconda, e prima e così fino all'ultima parte, uguale al secondo relato del numero diviso.

Sia diviso il numero 12. in quattro parti in 4. 2. 2. e 4. li secondi relati delle parti sono 16384. 128. 128. e 16384. li 7. cotanti del quadrato cubo di 4. nel 2. sono 57344. e 7. cotanti del q. cubo di 2. nel 4. sono 1792. e 7. cotanti del q. cubo della somma di 2. e di 4. cioè 6. nella terza sono 653184. e 7. cotanti de quad. cubo della terza 2. nel 6. sono 2688. e 7. cotanti del q. cubo della somma della terza, seconda, e prima, cioè 8. nel 4. sono 7340032. e 7. cotanti del q. cubo di 4. nell'8. sono 229376. di più 21. cotanti del relato della prima nel quadrato della seconda sono 86016. e 21. cotanti del relato della seconda nel quad. della prima sono 10752. e 21. cotanti del relato della somma della seconda, e prima nel quadrato della terza sono 653184. e 21. cotanti del relato della terza 2. nel quadrato della somma 6. sono 24192. e 21. cotanti del relato della somma della terza, seconda, e prima, cioè di 2. di 2. e di 4. che è 8. nel quad. di 4. sono 81010048. e 21. cotanti del relato di 4. nel quad. di 8. sono 1376256. e di più 35. cotanti del qq. della prima parte 4. nel cubo della,

16384  
128  
128  
16384  
57344  
1792  
653184  
2688  
7340032  
229376  
86016  
10752  
653184  
24192  
81010048  
1376256  
71680  
35840  
3602880  
120960  
9175040  
4587520  

---

35831808  
secon-

liiii 2



seconda 2. sono 71680. e 35. cotanti del qq. di 2. nel cubo di 4. sono 35840. e 35. cotanti del qq. della somma di 2. e di 4. cioè di 6. nel cubo della terza 2. sono 362880. e 35. cotanti del qq. di 2. nel cubo di 6. sono 120960. e 35. cotanti del qq. della somma di 4. 2. e 2. cioè di 8. nel cubo del 4. sono 9175040. e finalmente 35. cotanti del qq. di 4. nel cubo di 8. sono 4587520. li quali prodotti sommati, fanno 35831808. numero secondo relato di 12.

Molte altre proposizioni potrei stendere, e fare, ma perchè ciascuno da se stesso ne potrà formare quante gli pare, stante che in esse si da un mirabile ordine, che considerato apre l'intelletto ad uniformemente operare, le tralascio, e solo scoprirò tal'ordine con i seguenti avvertimenti.

*Avvertimenti per fare quante proposizioni universali si vogliono con esaminare l'antecedente.*

Primo avvertimento è di sapere i numeri peculiari, e propri per l'estrazioni delle radici, iquali si hanno dalla tavola posta al principio di questo trattato numero 10. ed ora quei del secondo relato sono 7. 21. 35. 35. 21. e 7.

Secondo avvertimento è di pigliare il secondo relato di ciascuna parte del numero diviso, ovvero quadrato quad. quad. il cubo cubo &c. secondo la potestà del numero, sopra la quale si vuol fare la proposizione ma per non confonderli si sappia, che gli avvertimenti per questa proposizione del secon. relato servono per tutte l'altre rispettivamente osservandosi il medesimo ordine.

Terzo avvertimento è di pigliare tanti cotanti della potestà immediatamente antecedente a quella, della quale si fa la proposizione, quanti ne significa il primo numero proprio, che qui è 7. e la potestà antecedente immediatamente il secondo relato è il quadrato cubo, dicendo 7. cotanti del cubo quadrato; o' quadrato cubo della prima parte nella seconda, cioè moltiplicati via il numero della seconda parte, che è come radice, e così si va da un estremo all'altro, e perchè ci sono due 7. si dice reciprocamente 7. cotanti del quadrato cubo della seconda nella prima parte, e quando il numero è diviso più, che in due parti, allora sommando la seconda, e prima, si dice di nuovo 7. cotanti del quadrato cubo della somma della seconda, e prima parte nella terza; E vice versa 7. cotanti del quadrato cubo della terza nella somma della seconda e prima parte, e così fino all'ultima pigliando la somma dell'antecedenti via la seguente.


Quarto avvertimento è di cominciare da capo pigliando l'altro numero proprio, che in questa è 21. dicendo 21. cotanti del relato della prima parte nel quadrato della seconda; Si osservi, che que-

questi cotanti si pigliano dal relato potestà im-  
 mense, il quadrato cubo del quale si pigliarono 7,  
 pigliano moltiplicati nel quadrato della seconda,  
 drato è posto suffeguente alla radice assumendo le  
 mezz' non nominate. E perchè ei sono due 21. si di-  
 mente 21. cotanti del relato della seconda nel quad-  
 ma, e se ci sono altre parti si sommi la seconda con  
 dica 21. cotanti della somma della seconda, e prima  
 la terza, ed al contrario 21. cotanti del relato della  
 della somma della seconda, e prima, e così fino all  
 Quinto avvertimento è di cominciare da capo pigliar  
 mero proprio, che qui è 35. e con il quadrato qua-  
 antecedente il relato si dica, 35. cotanti del qq. del  
 nel cubo, potestà suffeguente il quadrato della sec-  
 chè sono due 35. si dice reciprocamente 35. cotant  
 seconda nel cubo della prima: E se sono più part  
 dice 35. cotanti del qq. della somma della seconda  
 cubo della terza, ed al contrario 35. cotanti del qq.  
 cubo della somma della seconda, e prima, e così  
 parte. E qui per non esserci altri numeri peculiari,  
 estrazione della radice seconda relata sono finiti i p  
 per tutte le potestà inferiori, la somma de quali è ug  
 do relato del numero diviso, come nella proposiz  
 potuto vedere.

Sesto avvertimento è, che la detta proposizione ha i n  
 in numero pari, cioè 6. e ciascuno de tre ha il suo  
 pagno uguale cioè 7. e 7. 21. e 21. 35. e 35. e però al  
 tanti di tal potestà, che si sono detti della prima p  
 conda, o nella potestà della seconda, si dicono rec  
 della potestà della seconda nella prima, o nella pote  
 ma parte. Ma quando i numeri propri sono in nu  
 come del quadrato quadrato quadrato; o l'anteced  
 drato cubo, del quale i numeri propri sono 6. 15. 20.  
 di mezzo non ha compagno, allora pure rimane un  
 come nella proposizione del quadrato cubo, resta sol  
 bo, e però si pigliano i cotanti di quella potestà dell  
 te nella medesima potestà della seconda parte, di  
 tanti del cubo della prima nel cubo della seconda,  
 reciprocamente 20. cotanti del cubo della seconda n  
 prima per esservi un sol numero; si seguita bene,  
 fusse diviso più, che in due parti, dicendo 20. cot  
 della somma della seconda, e prima parte nel cubo  
 così fino all'ultima parte,

# TRATTATO DECIMOQUINTO.

## *Dell' Abbaco Ecclesiastico, e Cronologico.*



Padri del Concilio Niceno, conforme à Giulio Cesare, costituirono l' Anno di giorni 365. ed hore 6. intiere, e fermarono in quel tempo l'Equinozzio di Primavera nel dì 21. Marzo à cagione di celebrarsi la Pasqua la terza settimana del primo mese lunare, che è quello, del quale la Luna decimaquarta cade ò nell'Equinozzio, ò lo seguita vicino; e così la celebrazione della Pasqua venisse nella prossima Domenica, che segue la 14. Luna predetta, e cadendo la Domenica nella 14. Luna si trasferisse nella Domenica seguente per non concorrere con gl'Ebrei, talmente, che per i decreti del medesimo Concilio i termini Pasquali sono il dì 22. Marzo, e 25. Aprile, potendosi solo fra questi termini celebrare la Pasqua. Essendo, poi l'Equinozzio di Primavera uscito dal giorno 21. di Marzo, stante, che l'anno costa solamente di giorni 365. hore 5. minuti 49. e 16. secondi in circa, perciò l'anno di Giulio Cesare eccede di 644. secondi l'anno astronomico, ed essendo un giorno 86400. secondi per trovare in quanti anni l'anno Giuliano eccede un giorno per regola del Trè si dica, se 644. secondi sono eccello d' anno 1. di quant'anni sarà l'eccello di 86400. secondi? e verrà d'anni  $134\frac{2}{3}\frac{4}{5}$ . e dopo 134. anni in circa dal Concilio Niceno l'Equinozzio di Primavera accade nel dì 21. Marzo, mà nel dì 20. e dopo altri, e tanti anni nel dì 19. &c. di maniera che nell'anno 1582. nel quale si correffe il Calendario, l'Equinozzio era circa gl' 11. di Marzo. Onde il Pontefice Gregorio XIII. restituì l'Equinozzio nel 21. Marzo con il traslasciamento di 10. giorni nel mese d'Ottobre, e di più decretò, che da l'innanzi i centesimi fussero anni comuni di giorni 365. ed il quarto centesimo fusse anno bisestile di giorni 366. e per tanto nel Calendario nuovo gl'anni 1700. 1800. 1900. faranno comuni, e 2000. sarà bisestile per sfuggire di nuovo l'errore passato. Dal tempo del Concilio Niceno, che fù celebrato l'anno 325. fino all'anno 1582. l'anno solare errò 10. giorni, ed il lunare quasi 4. giorni, onde gl'aurei numeri posti nel Calendario vecchio, che à tempo del Concilio Niceno, significavano bene i novilunj, dipoi gl'hanno significati

ficati 4. giorni più tardi, ed a levare tal'errore in luogo de numero è stato substituito il Ciclo dell'Epatte, che sono gi giunti all'anno lunare comune di giorni 354. per eguagli anno solare comune di giorni 365. l'Epatte sono giorni dinariamente, alcuna volta 12. di raro 10. ovvero 13.

**Premessa** questa poca di cognizione si faranno diverse domande per via di numeri.

**1. D.** come si conosca se l'anno sia bisestile per il vecchio, e Calendario?

**R.** Per 4. si dividono gl'anni di Cristo; l'avvenuto è il numero anni bisestili passati, e se niente avanza quell'anno è bisestile; avanza 1. ovvero 2. ovvero 3. sarà il primo secondo, o terzo dopo il bisestile. Esempio, anni di Cristo 1698. partiti per 4. avvenuto 424. d'anni bisestili scorsi, ed avanza 2. che significa il secondo anno dopo il bisestile: La ragione di questo è perche il primo anno di Cristo era il primo dopo l'anno bisestile.

**S'avverta** però per gl'anni centesimi del Calendario nuovo, l'ordinazione di Gregorio XIII. l'anno 1600. fu bisestile; perche non venne i primi tre centesimi. 1700. 1800. 1900. fussero come solo il quarto centesimo cioè 2000. fusse bisestile, che perche il numero negl'anni centesimi si levano due zeri, il numero si parte per 4. se non avanza è bisestile, altrimenti no; V. g. l'anno 1700. partito il numero 17. per 4. levati i zeri, avanza 1. fa il primo anno commune. Anni 2000. partito il 20. per 4. avanza nulla: que sarà bisestile.

**2. D.** Come si trovino i giorni tralasciati per qualsivoglia anno futuro per la correzione fatta al Calendario?

**R.** Anno futuro 2768. da questo si sottrai 1600. e resta 1168. numero si parta per 400. ne viene 2. ed avanza 368. l'avvenuto si moltiplica per 3. fa 6. per i trecentesimi avanzati si aggiunga 3. fa 9. e più 10. fa 19. e tanti sono i giorni tralasciati. Leve ne è, si levano 1600. perchè fino a quell'anno non si tralasciavano i giorni intercalari, il resto degl'anni si partono per 400. l'avvenuto si moltiplica per 3. perchè ogni 400. anni, si tralasciavano 3. giorni; e si aggiunge un giorno per ogni centesimo, perchè 100. anni si lascia un giorno, eccetto il quarto centesimo che aggiunge finalmente 10. per li 10. giorni tralasciati il dì 4. di 1582. per la correzione del Calendario.

**3. D.** Che cosa sia il Ciclo lunare, ovvero aureo numero, e come si trovi per il vecchio, e nuovo Calendario.

**R.** Il Ciclo Lunare è lo spazio di 19. anni nel qual tempo la Luna torna a quella medesima congiunzione, che fece con il Sole.

qual tempo si misura dal moto della Testa del Dragone costellazione celestè , col qual moto ogni disuguaglianza del moto della Luna si uguaglia. Si chiama numero aureo, perchè si notava con carattere d'oro.

Per trovare poi quanto sia l'aureo numero, agl'anni di Cristo si aggiunge 1. la somma si parte per 19. l'avvenuto farà il numero de Cicli Lunari da un anno avanti la venuta di Cristo, l'avanzo sarà l'aureo numero, e se non avanza alcuna cosa sarà 19. Per esempio, anni 1706. aggiunto 1. fa 1707. partito per 19. ne vengono Cicli Lunari 89. 16. l'avanzo è l'aureo numero; la ragione perchè il primo anno di Cristo, l'aureo numero era 2.

4. D. Come si trovi l'Epatta vecchia e nuova per qualsivoglia anno.  
R. L'aureo numero dell'anno, nel quale si cerca l'Epatta si moltiplica per 11. perchè ad ogni anno si aggiunge 11. per uguagliare l'anno lunare di giorni 354. al solare di 365. il prodotto si parte per 30. l'avanzo sarà l'Epatta per il Calendario vecchio, mà per il nuovo si levano i giorni tralasciati cioè 10. fino al 1700. e dipoi 11. &c.



Del

Del 1659. l'Aureo numero è 7. moltiplicato per 11. fa 77. levati 130. resta 17. per l'Epatta del vecchio Calendario.

Del 1706. l'Aureo numero è 16. moltiplicato per 11. fa 176. partito per 30. avanza 26. dal quale leva ti 11. giorni tralasciati, resta 15. e tanto è l'Epatta.

L'antecedente Cerchio dimostra come si possa trovare l'Aureo numero, e l'Epatta per pettuamente, diviso in 19. spazi; comincia l'anno 1706. e dura sino à 1724. Si torna da capo con porre sopra 1706. l'anno 1725. e dura sino à 1743. Di nuovo si ponga 1744. sopra 1725. e così sarà perpetuo &c.

5. D. Come si trovi il Ciclo solare antico, e nuovo per qualsivoglia anno.

R. Il Ciclo solare, ò delle lettere Domenicali è uno spazio di 28. anni, al fine de' quali le lettere Domenicali ritornano con il medesimo ordine à causa degli anni bise stilli, altrimenti ritornerebbero dopo sette anni le medesime, per trovare il qual Ciclo agl'anni di Cristo s'aggiunge 9. la somma si divide per 28. l'avanzo sarà il Ciclo solare, l'avvenuto mostra le rivoluzioni insieme del Ciclo solare. Per esempio 1620. aggiunto 9. fa 1629. il quale diviso per 28. l'avanzo è 5. per il Ciclo solare. La ragione s'aggiunge ò perchè l'anno antecedente al primo di Cristo il Ciclo del Sole fù 9. Ma per trovare il Ciclo nuovo del Sole, proposto 1706. si moltiplichino per 12. i giorni intercalari lasciati, che sono 11. fa 132. s'aggiunga 9. à 1706. fa 1715. dal quale sottratto 132. resta 1583. quale partito per 28. resta 15. per il Ciclo Domenicale &c.

6. D. Come si trovi la lettera Domenicale, per il Calendario vecchio.

R. Si sommano insieme gl'anni di Cristo con 5. e gli anni bise stilli scorsi, la somma si parte per 7. l'avanzo si sottra da 8. e se non avanza si sottra 7. da 8. il restato numero dimostra la lettera Domenicale, cioè 1 A, 2 B, 3 C, 4 D, 5 E, 6 F, 7 G, per esempio: Si voglia sapere la lettera Domenicale del 1581. si sommino con 5. e 395. anni bise stilli, che si trovano con partire 1581. per 4. la somma 1981. partita per 7. resta nulla, però si sottra 7. da 8. resta 1. sicchè la lettera Domenicale fù A. e cominciò l'anno in Domenica. Tal lettera trovata nell'anno bise stille dura sino à la festa di S. Mattia. Di poi si piglia l'antecedente con ordine retrogrado cioè G. La ragione, s'aggiungono agl'anni di Cristo 5. perchè C. è la quinta lettera Domenicale con ordine retrogrado, che fù la seconda presa nell'anno antecedente al primo di Cristo per essere stato bise stille, s'aggiungono gl'anni bise stilli, in ciascuno de' quali corrono due lettere per avere la somma delle lettere.

K k k k k

Dome-

**Domenicali**, la quale partando per 7. l'avanzo dimostra la lettera Domenicale con ordine retrogrado, la quale levata da 8. darà la lettera Domenicale per ordine retto.

**9. D.** Come si trova la lettera Domenicale per il Calendario nuovo?

**R.** Si sommino gl'anni di Cristo con i bisestili, e con 5. dalla somma si levino 10. giorni tralasciati nella correzione del Calendario, il restato numero si parte per 7. l'avanzo si sottrai da 8. e se non avanza alcuna cosa si sottrai 7. da 8. il numero restato dimostra la lettera Domenicale per ordine retto. Per esempio si cerca la lettera Domenicale dell'anno 1706. si parte 1706 per 4. vengono anni bisestili 426. meno 1. stante che 1700. non fù bisestile cioè 425. quali si sommino con 1706. con più 5. la somma è 2136. dal quale sottratto 10. resta 2126. che partito per 7. l'avanzo 5. mostra la lettera Domenicale C. per ordine retrogrado, mà sottratto 5. da 8. resta 3. lettera Domenicale C. per ordine retto. Nell'anno bisestile dura sino alla festa di S. Mattia, dipoi corre la precedente più vicina. La ragione si è detta.

**8. D.** Come si può sapere con qual lettera delle 7. Domenicali sia notato ciascun giorno del Calendario?

**R.** Il primo di Gennaro si notà con la lettera A. il secondo con la lettera B. e così gl'altri per ordine. Ora sientino i giorni dal primo di Gennaro sino al dato giorno, tutto il numero si parte per 7. l'avanzo dimostra la lettera. Per esempio si voglia sapere il dì 24. Aprile con che lettera venga notato. Si sommino 31. di Gennaro, 28. di Febbraro, 31. di Marzo, e 24. d'Aprile, la somma 114. si parte per 7. avanza 2. sicchè con la lettera B. è segnato il dì 24. d'Aprile. Avvertasi, che quando l'anno è bisestile, la lettera F. serve al dì 24. ed al dì 25. di Febbraro.

**9. D.** Come si trova qual FERIA sia stata in qualsivoglia giorno di ciascun anno per il Calendario vecchio, e nuovo.

**R.** Per il vecchio si levi 1. dalla somma degl'anni già passati di Cristo, degl'anni bisestili, e de giorni dell'anno, che si cerca, il restato numero si parte per 7. il numero, che avanza dimostra la feria. Per esempio, che feria fù il dì 26. Aprile 1649. anni passati 1648. bisestili 412. ed i giorni 116. sommati sono 2176. levato 1. restano 2175. partiti per 7. resta 5. dunque fu feria 5. cioè Giovedì: Per il Calendario nuovo si vuol sapere, che feria fù il dì 3. Febbrajo 1706. anni passati 1705. anni bisestili 425. perchè il 1700. non fù bisestile, e giorni 34. sommati fanno 2165. levati giorni 11. cioè giorni 10. tolti per la correzione, ed i per esser nato Cristo in Domenica, essendo feria 2. cioè Lunedì il primo giorno del primo anno di Cristo cominciato da Gennajo, resta.

restano 2153. partiti per 7. avanza 4. dunque sù feria 2.  
Mercordì il dì 3. Febbrajo giorno di S. Biagio 1706. &c.

10. D. Come si trova la decima quarta luna termine Pasqua  
Calendario vecchio?

R. Se l' Epatta vecchia sia meno di 26. si levi da 47. ma se è  
più si levi da 46. il numero rimasto cominciando à conti-  
primo di Marzo dimostra il giorno della Luna 14. e del ter-  
Pasquale. Per esempio, si trovi la 14. Luna del 1695. l'Epatta  
levi da 47. resta 33. che contando dal primo di Marzo. vi  
14. Luna, è termine Pasquale alli 2. d' Aprile.

11. D. Come si trova la Luna 14. per il Calendario nuovo?

R. Se l' Epatta nuova non è maggior di 23. si levi da 44. m-  
maggiore, purchè non sia 24. o 25. di vario carattere, o  
da 43. se 24. o 25. di diverso carattere, o colore dai 42. il  
numero contando dal primo di Marzo dimostra il gior-  
quale la Luna 14. è termine Pasquale accaderà. Si voglia f-  
luna 14. è termine Pasquale del 1706. l'Epatta 15. levat-  
resta 29. ed à dì 29. Marzo sarà la 14. Luna, è termine P-  
Il quale giorno ha la lettera D, che fino alla lettera C Do-  
le dell'anno 1706. ci sono 6. sicchè la Pasqua sarà à dì 4. A-  
termini Pasquali sono da 22. Marzo fino alli 29. Aprile.  
quando il numero restato è meno, si comincia à contare d-  
d' Aprile. Per esempio si cerchi il termine Pasquale del  
Epatta è 26. sottratta da 43. resta 17. ed à dì 17. Aprì-  
termine Pasquale, e perchè è Domenica, per non conve-  
gl' Ebrei, la Pasqua sarà la Domenica seguente, cioè  
Aprile, ma se si fosse pigliato 17. per Marzo, allora la  
ca sarà stata alli 20. di Marzo segnato con la lettera B,  
guentemente la Pasqua fuor de termini Pasquali, &c.

12. D. Come si trova il giorno, nel quale si celebra la F-  
laltre Feste mobili, ed in numero delle Domeniche fra  
coste, e l'Avvento, i digiuni de quattro tempi, ed altro  
si voglia anno?

R. Trovata la 14. Luna, e termine Pasquale come di sopra  
à 29. di Marzo segnato con la lettera D, che fino alla  
Domenicale del medesimo anno ci sono 6. sicchè la P-  
à dì 4. Aprile. Tornando indietro 6. settimane, cioè  
giorni 42. avremo la prima Domenica di Quaresima  
Febbrajo, e 4. giorni avanti il primo giorno di Quares-  
le Ceneri à dì 17. Febbrajo. Adì 14. la Quinquagesima  
la sessagesima, ed à dì 31. Gennajo la Settagesima. Al  
Pasqua aggiunte 5. Settimane cioè giorni 35. S' averà

K k k k k a



delle Rogazioni alli 9. di Maggio, ed aggiunti 4. giorni, s'averà l'Ascensione à dì 13. Maggio, ed aggiunti altri 10. giorni si avrà la Pentecoste alli 23. del medesimo mese, ed aggiunti di nuovo altri 7. giorni s'averà la Domenica della Santissima Trinità alli 30. Maggio, ed aggiunti di più 4. giorni s'averà la solennità del Corpo di Cristo alli 3. Giugno.

Per sapere adesso quante Domeniche intervengono frà la Pentecoste e la prima Domenica dell'Avvento; Si trovi quante Domeniche siano da Pasqua fino alli 23. d'Aprile, giorno di S. Giorgio. Ovvero quante siano dalla Pentecoste fino alli 11. di Giugno, giorno di S. Barnaba, che essendo 2. nel detto anno 1706. si aggiungono à 24. e saranno 26. Domeniche. Mà se la Pasqua, e la Pentecoste saranno dopo dette Feste, saranno solo Domeniche 23. Le sopradette 26. Domeniche importano 27. Settimane; onde moltiplicate per 7. fanno giorni 189. Ora si sommino tutti i giorni dalla Pentecoste fino à dì 27. di Novembre, perchè prima non può succedere la prima Domenica dell'Avvento, cioè giorni 8. di Maggio, 30. di Giugno, 31. di Luglio, 31. d'Agosto, 30. di Settembre, 31. d'Ottobre, e 27. di Novembre, fanno 189. e per arrivare à giorni 189. detti di sopra, ci vuole 1. che aggiunto à 27. Novembre, fa 28. ed à dì 28. Novembre è la prima Domenica dell'Avvento, ci sono giorni 27. fino à dì 25. Dicembre Natale del Signore, che succederà in Sabato.

I digiuni de' quattro tumpi sono, il Mercoledì, Venerdì, e Sabato dopo la terza Domenica dell'Avvento, ovvero dopo Santa Lucia, dopo la prima Domenica di Quaresima, dopo la Pentecoste, e dopo l'Esaltazione della Santa Croce, e gl'accenna questo verso. *Post Crux, post Cineres, post Spiritus, atque Lucia.*

13. D. Come si può sapere quanti giorni abbia la Luna per annunciarli nella lezione del Martirologio?

R. Si sommi il numero dell'Epatta dell'anno che corre, il numero de' giorni del mese corrente con il numero de' mesi scorsi da Marzo, se la somma non arriva a 30. dimostra il numero de' giorni, che hà la Luna: Mà se sopravanza 30. levato 30. il restante numero è de i giorni della Luna. Nel mese però di Gennaio, e Febbrajo non si somma il numero de i mesi passati da Marzo con l'Epatta nuova. Ovvero si adopri l'Epatta dell'anno antecedente: Come adì 10. Marzo 1707. quanti giorni hà la Luna? sommiassi 15. d'Epatta con 10. giorni del mese, ed 1. del mese di Marzo, fa 26. e tanti giorni hà la Luna.

17. D. Chè cosa è il Periodo Metonico ?

R. Il Periodo Metonico è una rivoluzione di anni 19. li quali finiti Metone famoso Astronomo degl' Ateniesi , che fiorì l'anno 430. incirca avanti la Nascita di Cristo , volle , che l'anno lunare convenisse appunto con solare , e stabilì questo di giorni 365. ore 6. 18. prime, 56. seconde, 50. terze, 31. quarte, 35. quinte, e l'anno lunare di giorni 354. ore 9. 11. prime, 29. seconde, 21. terze, 42. quarte, ed il mese lunare di giorni 29. ore 12. 45. prime, 47. seconde, 26. terze, 48. quarte, 30. quinte, da questo periodo hà avuto origine il Ciclo lunare , d' l'aureo numero .

18. D. Che cosa è il Periodo Calippico ?

R. Questo costa di 4. Periodi Metonici, ed è una rivoluzione di anni 76. si denominò da Calippo , che visse anni 100. in circa dopo Metone , e il suo periodo fù ricevuto come esatto dagl' Astronomi , e Tolomeo se ne servì molte volte .

19. D. Il principio di questo periodo a qual'anno del periodo Giuliano , del quale dirò poi , corrisponde .

R. Corrisponde all'anno 4384. nel solstizio dell'estate. E perciò proposto qualsivoglia anno del periodo Calippico per trovare l'anno del Periodo Giuliano , si moltiplicano i Periodi Calippici compiti per 76. aggiungendo gl'anni di più , e la somma si aggiunge a 3483. e si averà l'anno del Periodo Giuliano. Tolomeo lib. 6. pag. 142. dice , che si eclissò la Luna l'anno 37. del terzo Periodo Calippico. Per trovare in che anno del Periodo Giuliano successe tal'Eclisse , due Periodi erano già compiti , che però si moltiplica 76. per 2. al prodotto 152. aggiunti 37. anni correnti , risulta la somma 189. che si aggiunge a 4383. e ne viene 4572. anno del Periodo Giuliano corrente . Al contrario: sapendosi l'anno del Periodo Giuliano , si trova l'anno del Periodo Calippico sottrarre 4383. da 4572. anno ; per esempio proposto il restato numero 189. si parte per 76. e risultano due Periodi Calippici compiti , e restano 37. anni del terzo corrente .

20. D. Che cosa è il Periodo Dionisiano .

R. È una rivoluzione di anni 532. instituito da Dionisio Esiguo, benchè altri l'appropriano a Vittorio Aquitano , e lo chiamano Vittoriano . Il numero 532. è prodotto dalla moltiplicazione di 28. Ciclo solare via 19. Ciclo lunare , e passati anni 532. ritorna no i medesimi numeri di Cicli , e in questa maniera nel primo anno il Ciclo del Sole è 1. e della Luna 1. nel secondo anno il Ciclo del Sole è 2. e parimente della Luna 2. Nell'anno ventesimo il Ciclo del Sole è 20. ma della Luna 1. e per tutta la serie di 532. non si averà mai la medesima combinazione di numeri sino che cominci di nuovo . . .

21. D.

21. D. Proposto qualivoglia anno del periodo Dion  
 si trova il Ciclo del Sole, e della Luna, che in que  
 R. Il numero del proposto anno per esempio 268. si  
 l'avanzo 16. è il Ciclo del Sole. Pare 268. si parte  
 zo 2. è il Ciclo della Luna del detto anno, quando a  
 Sole il Ciclo è 28. della Luna 19.
22. D. Come si trova l'anno del periodo Dionisiano  
 Sole, e della Luna?  
 R. Sia il Ciclo del Sole 16. e della Luna 2. si moltiplica  
 per 476. la somma de' prodotti 912. e 952. che è 1864  
 per 532. anni di tutto il periodo. L'avanzo 268. è l'  
 come sopra, e così sempre.
23. D. Che cosa è il periodo Giuliano?  
 R. Il priodo Giuliano, come si ha da Giuseppe Scalig  
 rivoluzione di anni 7980. numero prodotto dalla m  
 di 28. Ciclo Solare via 19. Ciclo Lunare, e via 19  
 La prerogativa di questo periodo è che ciascun'ann  
 numero de' Cicli distinto, che non ha altr'anno di ta  
 luzione, se non quando ricomincerà.
24. D. Proposto qualsivoglia anno del periodo Giulia  
 trovano i Cicli à tale anno corrispondenti.  
 R. Dagli avanzi, che vengono dal partire il numero  
 posto per 48. per 19. e per 15. Onde proposto l'ann  
 Giuliano 3860. Il Ciclo del Sole è 24. della Luna 3.  
 ne 5.
25. D. Come da Cicli del Sole, della Luna, e dell'Ind  
 l'anno del periodo Giuliano?  
 R. Si moltiplica il numero del Ciclo del Sole per 484  
 per 4200. e dell'Indizione per 6916. per regola fer  
 de' prodotti si parte per 7980. anni dell'intero peri  
 zato numero è l'anno del periodo Giuliano. Com  
 li del Sole 23. della Luna 2. e dell'Indizione, si mol  
 4845. e 3. per 4200. e 5. per 6916. li prodotti 1462  
 34580. si sommano, la somma 163460. si parte per  
 7980. e l'anno del periodo Giuliano.
- Il numero 4845. si ha dalla moltiplicazione di 19. v  
 che si moltiplica via 17. e risulta il detto 4845. il 17  
 partire per 28. il prodotto 285. e l'avanzo 5. si mol  
 numero, che il prodotto sia il minimo, che partito  
 za 1. e questo è il detto 17. che moltiplicato per 5.  
 e questo partito per 28. avanza 5.
- Parimente il numero 4200. si ha dalla moltiplicazione

15. fa 420. che si moltiplica via 10. e risulta il detto numero 4200. il 10. si trova col partire per 19. il prodotto 420. e l'avanzo 2. si moltiplica per un numero, che il prodotto sia il minimo, che partito per 19. avanzi 1. e questo è detto 10. che moltiplicato per 12. avanzo fa 20. e questo partito per 19. avanza 1.

Finalmente il numero 6916. si ha dalla moltiplicazione di 28. via 19. fa 532. che si moltiplica via 13. e risulta il detto 6916. Il 13. si trova col partire 532. per 15. l'avanzo 7. si moltiplica per un numero, che il prodotto sia il minimo, che partito per 15. avanzi 1. e questo è il detto 13. che moltiplicato per 7. avanzo fa 91. e questo partito per 15. avanza 1.

Avvertasi, che la somma di 4845. di 4200. e di 6916. e 15961. doppio di 7980. prodotto de tre Cieli, più 1.

26. D. Come per l'anno del periodo Giuliano, si trova l'anno di Cristo?

R. Dal numero dell'anno del periodo Giuliano, si sottra 4713. e resta l'anno di Cristo. Come sia l'anno del periodo Giuliano 6427. da questo si sottra 4713. resta 1714. anno di Cristo. Perche il primo di Cristo corrisponde all'anno del periodo Giuliano 4714.

27. D. Come per l'anno di Cristo, si trova l'anno del periodo Giuliano?

R. Al numero dell'anno di Cristo si aggiunge 4713. e viene l'anno del periodo Giuliano. Come sia di Cristo 1714. a questo aggiungito 4713. risulta 6427. anno del periodo Giuliano.

28. D. Che cosa è l'Era, o Epoca, e di quante sorti è?

R. E' un termine fisso, dal quale si cominciano a numerare gl'anni, ed è di quattro sorti Era Cristiana, o Giudaica, o Gentile, o Maomettana.

29. D. L'Era Cristiana quando principiò, e da chi fu instituita?

R. Principiò dalla Nascita di Cristo contando dal primo di Gennaio l'anno del periodo Giuliano 4714. Ciclo del Sole 10. della Luna 2. dell'Indizione 4. e ne fu institutore Dionisio Efigio, il quale visse Imperando Giustiniano circa gl'anni di Cristo 530. perchè insino allora i Cristiani si erano serviti dell'Epoche de' Gentili, benchè gl'Egizzj intorno gl'anni di Cristo 300. instituiròno l'Era denominata dell'empio Diocleziano.

30. D. Quando cominciò l'Era Diocleziana detta de' Martiri?

R. Cominciò li 29. d'Agosto l'anno dell'Era Cristiana 284. l'anno del periodo Giuliano 4997. e finì dopo l'anno di Cristo 532. sostituita l'Era Cristiana da Dionisio, che si usò dagl'Egizzj non meno, che dagl'altri Cristiani.

31. D. Proposto l'anno dell'Era de' Martirj Diocleziana, come si trova l'anno di Cristo?

R. Al

- R. Al numero dell'anno proposto si aggiunge 283. e si di Cristo, e dall'anno di Cristo si leva 283. e resta l'acleziano, perchè l'Era di questo cominciò li 29. d' 284. di Cristo, come si è detto.
32. D. Quante sono l'Ere, che si numerano dalla e mondo da Greci?
- R. Sono tre, delle quali si sono serviti gl'Orientali: un'altra Ecclesiastica, l'ultima Civile, o politica. L'istla, che suppone esser passati anni intieri 5500. sino di Cristo, al dire di Giorgio Monaco, seguitato dal ceforo, ed Eutichio Arabo nell'Anna li Alessandrina suppone la Nascita di Cristo dopo anni 8. all'Era Cgare, che però scrivendo il sopradetto Eutichio esse 276. dal Natale di Cristo sino all'Imperio di Diocleono aggiungere à 276. anni 8. e si averà l'anno 2 detto antecedentemente.
33. D. Quale è l'Era de Greci Ecclesiastica?
- R. E' quella, che pone la Nascita di Cristo nell'anno e del mondo, e detto anno 5494. cominciò alli 29. d' del periodo Giuliano 4714. Autore di questa Era doro, che visse imperando Arcadio, e se ne serve Eistoria de Saracini, e la distingue dagl'anni lunari fuga di Maometto dalla Mecca.
34. D. Come si riduce l'anno di questa Era all'anno R. Dall'anno proposto di tal Era si sottra 5492. e il rimane è l'anno di Cristo; per esempio, Elmacino r ratinica lib. 2. c. 7. dice, che Aba Abdalla Alamino di Egira anni 197. giorni 25. ed anni solari 6305. g rì dunque l'anno corrente di questa Era 6305. da 5492. resta 813. anno corrente di Cristo.
35. D. Qual è l'Era civile de Greci?
- R. E' quella, che conta anni compiti 5508. del mondo primo di Cristo, e siccome l'Era Ecclesiastica lev Ciclo Pasquale, così questa ne aggiunge 8. per l'Era istorica, e partendosi l'aggregato per 15. l'a numero dell'Indizione. Per il che facendo, che l'anno del Mondo 5509. questo diviso per 15. lasci per l'Indizione, e così l'anno 5509. di questa Era dell'Era Cristiana, e levando 5508. dell'anno di qu l'anno di Cristo. Per esempio, nel tomo dell'uni tempi di Costantino si legge. Decretiamo per fen dicio commune, che da quest' anno presente, che

6428, indizione A. nessuna passi alle quarte Nozze; Ma sieno proibite. Volendo sapere in che anno di Cristo fu fatto questo decreto da 6428. si sottra 5508. il restato 920. è l'anno di Cristo, nel qual si fece la proibizione delle quarte Nozze.

36. D. Qual'è l'Era Giudaica dalla creazione del Mondo?

R. E' quella, il di cui primo anno cominciò a 7<sup>o</sup> d' Ottobre del periodo Giuliano 953. e correndo il primo anno dell' Era Cristiana cominciò l'anno Giudaico 3762. dall' Autunno.

37. D. Proposto l'anno del periodo Giuliano, ovvero l'anno di Cristo, come si trova l'anno Giudaico, che gli corrisponde?

R. All'anno del periodo Giuliano, per esempio 6427, si leva 952. resta 5475. ed all'anno di Cristo, per esempio, 1714. si aggiunge 3761. la somma pure 5475. è l'anno Giudaico cercato.

38. D. Proposto vice versa l'anno Giudaico, come si trova l'anno del periodo Giuliano, o di Cristo?

R. All'anno Giudaico per esempio, 5475. si aggiunge 952. e torna l'anno del periodo Giuliano 6427. ovvero si levi da esso 3761. resta 1714. anno di Cristo, nel quale io scrivo questo. Si avverta, che secondo il costume de' Giudei nel notare gl' anni lasciano il numero delle migliaia onde per trovare l'anno di Cristo, per esempio, Beniamino nella prefazione del libro delle cose degne di memoria successe l'anno 933. nel viaggio in Castiglia. A 933. si aggiunge 239. e viene 1172. anno di Cristo, perchè nell'anno di Cristo 239. finirono 2000. anni dell'Era Giudaica. Di più si parte l'anno Giudaico per 28. o per 19. si averà il Ciclo del Sole per la prima divisione, e per la seconda il Ciclo della Luna.

39. D. Quante sono le principali Epoche de' Gentili instituite denominate da luoghi?

R. Sono tre, la Trojana, la Romana, e l'Antiochena.

40. D. Qual'è l'Epoca Trojana?

R. E' quella, il di cui primo anno fu del periodo Giuliano 3531. come si ritrae da Diodoro Siculo, il quale dice, che il primo anno dell'Olimpiade 94. fu l'anno 780. dopo l'estermínio di Troja. Ora il primo dell'Olimpiade 94. era 4310. del periodo Giuliano, da i quali levati anni 780. scorsi dalla rovina di Troja, restano 3530. Dunque il primo dell'Epoca Trojana, fu del periodo Giuliano 3531. Tuttavia non si può determinare cosa di certo.

41. D. Qual'è l'Epoca Romana?

R. E' quella, che si numera dall' Edificazione di Roma, ed una è Varroniana, e Paltra Capitolina. La Varroniana cominciò l'anno del periodo Giuliano 3961. denominata da Marco Varrone, che,

che , come riferisce Plutarco il primo anno dell'edificazione di Roma riporrebbe nell'anno terzo della festa Olimpica corrisponde l'anno del periodo Giuliano 3960.

**La Capitolina** , così chiamata dal Pettavio cominciò il periodo Giuliano 3962. un'anno dopo la Varroniana.

**42. D.** Proposta l'Epoca , è l'anno dell'edificazione di cui si trova l'anno del periodo Giuliano?

**R.** Al numero dell'anno si aggiunge 3960. e si avrà l'anno del periodo Giuliano , secondo il computo Varroniano , e secondo 3961. si avrà l'anno del periodo Giuliano , secondo Capitolino , e perchè l'anno primo di Cristo fu l'anno Giuliano 4714. se da questo si sottra 3961. si avrà l'anno Capitolino ab Urbe condita , benchè secondo il M. Anno 752.

**43. D.** Qual' è l'Epoca Antiochena?

**R.** E' quella , che denominata dalla recuperata libertà si cominciò nell'Autunno l'anno del periodo Giuliano proposto l'anno di questa Epoca si aggiunge 4664 l'anno del periodo Giuliano . Per esempio . Evagrio dice , che Giustiano fu dichiarato Imperatore il 1.º l'anno 575. dell'Era Antiochena . Volendo sapere l'anno del periodo Giuliano corrisponde , a 575. si aggiunga la somma 5239. è l'anno del periodo Giuliano , in cui fu dichiarato Imperatore : Ma il mese d'Aprile , nel qual tempo l'Imperatore concorre nell'anno del periodo Giuliano questo levato 4713. resta l'anno di Cristo 527. nella tale acclamazione .

**44. D.** In che anno del periodo Giuliano fu celebrata l'Olimpiade ?

**R.** Fu celebrata l'anno del Periodo Giuliano 3938 dopo il Solstizio Estivo , denominata dalla Città vicina al fiume Alfeo nella Grecia , e nelle sue faccende cinque giochi Olimpici , che duravano quei giorni , e tornavano a farsi dopo 4. anni .

**45. D.** Come per l'Olimpiadi si trova l'anno dell'Epoca ?

**R.** L'intero Olimpiadi si moltiplicano per 4. e così anni di più , ed ancora 3937. del periodo Giuliano cominciarono , e la somma sarà l'anno dell'Epoca . Alessandro morì nel principio dell'Olimpiade che anno del Periodo Giuliano ? Si moltiplica la somma per 4. al prodotto si aggiunge 1. per l'anno della Olimpiade , a questo si aggiunge 3937. la somma ,

111112

periodo Giuliano, nel quale morì Alessandro.

46. D. Come proposto l'anno del periodo Giuliano si trovano le Olimpiadi?

R. Sia l'anno del periodo Giuliano 4714. che fu il primo di Cristo 4714. si sottra 3937. resta 777. che si parte per 4. il quoziente 194. sono le Olimpiadi intiere create.

47. D. In che anno del periodo Giuliano, e di Cristo furono instituiti li combattimenti Capitolini da Domiziano?

R. Questi combattimenti furono instituiti l'anno del periodo Giuliano 4799. e di Cristo 86. a tenore dell'Olimpiadi, da farsi passati li 4. anni.

48. D. Proposto l'anno Capitolino, come si trova l'anno del periodo Giuliano, e di Cristo corrispondente?

R. Il numero dell'anno Capitolino si aggiunge a 4798. e la somma è l'anno del periodo Giuliano, ovvero si aggiunge 85. e si averà l'anno di Cristo: Clemente Alessandrino dice, che dal primo combattimento Capitolino fino alla morte di Commodo Imperatore passarono anni 111. se questi si sommano con 4798. fanno 4909. anno del periodo Giuliano, ma sommandosi con 85. fanno 196. anno di Cristo.

49. D. Quando Giulio Cesare Dittatore aggiustò l'anno Romano, detto l'anno della confusione per essere stato di 445. giorni, che anno del periodo Giuliano correva?

R. Correva l'anno del periodo Giuliano 4668. e cominciarono gl'anni Giuliani il primo Gennaio 4569. avanti la Nascita di Cristo anni 45.

50. D. Proposti gl'anni Giuliani come si trova l'anno del periodo Giuliano, e l'anno di Cristo?

R. Agl'anni Giuliani si aggiunge 4668. e si averà l'anno del periodo Giuliano, ovvero da essi si sottra 45. e resta l'anno di Cristo. Censorino commentò il suo libro del giorno natalizio nell'anno Giuliano 283. a questo aggiunto 4668. la somma 4951. è l'anno del periodo Giuliano. Ovvero da 283. si sottra 45. e resta 238. anno di Cristo, nel quale Censorino scrisse.

51. D. Quando cominciò l'Era Ispanica?

R. L'anno del periodo Giuliano 4676. avanti Cristo anni 38.

52. D. Come per gl'anni di questa Era si trova l'anno del periodo Giuliano, e di Cristo?

R. Al numero del proposto anno di questa Era si aggiunge 4675. e si averà l'anno del periodo Giuliano; ovvero si leva 38. e resta l'anno di Cristo; per esempio, il quarto Concilio Cartaginese fu celebrato da 314. Vessovi l'Era Ispanica 436. domando l'anno del periodo.



periodo Giuliano, e di Cristo l'anno 430. si somma con 4075. viene  
5111. anno del periodo Giuliano. Ovvero da 436. si leva 38. e re-  
sta l'anno di Cristo 398.

53. D. Quando comincio l'Era dell' Azziaca Vittoria?

R. Questa Era denominata dalla Vittoria riportata da Augusto  
contro Antonio, e Cleopatra in battaglia navale, appresso Az-  
zio promontorio dell'Epiro, dove fu fabbricata una Città per l'  
istessa vittoria detta Nicopoli, cominciò li 29. Agosto l'anno del  
periodo Giuliano 4684. anni 30. avanti la Nascita di Cristo. Gli  
anni di questa Era si domandano Azziaci, Egizziaci, ed ancora  
anni degl' Augusti.

54. D. Censorio attese a scrivere il suo libro, come esso testifica.  
l'anno degl' Augusti 267. si vuol sapere in che anno del periodo  
Giuliano, e di Cristo fu?

R. A 267. si aggiunge 4683. e risulta 4950. anno del periodo Giu-  
liano, si leva 30. da 267. e resta l'anno di Cristo 237. nel quale  
scrivse Censorino.

55. D. Quante sono l'Epoche, che pigliano il nome dalle Persone?

R. Sono quattro, la Nabonassarea, la Filippea, l'Alessandrea, e l'  
Idegerdica.

56. D. Quando cominciò l'Epoca Nabonassarea?

R. Questa Epoca denominata dal Rè de Caldei Nabonassare co-  
minciò li 26. Febbraro l'anno del periodo Giuliano 3967.

57. D. Come per l'anno Nabonassareo si trova l'anno del periodo  
Giuliano?

R. Dall'anno primo fino a 227. si aggiunge 3966. la somma è l'an-  
no del periodo Giuliano, ma dall'anno 227. di Nabonassare a  
1688. si aggiunge 3965. e da 1688. a 3149 si aggiunge 3964. e si  
averà l'anno del periodo Giuliano. Tolomeo lib. 4. pag. 105. di-  
cendo, che si eclissò la Luna l'anno di Nabonassare 366. per sapere  
in che anno del periodo Giuliano successe tal Eclisse, per essere il  
detto anno frà 227. e 1668. a 366. si aggiunge 3965. e risulta  
4331. anno del periodo Giuliano.

58. D. Come si riduce l'anno del periodo Giuliano all'anno di Na-  
bonassare?

R. Se l'anno del periodo Giuliano è maggiore di 3967. ed è minore di  
4193. dall'anno proposto si sottra 3966. ma essendo maggiore di  
4193. e minore di 5633. si sottra 3965. se poi è maggiore di 5633.  
e minore di 7113. si sottra 3964. e il restato numero è l'anno di  
Nabonassare. Come essendo l'anno del periodo Giuliano 4714.  
che fu il primo dell'Era Cristiana, per essere maggiore di 4193. e  
minore di 5633. da 4714. si sottra 3965. resta 749. anno di Na-  
bonassare.

59. D.

59. D. Quando cominciò l'Epoca Filippo?

R. Dopo la morte di Alessandro Magno, Arideo come suo Fratello fù assunto all' Imperio, e si chiamò Filippo, da cui questa Epoca si denomina, che cominciò li 12. Novembre l'anno del periodo Giuliano 4390. e di Nabonassare 425. onde agl' anni di questa Epoca, che si numerano dalla morte di Alessandro Magno si aggiunge 424. e si averà l' anno di Nabonassare, e per questo si averà l' anno del periodo Giuliano, come per la passata Domanda.

60. D. Quando cominciò l'Epoca Alessandrea?

R. Questa denominata da Alessandro Magno cominciò 12. anni, dopo la sua morte, cioè l'anno 4402. del periodo Giuliano; onde al proposto anno Alessandreo si aggiunge 4401. e la somma è l'anno del periodo Giuliano. Gl'anni di questa Epoca si chiamano anche anni de' Greci, de' quali il libro primo de' Maccabei si serve; Perciò dicendosi al Cap. 7. che Demetrio Figliuolo di Seleuco uscì dalla Città di Roma l'anno 151. s' intende de' Greci. Per sapere in qual' anno del periodo Giuliano convenga, à 151. si aggiunge 4401. e risulta 4552. anno del periodo Giuliano, nel quale cominciò l'anno 151. Alessandreo, ed in questo uscì da Roma Demetrio.

61. D. Quando cominciò l'Epoca Isdegerdica?

R. Questa denominata da Isdegerde ultimo Rè di Persia, ammazzato da Saracini, ò Muslimi, cominciò li 16. di Luglio l'anno del periodo Giuliano 5345. di Cristo 632. per ilchè se all'anno Isdegerdico è minore di 670. si aggiunge 631. ma se è maggiore di 670. si aggiunge 630. e la somma è l'anno di Cristo.

62. D. Come per l'anno di Cristo si trova l'anno Isdegerdico?

R. Se l'anno di Cristo è minore di 1300. si leva 631. se maggiore si leva 630. e resta l'anno Isdegerdico. Onde da quest'anno di Cristo 1714. che è maggiore 1300. si leva 630. resta 1084. anno Isdegerdico.

63. D. Quando cominciò l' Era Maomettana, ò di Egira?

R. Cominciò il dì 15. ò come vogliono altri, il dì 16. Luglio l'anno del periodo Giuliano 5335. di Cristo 622. Cielo del Sole 15. della Luna 15. Indizione 10. quando Maometto falso Profeta fuggì dalla Mecca sua patria in Medina, significando la parola Arabica Egira in lingua nostra fuga.

64. D. Come per gl'anni di Egira si trova l'anno di Cristo?

R. Dal numero dell'anno di Egira corrente si leva 1. e restano gl'anni intieri, che sono Lunari, quest'anni intieri si partono per 30. il quoziente si moltiplica per 7836. Ore, che 30. anni Giuliani superano.

importano giorni 10957. ore 12. e 30. anni Maomettani, de' quali 19. sono comuni, importano giorni 10631. i quali sottratti da 10957. ore 12. restano giorni 326. ore 12. cioè ore 7836.) il numero prodotto sono ore sopravanzate dagl'anni Giuliani negl'anni di Egira proposti, perichè dette ore si partono per 8766. che tante fanno un'anno Giuliano. il quoziente, sono anni da sottrarsi dagl'intieri proposti di Egira, ed al numero avanzato si aggiunge 622. anno dell'Era Cristiana, nel quale cominciò il primo di Egira, e la somma è l'anno di Cristo cercato.

Per esempio, sia corrente l'anno di Egira 1126. levato 1. restano anni intieri 1125. che si partono per 30. il quoziente  $37\frac{5}{6}$ . si moltiplica per 7836. il prodotto 293800. si parte per 8766. il quoziente 33. si sottra da 1125. resta 1092. al quale si aggiunge 622. la somma 1714. è l'anno di Cristo.

65. D. Come proposto l'anno corrente di Cristo si trova quello d'Egira?

R. Si opera brevemente così, dal numero dell'anno di Cristo si sottra 621. il restato numero è degl'anni Giuliani scorsi dal primo d'Egira, che si parte per 33. il numero quoziente si aggiunge al numero restato dal sottrarsi 621. e viene l'anno d'Egira. Sia il presente anno corrente 1714. dal quale si sottra 621. resta 1093. che si parte per 33. e dà pure 33. di quoziente, che si aggiunge a 1093. e viene 1126. anno di Egira.

Aliunabio, e Leoclavio affermano, come testifica Eduardo Procopio, la Città di Costantinopoli essere stata presa da Maometto Cano l'anno di Egira 858. si vuol sapere in che anno di Cristo successe. Si leva 1. da 857. resta 856. che si parte per 30 il quoziente  $28\frac{2}{3}$ . si moltiplica per 7836. il prodotto 223587. si parte per 8766. ne viene 25. che si sottra da 856. al restato numero 831. si aggiunge 622. e risulta 1453. anno di Cristo, nel quale fu presa Costantinopoli secondo questo computo. Altre particolarità si tralasciano, siccome altre Ere, ed Epoche, che rarissimamente occorrono.

Per terminare il presente libro finito di comporre, e stampare sul principio dell'anno di Cristo 1714. dalla creazione del Mondo 6912. del periodo Giuliano 6427. del Ciclo del Sole 15. dell'aureo numero 5 dell'indizione 7. dell'Epatta 14. lettera Domenicale g. lettera del Martirologio p. del periodo Calippico ventesimo settimo anno 68. del periodo Dionisiano secondo anno 43. dell'anno de Martiri Diocleziano 1431. Dell'anno computo greco Istoric 7213. Ecclesiastico 7206. politico, o civile 7221. dell'

24  
dell' anno Giudaico 5475. dall' Edificazione di Roma anno 2466.  
Dell' Olimpiade 623. anno secondo. Del combattimento Capito-  
lino 407. anno primo. Dell' Edizione Giuliana anno 1759.  
Dell' Era Ispanica 1752. Dell' Azziaca vittoria anno 1744. Di Na-  
bonaffare Rè de Caldei anno 2463. Dell' Epoca Filippea anno  
2039. Dell' Epoca Aleffandrea anno 2026. D' Isdegerde Rè de Per-  
fi anno 1084. e di Egira anno 1136. dell' Autore del Libro presen-  
te l' anno 54. verso.

**I L F I N E.**



